續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

九九二・子部・醫家類

本草彙言二十卷　〔明〕倪朱謨撰……一
本草原始十二卷（卷一至卷八）　〔明〕李中立撰……五七七

蘄州李瀕湖先生增訂
錢塘倪純宇先生選集

繪圖本草綱目彙言

大成齋藏板

序

醫雖方術其原寔与六經相表裏六經始羲易終二典而囊黄帝經靈素介在書易之間

毉固聖人所始謀也易類萬物之情詩多識鳥獸艸木在六經已寓有本草儒者寧可不溯求其義乎本草彙

十家類皆名儒續學之所爲自陶隱居著爲錄唐高宗因之命李英公蘇恭長史長孫太尉等幾經區訂壹歸老本

北宋後因之而爲盧學士之開寶掌秘閣之嘉祐蘇博士之圖經啓源翻藉日以賅備當時纂輯者非元老勳碩則

館閣英賢誠重之也然以詔命崇巍輶軒遍徵搜採考證較易爲功若夫身伏衡茅業專帖括以高[illegible]之餘功探

蒼黃之紛賾自非超邁研覈未可與語此也侄孫純寓遭擲華年埋頭場屋獨能重通物性索攬軒岐參綜條

實不偏不黨而且繁者芟之闕者補之訛者正之澀者開之編集錄之四彙之為之序之如李瀕湖之綱目陳月朗之蒙筌繆仲淳之經疏角立並峙乎以羽翼吾人啓迪來者厥功懋焉故樂為之序

時

天啓甲子陽月

賜進士第

經筵展書纂修

記注翰林院編修叔祖

元璐撰并書

元璐之印

鴻寶

大清順治乙酉冬仲重摹

本草彙言

凡例八則

一是書先會神農本經次錄陶弘景別錄次唐本草唐新定本草次甄權藥性本草次孫思邈千金食治次陳藏器本草拾遺次蜀孟昶本草次宋開寶本草次宋嘉祐本草次日華本草次東垣用藥法象次丹溪衍義補遺以至會編蒙筌并元明舊本不下四十餘種最後李氏瀕湖本草綱目該博倍于前人第書中兼收並列已甚辨別之功後賢評驗確論每多重載（謨）更加甄羅補訂删繁去冗僭曰彙言志要也志純也

一本草諸書可云淵廣然歷攷之主其說而古今人有不然者是知用藥之神妙非可執一不容黷質弗辯也（謨）蒐輯往代名言庶無滲漏復自周遊者直于都邑市廛幽巖隱谷之間偏訪耆宿登堂請益採其昔所未詳今所屢驗者一一核載校李氏原本稍有減增用供國手之取裁殊有大裨云

一論藥集方必見諸古本有據時賢有驗者方敢信從每論一方必註姓氏出處公諸天下猶恐字有訛脫貽悞于人復再三攷訂而存之締觀旁註畧見苦心至于芟繁汰複尤不待言

一藥品既詳辯其味其氣其性之有毒無毒力之升降浮沉入某經列于首條次載生成出處何時發生何時收

采形與何藥相似披訂前言眞確有據仍列前人姓氏廣綱目之未備者殊多

一本草諸書先敘氣味陰陽升降莫不亟言主治但云主治者必出于獨斷獨用乃可是書備引古今名家未拘一說故不得直標主治二字觀其主論處方即可以意消息之庶一藥不執于一說不滯于一用而化裁出焉識者鑒之

一凡藥治病有所宜者必有所忌者取所宜而不知所忌以致愈而復發發而轉劇或別變他證者往往有焉茲列其宜必詳陳其忌可爲取舍之準

一神農嘗百草而定藥故其書曰本草意必先以草爲正嗣後果木金石禽魚等類繼之故集中先列草部然取藥求其切于治病耳方士家謂可以供爐鼎服食如先賢韓柳歷陳服鍾乳金丹之悞不止一人下及砒石可化熱痰生漆可補腦髓一切荒誕之談悞聽之而橫夭者多矣槩屏不錄所以正道術闢邪說也

一集古今原本無取屈詞失實然綱目臚列繁碎難于記誦集中俱融貫爲章句可讀可記不至顧此失彼神而明之于是乎在

本草彙言總目錄

卷之一

草部（山草類）

葳蕤　人參　黃耆　甘草
白朮　天麻　桔梗　知母
沙參　遠志　巴戟天　肉蓯蓉
瑣陽　玄參　丹參　地榆
白頭翁　黃芩　秦艽　黃連
胡黃連　龍膽草　細辛　白薇
白前　前胡　柴胡　防風
獨活　羌活　升麻　苦參

本草彙言總目錄　一

玄胡索　貝母　貫衆　紫草
黃精　仙茅　淫羊藿　狗脊
紫參　山漆　白芨　蒼朮

卷之二

草部（芳草類）

廣木香　白豆蔻　香附子　縮砂仁
蓬莪朮　荆三稜　芎藭　蘼蕪
當歸　白芍藥　赤芍藥　牡丹皮
白芷　山柰　藁本　蛇牀子
甘松香　香薷　藿香　蘭草
澤蘭　益智子　高良薑　肉豆蔻
草豆蔻　草果仁　補骨脂　荆芥
紫蘇　荏草（即白蘇）　薄荷
鬱金　薑黃

卷之三

草部（隰草類上）

菊花　野菊花　艾葉　茵陳蒿
青蒿（子　黃花蒿　白蒿）　莽草　夏枯草
劉寄奴　旋覆花　紅藍花　大薊
小薊　續斷　漏蘆　苧根
大青　小青　胡盧巴　惡實
枲耳實　蠡實　豨薟草　麻黃（根節）

本草彙言總目錄　二

水紅花　木賊草　青葙子　燈心草

卷之四

草部（隰草類下）

生地黃　牛膝　紫菀　麥門冬
石龍芮　冬葵子　蜀葵　錦葵
酸漿草　漆姑草　敗醬草　款冬花
決明子　茳芏　瞿麥　淡竹葉
王不留行　三白草　葶藶子　車前子（葉）
鱧腸　連翹　藍澱　藍
青黛　蓼　水英　萹蓄
蒺藜　沙苑蒺藜　穀精草　海金沙

見睍消　紫花地丁　半邊蓮

卷之五

草部（毒草）類

大黃　商陸　狼毒　狼牙
山慈姑　蚤休　大戟　澤漆
甘遂（蕳茹）　續隨子　蓖麻子（葉　博落迴）
烟草　常山　藜蘆　附子（烏頭　側子）
（天雄　漏藍子）　草烏頭　白附子　天南星
玉簪花　半夏　羊躑躅　鬼臼
射干　鳳仙花　蕘花　芫花
海芋　透山根　鉤吻

卷之六

草部（蔓草）類

菟絲子（苗）　五味子　蓬虆　覆盆子
懸鉤子　蛇莓子　使君子　木鼈子
番木鼈　馬兜鈴（根名青木香）　豫知子（根）
牽牛子　紫葳花　營實墻靡　月月紅
栝樓實　天花粉　王瓜（子）　葛根（花）
天門冬　百部　何首烏　萆薢
土茯苓　白蘞　山豆根　黃藥子
白藥子　威靈仙　茜草根　防己
木通（子）　通脫木　白兔藿　蘿摩

絡石　木蓮

卷之七

草部（水草）類

澤瀉　羊蹄根　石菖蒲　香蒲
蒲黃　菰筍　蘋　水萍
海藻　昆布　海帶

草部（藤草）類

忍冬藤　鉤藤　白花藤　甘藤汁
黃藤　含水藤　天仙藤　清風藤
百稜藤　千里及　藤黃　地龍藤
龍手藤　牛領藤　牛奶藤　鬼臍藤

班珠藤　息王藤　百丈青　盪藤
藍藤　瓜藤　含春藤

草部（石草）類

石斛　地錦　骨碎補　石韋
金星石韋　石莧　虎耳草　景天火丹草
石胡荽　離鬲草　酸漿草

草部（苔草）類

陟釐　海苔菜　石蕊　井中苔
船底苔　地衣草　垣衣　屋遊
昨葉何草　土馬騣草　卷柏（地柏）　石松
桑花　馬勃

卷之八

木部（香木類）

桂（桂枝肉桂）（牡桂木犀花）　松脂　松實
松節　松葉　松花　柏子仁
側柏葉　胡桐淚　杉木　樟木（釣樟）
辛夷　沉香（奇南香）　丁香（枝皮）（白）
檀香（紫檀）　降眞香　榆木　烏藥
楓香脂　薰陸乳香　沒藥　騏驎竭
安息香　蘇合香　龍腦香　紫鉚
樟腦　阿魏　蘆會　孩兒茶

卷之九

木部（喬木類）

黃蘗　厚朴　杜仲　黃爐木
椿樗（根葉）　乾漆　海桐皮　楝實（根皮）
槐實　槐花（枝木皮）（葉根皮）　樺木皮
秦皮　無食子　合歡（枝子）　皂莢
皂莢子　皂莢刺　[illegible]　肥皂莢
無患子（莢核）　欒華木花　[illegible]　柳花（枝絮葉）
櫸柳　水楊枝葉（根皮）　白楊（木皮）　蕪荑
榆皮　楸木　蘇方木　烏桕木
巴豆　大風子（肉）　梓白皮　楸白皮
[illegible]（桐木皮）　梧桐子（栗木皮）　罌子桐油

卷之十

木部（灌木類）

桑根白皮（葉柴灰柘根白皮）　楮（實）（葉皮中白汁）　樹白皮
枳實　枳殼　黃楊木　巵子
酸棗仁　蕤核　山　金櫻子（花葉）
郁李仁（根）　女貞實　凍青子　枸骨刺
南天燭（枝葉）　五加皮　枸杞子　地骨皮
牡荊實（莖葉）　荊瀝　蔓荊實　紫金木皮
木槿花　木芙蓉　蠟梅　密蒙花
山茶花　柞木

卷之十一

木部（寓木類）

茯苓　琥珀　豬苓　雷丸
桑寄生　松寄生

木部（苞木類）

竹（篁竹葉甘竹葉）（淡竹葉苦竹葉）　竹茹　竹瀝
天竹黃

木部（雜木類）

古厠木　古櫬板　雷震木

服器部（服帛類）

故錦　黃絲絹　布　綿
裩襠　破漆器

卷之十二

金石部（金類）

金　箔　銀　箔（附白銀）　赤銅屑　銅　青

古文錢（附銅器）　黑　鉛　胡　粉　黃　丹

密陀僧　鉛　霜　鐵（附鐵落鐵華粉鐵精鐵鏽鐵砂）

（鐵漿鐵秤錘）（鐵蒺）水　銀（輕粉靈砂）（粉霜銀硃）

玉石類

玉　青琅玕　珊　瑚　瑪　瑙

雲　母　白石英　紫石英　菩薩石

金石類

石　青　空　青（曾青石綠）丹　砂（硃砂）雄　黃（雌黃）

花乳石　慈　石　自然銅　蛇含石

土石類

禹餘糧（太乙餘糧）滑　石　赤石脂　爐甘石

青礞石　代赭石

水石類

浮　石　石　膏　石鍾乳　麥飯石

石　蟹　石　燕

火石類

無名異　陽起石　石　炭　石　灰

毒石類

砒　石　礜石

卷之十三

石部（鹵石類）

鹽（戎鹽玄精石）凝水石　朴　硝（風化硝玄明粉）

硝　石　硇　砂　蓬　砂　石硫黃

礬　石　綠　礬　膽　礬

土部（火土類）

伏龍肝　百草霜　釜臍煤　京　墨

土部（水土類）

田中泥　井底泥　螺螄泥　蚯蚓泥

卷之十四

穀部（麻麥稷粟類）

胡　麻（油）大　麻（皮根）浮小麥　麥　粉

大　麥（芽）糯米泔（糯稻稈粳米泔）（糯米糠）薏苡仁

罌粟米（殼）

穀部（菽豆類）

大　豆　大豆黃卷　赤小豆　綠　豆（豆芽豆莢）

（豆葉）零烏豆　穞　豆　藊　豆

穀部（造釀類）

淡豆豉（附豆黃）蒸　餅　麴（小麥麴麩麴大麥麴神麴）

紅　麴　飴　糖　醬　醋

酒（附燒酒）

卷之十五

果部（果類）
杏仁　桃仁（毛梟葉膠花）　大棗
梨　木瓜　山查　柿（蒂霜）
石榴皮　橘皮（橘紅核葉附青橘皮）　枇杷葉
銀杏　胡桃　橡斗實（殼）　檳榔
大腹皮
果部（夷果類）
龍眼　荔枝核　橄欖（餘甘子）
椰子　無花果　馬檳榔　枳椇子
果部（味果類）
秦椒　蜀椒　胡椒（畢澄茄）

本草彙言總目錄　九

吳茱萸　茶茗　皐蘆
果部（瓜果類）
甜瓜蒂　西瓜　沙糖　甘蔗
果部（水果類）
蓮子（藕藕蔤藕節蓮薏蓮蕊鬚蓮蓬殼荷葉）
芡實
卷之十六
菜部（葷菜類）
韭（韭子）　葱　薤白　白芥子
萊菔子　生薑（皮葉）　胡荽　芹菜
蘹香　羅勒（子）

菜部（柔滑類）
薺菜　蒲公英　莧菜　馬齒莧
薯蕷　百合
菜部（蓏菜類）
苦壺蘆（敗舊瓢）　絲瓜
卷之十七
蟲部（卵生類）
蜂蜜　蜜蠟（蜂子）　露蜂房　白殭蠶（晚蠶沙）
九香蟲　五倍子（附百藥煎）　桑螵蛸　蟲白蠟
雀甕　樗雞　斑蝥　全蝎
水蛭

本草彙言總目錄　十

蟲部（化生類）
蠐螬　蚱蟬　螻蛄　蜣螂
䗪蟲　蜚虻
蟲部（濕生類）
蟾酥　蚪蛤　蜈蚣　蚯蚓
蜒蚰
卷之十八
禽部（水禽類）
鴨（血肉）　鵞　膽（掌上黃皮）
禽部（原禽類）
雞冠血（肝雞矢膍胵）　鴿肉　夜明沙

五靈脂
獸部（畜類）
猪膽汁（膚　心血　大腸　脬）　羊　肉（肝　腎　膽）
黃牛肉（乳　血　膽　角腮）　牛　黃　阿　膠
黃明膠
獸部（野獸類）
虎　骨　象　牙（膽　皮）　犀　角　羚羊角
鹿　茸　麝臍香　膃肭臍　刺蝟皮
鹿角膠（生鹿角　鹿角霜）
鱗部（龍類）
龍　骨　蛤　蚧　鯪　鯉　守　宮

蛇　蛻　蚺蛇膽（肉）　白花蛇　烏梢蛇
卷之十九
鱗部（魚類）
鯉　魚（膽）　青　魚　白　魚　石首魚鯗
（石首　骨）魚　膠　鯽　魚　鱘魚血
鰕　烏賊魚骨（腹中墨）　鰻鱺魚
介部（甲蟲類）
龜　板（膠）　瑇瑁甲　鱉　甲　牡　蠣
蚌殼粉　珍　珠　石決明　海　蛤
文　蛤　蛤蜊粉　車螯殼　淡　菜
田螺肉　螺　螄

人部
亂　髮（頭垢）　指　甲　人胞衣　人牙齒
人　乳　人　尿　糞　清（人中黃）
童　便（人中白　尿[illegible]　秋石　紅鉛）　口津唾　人　氣
臍　帶　人　血　人　骨
卷之二十
氣味陰陽　升降浮沉
五運六淫用藥主治　四時用藥
君臣佐使　上中下三部
七方十劑　汗吐下三法
藏府虛實寒熱主治之藥

寒熱虛實各有真假　反治之法
治氣之法　治病從本
氣味補瀉　引經報使
採藥時候　辨藥真僞
採藥方劑　用藥參伍
丸散湯膏　製藥節度
服藥時候　藥邪過劑

本草彙言卷之一目録

草部（山草類）

葳蕤　人參　黄耆　甘草
白朮　天麻　桔梗　知母
沙參　遠志　巴戟天　肉蓯蓉
瑣陽　玄參　丹參　地榆
白頭翁　黄芩　秦艽　黄連
胡黄連　龍膽草　細辛　白薇
白前　前胡　柴胡　防風
獨活　羌活　升麻　苦參
玄胡索　貝母　貫衆　紫草

黄精　仙茅　淫羊藿　狗脊
紫參　山漆　白芨　蒼朮

本草彙言卷之二目録

草部（芳草類）

廣木香　白豆蔻　香附子　縮砂仁
蓬莪朮　荊三稜　芎藭　蘼蕪
當歸　白芍藥　赤芍藥　牡丹皮
白芷　山柰　藁本　蛇牀子
甘松香　香薷　藿香　蘭草
澤蘭　益智子　高良薑　肉豆蔻
草豆蔻　草果仁　補骨脂　荊芥
紫蘇　荏草（即白蘇）　薺苧　薄荷

鬱金　薑黄

本草彙言卷之三目錄

草部（隰草類上）

菊花　野菊花　艾葉　茵陳蒿
青蒿（子 白蒿 黃花蒿）　益母草　夏枯草
劉寄奴　旋覆花　紅藍花　大薊
小薊　續斷　漏蘆　苧根
大青　小青　胡蘆巴　惡實
枲耳實　蠡實　豨薟草　麻黃（根節）
水紅花　木賊草　青葙子　燈心草

本草彙言卷之四目錄

草部（隰草類下）

生地黃　牛膝　紫菀　麥門冬
石龍芮　冬葵子　蜀葵　錦葵
酸漿草　漆姑草　敗醬草　款冬花
決明子　茳芒　瞿麥　淡竹葉
王不留行　三白草　葶藶子　車前子（葉）
鱧腸　連翹　藍澱　藍
青黛　蓼　水英　萹蓄
刺蒺藜　沙苑蒺藜　穀精草　海金沙
見腫消　紫花地丁　半邊蓮

本草彙言卷之五目錄

草部毒草類

大黃　商陸　狼毒　狼牙
山慈姑　蚤休　大戟　澤漆
甘遂（蒴藋）　續隨子　蓖麻子（葉博落迴）
烟草　常山　藜蘆　附子（烏頭側子）
天雄（漏藍子）　草烏頭　白附子　天南星
玉簪花　半夏　羊躑躅　鬼臼
射干　鳳仙花　蕘花　芫花
海芋　透山根　鉤吻

本草彙言卷之六目錄

草部蔓草類

菟絲子（苗）　五味子　蓬虆　覆盆子
懸鉤子　蛇莓子　使君子　木鼈子
番木鼈　馬兜鈴（根名青木香）　預知子（根）
牽牛子　紫葳花　營實墻蘼　月月紅
栝蔞實　天花粉　王瓜（子）　葛根（花）
天門冬　百部　何首烏　萆薢
土茯苓　白歛　山豆根　黃藥子
白藥子　威靈仙　茜草根　防己
木通（子）　通脫木　白兔藿　蘿藦
絡石　木蓮蓬

本草彙言卷之七目錄

草部（水草類）

澤瀉　羊蹄根　石菖蒲　香蒲

蒲黃　菰笋　蓴　水萍

海藻　昆布　海帶

草部（藤草類）

忍冬藤　鈎藤　白花藤　甘藤汁

黃藤　含水藤　天仙藤　清風藤

百稜藤　千里及　藤黃　地龍藤

龍手藤　牛領藤　牛奶藤　鬼膊藤

班珠藤　息王藤　百丈青　溫藤

藍藤　瓜藤　含春藤

草部（石草類）

石斛　地錦　骨碎補　石韋

金星石韋　石莧　虎耳草　景天火丹草

石胡荽　離鬲草　酸漿草

草部（苔草類）

陟釐　海苔菜　石蕊　井中苔

船底苔　地衣草　垣衣　屋遊

昨葉何草　土馬騣草　卷柏（地柏）　石松

桑花　馬勃

本草彙言卷之八目錄

木部（香木類）

桂（桂枝　肉桂）（牡桂　天竺桂）　松脂　松實

松節　松葉　松花　柏子仁

側柏葉　胡桐淚　杉木　樟木（釣樟）

辛夷　沉香（奇南香）　丁香（枝　皮）　白

檀香（紫檀）　降真香　楠木　烏藥

楓香脂　熏陸乳香　沒藥　麒麟竭

安息香　蘇合香　龍腦香　紫鉚

樟腦　阿魏　蘆薈　孩兒茶

本草彙言卷之九目錄

木部（喬木類）

黄檗　厚朴　杜仲　黄櫨木
椿樗（根葉）　乾漆　海桐皮　楝實（根皮）
槐實　槐花（枝木皮葉根皮）　樺木皮
秦皮　無食子　合歡（枝子）　皂莢
皂莢子　皂莢刺　椶櫚皮　肥皂莢
無患子（莢核）　欒華木花　訶黎勒　柳（花枝絮葉）
檉柳　水楊枝葉（根皮）　白楊（木皮）　蕪荑
榆皮　櫸木　蘇方木　烏柏木
巴豆　大楓子肉　梓白皮　楸白皮
青桐（木皮）　梧桐子（葉木皮）　罌子桐油

本草彙言卷之十目錄

木部（灌木類）

桑根白皮（葉柴灰柘木白皮）　楮實（葉樹白皮皮中白汁）
枳實　枳殼　黄楊木　巵子
酸棗仁　蕤核　山茱萸　金櫻子（花葉）
郁李仁（根）　女貞實　凍青子　枸骨刺
南天燭（枝葉）　五加皮　枸杞子　地骨皮
牡荊實（莖葉）　荊瀝　蔓荊實　紫荊木皮
木槿花　木芙蓉　蠟梅　密蒙花
山茶花　柞木

本草彙言卷之十一目錄

木部（寓木類）

茯苓　琥珀　豬苓　雷丸

桑寄生　松寄生

木部（苞木類）

竹（䈽竹葉　甘竹葉　淡竹葉　苦竹葉）　竹茹　竹瀝

天竹黃

木部（雜木類）

古厠木　古櫬板　雷震木

服器部（服帛類）

故錦　黃絲絹　布　綿

褌襠　破漆器

本草彙言卷之十二目錄

金石部（金類）

金箔　銀箔（附白銀）　赤銅屑　銅青

古文錢（附銅器）　黑鉛　胡粉　黃丹

密陀僧　鉛霜　鐵（附鐵落　鐵華粉　鐵精　鐵鏽　鐵砂）

（鐵漿　鐵秤錘　鐵炙）　水銀（輕粉　靈砂）（粉霜　銀硃）

玉石類

玉　青琅玕　珊瑚　瑪瑙

雲母　白石英　紫石英　菩薩石

金石類

石青　空青（附曾青　石綠）　丹砂（硃砂）　雄黃（雌黃）

花乳石　慈石　自然銅　蛇含石

土石類

禹餘糧（太乙餘糧）　滑石　赤石脂　爐甘石

青礞石　代赭石

水石類

浮石　石膏　石鐘乳　麥飯石

石蟹　石燕

火石類

無名異　陽起石　石炭　石灰

毒石類

砒石　礬石

本草彙言卷之十三目錄

石部（鹵石類）

鹽（戎鹽　玄精石）　凝水石　朴硝（風化硝　玄明粉）

硝石　硇砂　蓬砂　石硫黄

礬石　綠礬　膽礬

土部（火土類）

伏龍肝　百草霜　釜臍煤　京墨

土部

田中泥　井底泥　螺螄泥　蚯蚓泥

本草彙言卷之十四目錄

穀部（麻麥稷粟類）

胡麻（油）　大麻（皮及）　浮小麥　麥粉

大麥（芽）　糯米泔（糯稻稈　粳米泔）　糯米糠　薏苡仁

罌粟米（殼）

穀部（菽豆類）

大豆　大豆黃卷　赤小豆　綠豆（豆芽菜）

（豆漿）　零烏豆　穭豆　穞豆

穀部（造釀類）

淡豆豉（附豆黃）　蒸餅　麴（小麥麴　大麥麴　麪麴　神麴）

紅麴　飴糖　醬　醋

酒（附燒酒）

本草彙言卷之十五目錄

果部（果類）

杏仁　桃仁（毛　膠　花　梟　葉）　大棗

梨　木瓜　山查　柿（蒂　霜）

石榴皮　橘皮（橘紅　核　葉　附青橘皮）　枇杷葉

銀杏　胡桃　橡斗實（殼）　檳榔

大腹皮

果部（夷果類）

龍眼　荔枝核　橄欖（餘甘子）

桄榔子　無花果　馬檳榔　枳椇子

果部（味果類）

秦椒　蜀椒　胡椒（畢澄茄）

吳茱萸　茶茗　臯盧

果部（瓜果類）

甜瓜蒂　西瓜　沙糖　蔗

果部（水果類）

蓮子（藕　藕蒂　藕節　蓮薏　蓮蕊鬚　蓮蓬殼　荷葉）

芡實

本草彙言卷之十六目錄

菜部（葷菜類）

韭（子　黃）　葱　薤白　白芥子

萊菔子　生薑（皮　葉）　蒝荽　芹菜

蘹香　羅勒（子）

菜部（柔滑類）

薺菜　蒲公英　莧菜　馬齒莧

薯蕷　百合

菜部（蓏菜類）

苦壺蘆（敗舊瓢）　絲瓜

本草彙言卷之十七目錄

蟲部（卵生類）

蜂　蜜　蜜蠟（蜂子）　露蜂房　白殭蠶（晚蠶沙）

九香蟲　五倍子（附百藥煎）　桑螵蛸　蟲白蠟

雀甕　樗雞　斑蝥　全蝎

水蛭

蟲部（化生類）

蠐螬　蚱蟬　螻蛄　蜣螂

䗪蟲　蜚蝱

蟲部（濕生類）

蟾酥　蝌蚪　蜈蚣　蚯蚓

蜒蚰

本草彙言卷之十八目錄

禽部（水禽類）

鴨（血　肉）　鵝（膽　掌上黃皮）

禽部（原禽類）

雞冠血（脂　雞屎白　卵　膍胵）　鴿　肉　夜明沙

五靈脂

獸部（畜類）

猪膽汁（膚　心血　大腸　脬）　羊　肉（肝　腎　膽）

黃牛肉（乳　血　髓　角鰓）　牛黃　阿膠

黃明膠

獸部（野獸類）

虎骨　象　牙（膽　皮）　犀　角　羚羊角

鹿茸　麝香　膃肭臍　刺蝟皮

鹿角膠（生鹿角　鹿角霜）

鱗部（龍類）

龍骨　蛤蚧　鮫鯉　守宮

蛇脫　蚺蛇膽（肉）　白花蛇　烏稍蛇

一第七七二册 續修四庫全書 [illegible]

本草彙言卷之十九目録

鱗部（魚類）

鯉魚（膽）　青魚　白魚　石首魚鯗

（石首骨）　魚膠　鯽魚　鱓魚血

蝦　烏賊魚骨（腹中墨）　鰻鱺魚

介部（甲蟲類）

龜板（膠）　玳瑁甲　鱉甲　牡蠣

蚌殼粉　珍珠　石决明　海蛤

文蛤　蛤蜊粉　車螯殼　淡菜

田螺肉　螺螄

人部

亂髮（頭垢）　指甲　人胞衣　人牙齒

人乳　人尿　人糞　清（人中黃）

童便（人中白溺瓶鹼秋石紅鉛）　口津唾　人氣

臍帶　人血　人骨

本草彙言卷之二十目録

氣味陰陽　升降浮沉

五運六淫用藥主治　四時用藥

君臣佐使　上中下三品

七方十劑　汗吐下三法

臟府虛實寒熱主治之藥

寒熱虛實各有眞假　反治之法

治氣之法　治病從本

氣味補瀉　引經報使

採藥時候　辨藥眞僞

採藥方劑　用藥參伍

丸散湯膏　製藥節度

服藥時候　藥弗過劑


威靈
黄耆
甘草
人參
雲頭白朮
狗頭白朮
雞腿白朮
桔梗
天麻苗名赤箭
知母
羊角天麻
荔枝天麻


沙參
戟天
玄參
丹參
地榆
遠志
鎖陽
蓯蓉
老
嫩
白頭翁


條黃芩形細堅實
片黃芩鬆破成片
枯黃芩中心朽爛
黃連
胡黃連
秦州秦艽
草龍膽
遼細辛
西細辛
白薇


白前
銀柴胡
山柴胡
獨活
升麻
苦參
南羌活
西羌活
防風
前胡
玄胡索


川貝母
西貝母
南貝母
仙茅
貫衆
狗脊
甘草
紫參
山漆
淫羊藿
黃精

本草彙言卷之一圖

三




荆三稜
木香
馬尾當歸
鑱頭當歸
黑三稜
蓬莪朮
草三稜
石三稜
白豆蔻
川芎
西芎
撫芎
砂仁
香附子

本草彙言卷之二圖

一


白芍藥
赤芍藥
牡丹根皮
山柰
藁本
白芷
蛇床子



本草彙言卷之二圖　二

甘松香
香薷
藿香
高良薑
澤蘭
益智
肉豆蔻
草豆蔻
草菓仁
補骨脂
荊芥
紫蘇
荊芥
花鈸擺香
荏草即白蘇
薺苧即青蘇
鬱金
蓬莪
薄荷



本草彙言卷之三圖　一

甘菊花
野菊花
苦薏
艾葉
茵陳
青蒿
益母草
夏枯草
劉寄奴
旋覆花
紅藍花
大小薊
續斷
苧根

本草彙言卷之三圖　二


大青
枲耳實
麻黃
蠡實
胡盧巴
色紫者真
色綠者酒
浸了也
惡實
稀薟草
水紅花



本草彙言卷之四圖　一


牛膝
生地黃
石龍芮
紫菀
冬葵子
麥門冬
熟地
蜀葵


瞿麥
萹蓄
[illegible]草
決明子
漆姑草
淡竹葉
[illegible]
敗醬草


本草彙言卷之四圖
二
王不留行
茵蔯
連翹
車前子
藍
三白艸
鱧腸
青黛
刺蒺藜
沙蒺藜
蓼
見腫消
半枝蓮
穀精草
海金沙
萹蓄


本草彙言卷之五圖
一
大黃
狼毒
大戟
山慈姑
商陸
玉竹
甘遂
續隨子
正
背
蓖麻子
烟草
常山
藜蘆
附子
烏頭
側子
天雄
草烏
白附子


天南星
半夏
鬼臼
羊躑躅
玉簪花
射干
芫花
蕘花
芫花

本草彙言卷之五圖　十二


使君子
木鼈子
番木鼈
菟絲子
覆盆子
馬兜鈴
五味子
青木香
天花粉
營實墻蘼
牽牛子
月月紅
王瓜
瓜蔞子
瓜蔞實
紫葳花

本草彙言卷之六圖　一


土茯苓
葛根
何首烏
天門冬
萆薢
白蘞

本草彙言卷之六圖

二


山豆根
瓜防己
條防己
威靈仙
木通
黃藥子
茜草


通脫木
白芸藤
絡石
蘿摩
木蓮芷

本草彙言卷之六圖

三



本草彙言卷之七圖

三




忍冬
天仙藤
釣藤
白花藤
清風藤

本草彙言卷之七圖

二





本草彙言卷之七圖　三

石斛
石韋
地錦
金星石韋
骨碎補
石胡荽
石莧
酸漿草
[illegible]
虎耳草
景天 即慎火草



本草彙言卷之七圖　四

陟釐
垣衣
地衣
昨葉何草
石蕊
土馬騣
石松
卷柏
馬勃


桂枝
肉桂
松脂
箘桂
牡桂
栢子仁

本草彙言卷之八圖


側栢葉
樟木
沉香
胡桐淚
奇南香
辛夷
老杉木
雄丁香
母丁香


檀香
烏藥
沒藥
楓香脂
降真香
騏驎竭
薰陸乳香

本草彙言卷之八圖


安息香
阿魏
蘇合香
盧會
龍腦香


本草彙言卷之九圖
一
黄蘗
黄櫨木
乾漆
厚樸
杜仲
椿樗
海桐皮
楝實
樺木皮
合歡
皂莢刺
秦皮
皂莢
無食子
槐實


本草彙言卷之九圖
二
椶櫚皮
無患子
柳
[illegible]木花
檉柳
訶黎勒
肥皂莢
水楊
榆皮
蘇方木
白楊
櫸木
蕪荑
烏桕木


巴豆
梓白皮
罌子桐
青桐
梧桐
大楓子

本草彙言卷之九圖

三




山梔
枳實
桑根白皮
枳殼
桑寄生
酸棗
黃楊木
楮實

本草彙言卷之十圖

一


蕤核
郁李仁
南燭枝葉
山茱萸
五加皮
女貞
枸骨刺
金櫻子



本草彙言卷之十圖　二

木芙蓉
枸杞子
地骨皮
蔓荊
紫荊
牡荊實
木槿花
密蒙花
山茶花
柞木



本草彙言卷之十一圖　一

桑寄生
茯苓
茯神
松寄生
雷丸
甘竹葉
篁竹葉
苦竹葉
淡竹葉


煅水銀爐
古文錢
鉛
密陀僧
升煉輕粉爐
鋼鐵
火鐵

置砂於中下承以水上覆以盆用火煅養烟飛於上銀溜於下

眞者體輕色白如雪片片可愛假此放銅鐵器內置火上煉之無眞假者多有濟

本草彙言卷之十二圖　一


玉
瑪瑙
紫石英
粟丹
菩薩石
珊瑚
青琅玕
白石英


箭頭朱砂形
石青
雌黃
石榴子
和尚頭
劈砂
中空有竅
空青
雄黃
曾青
水窟雌黃
石綠

諸藥惟此最貴能化銅鐵鉛錫

本草彙言卷之十二圖　二


花乳石
禹餘糧
爐甘石
吸鐵石
中有細粉如麪
滑石
青礞石
自然銅
赤石脂
蛇含石


無名異
麥飯石
代赭石
陽起石
石蟹
浮石
石膏
石燕
雄
礬石
雌
石鐘乳

本草彙言卷之十二圖　三





本草彙言卷之十三圖　一


戎鹽
朴硝
硇砂
芒硝
凝水石
風化硝
蓬砂
玄明粉
玄精石
石硫黃
硝石


硫黃出產處
膽礬
礬石
綠礬

本草彙言卷之十三圖

一



本草彙言卷之十四圖

一




罌粟米
大豆黃卷
大豆
赤小豆
綠豆
本草彙言卷之十四圖
二
馬料豆
穭豆
白扁豆


大棗
杏仁
桃仁
梨
本草彙言卷之十五圖
一
木瓜
山梳
柿
橘皮
青皮
安石榴


胡桃
枇杷葉
銀杏
橡斗子

本草彙言卷之十五圖

二


龍眼
橄欖
大腹皮
荔枝
檳榔
桄榔子


秦椒
無花果
蜀椒
胡椒
枳椇子

本草彙言卷之十五圖

三


荸薺
吳茱萸
甜瓜蒂
茶茗


本草彙言卷之十五圖
四
西瓜
蓮子
甘蔗
雞豆
子
仁


本草彙言卷之十六圖
一
韭
薤白
萊菔
蔥
白芥子
生薑
水芹菜
胡荽
羅勒
蒲公英
茴香
薺菜
莧菜



本草彙言卷之十六圖　二


蜂蜜
露蜂房
桑螵蛸
螳螂
殭蠶
螵蛸
石蜜
五倍子

本草彙言卷之十七圖　一


蟲白蠟
樗鷄
水蛭
蠐螬
斑蝥
雀甕
蚱蟬
全蠍


螻蛄
蝸牛
蟾酥
蜈蚣
覆
仰
蜣螂
䗪蟲
蚯蚓
蜚虻

本草彙言卷之十七圖



本草彙言卷之十八





本草彙言卷之十八圖　二


虎骨
羚羊角
象牙
鹿
犀角
茸


麝臍香
膃肭臍
蛤蚧
刺蝟皮
龍骨

本草彙言卷之十八圖　三





本草彙言卷之廿八圖　四




鯉魚
石首魚
鯽魚
鯽魚
青魚
蝦
白魚

本草彙言卷之十九圖　一


烏賊魚
龜版
牡蠣
瑇瑁
鰻鱺魚
珍珠
鼈甲





萬曆庚申蒲月

蕭山庠士湯國華太素甫繪圖

錢塘處士翁立賢恒玉甫勒像

本草彙言卷之一

錢塘倪朱謨純宇甫選集　男倪洙龍冲之氏藏稿

沈　琯西璵甫校正

草部　山草類

葳蕤　氣味甘平。無毒。可升可降。陽中陰也。（別錄曰。生太山山谷及滁州。舒州。漢中。均州。江浙諸處山中多有。春生苗。莖強直。似竹。有節。故名玉竹。葉亦如竹。兩兩相值。葉端有黃色與點。三月開青花。結實如珠。根大如指。長尺許。橫行如荻根及菖蒲。節平直。多脂潤。雖燥亦柔。蕤飾繁密。宛如冠纓下垂之緌。而有威儀之象。凡羽蓋旌旗之纓緌。皆象葳蕤。是矣。又瑞應圖云。王者禮備。則葳蕤生于殿前。威儀之義。于此可見。修治洗淨。暴乾用。○又按本經有女萎。無葳蕤。別錄有葳蕤。無女萎。然女萎係蔓草。另是一物也。二物形相似。但葳蕤節有毛。莖斑。葉尖處有小黃點為異。性亦相似。而稍有別者。治泄瀉痢下。霍亂腸鳴。遊氣上下。女萎之功。特于葳蕤也。）

○葳蕤祛風濕。益筋脈。補虛羸之藥也。主中風暴熱。四肢拘攣。或頭風淫目。淚流眥爛。或傷寒風溫。自汗身重。語言難出。或寒熱痁瘧。形神勞損。凡一切元虛不足之人。兼挾外邪風濕迷悶之證。用代參耆。不寒不燥。大有殊功。不止于去風濕益筋脈而已也。

王紹隆先生曰。葳蕤惟本醇良。氣味平緩。稟天地清和之氣。而得稼穡之甘者也。故農皇經所主中風暴熱。不能動搖。跌筋結肉。諸不足證。此養營益精。潤澤血氣之驗也。外而目痛眥爛。淚出面黚。諸疾咸得奏功。駐顏輕身。不老而仙。良有以也。

繆仲醇先生曰。性稟醇和。如盛德君子。無往不利。故可

資其利用而不窮。正如斯藥之能補益藏府，滋養血氣根本。既治，餘疾自除矣。純而不駁，和而不偏，有益無損之藥也。

○集方：治中風暴熱，四肢拘攣，不能轉動。用葳蕤一兩，黃耆、當歸各五錢，膽星、天麻各三錢，水煎服。○治頭風淫目，淚流眥爛，或赤眼澀痛。用葳蕤三錢，白芍藥、防風、天麻各二錢，羌活、當歸、川芎、甘菊花各一錢，水煎服，仍薰洗。○治傷寒風濕，自汗身重，語言難出，或多汗亡陽，手足搐搦，筋惕肉瞤等證。用葳蕤一兩，黃耆、人參、白朮各五錢，防風、半夏各二錢，水煎服。如多汗亡陽，加乾薑、附子各三錢；熱不退，加柴胡一錢五分。○治久瘧元氣虛

損，愈發愈劇。用葳蕤一兩，人參、白朮各五錢，附子、懷熟地各三錢，半夏、牛膝、鱉甲、何首烏各三錢，水煎服。○治小便卒然成淋，澁脹不通。用葳蕤二兩，芭蕉根二兩，水五大碗，煎半，服。○治小兒癎病後，身面虛腫。用葳蕤、茯苓各三錢，龍膽草一錢，水煎服。○治熱痺，四肢風軟無力。用葳蕤、防風、黃耆、枸杞子各四兩，真羌活一兩，俱炒，熱浸酒飲。如不飲酒者，分作十帖，水煎服。

人參　味甘微苦，氣溫，無毒。入肺、脾二經。

（李時珍曰：人參年深者，根如人形，故謂之人薓。因字繁，故以參字代之。其在五參，色黃屬土，而補脾胃，生陰血，故有黃參、血參之名。春秋運斗樞云：搖光散而為人參。人君廢山瀆之利，則搖光不明，人參不生。○別錄曰：人參生上黨山谷及遼東，或生邯鄲、百濟、潞州、太行、紫團山。今沁州、遼州、深州、冀州、平州、易州、檀州、幽州、嬀州、并州並出人參，蓋其山皆與太行連接故也。○蘇氏曰：人參生于深山背陽向陰近椵漆樹下滋潤處。下有人參，則上有紫氣。春生苗，四五相對，一莖直上，一椏五葉，四五年後生兩椏，至十年後生三椏，年深者生四椏，各五葉。中心生一莖，俗名百尺杵。三四月作蕊如絲，開花紫白色，細小如粟。秋後結子，或七八枚，如大豆，生青熟紅，自落。秋冬采根，堅實堪用。泰山出者，葉幹青，根白，殊別。○江淮出一種土人參，苗長一二尺，葉如匙而小，與桔梗相似，葉對生，生五七節，根亦如桔梗而柔，味極甘美。秋生紫花，又帶青色。初冬采根，土人或用之。○陳氏曰：紫團參，色紫，形稍扁。百濟參，堅白且圓，俗名白條參，又名羊角參。遼東參，黃潤纖長有鬚，俗名黃參。高麗參，微紫，體虛。新羅參，色黃，味薄。○上黨今潞州也，民以人參為地方害，不復采取。今所用者，皆是遼參。其高麗、百

濟、新羅三國，今皆屬于朝鮮矣。其參猶來中國互市。亦可用收子，于十月下種，如種菜法。秋冬采者堅實，春夏采者虛軟，非地有虛實也。遼參連皮者黃潤，色如防風；去皮者堅白如粉。偽者皆以沙參、薺苨、桔梗采根造作亂之。但沙參體虛無心而味淡，薺苨體虛無心而味甘，桔梗體堅有心而味苦，人參體實有心而味甘微苦，自有餘味。○宋蘇頌圖經本草所云潞州者三椏五葉，其滁州者乃沙參之苗葉，沁州、兗州者皆薺苨之苗葉。所云江淮土人參者，亦薺苨也。○人參生時背陽向陰，故不喜見風日，見風日則易蛀，惟納新瓦器中，密封可經年不壞。或用華陰細辛與參相間收之，不蛀不壞。凡使，以銅刀切片用。）

○人參補氣生血，助津養神之藥也。故真氣衰弱，短促虛餒，以此補之；如榮衛空虛，用之可治也；精神散亂，魂魄飛揚，以此斂之；如陽亡陰脫，用之可回也；驚悸怔忡，健忘恍惚，以此寧之；如心志懶怯，用之可壯也；元神不足，虛羸乏力，以此培之；如中氣衰陷，用之可升也。又若汗

下過多。津液失守、用之可以生津而止渴。脾胃衰薄、飲食減常、或吐或嘔、用之可以和中而健脾。小兒痘瘡灰白倒陷、用之可以起痘而行漿。婦人產理失順、用力過度、用之可以益氣而達產。若久病元虛、六脉空大者。吐血過多。面色萎白者。瀉痢日久、精神委頓者。中熱傷暑、汗竭神疲者。血崩潰亂、身寒脉微者。內傷傷寒、邪實正虛者。風虛眼黑、旋暈卒倒者。皆可用也。如本草所云補益之外、又能除邪氣、破堅積者何耶。觀邪氣之所以留而不去者。無他。由真氣虛則不能敵。故留連而不解也。茲得補而真元充實。則邪自不容。譬如君子當陽、則小人自退矣。破堅積者。亦由真氣不足則不能健行而磨

物。日積月累、遂成堅積。譬夫磨孔納物。無力則不轉。不轉則物停積矣。脾主運化、真陽之氣回、脾強而能消。又何堅積之不磨哉。

○仲景云。病人亡血亡汗。身熱脉沉遲者。倍加人參。古人以血脫者宜益氣。益血不自生、須得生陽氣之藥乃生。素問言無陽則陰無以生、無陰則陽無以化。人參能補氣。故血虛者。宜用之也。又東垣以相火乘脾。身熱而煩。氣高而喘、頭痛而渴。脉洪而大者。用人參佐黃柏。又孫真人治夏月熱傷元氣、汗大泄。欲成痿厥者。用人參麥冬五味。以瀉熱火而救金水。此皆補天元之真氣。非補熱火也。又白飛霞以人參煉膏服回元氣于無何有之鄉。若氣虛有火者。合天門冬膏時服之。又王安道謂人參黃耆甘草。乃甘溫除大熱、瀉陰火。補元氣。亦為瘡瘍膿潰聖藥。此皆神而明之。配合得宜者也。凡人面白面黃面青顦悴者。皆脾肺腎氣不足。可用也。面赤面黑氣壯神強者。不可用也。脉之浮而芤濡虛大遲緩無力。沉而遲澀細弱結代。無力者。皆虛而不足。可用也。若弦長緊實滑數有力者。皆火鬱內實。不可用也。潔古謂喘嗽勿用者。痰實氣壅之喘也。若腎虛氣短喘促者。必用也。仲景謂肺寒而欬勿用者。寒束熱邪。壅鬱在肺之欬也。若自汗惡寒而欬者。必用也。東垣謂久病鬱熱在肺勿用者。乃火鬱于內。宜發不宜補也。若肺虛火旺、氣短自

汗者。必用也。丹溪言諸痛不可驟用者。乃邪氣方銳。宜散不宜補也。若裏虛吐利。及久病胃弱虛痛喜按者。必用也。如此推詳。則人參之可用不可用。思過半矣。

○繆仲淳先生云。論人參功能之廣。不可盡述。第其性亦有所不宜用者。世之錄其長者。或遺其短。摘其瑕者。并棄其瑜。是以或當用而後時。或非宜而妄投。不蒙其利。徒見其害。二者之覶。其失則一。遂使良藥不見信于世。粗工互騰其口說。惜哉。豈知人參本補五臟真陽之氣者也。若夫虛羸尫怯。勞役饑飽所傷。努力失血、以致陽氣短乏。陷入陰分。發熱倦怠。四肢無力。或中熱傷暑。暑傷氣。無氣以動。或嘔吐泄瀉。胃弱不能食。脾虛不磨食。

或真陽衰少、腎氣乏絕、陽道不舉。完穀不化、下利清水。中風失音、產後血崩。小兒慢驚、吐瀉不止、痘後氣虛、潰瘍長肉等證、投之靡不立效。惟不利于肺家有熱、咳嗽吐痰。吐血、衄血、齒衄。內熱骨蒸、勞瘵陰虛、火動之候。蓋肺者。華蓋之藏也。位乎上。象天屬金。喜清肅而惡煩熱。真氣無虧。則寧謐清淨。以受生氣之熏蒸。而朝百脈。苟縱恣情慾。虧損真陰。火空則發。熱起于下。炎爍乎上。則肺先受之。火乃肺之賊邪。邪氣勝則實。實則肺熱鬱結爲痰。喉癢而發嗽。血熱妄行。溢出上竅。王好古所謂肺熱還傷肺是已。又有痧疹初發。身雖熱而斑點未形。傷寒始作。形證未定。而邪熱方熾。若誤投之。鮮克免者。可

不戒哉。可不慎哉。

盧不遠先生曰。人參功力。安定精神魂魄意志。于倉忙紛亂之際。轉危爲安。定亡爲存。經云。人身衛氣日行陽道則寤。夜入五藏則寐。則凡病劇張惶。不能假寐者。人參入口。便得安寢。此即入臟養陰。安精神。定魂魄之外徵矣。

金靈昭先生云。以言乎天。則得生生升發之氣。以言乎地。則得清陽至和之質。以言乎人。故能回元氣于垂絕。却虛邪于俄頃。養人身臟府氣血肉液之精。參兩間而合人參之。故曰人參。

○集方治真氣衰弱。虛喘短促。并營衛空虛。用人參。麥門冬各五錢。北五味子。五分。黃耆。三錢。廣皮。一錢。水煎服。○治精神散亂。魂魄飛揚。并陽亡陰脫。用人參。麥門冬各三錢。北五味子。五分。酸棗仁。炒。五錢。茯苓。二錢。龍眼肉。十枚。水煎服。○治驚悸怔忡。健忘恍惚。并心志慚怯。用人參。麥門冬。各二錢。北五味子。五分。當歸身。益智仁二錢。白朮。半夏。茯苓。膽星各一錢。水煎服。臨服時調硃砂末。五分。○治元神不足。虛羸乏力。并中氣衰陷。飲食厭常。用人參。麥門冬。各三錢。北五味子。五分。當歸身。白朮。茯苓。木瓜。半夏各一錢五分。陳皮。蒼朮。升麻。甘草。木香各七分。水煎服。○治諸病汗下過多。津液失守。口乾

煩渴。飲食減少。或吐或嘔。用人參。麥門冬。各二錢。北五味子。五分。當歸。白芍藥。懷熟地。各三錢。水煎服。○治諸病脾胃衰薄。飲食減常。用人參。三錢。麥門冬。二錢。北五味子。甘草。各五分。白朮。半夏。白豆仁。各一錢八分。木香。一錢。水煎服。○治小兒痘瘡。灰白倒陷。不起漿汁。乾枯。用人參。麥門冬。各一錢。黃耆。二錢。白芍藥。八分。甘草。五分。皂角刺。桂枝。三分。穿山甲。火燒研末。一錢五分。水煎服。○治臨產分娩艱難。用力過度。胞胎愈澁。愈難分娩。母子危急。用人參數錢。當歸。五錢。川芎。一錢五分。益母草。二錢。水煎服即產。○治久病元虛。而色瘁白。言語懶微。飲食不入。六脈空大。或虛微無力。用人參。五錢。

茯苓、黃耆各三錢、甘草八分。生薑二片。黑棗三枚。水煎服。○治吐血過多、面色痿白、脉微神怯者。用人參、麥門冬各三錢、眞阿膠一錢、炮薑灰、炙甘草各七分、水煎服○治中熱傷暑、汗竭神疲、精神將脫者。用人參、麥門冬、黃耆各三錢、知母二錢、甘草、石膏各一錢、加薑棗水煎服。○治血崩神脫、精神潰亂、四肢將厥者。用人參二兩當歸五錢、炮薑灰三錢、童便製附子二錢、炙甘草八分。水煎溫和、徐徐服。○治內傷傷寒、邪實正虛、熱煩躁渴脉數神疲、懨懨欲寐者、用人參五錢、黃耆一兩、北五味甘草各七分。熱甚、加柴胡、乾葛。內熱、加知母、黃連。有痰加半夏、貝母。有宿食。加枳實、瓜蔞仁。增損以意消息用之。○治痰厥風虛、眼黑旋暈、卒然倒仆者。用人參八錢。白朮、天麻各五錢。半夏、膽星各三錢。乾薑、陳皮各二錢加薑棗、水煎服。

續補集方、治夾陰傷寒、陽衰陰盛。六脉沉伏。小腹絞痛四肢逆冷。嘔吐清涎。不假人參。無以保元。不用附子。無以回陽。不加乾薑。無以通營衛、達腠理、出入陰陽也。用人參一兩、童便製附子、乾薑各五錢。水四大碗、煎一碗。頓服。脉起身溫即愈。○治傷寒厥逆、身有微熱、人情煩躁、六脉沉細微弱、此陰極發躁也。用人參五錢、水二碗煎七分、調膽星末二錢、熱服立甦。○治勞傷力役過度發熱、用人參。五錢、黑棗五箇、生薑五片。水煎服。○治房後困倦、用人參七錢、陳皮一錢。水二碗、煎七分、溫服。日再。此千金不傳。○治胃寒氣虛、作滿、不能傳化、心易饑而口不能食。用人參三錢、便製附子。二錢、生薑一錢五分、水煎服。○治反胃嘔吐、飲食入口即出、脉弱無力、垂死者、用人參二兩、水二大碗、煎取五分。徐徐服。○治霍亂吐瀉、煩躁不止、用人參、陳皮、生薑各五錢、水一升。煎三合、徐徐服。○治妊娠嘔吐、飲食或水涎不止、形神疲頓者、用人參、炮薑各五錢、當歸、白朮、川芎各三錢、俱炒燥爲末、水發爲丸、梧子大、每服一百丸、米湯下。○治陽虛氣喘欲絕、自汗。氣短頭暈。用人參、五錢、便製附子。一兩。生薑十片、水二大碗、煎七分。待冷、徐徐服。○治老人

小子、聞雷即暈。此氣怯也、或久病神虛、聞喧嘩。紛亂煩擾即暈、用人參五錢、麥門冬。三兩、北五味。一錢、黃耆、白朮各三錢。生薑五片。黑棗五枚。水三碗、煎一碗、徐徐服○治心下常覺膨滿、而硬按之則無、多食即吐。氣引前後、噫呃不除。由思慮過多。氣不以時而行則壅澁而滯。謂之結氣病。用人參一兩、陳皮二兩。去白、共爲末、水發爲丸。如綠豆大、每服一錢、米湯下。○治吐血兼大便下血、此因七情所感、酒色內傷。以致氣血妄行。口鼻俱出。心肺脉絡破。血如湧泉、須臾不救、用人參焙、柏葉炒黃。荆芥穗、[illegible]黑、各五錢共爲末用二錢。入飛羅麵二錢以新汲水調如稀糊、一服立止。○治衄血、血屢出不止。用人

參蓮子心各一錢五分水煎服立止○治齒縫出血（[illegible]）用人參茯苓麥門冬各二錢水煎服立止○治陰虛人（[illegible]）口渴引飲用人參天花粉各等分為末每服二錢白湯調服（羅謙[illegible]方）○治痢疾陽虛氣冷六脉沉細欲脫用人參童便製附子各八錢乾薑五錢丁香一錢水煎服○治噤口（[illegible]）下痢用人參蓮肉各三錢薑汁炒川黃連二錢水煎服（[illegible]方）○治傷寒壞證不問四時瘟疫時氣不問陰陽老幼妊婦誤服藥餌困重垂死脉沉伏不省人事七日以後并二七三七日皆可服之用人參五錢水二鍾煎八分以井水浸冷服之少頃鼻梁有汗出脉復立瘥○治小兒（[illegible]）脾虛慢風風癇等證目定神昏語聲不出手足搐搦用

人參黃耆各一錢鉤藤辰砂各一錢二分水煎溫和徐徐服○治小兒（[illegible]方）驚愈後瞳仁歪斜不正用人參真阿膠糯米拌炒成珠各一錢甘草五分水一盞煎半盞服○治小兒（徐用[illegible]方）痘瘡乾枯灰白或擦損無皮九日以後用人參一兩為細末摻之○治狗咬（經驗方）風傷腫痛用人參置桑柴火上燒存性為末摻之立瘥○治脇（[illegible]方）破腸出急以油抹入煎人參湯淋洗內食羊腎粥十日愈

一人病氣上逆每飯下輒噯氣數十口再飯再噯食頃三四作此氣不歸元中焦火逆也服快氣藥愈甚以人參五錢砂仁二錢煎湯服首劑不動再服亦不動服三四劑上則噯（[illegible]）下則小遺無算自索瓊而瘳[illegible]止

黃耆氣味甘溫無毒氣薄味厚可升可降陰中陽也入手足太陰氣分又入手少陽足少陰命門

（陶隱居曰出隴西洮陽色黃白甘美次出黑水宕昌者色白肌理粗亦甘而溫補又有蠶陵白水者色理勝蜀中○蘇氏曰今出陝西宜寧州郡多有之收子仲冬下種春生苗獨莖或作叢生枝幹去地尺許其葉扶疏如羊齒狀七八月開黃紫色花其實結小尖角莢子長寸許八月中采根長一二尺折之如綿然有數種出隴西白水赤水二鄉白水者赤水者功用同而白水者更佳出山西沁州綿上者益勝用者以緊實如箭幹皮色黃折之柔韌如綿肉理中黃外白嚼之甘美可口者良嫩苗亦可茹食修治切片以蜜湯潤微炒黃用○若堅脆味苦者即苜蓿根也折之亦柔韌如綿頗能亂真但黃耆皮黃肉白中亦深黃味甘為異耳○外一種木黃耆者形類貞似貝是生時其莖葉短根理橫行不同也悞用伐人元氣辨之○李時珍曰耆長也色黃為補藥之長故名）

○黃耆補肺健脾實衛斂汗（[illegible]）驅風運毒之藥也故陽虛之（[illegible]）

人自汗頻來乃表虛而腠理不密也黃耆可以實衛而斂汗傷寒之證行發表而邪汗不出乃裏虛而正氣內乏也黃耆可以濟津以助汗賊風之痾偏中血脉而手足不隨者黃耆可以榮筋骨癰瘍之證膿血內潰陽氣虛而不愈者黃耆可以生肌肉又陰瘡不能起發陽氣虛而不潰者黃耆可以托膿毒東垣謂益元氣補三焦之虛損實腠理溫肉分之虛寒功在是矣若夫虛冷沉寒乃元陽之不足雖用薑桂朮附之屬而無參耆之藥則不能溫經以回陽陰虛不足陽邪下陷于陰經雖用升提透達之類而無參耆之劑則自上而復下也故補中益氣湯用參耆為君升柴為佐癰疽托裏散以參耆

獨用使腠理固密。而餘毒不能妄攻于內。若痘瘡用此以保元。胎前用此以全育。產後用此以輔正。傷寒用此以補中逐邪。久病用此以和營衛。生津液調血氣也。錢氏治小兒脾胃虛寒。腹痛嘔吐瀉利。青白宜益黃散。以黃耆倍用。又痘瘡毒化漿成。所賴脾氣充盛。內固營血。外護衛氣。用保元湯以黃耆爲重。而痘有順逆險三證。惟險乃悔吝之象。吉凶未定。須資藥力以治之。險證初出乾紅少潤。將長頂陷不起。既起色慘不明。漿行色灰不榮。漿定光潤不消。漿老濕潤不收。結痂胃弱內虛。痂落口渴不食。痂後生毒。毒潰斂遲。凡有諸證。並宜此湯。如是推之。則他證治例亦可詳矣。

○集方治陽虛腠理不密。自汗頻來。用黃耆一兩。白朮五錢。桂枝二錢。白芍藥一錢。乾薑二錢五分。大棗十枚。水煎服。○治傷寒裏虛表實。行發散藥。邪汗不出。身熱煩躁。六脈空數。用黃耆一兩。桂枝二錢。白芍藥。人參各二錢。甘草八分。柴胡一錢五分。加生薑三片。黑棗三個。水煎服。○治風邪偏中。血脈手足不隨。口眼喎斜。用黃耆防風各五錢。人參。白朮各三錢。天麻。半夏各二錢。當歸肉桂各一錢五分。水煎服。○治癰瘍潰後。不論五善七惡證。用黃耆八兩。金銀花二兩。人參一兩。穿山甲火燒五錢。水煎服。○治陰毒不起。內陷不潰。飲食不入。或大腸作瀉。腸虛氣脫之證。用黃耆二兩。人參一兩。肉桂。附子。童便製。各五錢。穿山甲火燒三錢。水煎服。○治痘瘡七八日後。漿汁未充。或乾枯不起。或漿汁不濃。種種虛寒證見者。用黃耆五錢。人參一錢。或二三錢。桂枝一錢。白芍藥酒炒一錢五分。穿山甲火燒二錢。水煎服。泄瀉不食。加附子童便製一錢。木香五分。肉桂八分。水煎服。○治男子氣虛白濁。女人氣虛白帶。用黃耆。茯苓。各一兩。人參。白朮各八錢。兎絲子二兩。俱炒燥爲末。每服二錢。空心白湯調下。○治男婦童幼諸虛不足。而色痿黃。煩悸焦渴。飲食減少。或先渴而後發瘡瘍。或先癰疽而後燥渴。用嫩生黃耆六錢。炙甘草一錢。水煎服。日一劑。○治老人虛秘。大便不通。用嫩白生黃耆一兩。陳皮五

錢。俱爲末。大麻子一合。研爛。和白蜜五匙。調藥末三錢。常服無秘結之患。○治腸風瀉血。用嫩白黃耆二兩。川黃連五錢。俱微炒。磨爲末。紅麴研末。打稀糊爲丸。如綠豆大。每服百丸。米湯下。○治欬嗽膿血。咽乾。乃虛中有熱。用嫩白黃耆四兩。甘草八錢。真北沙參二兩。共爲末。每早晚俱食前服二錢。白湯調下。○治氣虛胎動不安。腹痛下黃水。用嫩白黃耆二兩。真川芎五錢。當歸身二兩。糯米一合。水五碗。煎碗半。徐徐服。

○治婦人血崩不止。用黃耆。人參。麥門冬。各四錢。北五味子七分。杜仲。熟地黃。山茱萸各三錢。真阿膠二錢。川續斷。黑荆芥各一錢。河水煎服。即止。

甘草。 味甘 平。無毒。生用性寒。炙用性溫。通入手足十二經

（蘇氏曰，生陝西河東州郡及汶山諸夷處。○李時珍曰，春生青苗，高二三尺。葉如槐，微尖而糙澀，似有白毛。七月開紫花。結莢。至熟時莢拆，子扁如小畢豆。極堅，齒嚙不破。根長三四尺，粗細不定。皮赤色，上有橫梁，梁下皆細根也。此物有數種，以堅實斷理者為佳。其輕虛縱理及細韌者，不堪用。又蜀漢中及汶山諸夷中來者，其皮赤，斷理堅實者，是抱罕草，最佳。抱罕乃西羌地名。凡使用者，去[illegible]尾及赤皮，炙用。）

○甘草，和中益氣，補虛解（[illegible]）毒之藥也。健（[illegible]）脾胃（[illegible]），固中氣之虛羸，協陰陽，和不調之營衛。故治勞損內傷，脾虛氣弱，元陽不足，肺氣衰虛。其甘溫平補，效與參耆並也。又如咽喉腫痛，佐枳桔、鼠粘，可以清肺開咽；痰涎咳嗽，共蘇子、二陳，可以消痰順氣；佐黃耆、防風，能運毒走表，為痘疹氣血兩虛者首尾必資之劑；得黃芩、白芍藥，止下痢腹痛；得金銀花、紫花地丁，消一切疔毒；得川黃連，解胎毒于有生之初；得連翹，散懸癰于垂成之際。凡用純熱純寒之藥，必用甘草以緩其勢，如附子理中湯用甘草，恐其僭上；調胃承氣湯用甘草，恐其速下。此是緩之之法也。寒熱相雜之藥，必用甘草以和其性，如小柴胡湯有柴胡、黃芩之寒，人參、半夏之溫，內用甘草，此是和之之意也。又建中湯用甘草以緩脾急而補中州也。鳳髓丹用甘草以緩腎急而生元氣也。協和羣品，有元老之功。普治百邪，得王道之化。經云：以甘緩之，是也。

陳廷采先生曰：五味之用，苦直行而泄，辛橫行而散，其

上行而發。酸束而收斂，鹹止而軟堅。甘草味之極甘，當云上發可也。本草反言下氣，何耶？蓋甘味有升降浮沉，可上可下，可內可外，有和有緩，有補有瀉，居中之道，具盡故爾。

高元鼎先生曰：實滿忌甘草固矣。若中虛五陽不布，以致氣逆不下，滯而為滿，服甘草七劑即通。

繆仲淳先生曰：本草謂甘草為九土之精，安和七十二種石，一千二百種草，又能止渴，通經脉，解百物毒。甘為脾藥，甘能入脾生血，故止渴；血虛則經脉不通，能生血則經脉自通矣。其解一切金石草木蟲魚禽獸之毒者，凡毒遇土則化，甘草為九土之精，故能解諸毒也。○甘能緩中，中滿者忌之。嘔家忌甘，酒家亦忌甘，諸濕腫滿及黃疸臌脹鬱結諸證禁用。

朱東生先生曰：甘草生瀉火，炙補中。用梢，去尿管澀痛，又利小便；用節，消癰疽腫毒，又能護膜生肌。

○集方 治脾胃不和（許長如子集），一切勞損內傷，諸不足證。用甘草三錢，人參三錢，黃耆、白朮各五錢，當歸身七錢，生薑五片，黑棗十枚，水煎服。○治傷寒心悸（[illegible]），脉結代者。用甘草一兩，水煎服。○治傷寒咽痛（仲景方），少陰證。用甘草五錢，水煎服。○治赤白下痢（[illegible]）。用甘草一錢，川黃連一錢五分，水煎服。○治舌腫（[illegible]）塞口，不治殺人。用甘草一兩，水煎濃湯，乘熱漱口，頻吐漸消。○治一切癰疽（外科精要）諸發，預先服之，能消腫

逐毒。用大甘草五觔，浙水一石，煎至五斗，入磁砂鍋內慢火熬成膏，以磁罐收貯。每服十茶匙，白湯下。凡病丹石烟火藥發，亦解之，或微利無妨。○治諸般癰毒初起，用甘草一兩，水煎服，令人以毒處口咂之。○治痘瘡煩渴，用甘草五錢，水煎頻頻與之。如內熱，加黃連、花粉各一錢。內虛，加人參、黃耆各一錢。○治陰下懸癰，生於陰囊穀道前，初發如松子，漸大如蓮子，後赤腫如桃李，成膿即破，破後難愈。用大甘草二兩，炙黃透，再用溪流淡水五碗，煎一碗，食前服。如未潰可消，已潰可斂。半月全愈。○治蠱毒、藥毒，用甘草節數寸，以真麻油浸[illegible]年久愈妙。每用少許，嚼嚥，或水煎服亦妙。○治小兒中蠱欲

死者，用甘草五錢，水煎服，即吐出。

○治積勞虛損，氣血俱衰，用甘草、人參、白朮、茯苓、陳皮、黃耆、當歸、白芍藥、遠志肉各一錢，北五味七分，熟地黃三錢，肉桂八分，黑棗二個，生薑二片，水煎服。○治中氣虛乏，脾元不足，飲食減少，精神疲憊，用甘草炙六分，人參、白朮、茯苓各二錢，加黑棗三個，生薑二片，水煎服。○治中氣虛，脾胃弱，虛痰，虛嗽，氣逆不寧，用前方加半夏、橘皮各一錢，加粳米一撮，水煎服。

倪朱謨曰：甘草為藥中國老，諸方配用極多，今隨手所選數方，不足以盡其用。凡草木金石禽獸蟲魚諸部，集方中配用不少，如臨證擇方自見。

白朮。味苦甘辛，氣溫，無毒。味厚氣薄，陽中陰也，可升可降。入手太陽、少陰，足太陰、陽明、少陰、厥陰六經。（陶隱居曰：白朮生吳越舒宣州郡高嶺上，有薊開，取根栽蒔，一年即茂。獨浙杭於潛縣、天目山產者更佳。葉葉相對，葉稍大，方莖有毛，莖端生花，有紫、碧、紅數色，根岐生，紫色，塊大者為勝，或如指頭，如鼓槌，或大如拳，或至數觔者，皆削暴乾，如實象者，謂之片朮。又以夏末秋初采者佳，冬春采者，虛軟易壞。○外有一種赤朮，名蒼朮，苗高二三尺，葉亦抱莖，梢間葉似棠梨葉，其脚下葉各有叉，三五出，邊作鋸齒及小刺，根如人指，或老薑狀，色黑褐，而氣味辛烈。○陳氏言：白而肥者，曰白朮，若瘦而黃者，曰赤朮，是幕阜山所出，其力劣。昔人用朮不分蒼白，自宋以來，始分蒼朮苦辛氣烈，白朮苦甘氣和，極須不同，各自施用。○延采曰：浙朮俗名雲頭朮，種平壤，頗肥大，由糞力也。歙朮俗名狗頭朮，雖瘦小，亦得土氣充也。甚燥白，勝于浙朮。寧國、昌化、池州者，並同歙朮，境相隣也。如修治，切片，以人乳汁拌之，制其性也。脾病以陳壁土炒過，竊土氣以助脾也。二朮俱用杭米泔浸拌炒，則不燥烈，作燥矣。）

○白朮乃扶植脾胃，散濕除痹，消食去痞之要藥也。脾虛不健，朮能補之；胃虛不納，朮能助之。是故勞力內傷，四肢困倦，飲食不納，此中氣不足之證也；痼冷虛寒，泄瀉下利，滑脫不禁，此脾陽衰陷之證也；或久瘧經年不愈，或久痢累月不除，此胃虛失治，脾虛下脫之證也；或痰涎嘔吐，眩暈昏痛，或腹滿肢腫，面色痿黃，此胃虛不運，脾虛蘊濕之證也。以上諸疾，用白朮總能治之。又如血虛而漏下不止，白朮可以統血而收陰；陽虛而汗液不收，白朮可以回陽而斂汗。大抵此劑能健脾和胃，運氣利血。上而皮毛，中而心胃，下而腰臍，在氣主氣，在血主血，有汗則止，無汗則發，燥病能潤，濕病能燥，除風痺之

上藥安脾胃之神品也。又兼參耆而補肺。兼杞地而補腎。兼歸芎而補肝。兼龍眼棗仁而補心。兼苓連而瀉胃火。兼橘半而醒脾。土兼蒼樸可以燥濕和脾。兼天麥亦能養肺生金。兼杜仲。木瓜。治老人之脚弱。兼麥芽。枳樸治童幼之疳癖。黃芩共之。能安胎調氣。枳實共之。能消痞除膨。君參苓藿半。定胃寒之虛嘔。君歸芎芍地。養血弱而調經。溫中之劑無白朮。愈而復發。潰瘍之證用白朮。可以托膿。但其性本清和。而質復重濁。凡病肝腎有動氣者。燥癖成黃疸者。陰虛精血少者。咳嗽骨蒸熱者。寒熱瘧痢邪未清者。下痢積熱未盡者。皆禁也。

陳廷采先生曰。白朮性燥。仲景又言生津。何也。蓋脾惡濕。濕勝則元氣不得施化。津液何由而生。況膀胱爲津液之府。氣化而後能出。用白朮以燥其濕。則氣得周流運用。而津液亦隨氣化而生矣。他如茯苓。係淡滲之藥謂之能生津者。義與此同。

○集方（已下一十方俱出方龍潭本草纂要）治胃虛不納。脾虛不運。飲食不甘。四體困倦。此中氣不足之證。用於白朮土拌炒。二兩。白蒺藜黃耆茯苓廣陳皮白豆仁砂仁各一兩五錢。厚朴二兩。薑汁炒。人參六錢。共爲末。每早晚各食前服三錢。白湯調下。○治虛寒痼冷。泄瀉下利。滑脫不禁。飲食不思。腿痠頭暈。此脾陽衰陷之證。用於白朮土拌炒。三兩。黃耆。補骨脂各三兩。吳茱萸附子童便製。甘草木香人參各五錢。共爲末。餳糖爲丸。如菉豆大。每早晚各食前服三錢。酒下。○治久瘧經年不愈。用於白朮土拌炒。一兩。附子。童便製一錢。肉桂。牛膝。黃耆。人參各二錢。白薇酒洗。一錢五分。水三大碗。煎一碗。食前服。渣再煎。十帖愈。○治久痢屢月不除。用於白朮土拌炒。六錢。茯苓甘草川黃連白芍藥當歸身俱酒拌炒。白豆仁砂仁木香人參各一錢二分。水三大碗。煎七分。不拘時服。渣再煎。十帖愈。○治痰涎上攻。嘔吐眩暈。用於白朮土拌炒。一兩。天麻半夏南星俱薑製。廣陳皮茯苓各三錢。水三大碗。煎一碗。食後服。○治腹滿四肢腫。面色痿黃。用於白朮蒼朮俱土拌炒。各一兩。豬苓澤瀉肉桂茯苓茵陳乾薑各三錢。葶藶

子。一兩二錢。炒。共爲極細末。每早午晚各食前服二錢白湯調下。○治婦人血崩血漏不止。用於白朮土拌炒。五錢。當歸身牡丹皮丹參白芍藥俱酒洗炒。香附烏藥俱醋浸一宿。炒。各三錢。五靈脂水飛去砂石淨。一兩。共爲末。每早晚各食前服三錢。白湯調下。○治自汗盜汗。不止。用於白朮一兩。嫩黃耆白芍藥石斛酸棗仁炒人參沙參各三錢。水煎服。○治中風口噤。四肢痿痺。用於白朮一兩。黃耆人參當歸身枸杞子天麻膽星半夏各三錢。皮桂一錢。水煎服。○治老人脾虛脚弱無力。用於白朮土拌炒。一兩。杜仲木瓜各五錢。水煎服。○治婦人胎氣不安。腰腹脹重。或寒或熱者。用於白朮一兩。黃芩

當歸、川芎各三錢，甘草五分，水煎服。

續補集方：治胸腹痞滿，飲食不消，飽食作脹，用於白朮（土拌炒）四兩，枳實（麩拌炒）三兩，川黃連、乾薑各五錢，木香三錢，共為末，水發丸，如黍米大，每早午晚各食後服三錢，白湯下。○治五飲：酒癖一，留飲水停心下二，癖飲水在兩脇三，痰飲水在胃中四，溢飲水在五藏五，流飲水在腸間，五者皆因飲食胃寒，或飲茶酒，或食生冷肥甘過多所致，用於白朮、蒼朮（俱土拌炒）各四兩，乾薑、肉桂（微焙）、半夏（薑製）、炙甘草（俱酒炒）各一兩，共為末，水發丸，如菉豆大，每早午晚各食前服三錢，白湯下。○治產後中寒，遍身冷僵直，口噤不知人事，用於白朮（土拌炒）、乾薑各一兩，甘草（炙）三錢，水三碗，煎一碗，徐徐服。○治中濕遍身骨節痛，用於白朮（土拌炒）二兩，秦艽五錢，羌活四錢，水煎服。○治婦人血虛肌熱，飲食不甘，用於白朮、白芍藥各一兩，白茯苓五錢，當歸八錢，甘草一錢，水四碗，煎一碗，渣再煎，徐徐服。○治小兒肌熱，蒸蒸羸瘦，不能飲食，方同上，各藥分兩減三之二。○治腸風瀉血不止，而色痿黃，積年不瘥，并脫肛者，用於白朮（土拌炒焦）為末一觔，懷熟地八兩（酒浸，飯鍋上蒸爛），共搗為丸，如梧子大，早晚各服四錢，白湯下。○治面上黯黯如雀卵色，用白朮一塊，醋浸一日，時晚拭之，極效。○治牙齒日長，漸至難食，名髓溢病，用於白朮煎湯漱服。

天麻

味辛甘，溫平，無毒。乃厥陰經氣分藥也。

（陶曰：赤箭生陳倉川谷、雍州、太山、少室諸處，今汴京東西、湖南、淮南州郡及山東鄆、利二州亦有。春生苗，初出如芍藥，獨抽一莖，挺然直上，高三四尺，莖中空，色正赤，貼莖杪之半，微有尖小紅葉，四月稍頭成穗作花，反白色，苑如箭幹，且有羽者，有風不動，無風自搖，結實如棟子，核有六稜，中仁如白麵，至秋不落，却透空入莖中，還筒而下，潛生土內，根如芋，或如王瓜，去根三五寸，育子十二枚，環列如衛，皆有細根如白髮，雖相須，實不相連，但以氣相屬耳。大者重八兩，或五六兩，皮色黃白，肉即天麻也。方家以三四月采苗為赤箭，九月采根為天麻，肉功用稍異，後人分為二種。○修治：初得乘潤刮去皮，沸湯略煮過，暴乾收之，或潤時切片，焙乾用，亦可。○李時珍曰：嵩山、衡山人或取生者，蜜煎作果食，甚美。○其根暴乾，肉色堅白，如羊角色，明亮者，或沸湯炙過，或蒸過，黃皺如乾瓜者，皆可用。一種形尖而空薄，如玄參狀者，不堪用。○世人所用天麻，皆御風草根，非赤箭根也。御風莖葉與赤箭相似，獨莖，色青斑，葉背黃白，根有青點，雖風動搖，子不還筒，治療術同，性惟消痰，補益大謬矣。○沈則施曰：另一種天麻草，生平澤，如益母草之類，似馬鞭草，節節生花，花中有子，如青葙子，子性寒，作飲去熱氣，莖葉搗傅癰腫，實非赤箭、天麻也。）

○天麻祛風化痰，利周身，舒經脈之藥也。活腰膝，驅大人濕痹之疴，通經絡，蘇小兒搐搦之證，故主頭風頭痛，頭暈虛旋，癲癇強痓，四肢拘攣，語言不順，一切中風風痰等證。

沈則施先生曰：天麻乃肝經氣分藥。素問云：諸風掉眩，皆屬于肝，故天麻入厥陰之經，治諸風痰之證。

盧不遠先生曰：苗名赤箭，挺直不佩，陽剛中正者也。乃能獨運，不為物移，故有風不動，無風自搖，見剛之體；能立用能行也，故能殺鬼邪，除惡毒，乃若因風[illegible]如眩暈，如顫振，如驚癇攣癖，盡屬陰邪之證，惟[illegible]

象能勝之。

陳廷采先生曰。天麻言根用。之有自內達外之理。亦猶言苗用之有自表入裏之功。蓋根則抽苗徑直而上。豈非自內達外乎。苗則結子成熟而落。又從幹中而下。入土而生。又非自表入裏乎。以此而觀。粗可識其內外表裏主治精微之極致也。

○集方（普濟方）治風痰風濕。周身不利。經脈不舒。腰膝痿痺。并頭風頭痛。眩暈虛旋。癲癇勁痓。或語言蹇澁不清。四肢攣拘。癱瘓等證。用天麻八兩半。牛膝。當歸。川芎。枸杞子。半夏膽星。白朮。五加皮。牡丹皮。防風。萆薢。羌活。木瓜。紅花。殭蠶各四兩。俱酒洗炒。共爲末。懷熟地十兩。酒蒸爛搗膏

爲丸。如梧桐子大。每服百餘丸。白湯好酒隨下。○治小兒風痰搐搦。不拘急慢驚風。風癇之證。用天麻四兩。酒洗炒。膽星三兩。殭蠶二兩。俱炒。天竺黃一兩。明雄黃五錢。俱研細。總和勻。半夏麴二兩。爲末。打糊丸。如彈子大。遇是患者。用薄荷生薑泡濃湯調化一丸。或二三丸。

○治一人。卒然眩暈。不能起坐。細論其人。好嗜燒酒。飲食少進。仲淳曰。此中氣虛而酒熱之氣上升也。用天麻三錢。白朮二錢。人參一錢。黃連一錢。甘草五分。一劑。[illegible]

桔梗　味苦辛。氣溫。有小毒。味厚氣輕。陽中之陰。升也。入手太陰肺經氣分。其根結實而梗直。故名。

（吳氏曰。桔梗生嵩山山谷。及冤句。今在處有之。二三月生苗。莖嫩時亦可煑食。莖如筆管。高尺許。紫赤色。葉似杏及人參。薺苨葉但杏葉圓。桔梗葉長。人參葉兩兩相對。桔梗葉三四相對。亦有參差不對者。薺苨葉下光明滑澤無毛。桔梗葉下暗濇有毛。爲異。夏開小花紫碧色。頗似牽牛花。秋後結實。根色外白中黃。有心。味苦。若無心味甜者。薺苨也。又關中一種。莖細色青。葉小似菊葉。根黃似蜀葵根者。亦可入藥。○修治。冬月采去浮皮用。○又一種木桔梗。根形頗似。但咬之腥濇不堪。咬。不可入藥。）

○桔梗主利肺氣。通咽膈。寬中理氣。開鬱行痰之要藥也。凡咳嗽痰喘。非此不除。以其有順氣豁痰之功。頭目之病。非此不療。以其有載藥上行之妙。中膈不清。脇肋刺痛。或痰或氣之所鬱。一劑用二陳。佐以枳桔。治之無有不

愈。咽喉口齒。脹滿腫結。或火或熱之所使。劑用荊翹佐以甘桔。治之無有不瘥。所以桔配于枳。有寬中下氣之効。桔配于草。有緩中上行之功。古方立甘桔湯、枳桔湯。以治咽痛鬱結之證。良有義哉。但性本開達。故兒方以此散疵疹。發痘瘄。大方以此除瘟疫。解蠱毒。如桔桴之楫爲少陽少陰樞藥也。又按朱肱活人書。治胸中痞滿不痛。用桔梗枳殼。取其通肺利膈下氣也。張仲景治傷寒寒實結胸。用桔梗貝母巴豆。取其溫中消穀破積也。又治肺癰唾膿。用桔梗甘草。取其苦辛清肺。甘溫瀉火。又能排膿血。補內漏也。其治少陰證二三日咽痛。亦用桔梗甘草。取其苦辛散寒。甘平除熱。合而用之。能調寒熱

也。乾咳嗽，乃痰火之邪，鬱在肺中，宜桔梗以開之。痢疾腹痛，乃肺金之氣鬱在大腸，亦宜桔梗散之，後用痢藥。此藥能開提氣血，故氣藥中宜多用之。

○集方（方脉正宗）治傷寒傷風，咳嗽痰喘，氣逆不下，睡臥不寧。用桔梗四錢，甘草五分，前胡、枳殼、蘇子、防風、杏仁去皮、陳皮、半夏各一錢，生薑三片，葱頭二箇，水煎服。傷熱者，加黄芩、花粉各一錢。○治頭風（同前）頭痛，或時眼暴赤腫痛不寧，用桔梗、白芍各二錢，防風、荊芥、薄荷、羌活、乾葛、柴胡、白芷、益母葉、連翹、甘菊花各一錢五分，甘草八分，水煎服。○治小兒（張文仲方）風熱內盛，外復感寒，風熱寒三氣壅閉，或發寒熱咳嗽，或發痧疹瘖疥、遊風等證，用桔梗一錢，荊芥、

薄荷、防風、連翹、前胡、乾葛、大力子各一錢三分，甘草五分，水煎服。○治時行（丹溪方）瘟疫瘟毒及大頭風瘟諸證，用桔梗、防風、羌活各一錢五分，連翹、白芷、玄參、馬勃、貝、青黛各一錢，甘草八分，半夏薑製二錢，生薑二片，菉豆一撮，葱頭三箇，水煎服。○治中蠱（得效方）下血如雞肝，晝夜不止，將危者，用桔梗四兩，焙燥為極細末，真犀角二兩，鎊，研為細末，二味和勻，用白湯調服數錢，日服三四次，漸止。○治妊娠中惡，腹痛衝心欲死，用桔梗一兩，薑三片，菉豆一撮，水煎服。○治小兒（衛生方）客忤，垂死不能言，用桔梗五錢，水二鍾，煎減半，臨服研麝香二分和入。○治打（肘後方）撲跌瘀血內結不散，愈後時發動者，用桔梗二兩，水煎服。

知母　味甘苦辛，氣寒，無毒。氣味俱厚，沉而降，陰也。腎經本藥，入足陽明、手太陰經氣分。（蘇頌曰：出瀨州、懷衛、彰德及解州、滁州、彭城諸處。二月宿根再發，四月開花，色青如韭，八月結實，根形似菖蒲而柔潤，至難死，掘出隨生，須枯燥乃止。入藥揀肥潤裏白者良。日用）

○知母乃滋陰濟水之藥也。養腎水，有滋陰之功；瀉腎火，有生津之効。故主陰虛不足，發熱自汗，腰疼背折，百節煩疼，津液乾少，咳嗽無痰，頭眩昏倦，耳閉眼花，小便黄赤。是皆陰虛火動之證，惟此可以治之。又如傷寒邪熱有餘，煩渴引飲，目赤唇焦，若暑瘧熱煩悶亂，口燥咽乾，是皆內熱火盛之證，惟此可以清之。又若陰火攻沖，使咽癢肺嗽；遊火遍行，使骨蒸有汗；胃火燔灼，使消渴熱

中，舍知母，其誰治乎？則滋陰降火，瀉南補北，是知母之長技也。故仲景用此入白虎湯，治陽明胃熱，大汗大渴，君以石膏之辛寒，以清肺之源；佐以知母之苦寒，以清腎之火；緩以甘草粳米之甘和，使不傷胃也。又凡病小便閉塞而渴者，是熱在上焦氣分，由肺中伏熱不能生水，膀胱絕其化源，法當用麥冬、玄參、薄荷、桑皮氣薄味淡滲之藥，以瀉肺火，清肺金，滋水之上源，小便自行矣。若小便閉塞而不渴者，是熱在下焦血分，乃真水不足，膀胱乾涸，無陰則陽無以化，法當用黄柏、知母大苦寒之藥，以補腎與膀胱，使陰氣行而陽自化，小便自通矣。

周振公曰本草云腎苦燥宜食辛以潤之肺苦逆宜食辛以瀉之知母辛苦而寒下則潤腎燥而滋陰上則清肺金而瀉火乃氣分藥也非若黃栢苦寒走血分也

○集方治陰虛不足發熱自汗腰痠背折百節煩疼咳嗽無痰津液乾少頭眩昏瞶耳閉眼花小便黃赤等證用知母四兩地骨皮沙參黃耆牛膝懷熟地黃栢川貝母百合麥門冬兎絲子山藥山茱萸各二兩人參一兩或爲丸或爲膏每早晚各服三錢白湯下○治傷寒邪熱內盛齒牙乾燥煩渴引飲目昧唇焦用知母五錢石膏三錢麥門冬二錢甘草一錢人參八錢水煎服○治溫瘧熱煩悶亂口燥咽乾用知母白芍藥各五錢甘草三

錢柴胡半夏青皮川黃連各一錢人虛加人參黃耆各一錢五分水煎服○治久近痰嗽氣急胸膈閉塞用知母川貝母各一兩爲極細末每服一錢用生薑一片蘸藥細嚼嚥下便睡不過三四次愈○治妊娠胎氣不安煩不得臥病名子煩用知母二兩炒爲末棗肉丸如彈子大早晚各服一丸白湯化下

○治老人氣虛不大便用桔梗一兩懷熟地五錢紫菀一兩二錢水煎服即通○治妊娠胎氣下陷腰痠痛小便頻數用桔梗五錢當歸身三錢白朮二錢川芎一錢甘草五分加黑棗三個生薑三片水煎服

沙參　味苦甘氣微寒無毒入手太陰肺經又爲肝脾二經氣分藥也

別錄曰沙參生河內川谷及寃句般陽續山二月八月采根立夏後母根枯死○蘇氏曰今出淄齊潞隨江淮荊湖州郡沙磧中或叢生厓壁間二月生苗初生如小葵葉團匾不光八九月抽莖莖端葉尖長如枸杞邊有細齒葉間開小花五出色紫長如鈴鐸亦有色白者瓣有白粘膠結實如冬青實中有細子霜後苗枯生沙土地者根長尺許若生黃土地者根則短小根莖俱有白汁如乳故名羊乳根乾時宛似人參中黃外白世所用者皆僞不知爲何物也

○沙參清肺熱疎肝逆解脾火之藥也蓋稟天地清和之氣味甘苦而寒王好古謂苦者味之陰也寒者氣之陰也甘乃土之沖氣所化合斯二者故補五藏之陰而治熱勞欬嗽并瘵諸因熱所生病設使藏府無實熱而肺

虛寒客之作嗽愼勿服也

盧不遠先生曰色白而乳肺金之津液藥也藥生沙磧而氣疏質本秋成而性潔參容平之金令轉炎蒸爲清肅者也故可汰除肺靑因熱傷氣分爲胸痺爲寒熱及藏眞失行營衛陰陽致氣不呴血不濡者功用頗捷

○集方治陰虛火炎咳嗽無痰骨蒸勞熱肌皮枯燥口苦煩渴等證用眞北沙參麥門冬知母川貝母懷熟地鱉甲地骨皮各四兩或作丸或作膏每早服三錢白湯下

○治一切陰虛火炎似虛似實逆氣不降淸氣不升爲眩爲渴爲欬爲敷爲脹爲滿不食用眞北沙參五錢水煎服（林仲先醫案）

遠志。味苦甘辛。氣溫無毒。手足少陰二經藥也。（陶隱居曰：出泰山及宛句川谷。宛句屬兗州濟陰郡。今從彭城北蘭陵來。河陝雒西州郡亦有之。有大葉小葉二種。俱三月開花。四月采根。大者葉大花紅。根亦肥大。小者葉小。花白。苗似麻黃而青。葉似大青而小。根形如蒿而黃色。苗即小草也。○蘇氏曰：泗州出者花紅根葉俱大。商州出者根黑色。俗傳夷門出者最佳。修治取遠志一觔。止得三四兩。此草服之能益智强志。故有遠志之稱。）

○遠志通心氣、補腎氣之藥也。主利九竅，聰耳目，而安神明，解鬱結，定驚悸，而止夢泄，益精補腎，開心靈于未發之天，達衛調營，散痰痹于已頑之疾。氣味清芳，無消無滯，不寒不燥，爲心腎二經養精養血之妙品也。經曰：腎藏精，精合志。腎精不足，則志氣衰，不能上通于心，故迷惑善忘。遠志之功，專于益精强志，故治善忘特效。

繆仲淳先生曰：遠志感天之陽氣，得地之芳烈而生，陽草也。其菖蒲之流乎。其味苦甘辛而溫，爲手足少陰二經君藥。苦能養血，甘能養精，辛能散鬱，故利九竅，通心氣，益智慧。心有積想，則氣鬱矣；心有伏痰，則驚悸神亂而不寧矣。心氣開通，則神志安而驚悸定。又相火自靖，意不妄動，則精不妄瀉，陽不妄舉矣。心清則腎水自安；腎安則淫火自熄，瘖痹夢想動惕之證，何所有焉。

盧子由先生曰：志，意也，心之所之，心之所御也。藏于腎而用于心，故處則爲意，出則爲志也。意居六根之六，志居五神之五，可謂遠也已矣。維爾之遠，乃可神神明之欲動欲流，圓通無礙，令根身聰慧輕安也。如是則何有于器界六淫潛入根身之中，而爲塡塞奔逆者哉。

王紹隆先生曰：遠志清虛芳烈，陽藥也。入手少陰經，益心。心爲君主之官，神明出焉。天君既定，五官自明，百體從令矣。

沈則施先生曰：遠志同人參、茯苓、白朮，能補心；同黃耆、甘草、白朮，能補脾；同地黃、枸杞、山藥，能補腎；同白芍、當歸、川芎，能補肝；同人參、麥冬、沙參，能補肺；同辰砂、金箔、琥珀、犀角，能鎮驚；同半夏、膽星、貝母、白芥子，能消驚痰；同牙皂、鉤藤、天竺黃，能治急驚；同當歸、六黃湯，能止陰虛盜汗；同黃耆、四君子湯，能止陽虛自汗。○獨一味煎膏，能治心下膈氣，心氣不舒；獨一味釀酒，能治癰疽腫

毒，年久瘡痍從七情鬱怒而得者，服之漸愈。

陳氏三因方用遠志酒，治一切癰疽發背惡候。有死血陰毒在中則不痛，傅之即痛；有憂怒等氣內攻則痛不可忍，傅之即不痛；或蘊熱在內，熱逼人手不可近，傅之即清涼；或氣虛冷潰不斂，傅之即斂。若七情內鬱，不問虛實寒熱，治之皆愈。用遠志不拘多少，米泔浸洗，槌去心，爲末。每服三錢，溫酒調澄少頃，飲其清酒，以滓敷患處。

○集方　治耳目昏重，精神恍惚。用遠志三兩，棗仁二兩，當歸一兩，蒼耳仁五錢，枸杞子、甘菊花各四兩，爲丸，每早晚各服三錢，白湯下。○治情鬱神虛，怔忡驚悸，夢遺

精及婦人夢與鬼交等證，用遠志三兩，棗仁二兩，黑山梔仁一兩，茯苓八錢，當歸、川芎各五錢，爲丸，每早晩各服三錢，白湯下。○治怔（同前）忡健忘，驚悸恍惚，用遠志、棗仁、當歸身、白茯苓各二兩，爲丸，每早晩各服三錢，白湯下。○治心（肘後方）孔昏塞，多忘善誤，丁酉日取遠志肉二兩，炒爲末，每晩臨睡時服一錢，白湯下。○治喉（直指方）痺作痛，用遠志炒爲末，吹之，涎出爲度。○治一（三因方）切癰疽發背惡毒，用遠志肉不拘多少，炒爲末，用好酒一盞，調末三錢，澄清，將酒飲之，其滓末敷患上。其赤痛者敷之即止，不痛者敷之即痛，熱者敷之清涼，冷者敷之溫煖，焮腫者敷之消減，平陷者敷之起發，未潰者敷之即潰，潰久不斂者敷

之即斂。○治小（濟生方）便赤白濁，用遠志肉二兩，甘草一兩，茯苓五錢，益智仁三錢，共爲末，酒糊丸梧子大，每空心白湯下二錢。

○續補集方（陳肯巷自製方）治氣鬱成蠱，服諸藥不効者，用遠志肉四兩，麩拌炒，每日取五錢，加生薑三片煎服。○治婦人無病而不生育者，用遠志二兩，和當歸身一兩，炒燥和勻，每用藥一兩，浸酒二壺，每日隨量蚤晩飲之，三月即受孕。

○治小（方脈正宗）兒胎驚，用遠志肉三錢，天麻一錢，半夏五分，生薑二片，煎汁半盞，調天竺黃、硃砂末各二分，與服。

巴戟天。　味辛甘，氣微溫，無毒。補肝腎二經血分藥也。（蘇氏曰：出巴郡及下邳山谷，今江淮河東州郡亦有，不若蜀中者佳。多生山林內，葉似茗，經冬不枯，又似麥門冬葉而厚大，秋深結實，根如連珠，宿根青色，嫩根紫白，以連珠多肉者爲勝。土人采根，同黑豆煮紫，殊失氣味。一種山律根，極相似，但色白，土人以醋煮，僞充巴戟，莫能辨。但擊破紫而青白，如糝粉色，其理小暗者，眞也；紫而鮮潔者，僞也。又一說，巴戟天形如念珠，本有心，乾縮時偶自落，或抽去心，中有小孔子，堅硬難搗。）

○巴戟天，強陰益精之藥也。生血脈，去大風瘡癩之虞，堅骨髓，起腰膝陽衰之證。病人肝腎虛者，舍此不治。有益壽延年之妙用也。觀夫草枝木葉，至冬莫不隨天地肅殺之氣而零落，獨此凌寒不凋，與天相戰，專得陽剛之氣最厚也。日華子謂扶男子陽絕不興，而子嗣難成；啓女人陰器不舉，而胎孕少育；或肝失用，而血海早枯；或

形失主，而手足痿痹，種種形神兩疲之疾，用此靡不奏功。他如補中益智，健膝壯筋，又不待言矣。

金靈昭先生曰：巴戟天稟土德眞陽之精，經冬不枯，草本而得松栢之幹，是常木之體而兼金之用也。故其味辛而甘，性能補助元陽，而兼散邪，況眞元得補，邪安所留？此所以愈大風瘡癩也。主陽衰陰痿不起，強筋骨，補血海者，是肝腎二經得所養，而諸虛自愈矣。況筋骨血脈之病，腎爲之主，腎家之眞陽強，則邪火降，邪火降，則眞水升，陰陽互宅，精神內守，故腎氣滋長，元陽益盛，諸邪爲病者，不求其退而自退矣。○此藥性溫屬陽，凡病相火熾盛，思慾不得，便赤口苦，目痛目眶煩熱，口渴大

便燥閉諸證咸宜忌之。

○集方（孫林仲若盛方）治陽衰氣弱，精髓空虛，形神憔悴，腰膝痿痹，或女人血海乾虛，經脈斷續，子嗣難成。用巴戟天八兩，當歸、枸杞子各四兩，廣陳皮、川黃柏各一兩，俱用酒拌炒，共爲末，煉蜜丸梧桐子大，每早晚各服三錢，白湯下。男婦皆可用。

○治一切陽虛氣陷，似虛似實，逆氣不降，清氣不升，爲眩暈，爲倦怠，爲痛，爲麻，爲泄利，大便不實，小便短澀，或氣短聲微，或腰脊痿弱，或因久勞形役，筋力衰疲者。用巴戟天，酒炒過，每日用五錢，水煎，空心服。（朱少先醫案）

肉蓯蓉　味甘酸鹹，氣微溫，無毒。

（陶弘景曰：出西河山谷及代郡雁門，或并州，或陝西州郡多有之。叢生教落樹下并土塹上。春時抽苗，似肉色而紅，有鱗甲。第一出隴西者，形扁紅黃，柔潤多花，味甘且肥也。西人多用作食，洗淨亦可生啖，或以羊肉和煮，補虛之極美。次出北國者，形短花少。巴東建平間亦有，而不佳。有言馬精落地所生，觀教落樹下併土塹上，此非馬交之處，或謬說耳。今人以金蓮花根鹽潤充之，又以嫩松梢鹽拌偽之，用者宜辨。修治：以米泔水浸，以椶刷刷去沙土浮甲并黑汁，劈破中心，去白膜一重，如竹絲草樣者。有此能隔人心氣，致令氣上也。○韓保昇曰：有出肅州福祿縣沙中，三四月掘根，長尺餘，切取中央者三四寸，繩穿陰乾，皮有松子鱗甲。又草蓯蓉四月中旬采，長五六寸或一尺，莖圓紫色，以代肉蓯蓉，助力補劣，用者宜審。）

○肉蓯蓉，養命門，滋腎氣，補精血之藥也。（程君安稿）主男婦五勞七傷，陰虛不足，情慾斲喪，以致羸弱，或精髓空虛，腰膝無力，或莖中痛澀，寒熱交作，或崩帶淋瀝，血氣虛冷，或癥瘕內痛，攻痛不時，是皆腎氣不足，命門虛竭之證。又男子丹元虛冷，而陽道久沉，婦人衝任失調，而陰氣不治。此乃平補之劑，溫而不熱，補而不峻，暖而不燥，滑而不泄，故有從容之名。

沈則施先生曰：肉蓯蓉，味甘酸鹹，溫平無毒，補腎命之要藥。甘能入脾以除熱，酸能入肝以化癥，鹹能入腎以治勞。肝腎爲陰，陰氣滋長，則五勞之熱自退，陰莖澀痛寒熱自愈。肝腎充和，則精血自盛，陽絕可興，陰絕可舉，故能子。又婦人癥瘕內痛，血分有留積也。精血得補，則絡脈通行，絡脈通行，則癥瘕內痛自除矣。○若腎命有鬱火，膀胱有濕熱，與強陽易興，精不固者，禁用。

瑣陽[illegible]味甘，氣溫，無毒。

（李時珍曰：出肅州，或陝西，及西夷韃靼地面。其形如筍，上豐下儉，鱗甲櫛比，筋脈聯絡，絕類男陽，即肉蓯蓉之類。土人掘取洗淨，去皮，薄切，晒乾，功力十倍于蓯蓉。）

○瑣陽，興陽固精，強陰益髓，潤大腸燥結之藥也。但味甘可啖，煮粥益佳，入藥尤效。虛人血枯，大便燥結者宜之。脾虛有濕痰溏泄者勿用。

○集方：治男婦陰陽衰陷，瘦弱不振，腰膝無力，頭眩足重，精髓空虛，血脈絕少，婦人崩帶淋瀝，或癥瘕內疝，男子遺精失溺，或蒸中遊痛等證。用肉蓯蓉八兩，依前法修製，搗爛成膏，配入鹿角膠、龜甲膠、鱉甲膠、當歸、白朮、山藥、杜仲、牡丹皮、山茱萸、茯苓、芡實各三兩，萆薢四兩，牛

膝五兩，俱炒過，共爲末，煉蜜丸梧桐子大。每早晚各服三錢，白湯下。○治破傷風口噤身強，用肉蓯蓉切片，晒乾，燒烟于瘡口薰之，累効。

集方（方龍潭本草切要）：治男婦陽弱精虛，陰衰血竭，大腸燥涸，便秘不運諸證。用瑣陽三觔，清水五斗，煎濃汁二次，總和，以砂鍋內熬膏，煉蜜八兩收成，入磁瓶內收貯。每早午晚各食前服十餘茶匙，熱酒化服。

玄參　味苦，氣寒，無毒。足少陰腎經藥也。

（陶隱居曰：生河間川谷及冤句。今仁和筧橋、山陽近道亦有。二月生苗，高四五尺，其葉有毛，莖方而細，色青紫。葉似芝麻對生，又如槐柳，尖長，邊有鋸齒。七月開花青碧，八月結子黑色。又有白花者，莖方而大，有節若竹，色紫赤。葉似烏藥，七月開花白色，或茄花色，形似大薊花，端叢刺，刺端有鉤，最堅且利。八月結子黑色，其根一株五七枚，有腥氣。七八月采，曝乾。老根不用，在地者中空，或云地蠶食之故也。○此藥忌犯銅鐵器。）

○玄參，濟水滋陰，散風解熱之藥也。散火鬱，解陽明胃熱之疹疰，益陰精，治虛勞寒熱之骨蒸。此乃樞機之劑，管領諸氣，上下肅清而不濁。故上焦之火，發于咽喉腮頰唇齒之間，焮赤腫脹，及皮膚癍疹不消，痘瘄火鬱不透；下焦之火，小便赤濁，癃閉淋瀝，小腹急疾，及腎水受傷，孤陽浮越，發爲火病，當壯水主以制陽光，惟玄參與生

地爲最也。又陰虛火盛，咳嗽無痰，腎銷骨蒸，勞熱潮熱，又傷寒汗下後，熱毒不散，心下懊憹不得眠，心神顛倒欲絕者。以上諸證，俱用玄參，其功可知矣。其味苦，其氣寒，具備少陰之體用者也。

金靈昭先生曰：玄參乃樞機之劑，配荆防而治火于上，配知栢而治火于下，配膽星、半夏祛一切暴發風痰，配知母、麥冬療一切虛火痰嗽，配升麻、鼠粘起痘瘄于將萌之初，配麥冬、竹葉解傷寒陽毒于汗下之後。此藥性寒而潤，如胃寒停飲，腹脹寒熱，脾虛泄瀉，並不宜服。

盧子由先生云：玄參味苦，氣寒，本草言補腎氣者，補腎氣方萌之機兆，非補腎藏欲藏之形質。

○集方、治陽明胃熱、咽腫齒疼。并頭面眼耳一切火病、及時行熱毒疹瘖癍疔諸證。用玄參、大力子各五錢、前胡、荊芥、桔梗、薄荷各二錢、羌活、防風、連翹、白芷各一錢、水煎服。○治陰虛火炎、口乾寒熱、骨蒸夜熱、咳嗽無痰、大便結燥、小水短赤、或癃閉不通、淋瀝白濁等證。用玄參四兩、沙參、白芍、懷生地、銀柴胡、地骨皮各三兩、黃柏、知母各二兩、甘草一兩、分撮作二十劑、水煎服、或總和一處、煎汁熬膏煉蜜收、每早晚白湯調服十茶匙亦可。○治傷寒汗下後、熱毒不散、心下懊憹、不得眠、心神顛倒。用玄參、知母各一錢、甘草五分、茯苓一錢、加生薑三片、黑棗三箇、水煎服。○治陽毒發斑、咽痛煩渴者。

用玄參、升麻、甘草各五錢、水煎服。○治急喉痺風、不拘大人小兒、用玄參、鼠粘子各一兩、水煎服、立瘥。○治夜走勞倦、或言語煩雜、或謀慮過多、心火妄動、一時眼目將花、心神振搖、頭眩欲倒。用玄參四錢、麥門冬三錢、茯苓二錢、人參一錢、生薑三片、大棗三個、水煎服。○治時行暑熱、日下奔走、頭眩煩悶、精神疲倦、口燥焦渴。用玄參五錢、麥門冬、白朮、知母各三錢、水煎服。

丹參。味苦、氣微寒、無毒。色赤、氣平而降。入手少陰厥陰經心與包絡血分藥也。

（李時珍曰、五參合五色以配五臟。故人參曰黃參、入脾。沙參曰白參、入肺。紫參曰青參、入肝。丹參曰赤參、入心。玄參曰黑參、入腎。其苦參、則命門之藥也。○生陝西河東州郡、及隨州皆有之。二月生苗、高尺許。莖方有稜。枝五葉、葉對生、葉如野蘇而尖。青色有毛。三月至八月開小紫花、成穗如蛾形。又似紫蘇花。中有細子。一苗數根、大如指、長尺許。皮丹肉紫。）

○丹參。善治血分、去滯生新、調經順脈之藥也。主男婦吐衄淋溺、崩血之證、或衝任不和、而胎動欠安。或產後失調、而血室乖戾、或瘀血壅滯、而百節攻疼、或經閉不通而小腹作痛、或肝脾鬱結、而寒熱無時、或癥瘕積聚、而脹悶痞塞、或疝氣攻衝、而止作無常、或腳膝痺痿、而痛

重難履、或心腹留氣、而腸鳴幽幽、或血脈外障、而兩目痛赤。故明理論以丹參一物、而有四物之功。（補血生血、功過歸地。調血斂血、力堪芍藥。逐瘀生新、性倍芎藭。）婦人諸病、不論胎前產後、皆可常用。而時醫每用每效。此良方也。

朱東生先生曰、丹參入天王補心丹、則養心。　同四物湯、則補血調血、治胎前一切病。　同鼈甲、玄胡、牛膝、乾漆、赤芍、牡丹皮、除癥瘕積聚寒熱。　同小柴胡、合四物湯、加牡丹皮、香附、玄胡、治鬱結寒熱。　同三稜、莪朮、牛膝、細辛、桃仁、則破血。　同當歸、川芎、枸杞、阿膠、地黃、則補血。　同麥門冬、沙參、北五味、知母、治肺虛勞。　同人參、麥門冬、酸棗仁、地黃、則益氣養血。　同牛膝、虎脛、

木瓜、杜仲、續斷，治腰脊脚膝痿痺。同玄胡、小茴香、橘核，治男子冲疝。

馬瑞峯先生曰：丹參能破宿血，補心血，安生胎，落死胎，止崩中帶下，調經脉，治腰脊百節痿痛，凡軟脚弱等病，以酒炒末服。藥平而効驗殊異。

○集方治男婦吐衂淋溺崩血之證，用丹參一兩，當歸身三錢，懷熟地五錢，白芍藥二錢，黃芩、知母、茯苓、牡丹皮、各一錢五分，甘草七分，水煎服。

○治產後虛喘，予婦產後五日，食冷物，怒傷肝，又作泄，又作嗽，又三日泄不止，手足冷，卒然發喘，覺神氣飛蕩不守。一醫以丹參二錢，人參三錢，附子二錢，煎服如故，又

加參附，又不效。仲淳竟用人參三兩，附子五錢，童便製丹參五錢，鹽水炒，水五碗，煎二碗，徐徐進之，半日許，喘即霍然而定。○治婦人卒然風狂，妄言妄動，不避親疎，不畏羞耻，用丹參八兩，醋拌炒，研極細末，每早晚各服三錢，淡鹽湯調灌，三日即愈。

地榆，味苦微酸，氣寒，無毒，沉而降，陰也。入足少陰、厥陰、手足陽明經。

（陶隱君曰：生桐柏及冤句山谷，今處處平原川澤亦有。三月宿根布地，作苗獨莖直上，高三四尺，對分出葉，青色，似榆葉，稍狹細而長，邊有鋸齒。七月開花如椹，九月采根，根似柳根，外黑內紅。根可釀酒，山人乏茗，摘葉亦可作飲，或作蔬用。）

○地榆，苦寒，凉血止血之藥也。達下焦，止腸風下血、痔痢之紅，消熱癰，治諸瘻惡瘡、乳癰之疾。其性苦寒酸收，療一切熱散氣流而動血者，故他書有吐衂溺血、月經妄行，或中酒熱，及小兒疳熱積痢，兼可收治，總因血熱爲害也。若脾胃虛寒，泄瀉癰瘡，久病無火，并陽衰血證，並禁用之。

○集方治腸風下血、穀道腫癢不止，用地榆一兩，蒼术五錢，米泔浸一宿，水二碗，煎八分，食前服。○治結陰下血，腹痛不已，用地榆四兩，炒甘草、炒砂仁、炒炮薑灰各一兩，共爲末，每服五錢，白湯調服。○治乳癰諸瘻，用地榆三兩，蒲公英二兩，俱酒洗炒，乳香、沒藥各一兩，瓦上焙出汗，共爲細末，每服三錢，食後白酒調下。○治吐血、衂血，或溺中帶血，或糞前後見血，用地榆五錢，懷熟地三錢，當歸、白芍藥各二錢。如吐血，本方加牡丹皮、茜草各二錢；衂血，加川黃連、炮薑末各一錢；溺血，加玄參、車前子各二錢；便血，加蒼术、炮薑灰各三錢。俱用水二大碗煎服。○（治小兒疳熱積痢，用地榆八兩，煎汁二次，成搗內熬如餳，不時與服半茶匙，白湯調下。）

白頭翁味苦氣微寒無毒可升可降陰中陽也。（李時珍曰生山谷田野在處有之春生苗作叢狀似白微而柔細稍長葉生莖頭如杏葉上有細白毛而不滑澤近根有白茸根似蔓菁色深紫其苗有風不動無風自搖與赤箭獨活鬼臼同也二月作蕋色黃開花色紫似木槿花修治二月采花四月采實八月采根皆日乾用花子莖葉根並無毒出河南洛陽新安山中多服此云令人壽考之）

○白頭翁涼血消瘀解濕毒之藥也。解傷寒治熱利之下重祛濕瘧定狂惕之如迷又治癥瘕積聚瘰癧寒熱男子陰疝偏墜小兒頭禿腥瘡熱毒下痢鮮血紫血者咸宜服之因其味苦性寒苦能下泄寒能除熱具諸功能故悉主之殆散熱涼血行瘀之要藥歟。

楊太和先生曰張仲景治熱痢下重用白頭翁湯主之蓋取其腎欲堅急食苦以堅之之意痢則下焦虛故以純苦之劑堅之。

繆仲淳先生曰白頭翁苦寒滯下胃虛不思食及下利完穀不化諸病由于虛寒寒濕而不由于濕毒者忌之。

○集方。（治熱痢下重用白頭翁二兩川黃連黃柏各五錢水一升煎二合服如婦人產後痢疾虛極者本方加眞阿膠一兩甘草三錢○治溫瘧發作昏迷如死用白頭翁一兩柴胡半夏黃芩檳榔各二錢甘草七分水煎服○治婦人癥瘕積聚用白頭翁不拘多少酒炒爲末每服三錢白湯調服○治瘰癧延生身發寒熱用白頭翁二兩當歸尾牡丹皮半夏各一兩炒爲末每服三錢白湯調下○治男子疝氣或偏墜用白頭翁荔枝核各二兩俱酒浸炒爲末每早服三錢白湯調下○治小兒白禿頭瘡用白頭翁根搗爛敷一宿作瘡半月後愈）

黃芩味苦氣寒無毒味薄氣厚可升可降陰中陽也入手太陰少陰太陽陽明及足少陽經。（陶隱居曰黃芩生建平郡及兗何山谷彭城鬱州及宜州鄜州涇州今川蜀河東陝西諸郡亦有俱二月生苗長尺餘莖幹粗如筯中空外方葉色黃赤從地四面叢生五月開花花色紫實色黑根色黃根圓者名子芩曰條芩即小根之內實者根破者名宿芩即大根之內虛者其心黑爛故有腐腸妬婦諸名又一種獨莖者其葉細長而青根如知母粗細長四五寸八月采根暴乾又云西芩多中空而色黔北芩多內實而深黃兗州一種大而實者名豚尾芩亦妙）

○黃芩清理三焦消痰降火之藥也。（東垣）凡病痰火咳嗽喘急氣盛或黃疸濕熱骨節煩疼或小便赤濁小腹急疾或熱毒骨蒸寒熱虛勞或痢疾赤白大便後重或天行疾熱目痛腫赤六者非黃芩不能治又曰清肌退熱柴胡最佳然無黃芩不能涼肌達表上焦之火山梔可降然舍黃芩不能上清頭目本草云氣清而親上味重而降下此劑味雖苦寒而有泄下之理體質枯飄而有升上之情故善能治三焦之火者也所以方脈科以之清肌退熱瘡瘍科以之解毒生肌光明科以之散熱明目婦女科以之安胎理經此蓋諸科半表半裏之首劑也。

王少宇先生曰按黃芩其性清肅可以除邪其味苦可以燥濕其氣寒可以勝熱故能瀉心火泄痞熱則邪火不流入肺而金不受刑即所以救肺也傷寒少陽證寒熱胸脇痞滿心煩嘔或渴或小便不利雖曰病在半表半裏而係心肺上焦之邪又兼脾胃中焦之證故用黃

芩。亦少陽本經藥也。前人云柴胡退熱。不及黃芩。不知柴胡之退熱。乃苦以發之。散火之標也。黃芩之退熱。乃寒以勝熱。折火之本也。別錄謂黃芩治小腹絞痛而利小腸。然仲景又云腹中痛者。去黃芩。加芍藥。心下悸小便不利者。去黃芩。加茯苓。似乎相反。蓋亦有說也。若因飲食受寒。腹中痛及飲水多。心下悸。小便不利者。是裏無熱證。黃芩不可用也。若熱厥腹痛。肺熱而小便不利者。黃芩可不用乎。

高元鼎先生曰。黃芩。苦能燥濕。苦能泄熱。苦能下氣。如中枯而輕飄者。主上行。清肺部而止嗽化痰。并理目赤疔癰。細實而堅者。下降。清大腸而除濕治痢。兼可安胎利濁。二用少有別也。

李時珍先生曰。黃芩入小柴胡湯。治傷寒寒熱。邪在少陽。亦治少陽瘧。往來寒熱。傷寒心下諸痞滿證。用諸瀉心湯。（傷寒。心下滿而鞕痛者。爲結胸。宜陷胸湯。心下滿而不鞕痛者。爲痞。用半夏瀉心湯。傷寒。心下痞而復惡寒。汗出者。用附子瀉心湯。傷寒汗出解之後。心下痞鞕。乾噫食臭。脇下有水氣。腹中雷鳴。下利者。用生薑瀉心湯。傷寒中風。醫反下之。下利日數十行。腹中雷鳴。心下痞鞕而滿。乾嘔心煩。用甘草瀉心湯。）皆用黃芩以主諸熱。利小腸故也。又太陽病下之。利不止。喘而汗出者。有葛根黃芩黃連湯。又太陽少陽合病。下利。黃芩湯。若嘔者。黃芩加半夏生薑湯。成氏言黃芩苦而入心。泄痞熱。清心火。去脾濕也。諸方故多用之。　同白芍藥、黃連、炙甘草、滑石、升麻。治痢疾腹痛。　同白芷、天

麻。治風熱有痰。眉眶作痛　同白芍藥、麥門冬、白朮。能安胎清熱。　治大人小兒火丹。爲末。用雞子清調敷。又治驢馬負重傷破。洗淨敷之。立生肌肉。

繆仲淳先生曰。黃芩爲苦寒清肅之藥。功在除熱邪。利痰氣。然苦寒能損胃氣而傷脾陰。脾肺虛熱者忌之。故凡中寒作泄。中寒腹痛。肝腎虛而少腹痛。血虛腹痛。脾虛泄瀉。腎虛溏瀉。脾虛水腫。血枯經閉。氣虛小水不利。肺寒喘欬。及血虛胎不安。陰虛淋露等證。法並禁用。

○集方　治痰火咳嗽。氣盛喘急。用黃芩三錢。黑山梔、蘇子各一錢五分。茯苓、杏仁各一錢。水煎服。○治黃疸。面目身黃。骨節煩疼。因濕熱者。用黃芩、秦艽、黑山梔、薄荷各二錢。茵陳三錢。水煎服。○治小便赤澁。或白濁淋閉不通。用黃芩、木通各三錢。茯苓一錢五分。甘草一錢。水煎服。○治骨蒸內熱。或虛勞寒熱。用黃芩三錢。知母、花粉、沙參、麥門冬、懷生地、地骨皮、黃栢各二錢。白芍藥、當歸各一錢五分。水煎服。○治赤白痢疾。大便後重不通順者。用黃芩、山查各三錢。枳殼、厚朴、白芍藥各二錢。川黃連一錢。甘草五分。水煎服。如腹痛閉滯不通者。本方加大黃一錢二分。○治傷寒三陽協熱利。口渴。下清水。日數行。用黃芩、柴胡、花粉、甘草各一錢。水煎服。○治時行暴發赤眼。腫痛難忍者。用黃芩二錢。連翹、柴胡、龍膽草、防風各一錢五分。水煎服。○治吐血衄血。或咳或[illegible]

黃芩一兩爲末，每服三錢，白湯調下。○治血淋熱痛，用黃芩一兩，水煎熱服。○治婦人五十後經水當斷不斷，每月經來反過多不止，用黃芩四兩，香附二兩，懷生地六兩，俱切片，俱用醋浸三日，曬乾炒爲末，醋糊爲丸梧桐子大，每早晚各服三錢，白湯下。○治肝熱不安，用黃芩、白朮各等分，俱微炒爲末，煉蜜丸梧桐子大，每早服三錢，白湯下。○治小兒驚癇，用黃芩、人參各等分，爲細末，每服三五分，白湯調下。○治產後發渴，用黃芩、麥門冬各五錢，水煎服。

○續補方：治男婦相火時發不能忍，用黃芩一兩，懷生地五錢，甘草三錢，水煎服。○治老幼男婦無故夜熱盜汗，又能飲食起居平常無他疾者，用黃芩一兩，麥門冬五錢，黑棗十個，水三碗，煎一碗服。○治痢疾後重不通，淋漓不斷，用黃芩一兩，白芍藥三錢，大黃二錢，甘草一錢，水四碗，煎一碗，食前服。

治春夏秋感冒非時暴寒，亦有頭疼惡寒發熱脈浮緩自汗，用黃芩、黃耆、羌活、桂枝、川芎、白芷、防風、甘草、生地黃各一錢五分，細辛五分，生薑三片。○治吞酸吐酸水，刺心不安者，用黃芩一兩，吳茱萸五錢，甘草四錢，人（參三錢，陳皮二錢，芒硝一錢五分，共爲末，水發爲丸菉豆大，每食後服二錢，白湯下。）

秦艽。味苦辛，氣溫無毒。陰中微陽，可升可降。入手足陽明經。

（李時珍曰：出飛鳥山谷及甘松、龍洞、涇州、鄜州、岐州諸處。枝幹高五六寸，葉婆娑如萵苣葉，莖梗俱青，六月開花紫色，似葛花，當月結子。根黃白色，長尺許，作羅紋交糾，其文左列者佳，右列者次之。每于春秋二季采根[illegible]乾，拭去黃白毛用。紋中多土，宜洗去。）

○秦艽清熱去濕，祛風利水，養血榮筋之藥也。散風寒濕邪，療五疸蒸熱而發黃，通筋骨絡脈，去痿痺攣急之疼痛，又止腸風藏毒，痔血，白帶，寒熱，骨蒸等證，統屬陽明一經之病也。蓋陽明有濕，則身體煩疼；陽明有熱，則日晡潮熱骨蒸；陽明有風，則腸澼痔血，寒熱淋帶。秦艽專入陽明，故盡能去之。

盧不遠先生曰：人身直者爲經，橫者爲絡，絡之下注者爲孫。肌腠之邪，多從孫入，次薄于絡，復溜于經，漸傳於藏。秦艽羅紋交糾，錯綜如織，象形從治法也。

沈則施先生曰：秦艽味苦辛溫，感秋金之氣，故入手足陽明經。苦能泄，辛能散，溫能通，故主寒熱邪氣，濕熱黃疸，腸紅痔帶，或機關不利，爲痠，爲躄，爲縱，爲攣，爲麻，爲[illegible]痛，而諸因濕、因熱、因風者，一併除之。凡病陰虛血燥精竭髓衰之證，非配大滋養藥不可。

○集方（治風寒濕熱鬱蒸成黃疸，用秦艽、茵陳各五錢，[illegible]煎服。○治風寒濕熱壅閉經絡，成痿痺癱瘓諸[illegible]，用秦艽、蒼朮米泔浸曬乾各四兩，萆薢、黃柏、羌活、當[illegible]、紅花各二兩，分作十劑，水煎服。○治腸風便血或[illegible]白濁不止，用秦艽八兩，黃連炒苗各二兩，共爲末，每早[illegible]錢，白湯下。○治骨蒸夜熱，用秦艽、地骨皮各三錢，水煎服。）

黃連味苦。氣寒。無毒。氣味俱厚。可升可降。陰中陽也。入手少陰。手足陽明經。

（李時珍曰。黃連漢取蜀郡。唐取澧州者。以黃肥而堅者爲勝。今以雅州宣州者亦良。苗似茶。叢生。一莖三葉。高尺許。四月開花黃色。凌冬不凋。六月結實似芹子。色亦黃。今江浙荆夔州郡亦有。而以宣城九節堅重相擊有聲者爲勝。滇黔者次之。東陽處州歙州者又次之。江左者根黃連珠。其葉如小雉尾草。三月開花作細穗。淡黃色。六七月根緊始堪采。諸處皆不如蜀道者粗大。味極濃苦。療渴爲最。江東者節如連珠。治痢大善。有二種。一種根粗無毛。有連珠。形如鷹爪。質堅實。色深黃。一種無珠多毛。中虛。色淡黃。各有所宜。修治去蘆及鬚用。）

○黃連沉靜而涼。陰寒清肅之藥也。解傷寒疫熱。定陽明少陰赫曦之傳邪。退心脾鬱熱。袪下痢赤白後重之惡疾。又如驚悸怔忡。煩亂恍惚。而神志不寧。痛癢瘡瘍。癍疹痦瘡。而邪熱有餘。黃連爲必用也。若目痛赤腫。睛散羞明。乃肝之邪熱也。嘔逆惡心。吞吐酸苦。乃脾之邪熱也。脇痛弦氣。心下痞滿。乃肝脾之邪熱也。舌爛口臭。唇齒燥裂。乃心脾之邪熱也。均屬火熱內甚。陽盛陰衰之證。非此不治。設或七情之火聚而不散。六鬱之火結而不舒。用二陳以清之可也。然無黃連之苦寒。則二陳不能獨清。吐血衄血。妄奔于上。溲血淋血。妄泄于下。用四生以止之可也。然無黃連之少佐。則四生不能獨止。又有腸風下血。用之可以厚腸胃而止血。小便熱閉。用之可以清內熱而行便。又能退伏熱而消蓄暑。其功專于瀉火清濕熱而治猖熱。其味在于苦寒。若胃虛不足。苦寒有不可投。薑汁製炒可也。陰分之病。苦寒有不能入。醇酒製炒可也。按法乘機而用。藥至病自除矣。○但此藥稟天地清寒之氣以生。羣草中肅清之物也。故袪邪散熱。蕩滌腸胃。肅靜神明。是其性之所長。而于初病氣實熱盛者。服之最良。若久病元虛發熱。用之于補益精血。滋養元氣。則其功殆如也。凡病人血少氣虛。脾胃薄弱。血不足以致驚悸不眠。而兼煩熱躁渴（當用人參酸棗仁麥門冬北五味遠志之類。）及產後不眠（當用當歸川芎茯苓白芍之類。）血虛發熱（當用薑炭熟地牡丹皮之類。）泄瀉腹痛（當用於朮肉桂陳皮之類。）小兒痘瘡腸虛作瀉。行漿後泄瀉（當用參朮異功散之類。）老人脾胃虛寒作瀉。陰虛天明溏瀉（當用參耆吳萸白朮補骨脂之類。）眞陰不足。內熱煩躁（當用當歸白芍龜膠熟地枸杞山茱萸之類。）諸證咸宜忌之。

沈則施先生曰。黃連同西河柳。蟬退。牛蒡子。桔梗。治痧瘄已透而煩燥不寧。　同甘草。升麻。白芍藥。治痧瘄已透而泄瀉不止。　同僵蠶。蟬退。升麻。生地。治痘疹火盛熱深不起。　同木香。檳榔。治赤白痢疾。　同人參。蓮肉。治老人虛人。產後人。痢疾不止。　同乾薑末各等分。入冰片少許。共爲末。摻痘瘡後餘毒。致成牙疳臭爛。　同明礬。銅青。人乳少許。泡湯洗暴赤眼。　同蘆薈。蕪荑。白槿花。白芙蓉花各等分。治小兒一切熱疳。　同枳實。白朮。治心下痞滿。宿食不化。

金震昭先生曰。黃連大苦寒之藥。用之降火燥濕。中病即止。不可久服。使肅殺之令常行。而伐其生發沖和之

氣。若久服黃連、苦參，反致熱發，從火化也。經言五味入胃，酸入肝爲溫，苦入心爲熱，辛入肺爲清，鹹入腎爲寒，甘入脾爲至陰，而四氣兼之。凡諸食味專一，久則偏勝，即有偏絕，故有暴夭之患，況苦味更能損胃乎。修生之士，可不謹哉。又立齋曰：醫書有久服黃連、苦參，反作熱之說。此雖大寒，其味至苦，入胃則先歸于心，久服不已，反增心氣而動虛火，人不知也。屢見目病經年，屢服黃連，竟至昏暗失明者；火病多服黃連，立見陽脫。

胡黃連　味苦，氣寒，無毒。入手足太陰、足陽明、足厥陰經。沉也，降也。

（蘇氏曰：出波斯國及海南陸地，今秦隴間亦有之。初生苗若夏枯草，又如蘆。乾則似楊柳枯枝，根頭似烏嘴。折之內黑外黃，似鸜鵒眼，塵出如煙者良。不拘時月收采。）

○胡黃連，退肝脾伏熱、濕熱之藥也。此劑大寒至苦，極清之性，能清熱，自腸胃以及于骨，一切濕火邪熱、陰分伏熱所生諸病，莫不消除。故陳氏方化五疳，截溫瘧，解熱痢，清黃疸，退骨蒸，明目疾，定驚癇寒熱，治小兒久痢成疳，皆取苦以泄之、寒以散之之意云。

繆仲淳先生曰：胡黃連氣味苦寒之至，設使陰血大虛，真精耗竭，而胃氣脾陰俱弱者，雖見如上諸證，亦勿輕投。即欲用之，亦須與健脾養胃等藥同用乃可。

沈則施先生曰：胡黃連統治小兒熱疳熱勞，一切虛羸怪異熱病。

○集方：治傷寒傳裏，裏熱入深，口燥煩渴，舌生芒刺，譫語狂言，揚手擲足等證。用川黃連三錢，枳實五錢，花粉、柴胡、知母、連翹、瓜蔞仁各四錢，水煎服。如大便結硬，本方加大黃三錢。○治下痢赤白，後重裏急，脹閉不通。用川黃連五錢，木香三錢，白芍藥一兩，大黃酒煮過四錢，共爲末，水發爲丸，如綠豆大。每服三錢，空心白湯下。○治心經伏熱，常發驚悸，煩亂恍惚。用川黃連一錢五分，黑山梔、茯苓、犀角屑、丹參各二錢，水煎服。○治熱血疥癬諸瘡。用黃連一錢五分，連翹、生地、玄參、花粉、當歸各二錢，甘草五分，水煎服。○治癰瘡初起，口燥煩渴，根窠不起，煩躁鬱亂，舌乾索飲，氣促不寧。用黃連二錢，玄參、惡

實、桔梗、連翹、天花粉、紫草茸各一錢五分，甘草五分，水煎服。○治目痛赤腫。用黃連一錢，柴胡、連翹各一錢五分，益母草三錢，水煎服。○治雜病嘔逆惡心，吞吐酸苦。用黃連、黃芩俱酒炒，乾薑各一錢，麥芽、枳實、厚朴、茯苓、砂仁各一錢五分，水煎服。○治脇痛弦氣，心下痞滿脹。用黃連吳萸泡湯炒、黃芩各一錢，白朮、枳實、厚朴、青皮、茯苓各一錢二分，水煎服。○治舌爛口臭，唇齒燥裂。用黃連吳萸湯泡、黃芩、白芍藥各一錢五分，梔子一箇打碎，水煎服。○治腸風下血。用黃連、地榆俱酒洗炒，蒼朮、蒲黃各二兩，炮薑灰一兩，白芍藥醋炒三兩，柿餅六兩切細，酒煮爛，搗膏爲丸，梧桐子大。每早服五錢，白湯下。

一集一 冊 續修四庫全書 第6 版正內

○治小便熱閉不通，[illegible]車前子、黄柏、木通各一錢，滑石一錢五分，[illegible]白茅根汁十餘茶匙。因血瘀者，加韭汁如數。[illegible]者，煩熱口渴，加黄連一錢，香薷、厚朴、[illegible]一錢五分，陳皮七分，麥門冬三錢，知母[illegible]錢，水煎服。[illegible]虛，加人參、黄耆各一錢五分。○治小兒[illegible]熱[illegible]用胡黄連、於白术、茯苓、枳實各[illegible]錢五分，[illegible]共為末，飴糖為丸，如龍眼核大，每[illegible]各服一丸，白湯下。○治五痢八痢，用黄連一觔，以酒浸炒四兩，以生薑自然汁浸炒四兩，以吳萸一兩泡湯浸炒四兩，以童便浸炒四兩。配廣木香、益智仁各二兩，白芍藥、使君子仁俱炒，俱研極細末，飴糖為丸，如菉豆大。每服六七十丸，米湯下，日服三次。○治肝虛不足，風熱上攻，眼目昏暗，隱澁羞明及翳障、青盲等證，用眞雅州黃連一兩，爲末，嫩羊肝五箇，煮半熟，去筋膜，搗爛成膏，和丸梧子大。每食後白湯送五十丸，日服二次。○治小兒口瘡臭爛及走馬急疳，用雅州黃連、蘆薈各一錢，眞蟾酥五釐，共研極細末，吹少許于患上，立止。

龍膽草　味苦澁，氣大寒，無毒。氣味俱厚，沉而降，陰也。足厥陰、少陽經氣分藥也。

（別錄曰：龍膽草處處有之。葉如龍葵，味如膽苦，故名。以吳興者為勝。其宿根黃白色，下抽根十餘條，類牛膝而短。直上生苗，高尺餘。四月生葉，如嫩蒜而細，莖如小竹枝。七月開花，青碧色，如牽牛花，作鈴鐸狀。冬後結子，莖葉即枯。二八十一月采根，晒乾用。一種石龍膽，味亦苦澁，其葉經霜不凋，與此同類而別種也。[illegible]治四肢疼痛。）

○龍膽草，瀉肝火，清濕熱之藥也。此藥稟天地純陰之氣以生，味大苦，性大寒，善攻一切實熱火證。故別錄主散目赤，去翳膜，退腳氣，消黃疸，利小便，化赤濁，療[illegible]疾，解諸瘡，有徹上徹下之妙也。竊思相火寄在肝膽，有瀉無補，古方以龍膽益肝膽之氣者，正以其能瀉肝膽之邪熱也。肝膽之邪熱退，則他如病熱極生風，而為驚搐癎痓、蟲毒、積癖、疫熱、痢諸疾，可一劑而除矣。若老人虛人、久病之人，或脾虛胃弱，血少精衰，肝虛腎虛，虛火因而致疾者，不可輕用。

陳廷采先生曰：按龍膽稟天地純陰之氣，大苦大寒，但以蕩滌肝膽之熱為職，先哲謂苦寒伐標，宜暫不宜久。如聖世不廢刑罰，所以佐德意之無窮。苟非氣壯實熱之證，率爾輕投，其取敗也必矣。

沈端子曰：按廣濟方治暴赤時眼，用龍膽草、柴胡、甘菊花、刺蒺藜、連翹。○治腳氣，用龍膽草、木瓜、漢防己、威靈仙、厚樸。○治黃疸，用龍膽草、澤瀉、茵陳、木通、苦參。○治赤白濁，用龍膽草、滑石、車前、木通、茯苓、豬苓。○治風熱

急驚發搐。并治癎痓。用龍膽草。鈎藤。蟬退。天竺黃。白芍藥。茯神。○治蟲積蟲痛。用龍膽草。升麻。烏梅。花椒。○治瘟疫熱疫。用龍膽草。犀角。川黃連。甘草。

○續補集方。治傷寒熱極發狂。用龍膽草。爲極細末。白蜜湯調服二錢。○治蛔蟲攻心胃刺痛吐清水。忌一切食物。用龍膽草。一兩水煎服。立止。○治咽喉腫痛。用龍膽草。一把。搗汁。汩嗽服之。○治卒然尿血莖中痛。用龍膽草。一把。水煎服。○治眼中膿漏。用龍膽草。當歸。各等分爲末。每服二錢。食後白湯下。

○治思慾不遂。敗精迷失。溺道小便脹閉不通。或腫脹欲潰者。用龍膽草。一兩。淡竹葉。八錢。生甘草。五錢。水五碗煎二碗。臨服加生白菓肉。三十個。搗汁冲入。○治蟢兒瘡。叢聚細水泡。疼痛異常。或延纏背脇腰腹之間。又名白蛇瘡。用龍膽草。搗敷。立時止痛。消退。

○治陰囊發癢。癢之濕潤不乾。漸致囊皮乾澀。愈癢愈搔。漸成風癬。用龍膽草二兩五。梔子五錢。劉寄奴一兩。用水一甕。煎。將滾。濾出渣。加樟腦末五分。俟湯通手浸洗。

廣筆記

細辛味辛。氣厚于味。陽也。升也。入足厥陰少陰血分。爲少陰引經之藥。

（蘇氏曰。華州真細辛。根細而味極辛。故名。出華陰山谷中者爲上。今處處雖有。皆不及也。南閩臨海可用。春生苗。一根則一葉相連。今多以杜衡爲之。李時珍先生曰。杜衡亂細辛。自古已然。然又不止一物也。今以根苗色味細辨之。葉似小葵。莖柔根細直且長。色紫。味極辛辣。嚼之習習如椒者。細辛也。○似馬蹄。莖微粗。根似細辛而稍彎曲。色黃白。味亦辛杜衡也。○一莖直上。莖端生葉如繖狀。根似細辛而粗。色黃白。味辛兼苦者。鬼督郵也。○根似鬼督郵而黑者。及已也。○葉似小柔。根似細辛而粗長。色深黃。味辛而有臊氣者。徐長卿也。○葉似柳葉。根似細辛而粗長。色黃白而味苦者。白薇也。○根似白薇而脆。色白者。白前也。凡使細辛。揀去雙葉者。服之害人。再切去頭上子。日乾用。○杜衡。鬼督郵。徐長卿。白薇。白前。五種根皆粗肥。反于細辛之細。五種亦多曲。反于細辛之直。）

○細辛。散風寒。開關竅之藥也。故主頭風腦痛。目風流淚。

濕風痺痛。百節拘攣。又開肺氣。通鼻竅。治口臭。療牙疼。消死肌。破結氣。溫中氣。利九竅。皆升發辛散。開通諸竅。活諸脉絡之功也。又佐薑桂。能驅藏府之寒。佐附子。能散諸疾之冷。佐獨活。能除少陰頭痛。佐荆防。能散諸經之風。佐芩連菊薄。又能治風火齒痛。而散解諸鬱熱。最驗也。但其性升散發燥。故凡病內熱。及火升炎上。上盛下虛。氣虛有汗。血虛頭痛。陰虛咳嗽。法皆禁用。即入風藥。亦不可過用壹錢。多則悶塞不通。昏暈如死。以其氣味俱厚而性烈故耳。

沈則施先生曰。按細辛辛熱純陽。祛風逐冷。行水通塞。攻齒蝕。定寒嗽。化痰飲。其用當于辛香溫利之效。[illegible]

齋方。治婦人產後血閉不行。意在此乎。
王紹隆先生曰。肝木上行、春風上升、反于橫徧矣。經云
無怒其志。使華英成秀。此春轉成夏。升轉從出之機乎。
仲景方。入小青龍湯。治傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔
發熱而欬。○入麻黃附子細辛湯。治傷寒少陰病。始得
之反發熱。脉沉者。○治少陰咽痛。用細辛。甘草。○廣濟
方。治陽明火熱上攻。以致齒痛。用細辛。石膏。○治婦人
子宮冷。不受孕。用細辛。當歸。白芍藥。川芎。藁本。牡丹皮。
白薇。○治風頭痛。川細辛。藁本。川芎。白芷。荊芥。防風。○
治傷風寒。鼻塞。用細辛。紫蘇。防風。杏仁。桔梗。薄荷。炙白
皮。○治肝腎虛。目風冷淚。用杞菊地黃丸。加細辛。

○續補集方。治中風卒倒。不省人事。用細辛。爲末。吹入鼻
中。○治胃虛作嘔呃。用細辛三錢。丁香一錢。爲末。每服
一錢。柿蒂湯下。○治大人小兒口瘡。用細辛。黃連。各等
分。爲細末。摻之。○治牙宣齒蠹。用細辛二錢。水煎汁。乘
熱汨漱。含之待冷吐去。○治鼻生瘜肉。用細辛。爲細末。
時時吹之。
○治傷風久咳。時吐冷涎。用細辛五分。半夏。陳皮。桂枝。防
風。蘇子。杏仁。各一錢。乾薑八分。甘草七分。北五味三分。
黑棗三個。水煎服。如久嗽將成陰虛勞瘵者。不可服。

白薇　味苦鹹。氣溫。無毒。乃陽明經藥也。
（蘇氏曰。白薇出陝西。及舒。徐。潤。遼諸州。近以山東沂濮
莒萊諸州者稱勝。莖葉俱青。頗類柳葉。六七月開紅色
花。遂結實。根似牛膝而細長尺許。色黃微白。芳香
襲人者。白薇也。色白微黃。折之易斷者。白前也。）
○白薇。調經順脉之藥也。主中風身熱。忽忽而不知人。退
溫瘧狂惑。洗洗而寒熱交作。又于婦人陽勝陰虛。則營
血日損。血淋白帶。多不受孕。此藥芳香寒燥。利濕養陰。
故風可驅。瘧可解。經滯可行。淋帶可止。胎孕可育。諸因
熱淫爲眚。此藥苦鹹氣寒。宜其悉主之也。究其益陰除
熱。功用之全耳。但苦鹹大寒之性。病汗多亡陽。或內虛
不食。腹中虛冷。泄瀉不止。皆不可服。
朱肱活人書。治風溫發汗後。身猶灼熱。自汗身重多眠。

鼻息必鼾。語言難出者。葳蕤湯中亦用之。又胎產金丹
方中用白薇爲君。總療胎前產後百病。○普濟方。治溫
瘧癉瘧。久而不解者。必屬陰虛。除瘧邪藥中。多加白薇。
則易愈。○又治似中風證。除熱去風藥中。加白薇良。○
又天行熱病。未愈或愈後。陰虛內熱。及餘熱未除者。隨
證隨經應投藥中。宜加用之。
○續補集方。治婦人平居無疾苦。忽然頭眩。目閉口噤。身
不動搖。不知人事。或有微知。移時方寤。名曰血厥。用白
薇。當歸。各一兩。人參三錢。甘草一錢。水煎服。此病不治
而發。必成癇證。○治婦人遺尿。不拘已婚未婚。已產未
產。用白薇。白芍。各一兩。炒。爲末。每服三錢。白湯調下。

白前味甘氣溫無毒手太陰經藥也（陶氏曰白前生洲渚沙磧上苗高尺許葉似柳或似芫根似白薇或似細辛○陳氏曰似牛膝粗長堅直色白微黃折之易斷者白前也似牛膝短小柔軟能灣色黃微白折之不斷者白薇也近道亦有形色頗同以此別之不致差悞修治水浸洗淨去頭鬚焙乾收用）

○白前泄肺氣定喘嗽之藥也療喉間喘呼為治欬之首劑寬胸膈滿悶為降氣之上品前人又主奔豚及腎氣然則性味功力三因並施藏府咸入腠理皮毛靡不前至蓋以功用為名也性惟走散長于下氣功無補益凡欬逆上氣咳嗽氣逆由于氣虛氣不歸源而不由于寒邪客氣壅閉者禁之深師方中所主久欬上氣體腫短氣脹滿不臥等證當是有停飲水濕濕痰之故乃可用之病不由于此者不得輕試

○集方治冷哮久年頻發者用白前川貝母乾薑甘草各一錢水煎服（方脈正宗）○治奔豚痃積用白前三錢吳茱萸二錢白朮一錢甘草五分黑棗三個水煎服（同上）○治五飲痰閉氣逆不下用白前酒炒半夏陳皮茯苓各一兩甘草五錢白朮二兩俱土拌炒共為末竹瀝一碗薑汁半盞和勻煎滚調真神麴為稀糊作丸如黍米大每服二錢白湯下

前胡味苦微甘氣溫無毒陽中之陰降也乃手足太陰陽明之藥與柴胡清陽上升入手足少陽厥陰者不同也（蘇氏曰前胡南北諸道皆有生下濕地今出吳興者功勝初春生苗青白色似斜蒿初出有白芽長三四寸味甚香美七月開紫白花與葱花相似八月結實根青紫色乾則外黑內黃白八月採根暴乾苗生柴胡之前故名前胡○王氏曰前胡南北皆有其品甚多良醜不一又汴京北地者色黃白枯脆絕無氣味江東有三四種一種類當歸皮斑黑肌黃而脂潤氣味濃烈一種色理黃白似人參而細短香味俱微一種似草烏頭膚赤而堅有兩三岐食之戟人咽喉惟以薑汁浸擣服之能下膈間痰結皆非真前胡也今最上者出吳中及壽春皆類柴胡氣芳烈味亦濃苦療痰下氣最勝諸道者○李薊湖曰前胡有數種惟以苗高一二尺色似斜蒿葉如野菊而細瘦嫩時可食秋月開紫白花又類蛇床子花其根皮黑肉白有香氣為真大抵北地者為勝故方書稱北前胡云○一種野蒿根類前胡悮用今人反習不受食真前胡味苦微甘野蒿根味苦微酸（[illegible]））

○前胡散風寒淨表邪溫肺氣消痰嗽之藥也如傷風之證咳嗽痰喘聲重氣盛此邪在肺經也傷寒之證頭痛惡寒發熱骨疼此邪在膀胱經也胸脇痞滿氣結不舒此邪在中膈之分也又妊娠發熱飲食不甘小兒發熱瘡疹未形大人痰熱逆氣隔拒此邪氣壅閉在腠理之間也用前胡俱能治之但苦辛而溫能散有餘之邪熱實痰而不可施諸氣虛血少之病故凡陰虛火熾煎熬真陰凝結為痰而發咳嗽者真氣虛而氣不歸原以致胸脇逆滿者頭痛骨疼不因于痰而因于陰血虛少者內熱心煩外現寒熱而非外感者法並禁用大抵此劑與柴胡不同柴胡性味寒苦入少陽厥陰治在半表半裏以清往來之熱前胡性味溫辛入太陽太陰專攻初

病之時，以清表間之熱。然柴胡之性專于上升，而前胡之功專于下氣，故治痰熱喘嗽、痞膈逆氣、胎脹諸疾，氣降則痰降，痰降則火亦降矣。與柴胡治證不同，而所入所主亦有異耶。

金靈昭先生曰：前胡辛溫而散，功能下氣，治寒熱喘嗽，復能升出，又可退痰痘出痘疹。柴胡苦寒而清，功能上行清陽，升引胃氣上達，而復能降入，又可調血和營，出入升降，二藥各自有互通之用也。

門人羅一經曰：前胡去寒痰，半夏去濕痰，南星去風痰，枳實去實痰，蔞仁治燥痰，貝母、麥門冬治虛痰，黃連、天花粉治熱痰，各有別也。

廣濟方：治風熱痰壅，喘嗽上氣。用前胡同杏仁、桑白皮、甘草、桔梗。○治一切實痰，（項子貞方）用礞石滾痰丸方中，用前胡易黃芩，有殊功。○治時疫寒熱，（方脈正宗）用前胡同羌活、乾葛、黃芩、柴胡、天花粉。

柴胡　味苦寒，無毒。氣味俱輕，陽也，升也。入手足少陽厥陰四經。欲上升則用根，欲下降則用稍。

蘇氏曰：柴胡出弘農川谷及冤句，今關陝、江湖近道亦有，以銀州者為勝。銀州即寧夏衛也。十一月根生，白蒻香美可食。二月苗長，莖青紫，堅硬，微有細線，葉似竹葉而稍緊小。亦有似邪蒿者，亦有似麥門冬葉而稍短者。七月開黃花，根淡赤色，似前胡而強硬如柴，故名柴胡。惟丹州者結青子，與他處不同。其根似蘆頭，有赤毛如鼠尾，獨窠而長者佳。生處香氣直上雲間，多有白鶴飛翔，人有過其園者，聞之皆氣爽也。李氏曰：銀州者根長尺餘，微白而軟，皮皺肉有紋，不易得也。治虛勞骨蒸最妙。北地所產者如前胡而強，謂之北柴胡，治傷寒解半表半裏之邪最效。南土所產者，不似前胡，有似蒿根，堅硬不堪用，最下也。近時有一種根似桔梗、沙參，白色而大，市人偽充銀柴胡，殊無氣味，不可不辨。

○柴胡能條達肝氣，升清降濁之藥也。（王好古）解傷寒，（東垣）清少陽半表半裏之邪，調血氣，疏肝膽已結未結之疾。其味苦寒，可以清熱；其性輕揚，可以散邪。故治少陽傷寒，寒熱往來，口苦嘔逆，胸脇滿悶，頭角作痛等證；或濕瘧瘴瘧，邪熱不清；或邪陷陰中，日晡發熱；又治婦人熱入血室，譫語妄見，并經水不調，寒熱交作；又治小兒五疳羸熱，能食而瘦，疸後餘熱，兩眼赤爛等證，悉用柴胡治之。因其味之苦寒而散，性之輕揚而達，能發越屈曲不正之氣也。前人又謂治勞熱，若勞熱在肝膽心及胞絡、三焦、膀胱者，用之有驗；若勞熱在肺腎者，用之無益耳。病人元虛而氣升者，嘔吐及陰虛火熾炎上者，法皆禁忌。

朱東生先生曰：柴胡少陽厥陰主藥，輕清而升，苦寒而降。散表邪，除頭痛，退寒熱，止脇痛，和表裏，調[illegible]

疾。升下陷。降濁陰。性惟疏散。凡病肝鬱憤悶不平者。服之最靈。

倪朱謨曰。柴胡有銀柴胡。北柴胡。軟柴胡三種之分。銀柴胡出關西諸路。色白而鬆。形長似鼠尾。北柴胡出山東諸路。色黑而細密。形短如箒。軟柴胡出海陽諸路。色黑而輕軟。一名三種也。氣味雖皆苦寒。而俱入少陽厥陰。然又有別也。銀柴胡清熱。治陰虛內熱也。北柴胡清熱。治傷寒邪熱也。軟柴胡清熱。治肝熱骨蒸也。其出處生成不同。其形色長短黑白不同。其功用內外兩傷。主治不同。胡前人混稱一物。漫無分理。日華子所謂補五勞七傷。治久熱羸瘦。與經驗方治勞熱青蒿煎丸少佐

柴胡。言銀柴胡也。衍義云。本經並無一字治勞。而治勞方中用之鮮有不恨者。言北柴胡也。然又有眞臟虛損原因肝鬱血閉成勞。虛因鬱致熱。由鬱成。軟柴胡亦可相機而用。如傷寒方有大小柴胡湯。仲景氏用北柴胡也。脾虛勞倦。用補中益氣湯。婦人肝鬱勞弱。用逍遙散。青蒿煎丸。少佐柴胡。俱指軟柴胡也。業醫者當明辨而分治可也。

沈則施先生曰。仲景治傷寒寒熱往來。口苦耳聾。胸脇痛而無汗。設小柴胡湯。同參。半。芩。草。○又治少陽經正瘧。并似瘧非瘧。寒熱不時等病。○又治傷寒表裏俱急。設大柴胡湯。同枳樸大黃。黃芩白芍等。二證皆屬少陽甲膽病也。柴胡稟仲春一陽之氣以生。苦寒而潔。其氣升散。自下而上。以奉春升之發陳。化濁陰而載清陽。故前證之邪在少陽甲膽者。或少陽甲膽之邪。轉入裏者。無不奏效。讀農皇本草。所謂主心腹腸胃中結氣。飲食積聚。寒熱風邪。推陳致新。義在是矣。又傷寒百合病。有柴胡百合湯。又東垣治勞傷元氣。精神倦怠。有補中益氣湯。用參耆歸术。佐以升麻柴胡。引脾胃之氣行陽道。可見柴胡妙用。又不止于散邪退熱而已。

本事方云。治傷寒後餘熱未淨。體瘦肌熱。用小柴胡五錢。甘草一錢。水煎服。○聖濟總錄治小兒十五歲以下。遍身如火。日漸黃瘦。咳嗽煩渴。骨蒸盜汗。用銀柴胡爲

末四兩。硃砂爲細末一錢。豬膽汁拌和。飯上蒸過。曬乾爲丸如綠豆大。每服五丸。桃仁湯送下。○男婦虛勞發熱。或咳或不咳。用銀柴胡。沙參各等分。每服二錢。水煎服。

○續補集方。治（[illegible]）濕熱黃疸。用柴胡。茵陳各等分。水煎服。○治眼（千金方）目昏暗。用柴胡一錢。爲末。羊肝煮熟蘸食。食肝三十餘。用柴胡三兩。自明。○治積熱（理眞方）下痢不止。用柴胡黃芩各四錢。水煎服。五劑愈。

一錢。麥門冬　五錢。知母。石

一撮。水二碗。煎八分。不拘

服。若用柴胡。半夏。厚朴。陳皮各二錢。如前煎服。

防風味辛甘，氣溫，無毒。氣味俱薄，浮而升，陽也。手足太陽二經本藥，又行足陽明、太陰二經，爲肝經氣分藥也。（李時珍曰：防者，禦也。其功禦風最要，故名。曰芸、曰茴、曰蕳根者，其花如茴香，其氣如芸蒿、蕳蘭也。今出彭城蘭陵、琅琊、鬱川，有市者佳。○蘇氏言：出齊州龍山最善，淄州、兗州、青州者亦佳。二月生苗，紅紫色，作茹柔嫩爽口。三月莖葉轉青，深葉淡，似青蒿而短小。五月開花，似蒔蘿花，細小而白，攢簇作房，似胡荽子而稍大。九月採根，似葵根而黃色。又江淮間一種石防風，生山石間，二月採嫩苗作菜，辛甘而香，呼爲珊瑚菜，長大，葉青花白。其根粗醜，似蒿根，其子亦可種。修治去又頭、又尾及枯黑者。又頭食之令人發狂，又尾令人發痼疾也。○又開中生者，三月、六月採之，然輕虛不及齊州者良。又東頭風服婦加神。）

○防風，散風寒濕痺之藥也。故主諸風週身不遂，骨節痠疼，四肢攣急，痿躄癇痓等證。又傷寒初病太陽經，頭痛發熱，身疼無汗，或傷風咳嗽，鼻塞咽乾，或痘瘄將出，根點未透，用防風辛溫輕散，潤澤不燥，能發邪從毛竅出。故外科癰瘍腫毒，瘡痍風癩諸證，亦必需也。爲卒伍之職，隨引而效，如無引經之藥，亦不能獨奏其功。故與芎芷上行，治頭目之風；與羌獨下行，治腰膝之風；與當歸治血風；與白朮治脾風；與蘇麻治寒風；與芩連治熱風；與荊栢治腸風；與乳桂治痛風；及大人中風、小兒驚風。防風雖能去之，若入大風厲風藥中，須加殺蟲活血藥乃可。至如產後血虛發痙，角弓反張，血虛痿躄者，頭痛不因于風寒濕者，及陰虛盜汗、陽虛自汗者，諸證法宜禁用。

盧不遠先生曰：四大中風力最勝，扶持世界，鑄無不入。

設人身腠理疎泄，則生氣有所不衛，風斯入焉。又云：身本四大合成，以動搖爲風，則凡身中宜動處不動，即是風大不及；宜動處太動，即是風大太過。防風黃中通理，甘溫辛發，濡潤和暢，匀而平之，斯無過不及

治半身不遂，用防風、秦艽、天麻、羌活、白芷、當歸、白朮、

治五癇痰厥，發則仆地，或作畜聲，口唾涎沫，用防風、半夏、膽星、天麻、人參、耆朮。

治太陽傷風寒頭痛，用防風、羌活、生薑、紫蘇。

治痘疹出而未透，用防風、荊芥、羌活、牛蒡子、桔梗、蟬退、甘草。

治癰疽腫毒，用防風同解毒散。

治表虛自汗，用防風、黃耆、白芍藥。

解利肺經傷風，用防風、甘草、桔梗、紫蘇、桑白皮、杏仁，加薄荷、石膏，兼除風熱。

○續補集方：治婦人血崩，用防風、蒲黃炒，各等分，爲末。每服二錢，白湯調下，累試有驗。

○治瘄疹不透發，用防風五錢，西河柳一兩，水煎代茶飲。瘄毒立時發出。

○治久病泄瀉不止，用防風五錢，酒洗炒，於白朮四錢，土拌炒，骨碎三錢，酒洗炒，加黑棗五個，生薑三片，水煎服。

○治男人便血，久不止，用防風、升麻各三錢，黃耆、白朮、熟地各三錢，炮薑（一錢，水煎服）。

獨活味苦甘辛。氣溫。無毒。氣味俱薄。浮而升。陽也。足少陰行經氣分血分之藥。（寇氏曰。獨活是羌活母也。出漢獨西羌者良。春生苗葉如青麻。一莖直上。有風不動。無風自搖。故名獨搖草。六月開花。作叢。或黃或紫。生砂石中者。葉微黃。生肥土中者。葉青翠。有兩種。一種形大。有臼如鬼眼者。今人呼為獨活。一種蠶頭鞭節。色黃紫。臭之如蜜蠟香。今人呼為羌活。近以老前胡及土當歸長尺許。白肉黑皮。氣亦芬香。如白芷。用充獨活。不可不辨。○蘇氏曰。羌活獨活乃一種二物。正如川芎撫芎。蒼朮白朮之義。入用微有不同。後人以為二種者非矣。今人以紫色節密者為羌活。黃色作塊者為獨活。今蜀中有大獨活。類羌活。微黃而極大。收時寸解之。氣味亦芳烈。又有槐葉氣者。用之極效驗。意此為真者。今市人或擇羌活之大者為獨活。殊為未當。○李時珍曰。乃一類二種。以中國者為獨活。西羌者為羌活。蘇氏所說甚明。又按易簡方云。羌活須用紫色有蠶頭鞭節者。獨活是極大羌活有臼如鬼眼者。○又按獨活一名羌活。本非二物。後人見其形色氣味不同。故為異論。然物多不齊。物之情也。一種之中。自有不同。有緊實者。有輕虛者。仲景用獨活治少陰。必緊實者。東垣用羌活治太陽。必輕虛者。正如黃芩。取中枯而飄者。名宿芩。治太陰。取實而堅者。名子芩。治陽明之義相同也。）

○獨活善行血分。祛風行濕散寒之藥也。凡病風之證。如頭項不能屈伸。腰膝不能俛仰。或痹痛難行。麻木不用。皆風與寒之所致。暑與濕之所傷也。必用獨活之苦辛而溫。活動氣血。祛散寒邪。故本草言能散腳氣。化奔豚。療疝瘕。消癰腫。治賊風百節攻痛。定少陰寒鬱頭疼。意在此矣。

○羌活祛風逐濕。升陽發散之藥也。如頭痛目疼。發熱惡寒。腰脊強痛。四肢拘急。乃風寒之證也。或頭重目眩。四肢怠惰。腰膝拳攣。難以俯仰。乃風濕之證也。以此苦辛之劑。功能條達肢體。通暢血脈。攻徹邪氣。發散風寒風濕。故瘍證以之能排膿托毒。發潰生肌。目證以之治羞明隱澀。腫痛難開。風證以之治痿痓癲癇。麻痺厥逆。蓋其體輕而不重。氣清而不濁。味辛而能散。性行而不止。故上行于頭。下行于足。遍達肢體。以清氣分之邪之神藥也。○又有血虛頭痛。及遍身骨痛。因而兼寒熱者。此屬內虛。當用歸、芎、熟地、白朮、知母、枸杞、丹皮等類。誤用風藥。反致增劇。

丹溪先生云。獨活、羌活。均能祛風燥濕者也。然而表裏上下氣血之分。各有所長。羌活氣雄。入太陽。外行皮表而內達筋骨。氣分之藥也。獨活氣細。入少陰。內行經絡

而下達足膝。血分之藥也。所以羌活有風寒發散之功而解太陽。故目證、瘍證、風痹等證。為必用也。獨活僅可為風濕寒邪之用。而治少陰厥陰。故奔豚疝瘕、腰膝腳氣等疾。為必用也。二物一種。其主治有不同者如此。

繆仲淳先生曰。羌獨二活。稟天地正陽之氣以生。各列君部。非比柔懦之主。大無不通。小無不入。却亂反正之上藥也。故能開散發而出八風之邪。通四大而利關節之鍵。羌獨本同一種。但分質有老嫩虛實。氣有厚薄緩急之殊耳。

盧不遠先生曰。動搖萬物者。莫疾乎風。故萬物莫不因風以為動搖。惟獨活不然。有風獨立不動。無風獨能自

搖在蜀名獨活。在羌名羌活。隨地以名。亦隨地有差等。其從治一切不能獨立不動。而爲風寒刀刃之所擊。因風而痛者。及奔豚疝瘕之因風以爲動搖者。女子疝瘕因風以爲堅聚者。惟獨活氣味溫辛而苦。復因風而及乎上下。因風而出入開闔。能啓太陽之闔而開。能入厥陰之開而闔。其備風木化氣之體用者。故奏功獨捷歟。

繆仲淳先生曰。獨活羌活。陽草中之風藥也。本爲祛風散寒除濕之要品。風能勝濕。以其性燥故也。本草諸書並載主中風及諸風。不知眞中風。惟西北邊塞高寒之地。風氣剛猛。虛人受之。往往卒中。或口眼歪斜。或口噤不語。或手足癱瘓。左右不仁。或剛痙柔痓。角弓反張。此藥與諸風藥並可用也。若夫江南吳楚。越閩百粵。鬼方梁州之域。從無剛勁之風。多有濕熱之患。質柔氣虛。多熱多痰。其患中風如前等病。外證雖一一相似。而其因實非。即劉河間所謂將息失宜。水不制火。丹溪所謂中濕中痰中氣是也。此則病係氣血兩虛。虛則內熱煎熬。津液結而爲痰。熱則生風。故致卒倒。亦如眞中風狀。而求其治療之方。迥若天淵。外邪之氣勝。則實。實則瀉之祛風是已。如內而眞氣不足。則虛。虛則補之。調氣補血生津淸熱是已。倘誤用風藥。反致燥竭其津液。血愈不足而病愈沉困。命曰虛虛。攻補既謬。死生遂殊。粗工懵昧。執迷不悟。玆特表而明之。

廣濟方云。治冬月傷寒。太陽經。頭痛身疼。發熱惡寒。無汗者。用羌活。杏仁。甘草。○治太陽陽明頭痛。兼遍身骨痛。用羌活入葛根湯。○治四時感冒風寒。用羌活沖和湯。○治下身一切風濕濕熱。用羌活。蒼白术。秦艽。生地。苡仁。木瓜。萆薢。黃蘗。○治風熱上攻。齒牙腫痛。用羌活。赤芍。生地。薄荷。荆芥。蔓荆子。石膏。○六經頭風頭痛。用羌活。川芎。蒼耳。荆芥。黃芩。天麻。

陳延之小品方云。治中風不語。用眞獨活、一兩。炒黃大豆五合。炒黑。以酒乘熱投蓋之。良久。溫服二合。未差再服。○治產後中風語濇。四肢拘急。用眞川羌活。二兩。爲末。每服五錢。水煎服。　外臺秘要治歷節風痛。用眞川羌活。松節。各等分。酒煑。每早晚各飲一杯。○治風牙腫痛。用眞川獨活。煑酒。熱漱之。

○續補集方治脚氣腫脹痛。用眞川獨活。五錢。木瓜。牛膝。各一兩。共爲末。每服三錢。空心白湯調下。○治奔豚氣或瘕疝攻築疼痛。用眞川獨活羌活。各一兩。吳茱萸三錢。荔枝核。小茴香。各五錢。共爲末。每服三錢。空心白湯調下。○治下部癰腫。用獨活羌活。各三錢。防風。柴胡。桔梗。金銀花。連翹。川芎。赤芍藥。各一錢五分。水煎服。○治賊風百節攻痛。用川獨活。羌活。防風。當歸。各二錢。水煎服。○治少陰寒鬱頭痛。用川獨活。五錢。防風二錢。水煎服。

升麻味苦微辛氣寒氣味俱薄浮而升陽也為足陽明太陰引經之藥

（蘇氏曰升麻生蜀漢陝西淮南州郡以川蜀者為勝春生苗高三尺葉似麻莖青色四五月開花似粟穗白色六月結實黑色根如蒿根紫黑色多鬚陶弘景曰舊出寧州者為勝形細而黑極堅實今出益州者細小而堅削去皮青綠色謂之雞骨升麻亦佳北部建平一種虛大黃白色味薄蒿高一種純青色質亦堅又一種外黑裏白質亦緊實謂之鬼臉升麻並不堪用俱不如川蜀青綠色者為最也又一種落新婦根其形相似氣與色俱非方同升麻用于兒科解毒痘疹方中稍可餘不然也明宿不可不辨修事去皮麩乾用）

○升麻散表升陽之劑也療傷寒解陽明在表（發熱頭額痛眼眶痛鼻乾不得眠）之邪辟瘟疫吐蠱毒惡厲之氣發痘瘡于隱密之時化癍毒于延綿之際但味苦寒平稟天地極清之體故能効升散之用所以風寒之邪發熱無汗風熱之

邪頭風攻痛耳目疾腫赤乳蛾喉脹升麻並皆治之又如內傷元氣脾胃衰敗下陷至陰之分或醉飽房勞有損陽氣致陷至陰之中或久病瀉痢陽氣下陷後重窘迫或久病崩中陰絡受傷淋瀝不止或胎婦轉胞下墜小水不通或男子濕熱下注腰膝沉重或瘡毒內陷紫黑脹痛或大腸氣虛肛墜不收升麻悉能療之此升解之藥故風可散寒可驅熱可清瘡疹可解下陷可舉內伏可托諸毒可拔又諸藥不能上升者惟升麻可以升之觀其與石膏甘草治齒痛與人參黃耆補上焦不足與桔梗款冬治肺癰膿血意可見矣但屬陽性升凡吐血衄血咳嗽氣急陰虛火動及氣逆嘔吐怔忡癲狂等證一切禁用

沈起愚先生曰升麻稟天地清陽之氣以生故能升陽氣于至陰之下顯明滅暗致新推陳升麻兩得之矣

厲子由先生曰升即四氣之先機時令之首兆也經云春三月此謂發陳者是矣設無成功之藏之入亦無將來之生之升矣所謂柔以時升積小以高大實非決驟之比

廣濟方云升麻葛根湯散足陽明之熱邪發于太陰陽明之瘢疹及天行豌豆瘡○治禁口痢用升麻醋炒綠色配蓮肉人參極驗○治過食冷物陽氣鬱遏四肢發熱腹滿口不渴者入升陽散火湯用之○治一切風毒

熱毒發斑疹麻子等證用升麻牛蒡子荊芥玄參○治蠱毒中惡惡厲諸證升麻同鬱金磨服不吐則下○治小兒尿血用升麻生地麥門冬牛膝蒲黃○治喉痺作痛用升麻片含嚥或用五錢煎服取吐○治腫毒卒起用升麻一段磨醋頻頻塗之○治口舌生瘡用升麻一錢川黃連三分共為末不時含嚥○治熱痱瘙癢用升麻煎湯飲并洗之○產後惡血不盡或經月經年以升麻一兩清酒二升煮取一升頻服當吐惡物極良○解莨菪毒用升麻煮汁頻服之○解射工溪毒用升麻烏翣煎水服以滓塗之

○續補集方、治瀉痢經月、脾胃衰虛、陽氣下陷、後重窘迫、與初病積滯後重不[illegible]理宜補而升之。用升麻、白朮、乾薑、黃耆、人參各一錢五分、甘草、陳皮各八分、加黑棗三枚、水煎服。○治婦人久病崩中、陰絡受傷、淋瀝不止、用升麻、川芎各一錢、當歸身、人參、續斷、杜仲、石斛各一錢五分。龜膠、阿膠、炮薑灰、金櫻子各二錢、加黑棗三枚、水煎服。○治胎婦轉胞下墜、小水不通、用升麻、柴胡各一錢五分、當歸、川芎、牡丹皮、茯苓、車前子各一錢、加黑棗三枚、水煎服。○治男子濕熱下注、腰膝沉重、不能動履、用升麻二錢、牛膝、木瓜、白朮、茯苓、豬苓、肉桂、蒼朮、黃栢、各一錢六分、水煎服。○治癰疽發背、裏氣空虛、毒氣內

陷、瘡口紫黑、脹痛、用升麻一錢五分。人參、黃耆、白朮、白芷、穿山甲、各三錢、如虛極甚、大便泄者、加乾薑、肉桂、附子、童便製各四錢、水煎服。○治裏氣衰虛、大腸氣陷、肛墜不收、用升麻、柴胡各二錢、黃耆、白朮、人參、白芍藥、北五味子、各一錢、內熱甚者、加川黃連八分、水煎服。○治小便淋瀝澁痛不通。用升麻八錢、甘草五錢、滑石三錢、蓮子肉、五十粒、水五[illegible]煎二碗服。○治感冒發熱惡寒。頭疼身痛、咳嗽喘急、欲成疹、此藥專治風寒、及四時不正。瘟疫妄行、並宜服之。用（升麻、川芎、麻黃、白芷、紫蘇、陳皮、香附、赤芍藥、乾葛、各二錢、甘草五分、生薑三片、水煎服。胸膈脹悶、加厚朴、枳殼、咳嗽喘急、加杏仁、半夏、嘔吐、加藿香、半夏、瘧痢、加草果、實、柳痢加枳殼、黃連）

苦參、味苦、氣寒、無毒。氣沉純陰。足少陰腎經。主藥。治本經須用、能逐濕、（李時珍先生曰、苦以味名。參以功名。生汝南山谷及田野。近道處處有之。苗高三四尺、葉細碎、青色。極似槐葉。春生冬凋。花色黃白。七月結實、如萊菔莢、內有子二三粒、如小豆而堅。根三五並生、長五七寸、兩指許大。色黃褐、味極苦惡。河北生者無花子、莖葉根皆相若也。五六十月採根暴乾。製法、用濃糯米泔汁浸一宿、其腥穢氣並浮在水面、再切片晒乾用。）

○苦參祛風瀉火、燥濕去蟲之藥也。化癥瘕、散心腹之結氣。逐黃疸、治腳氣之脛疼、又治癘風癩疾、遍身疙瘩。甚則眉髮墮落。并一切風癬風瘙。搔癢風屑、及時瘡破爛、膿水浸淫、或腸風下血、腸澼痔血諸證。統屬濕熱血淤之病也。此劑苦可除熱、寒可涼血、燥可勝濕。蓋東南之

地。皆是濕熱。熱生風。風勝則血熱、勝則生瘡。惟苦參皆可治也。前人謂苦參補腎補陰、其說甚謬。蓋此藥味苦氣腥。陰燥之物。穢惡難服、惟腎氣實而濕火勝者宜之。若火衰精冷、元陽不足。及年高之人、胃虛氣弱。非所宜也。況有久服而致腰重者、因其氣降而不升、實傷腎之謂也。何有補腎補陰之功乎、書之不足盡信者、以此

沈拜可先生曰、苦參苦寒。燥脾胃之濕熱。兼泄氣分血分之濕熱。故協治癥瘕結氣。黃疸便紅。腳氣癰腫。熱毒皮風煩燥。癘毒疙瘩癩癬諸疾。由于風雨飲食濕熱而成者、所以農皇本草云。有安五臟平胃氣之功焉。

廣濟方云，臘月以米醋漬苦參，入瓶中封固，主一切天行熱病，頭痛口渴，身熱甚，及發狂者，飲杯許，得出卽愈，汗亦如之。○治大麻風癩，用苦參、胡麻、皂莢刺、當歸、川芎、牛膝、漆葉、龍膽草、蘄蛇。○治久失饑之人，驟食多食，胃氣濕熱薰蒸，成黃爲疸證者，用苦參、龍膽草，爲末，作丸如梧桐子大，每服十餘丸。○治童子胃熱，羸瘦疳蚘，用苦參、川黃連、白朮。○治熱病狂邪，不避水火，欲殺人，用苦參末三錢，薄荷湯調服。○治中惡心痛，用苦參三兩，水煎服，亦治飲食中毒及毒魚猪菜等物。○治妊娠飲食如故，小便難出，用苦參、貝母、當歸各二兩，爲末，每服二錢，白湯送下。○治齒縫出血，用苦參一兩，枯白礬一錢，共爲末，日三揩之，立驗。○治肺熱遍身生瘡，用苦參末，丸粟米大，每服百餘丸，白湯下。○治遍身風疹痒痛不可忍，胸頸臍腹及隱處皆是，多痰涎，夜不得睡，用苦參末一兩，先用皂角二兩，水一升，揉摸取汁，淨器熬成膏，和苦參末丸梧桐子大，每服百丸，食後溫湯服。○治瘰癧結核，用苦參四兩，牛膝汁爲丸，綠豆大，每白湯服三錢。

○續補集方：治腸風下血，腸澼痔血諸證，用苦參二兩，川黃連二兩，俱酒浸一宿，晒乾炒，甘草、木香各五錢，白芍藥一兩二錢，醋浸炒，共爲末，餳糖爲丸，如梧子大，每早服三錢，白湯下。

玄胡索，味苦辛，氣溫，無毒，可升可降，陰中陽也。入手足太陰厥陰經，行血中氣滯，氣中血滯之藥。（李時珍先生曰，生東北夷方，今二茅山上龍洞，及仁和筧橋亦種之。寒露後栽，種立春後生，苗高三四寸，延蔓布地，葉必三之，宛如竹葉，片片成个，細小嫩綠，邊色微紅，作花黃色，亦有紫色者，根叢生，蔓延結，如芋粒，亦如半夏，但色黃耳，立夏後掘取，洗淨滾蒸，晒乾，剉，炒末尤良，活血化氣第一。）

○玄胡索，通經絡，行血中氣滯，氣中血滯之藥也。凡治男婦長幼，一身上下，諸因氣滯血滯爲病者，然于婦人爲尤宜。故病血氣積聚，腹中結塊，癥瘕脹滿，或崩中淋瀝漏下不止，或惡露攻衝，惡心眩暈，是皆婦人血分之病也。又于男子可治之證，疝核痛，暴腰痛，心胃卒痛，小腹脹痛，是皆厥陰氣分之病也。俱以此藥治之。凡用之行血，酒製則行；用之止血，醋製則止；用之破血，非生用不可；用之調血，非炒用不神。隨病制宜，應用無窮者也。但性味溫辛，能走而不能守，故經事先期，與一切血熱，或崩中淋露，應用補氣血、涼血清熱藥者，一切辛走之藥法所必禁。

繆仲淳先生曰：玄胡索稟初夏之氣，而兼得乎金之辛味，故辛溫則能和暢，和暢則氣行；辛溫則能潤而走散，走散則血活。血活氣行，故能主破血及產後諸病因血所爲者，婦人月經之所以不調者，無他，皆氣血不和，因而凝滯，則不能以時至，而多後期之證也。腹中結塊，產後血暈，暴血衝上，因損下血等證，皆須氣血和而後愈

故悉主之也崩中淋露利守不利走此則非與補氣血藥同用未見其可。

盧不遠先生曰名玄而色黃醞金氣也氣溫而味辛秉金制也以一春而備四氣葉必三之其木生數象形對待肝血之非其所藏而玄爲破堅之線索無疑矣以言疾疢之證因以言主治之功力判屬血中之氣藥氣中之用藥也蓋氣主噓之血主濡之氣之所不噓卽血之所不濡矣如腹中結塊癥瘕之爲證卽血留營實之爲因如臚脹氣塊盤繞之爲證卽氣滯衛實之爲因如崩中淋露逆衂衝暴之爲證卽血菀營泣之爲因如奔豚逆厥百體疼煩之爲證卽氣弛衛濇之爲因玄胡

立鼓血中之氣震衍氣中之用虛則補實則平推陳致新之良物也

茹泳之先生曰幽深邃遠曰玄遐甸荒服曰胡索取而竭之也此指玄胡索之功用行瘀血活滯血推死血凡人身藏府膜原谿谷隧道偏僻幽隱之處一切行血藥之所不及至者玄胡索取而竭之無餘留矣命名者以此也夫

廣濟方治產後血暈用玄胡索當歸生地牛膝川芎甘草童便○聖惠方治產後諸病凡產後穢污不盡腹滿及產後血暈心頭鞕悶或寒熱不禁手足煩熱氣力欲絕者用玄胡索酒炒研末酒服二錢○直指方治疝氣危急用玄胡索鹽水炒全蝎生用各等分研末空心鹽酒下○又方治冷氣腰痛用玄胡索當歸肉桂各等分研末溫酒服三四錢隨量頻進以愈爲度○又方治熱厥心痛或發或止久不愈身熱足寒者用玄胡索金鈴子肉各等分爲末白湯下二錢○濟生方治婦人腹中刺痛經候不調用玄胡索醋炒當歸酒炒各一兩香附醋炒一兩五錢共爲末神麯醋打糊爲丸梧桐子大每服百丸空心白湯下○治下（本事方明）痢腹痛用玄胡索醋炒爲末米飲調服二錢○治小（衛生易簡方）兒盤腸氣痛用玄胡索醋炒大茴香炒各等分爲末大人三錢小兒一錢白湯調服○治墮落車馬跌蹼筋骨痛不止用玄胡索爲末生酒

調服三錢

○續補集方治男婦血氣積聚腹中結塊癥瘕脹滿或崩中淋瀝漏下不止或癥癖攻衝惡心眩暈用玄胡索四兩醋浸炒當歸身川芎各一兩五錢酒洗炒香附三兩童便浸炒炮薑灰牡丹皮焙各二兩共爲末水發爲丸梧子大每早服三錢白湯下○治婦人女子經血不調爲一切腹內脹滿痛滯諸疾用玄胡索醋炒益母葉酒炒香附米童便浸炒當歸川芎俱酒炒各二兩共爲末煉蜜丸如梧子大每早晚各食前服三錢白湯下裏寒大便不實者加肉桂木香白朮各一兩元本虛弱者加人參黃耆各一兩

貝母味苦甘。氣涼。無毒。入手太陰少陰經。可升可降。陰也。

（李氏曰。貝母生蜀中及晉地。又出潤州、荆州、襄州者亦佳。江南諸州及浙江金華、象山亦有。但味苦惡。僅可于破血解毒藥中用之。又河中、江陵、郢、壽、隨、鄭、蔡、滁州皆有。二月生苗。葉隨苗出。如蕎麥狀。莖細。青色。七月開花碧綠色。形如百合花。斜懸向下。上有紅脉。若似人肺。八月採根。根有瓣子。黃白色。如聚貝子。一種葉如栝樓而細小。子在根下。如芋子。正白色。連累相著。而可分解。一種葉如韭。而花色白。根子亦作兩瓣也。詩云。言采其䖟。即此。其中有獨顆不作兩瓣者。名丹龍睛。誤食能軟筋脉。以黃精小藍汁服之。立解。）

○貝母開鬱下氣化痰之藥也。安肺氣橫逆。止虛勞喘嗽之不寧。退傷寒煩熱。定心神火躁之不眠。又散心胸鬱結不舒之氣。齊多愁鬱者。殊有神功。乃肺經氣分之藥也。甄權方散逆滿。開喉痺。消瘰癧。點目瘴。仍取開鬱散結氣之效也。至于潤肺消痰。止嗽定喘。則虛勞火結之證。貝母專司首劑。故配知母可以清氣滋陰。配芩連可以清痰降火。配參耆可以行補不聚。配歸芍可以調氣和營。又配連翹可以解鬱毒。治項下瘻核。配二陳代半夏用。可以清肺消痰。和中降火者也。以上修用。必以川者為妙。若解癰毒。破癥結。消實痰。傅惡瘡。又以土者為佳。然川者味淡性優。土者味苦性劣。二者宜分別用。

繆仲淳先生云。貝母甘苦而寒。在地則得土金之氣。在天則稟清肅之令。色白象金。而主肺。肺有熱。因而生痰。或為熱邪所干。喘嗽煩悶有痰。傷寒煩熱有痰。胸中鬱結有痰。頸項火癧有痰等證。必此主之。至如寒濕痰、食積痰。或濕痰在胃。惡心欲吐。痰飲作寒熱。脾胃濕痰作眩暈。齊痰厥頭痛。中惡嘔吐。胃寒嘔吐。法應以辛溫燥熱之藥。如南星、半夏、天麻、蒼朮、白朮、茯苓之類治之。貝母並禁用。

陳廷采先生曰。世俗多以半夏有毒。棄而不用。每取貝母代之。殊不知貝母乃太陰肺經之藥。半夏乃太陰脾經、陽明胃經之藥。何得而相代耶。且夫咳嗽吐痰。虛勞吐血。咯血。痰帶血絲。血屑。咽痛喉閉。肺癰肺痿。婦人乳難。癰疽。及諸氣鬱等證。此皆貝母為專司也。半夏乃為禁用。若涎者。脾之液也。美味膏粱。炙煿火食。皆生脾胃濕熱。故涎化稠粘為痰。久則生火。痰火上攻。故令人昏憒不省人事。口禁。僵仆。偏廢。不仁。蹇澀不語。生死旦夕。自非半夏、南星。曷能治之。若以貝母代之。非所宜也。

廣濟方云。治傷寒陽明壯熱。喘嗽有痰不得眠。用貝母、前胡、乾葛、黃芩、麥冬、玄參。○治肺熱痰嗽及胸中煩熱。用貝母、知母、天冬、桑白、甘草、桔梗。○治一切熱毒。用貝母、紫花地丁、金銀花、鼠粘子、甘草、玄參。○治一切虛勞咳嗽。骨蒸夜熱。用貝母、天冬、麥冬、懷生地、地骨皮、沙參、茯苓、知母、丹皮。○治肺熱吐膿血。用貝母、百部、百合、薏苡、麥冬、蘇子、竹瀝、童便。○解一切氣鬱。用貝母、陳皮、蘇梗、香附、撫芎、黃芩。○治喉痺腫脹。用貝母、山豆根、桔梗、甘草、荊芥、薄荷。○治小兒百日晬嗽痰壅。用川貝母三錢。甘草、廣橘紅各一錢。共為末。每服三五分。（朱氏集驗方）

服。○治小兒鵝口，滿口白爛，用金華貝母，去心，為末，白湯調，用白絹蘸藥抹之，日三四度。○治吹奶作痛（危氏方），用川貝母末酒調服二錢，仍令人吮之即消。○解蜘蛛咬毒，縛定咬處，勿使毒行，川貝母末，酒服五錢，良久，毒水自瘡口出，水盡，仍塞瘡口，甚妙。并治蛇蠍咬傷。

○續補集方治虛火（方脉正宗），喘嗽不寧，用川貝母一兩，去心，研細末，每服二錢，淡薑湯調下。○治傷寒心虛，內熱有痰，煩躁，心神不寧，不能安睡，用川貝母五錢，研細末，每服二錢，燈心湯調下。

○治瘰癧未破可消，用土貝母、甘草各二兩，微炒研末，肥皂二觔，去核，每個內藏斑猫四個，用竹篾作架，放肥皂於上，蒸爛取出斑猫，并肥皂皮筋，取淨肉搗爛如泥，加入貝母、甘草末，為丸如梧桐子大，每食後服一錢五分，白滾湯下，倘腹疼勿慮，是此藥追毒之故。○治頸（同上）下生硬塊，或似石癭，用土貝母、何首烏各三兩，連翹、鼠粘子、天花粉、蒼耳子、青木香、白芨各二兩，黑棗百個，金銀花、紫花地丁、甘草、夏枯草各五兩，分作十劑，每劑用河水五碗煎至二碗，徐徐服。

貫衆味苦，氣微寒，有毒。（別錄曰：貫衆生玄山山谷及宛句、少室山中。蘇氏曰：今陝西、河東州郡及荊襄間多有之，出陰山、沂水處，數根叢生，每根必有多莖貫之，故名貫衆。莖有三稜，如蕨狀，大如筯，有黑汁涎滑。其葉兩兩對生，如雞翎及鳳尾，又似狗脊葉，而但無鋸齒，色青黃而深，背淡。四月開白色花，七月結實，黑緇，聚聯卷而旁生。其根曲而有尖，黑鬚叢簇，亦似狗脊根狀，及伏鴟皮，黑肉赤，直而多枝，若百枝狀，冬夏不死，雖乾枯，見水即活。人家置水缸中，可辟水底塵垢，揚之不使渾濁。）

○貫衆，殺蟲化癥之藥也。前古主腹中邪熱結氣，故時人用為殺蟲化癥，皆屬腹中邪熱濕鬱結氣也。蘇氏方又治下血崩淋，衂血不止，亦取氣味苦寒，散結熱，百莖貫脈絡耳。但性氣寒燥有毒，如病人營虛血槁，肝腎有火，并陰虛咳嗽人，不可加用。

○集方治腸風（林氏方）下血，婦人崩淋瀝血，久痢日下血水，并積年白帶等疾，並宜服之。用貫衆五箇，酒浸一日，連鬚并內肉俱切碎，曝乾，微炒，配黑消、黃丹參各減半，俱酒洗炒，共為末，每早晚各食前服三錢，白湯下。○治漆瘡痛（千金方）癢濕爛，用貫衆一兩為末，摻之即消。

○治吐血成斗，命在須臾，用貫仲末三錢，髮灰五錢，側柏葉搗汁一碗，和童便一匀，調入貫仲、髮灰，頓溫徐徐服之，毒止。如不止，用雲兩煎湯頻灌即止。

紫草、味苦。氣寒。無毒。入足少陰、厥陰經。（別錄曰紫草生碭山山谷及楚地李氏曰今出襄陽多從南陽新野來。二月逐壟下子苗似蘭香赤莖青節紫花白實其實秋月乃熟。春社前後采根頭有白毛如茸以石壓扁曝乾收時忌人溺及驢馬糞并烟火氣。不爾能令根色黃也。如未開花時采取根色鮮明如已開花根色黯惡染色不堪用也。雷氏曰修治每觔用蠟二兩溶水拌蒸待水乾去頭并兩畔髭細剉用）

○紫草涼血解疹毒之藥也。前古主利九竅。通水道。散五疸。逐心腹邪氣。腫脹滿痛等疾。凡關濕熱血熱。氣閉火結之證。咸宜用之。後人推廣此意。通治斑疹痘毒。欲出未出之際。根暈紫黑。或已出。仍紫黑乾枯。口渴便閉。熱極者投之。即透發。毒色轉紅潤。誠為痘家起死回生之首劑也。如脾元薄弱之子。或痘色紅潤。或根暈淡紅。及白陷下塌。與大便通利者。切宜忌之。

徐仰垣先生曰。紫草涼血解毒。古方稀用。今時醫治傷寒熱極與痘疹熱閉不出。以此發透獨行有效。令人不達此理。一槩用之。非矣。如前醫曾氏仁齋公有云。脾實協熱者可用。脾虛協寒者不可用。慎之慎之二句盡之矣。

○集方。治痘瘡深紅色。或紫。或黑陷。乾枯便閉。用紫草三錢。紅花子、莧橋、生地、貝母、牡丹皮各一錢。甘草五分。濃煎汁。加生犀角汁。十匙。至五十匙。量兒大小和之。在二朝及三四五朝。稍有元氣。雖危可生。痘疔立解。如痘瘡夾斑疹者。本方加石膏、麥門冬、花粉、竹葉。如痘毒須加黃耆、金銀花、鼠粘子、白芷各三錢。○治癰疽便閉。用紫草。五錢。瓜蔞實一箇。打碎水煎服。○治赤遊丹毒。紅暈如雲頭。用小鋒刀或磁碗鋒。畫去毒血。用紫草。五錢。鼠粘子。一兩。研細水煎服。○治五疸熱黃。用紫草三錢。茵陳草。一兩。水煎服。○治小便淋血。小水不通。用紫草、瞿麥、滑石各三錢。甘草、一錢。水煎服。

○治吐血衄血。不大凶。亦不盡止。起居如故。飲食如常。一歲之間。或發二三次。或發五六次。久必成勞。用紫草、懷生地各四兩。白果肉百個。茯苓、麥門冬各三兩。煎膏煉蜜收。每早晚各服十餘茶匙。白湯下。

黃精、味甘。氣平。無毒。

（蘇氏曰。黃精南北皆有。以嵩山茅山者更佳。可劈根長二寸。稀種之。一年後極稠密。三月生苗。高一二尺。一根只一莖。莖梗柔脆。本黃末赤。葉如竹。不尖而短。或兩葉三葉。四五六葉。俱兩兩相對。若偏生不對者。偏精也。力少不及。四月開花。青白色。狀如小豆花。結子白色。如黍粒。根如嫩生薑而黃。赤如鬼臼黃連輩。一年一節。節大不平。肥地生者。大者如拳。瘠地生者。小者如拇指。二八月采根。以溪水洗淨。雖曝燥。亦柔潤有脂。甑上蒸熟。黃黑色。曝乾。作菜食。甚甘美。其苗嫩時。采為蔬。謂之畢菜。蒸熟。淘去微苦味。極鮮美。又一種苗葉際類黃精。只是葉頭尖。有毛鉤子二箇。但莖不紫赤。其莖蔓生。乃鉤吻也。誤食立死。）

○黃精、除風濕。補五藏。益中氣之藥也。別錄加稱為可代穀食之不饑。有延年之功。醫方雖未嘗用。久為仙經所貴。根葉花實皆可餌食。湯酒丸散。隨病制宜。其性味甘溫而和。獨得戊己之淳氣。故曰黃精能補中健力。氣血精三者咸益。則水火既濟。金木交孫。而諸邪自去。百病不生矣。

○集方、治精神不足。肝虛目暗。毛髮憔槁。足膝乏力。并大風癩瘡。一切頑疾。偏痺不愈。總能治之。用黃精五十觔。枸杞子、懷熟地、天門冬各十觔。於白朮、萆薢、何首烏、石斛各八觔。用水二石。煮之。自旦至夕。候冷。入布袋榨取汁。渣再用水一石五斗。再如法煮。如法榨取汁。總和一處。文火熬之。其清汁十存其二。如飴糖。以煉蜜十觔收之。每早晚各服十大茶匙。湯酒皆可調下。此藥須冬月製。方妙。

仙茅、味苦辛。氣熱。有小毒。氣味俱厚。可升可降。陰中陽也。入手足厥陰經。

（蘇氏曰。仙茅生西域。及大庾嶺川蜀江湖兩浙亦有。葉青如茅而軟。較茅稍闊。而有縱紋。又似初生棕櫚狀。夏抽莖。勁直。至秋高尺許。冬至盡枯。春初復生也。三四月開花。深黃色。酷似梔子瓣。不結實。根獨莖而直。大如指頭。下有短細肉根。相附外皮粗褐。內肉黃白。二八月采根。曝乾。獨衡山出者。花色翠碧。結黑子。亦有白色花者。修治。以水浸。刮去皮。切作豆大。酒浸一宿。去赤汁。曬乾用。）

○仙茅、助陽氣。暖藏府。壯筋脈。强骨力之藥也。開寶方統治一切風氣冷痺。腰脊痠軟。足膝攣癱。不能行立。或陽道久虛。子嗣難成。或血室衰寒。胎娠罔育。或腎弱精寒。瞳人昏瞶。或脾虛氣倦。水穀不消。此藥培土益陽。凡屬陰凝痼冷之疾。總能治之。然味辛氣熱。性猛而烈。凡一切陰虛發熱。咳嗽吐血。衄血齒血。溺血淋血。遺精白濁。夢與鬼交。或虛火上炎。口乾咽痛。或水涸血竭。夜熱骨蒸。或腎虛有火。腳膝無力。或多慾精耗。不能種子。或血熱經枯。不能受孕。或多食辛熱炙煿之味。或久服金石丹火之藥。以致筋骨偏痺。攣癱不起。或胃火攻灼。邪熱不能消穀。或胃熱血耗。嘈雜易于作饑。或三消十膈。五疸八痢。或諸病外寒內熱。陽極發厥。火極似水等證。法並禁用。

李士材先生曰、仙茅辛熱雄健。助陽道。壯命門火。若心腹若腰足若筋骨。陽明厥陰兩臟寒虛。以此潤宗筋。束骨而利機關。在所必需者也。倘壯火熾然。少火食氣者

恢服必有暴絕之禍，慎之慎之。

○集方治一切風氣冷痺，腰脊疼軟，足膝癱攣，不能行立，或精虛血冷，子嗣難成，或瞳人寒障不明，或胃寒水穀不化等證。用仙茅一觔，酒浸五日，晒乾炒。枸杞子、懷生地、覆盆子、人參、白朮、當歸、黃耆、牛膝、白芍藥、小茴香、甘菊花、密蒙花、知母各二兩，俱酒拌炒。煉蜜丸，每早服三錢，白湯下。

○治跌傷、打傷、杖傷、夾傷，或木石壓傷等證，或筋骨內損，血冷不散，用仙茅一味。傷在上部，作末子，食後服，每用二錢，酒下。傷在下部，作丸子，食前服，每用三錢，酒下。傷在遍身，浸酒蒸熟服，隨食前食後，亦隨量飲。

淫羊藿，味辛，苦，氣溫，無毒。入手足厥陰，足少陰經。可升可降，陽也。為命門之要藥。

（別錄曰：淫羊藿出上郡陽山山谷，今所在皆有。蘇氏曰：今江東、陝西、泰山、漢中、湖湘間亦有。李氏曰：一根數莖，莖細極堅，高一二三尺，一莖三椏，一椏三葉，葉長二三寸，如豆藿葉，如杏葉，面光背淡，邊有細齒，薄而有刺，四月開花，白色，亦有紫色者，碎小獨頭，經冬不凋，根似黃連，色紫多鬚。羊食此草而淫，故曰淫羊藿，以形似葉也。蜀本草言生處不聞水聲者更良。修治以夾刀夾去葉四畔花枝，用酒浸曬乾用。）

○淫羊藿，強陽起氣，發動情慾之藥也。前古主陰痿陽絕，葢可知矣。故大氏方治男子陽弱不生，女人陰衰不育，老人昏耄失靈，此藥辛溫，發達鼓動相火。凡意索情疲，欲子而無其為者，宜加用之。如年少之人，血熱氣強，精盛力充者，服之，陰陽頻舉，意念妄為，交御多而精血走耗，不惟無子，亦且損年，切宜戒之。

○集方治男婦精衰血冷，子嗣少成，服此宜節慾謹養百日，一鼓而弄璋矣。用淫羊藿二觔，酒浸一日，晒乾。鹿角膠、龜板膠、鱉甲膠各六兩，切碎，好酒溶化。當歸、白朮、枸杞子、北五味子、黃耆、白芍藥、懷生地、牡丹皮、山藥、澤瀉各三兩，俱酒浸炒。川黃柏二兩，鹽水炒。共為極細末，以三膠酒和為丸。再加煉蜜少許，丸如黍米大，每空心服五錢，好酒下。○治偏風手足不遂，皮膚麻木。以淫羊藿八兩，枸杞子、天麻各四兩，人參一兩，龍眼肉三兩，浸酒隔湯蒸一日，每日頻飲，不得大醉，極效。○治牙齒虛痛，以淫羊藿煎湯，泪漱立止。

狗脊味苦。氣平。無毒。

（李氏曰。狗脊出常山山谷。今大行山淄濡眉州深山中有之。苗尖莖細。有刺。葉花兩兩相對。葉似貫衆而細。邊有鋸齒。面背皆光。根黃白色。形如狗脊骨。凸凹巃嵸。有黃毛叢密如軟刺。二八月采根。火燎去毛。細切。酒浸半日。曬乾用。外有一種透山根。形狀相似。味極苦。不可餌服。）

○狗脊補肝腎。活筋骨血脉。利機關經絡之藥也。滑氏方引前古利機關緩急。周痺。寒濕諸證。故時醫每治男婦傷中痿痹。腰痛不能俛仰。痿痺强急。軟癱脚弱。筋骨堅掣不能動搖諸疾。或瘇子昏蒙。或失溺不節。或淋露奔豚諸疾。凡屬肝腎虛疲有風寒濕氣者。咸需用之。又濟生方治衝任寒冷。婦女白帶。此又屬機關不利爲病。并可治奇經諸脉。陽維陰維。陽蹻陰蹻。以及督與十二經

脉經絡之機關失利。爲病。與諸病治及機關者。俱可投入。以此推取。真不勝其用矣。如腎虛有蓄熱。肝虛有鬱火。精虧血熱。多慾斲喪之人。以致已上諸疾。或小水不利。或短澁赤黃。口苦舌燥者。皆忌用之。

○集方治風寒濕氣。傷中痿痹。腰痛不能俛仰。痿痺强急。軟癱脚弱。筋骨不能動搖者。用金毛狗脊四兩。酒浸一日。曬乾。炒。萆薢。於白术。當歸。羌活。枸杞子。牛膝。黃柏。各三兩。俱酒洗炒。共爲末。每早晚各服五錢。白湯調下。○治骨冷癱痪。四肢不舉。用金毛狗脊四兩。如法修製。磨（爲末。大附子一兩。童便煮。搗膏爲丸。如梧子大。每早晚各食前服二錢。白湯下。○治婦人并室女白帶。用金毛狗脊四兩。如前法修製。白斂。新艾葉。俱醋炒。共爲末。煉蜜丸。每早服五錢。白湯下。）

紫參味苦辛。氣寒。無毒。氣味俱厚。陰也。沉也。入足厥陰經肝藏血分藥也。

（別錄曰。紫參生河西冤句山谷。范氏曰。今河中淮郡三輔商山蜀州亦有之。蘇氏曰。莖高一二尺。葉似槐。亦有似羊蹄者。五月開花白色。似葱花。亦有紅紫而似水葒者。結實色黑。大如豆。圓聚而生。其根黃赤。有紋。根皮紫黑。肉紅白色。肉淺而皮深。三月采。根火炙紫色用。李氏曰。根乾色紫。狀類小紫草。）

○紫參涼血散血。行血止血之藥也。前古治心腹積聚。寒熱邪氣。通九竅。利二便等證。統屬血所爲患者。用之無疑也。故後世如金匱方。別錄方。甄氏方。與蘇王二氏方。共稱紫參。治諸血病。如唾血。衄血。便血。溺血。淋血。腸中聚血。癰腫熱血。經阻瘀血。金瘡留血。下痢蓄血。或傷寒遺熱。下血如豚肝。或陽明熱勝。血蓄如狂狀。或溫瘧寒

熱。血結如昏迷。或婦人血閉不通。寒熱譫語。如見鬼祟。或男子血蘊腹脹。身面如黃疸諸證。用此苦以燥濕。辛以散結。寒以除熱。則諸證自平矣。如脾胃虛乏。與肝腎不足。男子陰虛失血。婦人血枯經閉。俱禁用之。

○集方治唾血衄血嘗發。用紫參四兩。牡丹皮。川貝母。麥門冬。當歸身。玄參。知母。乾葛。藕節。各二兩。甘草五錢。煎汁。熬膏。煉蜜收成。每早午晚各服十茶匙。燈心湯化下。○治衄血。便血。淋血。用紫參五錢。水煎服。（○如衄血。本方加大生地三錢。如便血。本方加地榆。蒼木。米泔浸。各二錢。赤石脂一錢五分。○如淋血。本方加丹參。玄胡索。白芍藥。懷生地。俱醋炒。各二錢。○如溺血。本方加車前。茯苓。牡丹皮。麥門冬。去心。建蓮子。去心。各三錢。○如腸中聚血腹脹。本方加丹參。牡丹皮。玄胡索。桃仁。俱酒炒。各三錢。○如癰疽熱血。本方加金銀花。赤芍藥。牡丹皮。當歸。紅花。皂角刺。各三）

錢。○如經阻瘀血腹痛，本方加紅花、當歸、牡丹皮、玄胡索、香附各二錢。○如金瘡瘀血腫脹硬痛，本方加當歸二錢、肉桂、木香各一錢。○如下痢蓄血，本方加芍藥、檳榔、生地、牡丹皮、五靈脂各三錢。○如傷寒移熱于大腸下血如豚肝，本方加柴胡、黃芩、川黃連各一錢、生地二錢、貝、阿膠三錢。○如傷寒陽明熱甚蓄血如狂，本方加柴胡、牡丹皮、紅花、青皮各一錢、桃仁三錢、大[illegible]一錢五分。○如溫瘧久發，發必昏迷如死，本方加柴胡各二錢、青皮、白殼、桃仁、杏仁、鱉甲各三錢。○如婦人血閉不通，或適來適斷，發寒熱，譫語如見鬼祟，病名熱入血室，本方加柴胡、牡丹皮、紅花、桃仁、玄胡索俱酒炒各三錢。○如男人血蓄腹脹，身面發黃如疸，病痰積滯未清，早行兜澀，或瘧疾邪氣未散，速行止截，恐有此證，本方加佐滌牡丹皮、青皮、桃仁、龍膽草、茵陳草各二錢。已上數方俱用水煎服。

續補方治子癖上衝刺，用紫參、苦參、沙參各一兩五錢，共爲末，胡桃肉去皮搗和丸梧子大，每服百丸，苦茶下。

[illegible]名三七又名金不換　味苦，微甘，性平，無毒。入陽明、厥陰經。

（[illegible]氏曰：山漆生廣西南丹諸州及番峒深山中。其根黃黑色，團結略似白及，長者如乾地黃，有節，味苦，微甘。似人參之味。或云試法以末摻豬血中，血化爲水，乃眞。今東廣江浙出一種草，春生苗，夏高二三尺，葉似菊艾而勁厚，有歧尖，莖有赤稜，夏秋開黃色花，蕊如金絲盤紐可愛，而氣不香，花乾則如絮，根葉味甘，治金瘡折傷出血及上下血病甚效，云是三七，而根大如牛旁根，與南中來者不類，甚是繁衍。）

○山漆，活血散血，行血止血，治上下諸失血之藥也。蘋湖方治刀斧損傷，箭鏃釘刺損傷，跌磕撲打，滚墮損傷，皮肉筋骨，內損外破，血出不止，搗爛塗敷，或爲末摻之，其血即止。又主吐血、衂血、溺血、便血、血痢、血崩經水不止，或產後惡血不下，血暈、血脹、血悶、血痛，熱血癰腫，虎咬蛇蟲咬等瘡，並皆治之。凡遇上件[illegible]○搗汁服，或搗渣敷，或爲末摻，內服外貼，咸可奏功，[illegible]血寶也。

白及，味苦，氣寒，性濇，無毒。陽中之陰也，收也。（別錄曰：白及出北山山谷，及兗州、越山。蘇氏曰：今江淮、河陜、漢、黔諸州亦有之。生石山上，春生苗，長尺許，葉如初生欆苗及藜蘆，兩指許大，色青翠。夏月葉中抽條，開紫色花，酷似草蘭，即香蘭也。八月結實，黃黑色。根色白，相連，似水菱，有三角，下有臍，又有螺旋紋，角頭生芽，節間有毛。方用甚少，質極粘膩，可以作糊。）

○白及，斂氣滲痰，止血消癰之藥也。此藥質極粘膩，性極收濇，味苦氣寒，善入肺經。凡肺葉破損，因熱壅血瘀而成疾者，以此研末，日服，能堅斂肺藏，封填破損，癰腫可消，潰敗可托，死肌可去，膿血可潔，有托舊生新之妙用也。如已上諸證，非關肺藏者，用無與焉。如已關肺藏，不係肺葉外絡為病者，又無與焉。但此藥質膩性濇，若平斂肺，如熱壅血瘀，肺葉潰損，服之可修。如肺氣鬱逆有痰，有火，有血，迷聚于肺竅氣管之中，此屬統體一身氣道之故，理宜清肺之原，降氣之逆，痰血清而火自退矣。若徒用此藥粘膩封塞，無益也。

劉默齋先生曰：白及苦寒收濇，農皇主癰疽惡瘡，取苦寒涼血也；去敗疽死肌，取苦濇以去浮垢也；又治痱緩不收，亦取苦寒收濇、斂束筋骨脈絡之意云。

○集方：治肺熱吐血不止，（本草發明）用白及研末，每服二錢，白湯下。

○治刀斧傷損肌肉，出血不止，用白及研細末，糝之即止血收口。○治湯火傷灼，（趙氏方）用白及研細末，麻油調敷。

蒼朮，味苦，氣溫，性燥，無毒。陰中陽也，可升可降。入足太陰、陽明經。（漢人鍾離氏曰：蒼朮處處山中有之，惟嵩山、茅山者良。苗高一二尺，其葉抱莖而生，稍間葉似棠梨葉，其腳下葉各有三五出，邊有鋸齒及小刺，花開紫色，根如老薑狀，蒼黑色，氣味辛烈。古人用朮不分赤白，自宋人始分白者曰白朮，赤者曰蒼朮。但氣味有和烈之殊，則施治亦有補利剛柔之別。先以米泔水浸去暴氣，再以黃土拌蒸，再以人乳拌蒸，曬乾入藥用。按二朮，白者補中有燥，氣平而和；蒼者燥中有補，氣雄而烈。蒼者發汗寬中，白者止汗，特異用者不可以此代彼。如欲補脾中之濕，必用白朮；如用燥脾中之濕，必用蒼朮。）

○蒼朮，健脾燥濕之藥也。此稟初夏之氣以生，其味苦，其氣溫，其性燥，（繆仲淳）辛烈純陽，從火化也。為除濕痹之上品，安脾胃之神方。（方龍潭）蓋脾喜燥而惡濕，喜利而惡滯，喜溫而惡寒。本草主健脾胃，療泄瀉，消宿食，行滯氣，利水濕，辟瘴氣，散寒溫中，用不可少。若風雨山蒸，瘴霧濕氣，或頭重目眩，胸腹脹滿，或四肢困倦，腰疼重墜，或陰疝虛浮，脹痛，或足膝痺腫不仁，是皆濕氣之所致，惟蒼朮可以治之。又如瓜菓魚腥，有傷脾胃，或腹痛泄瀉，脹滿否塞，或積聚不清，霍亂吐利，是皆積濕停寒之症，惟蒼朮可以理之。凡病屬陰虛血少，津液不足，內熱骨蒸，口乾唇燥，咳嗽吐痰，吐血衄血，咽燥便塞，下痢大腸澀閉，欲通不通之證，法咸忌之。

馬瑞雲先生云：蒼朮治濕，上中下皆可通用。入平胃散，運脾去濕；入六鬱湯，又能總解諸鬱，如痰、火、濕、食、氣、血六鬱者，皆因脾胃傳化失常，不得升降，病在中焦，故蒼朮為燥胃強脾，能發越中焦陳宿水穀之氣而疏散之。

在裏者能利。在表者能散。在上者能降。在下者能升。在中者能化。鬱散氣平。脾胃通調。能食而運。力不補而自強。氣血不培而自健也。漢人有謂燥中有補。信夫。如陰津內耗。虛火妄動之人。切禁。

○集方。治脾虛有寒濕。不能健運。爲腫滿脹泄不食諸證。或傷食不消。或氣滯不行。或水道不利。用蒼朮八兩。切片。米泔浸三日。晒微乾。再拌黃土。蒸半日。晒乾。磨爲細末。乾薑七兩。白朮六兩。厚朴、砂仁、茯苓各二兩。人參、肉桂、木香各一兩。後九味剉碎。俱用麩拌炒。和蒼朮共磨爲細末。錫糖爲丸。梧子大。每早晚各服四錢。米湯下。○治人受風雨山蒸。瘴霧濕氣。或頭重目眩。胸腹脹滿。或四肢困倦。腰疼重墜。或寒疝虛浮脹痛。或足膝痹癧不仁諸證。用蒼朮六兩。切片。（製法如前）藁本、川芎、厚朴、陳皮、杜仲、胡盧巴、木瓜、防己各二兩。後八味剉碎。俱用鹽酒拌炒。和蒼朮共磨爲末。紅麴糊爲丸。梧子大。每早晚各食前服三錢。酒下。○治瓜菓魚腥生冷。有傷脾胃。或腹痛泄瀉。脹滿否塞。或積聚不清。霍亂吐利諸證。用蒼朮六兩。切片。（製法如前）吳茱萸、黃連三錢。煎湯泡浸一宿。晒乾。木香、厚朴、草菓仁、半夏、扁豆各二兩。白朮四兩。紅麴三兩。茯苓三兩。人參一兩。後十一味剉碎。和勻。用黃土三錢。調醋一碗。俱拌炒。和蒼朮共磨爲末。水發爲丸。每早晚各食前服三錢。酒下。

本草彙言卷之二

錢塘　倪朱謨純宇甫選集　男倪洙龍冲之氏藏稿
沈　琯西瑛甫校正

草部　芳草類

廣木香。味苦辛。氣溫燥。氣味俱厚。可升可降。陰中陽也。入手太陰、陽明、足太陰、厥陰經。諸經氣分藥。（李時珍先生曰。木香草類也。出天竺。及崑崙、南番諸國。今惟廣州舶上來。廣州一種。類木頭藤。似是而非。滁鬼海州一種。是馬兜鈴根。市肆以此相混。不可不慎也。三洞珠囊云。五香者。木香也。一株五根。一莖五枝。一枝五葉。葉間五節。故名五香。燒之上徹九天也。根形如枯骨而味苦辛。粘牙者爲良。凡修事入理氣藥。只生用。不可見火。欲實大腸藥。麪裹煨熟用。○一說云。其香是蘆蔓根條左盤旋。采得一月。方硬如朽骨。其有蘆頭丁蓋子色青者。是木香神也。）

○木香能升降諸氣。乃三焦氣分之藥也。蓋諸氣膹鬱。屬於肺。故上焦氣滯用之者。乃金鬱則泄之也。中氣不運。屬於脾。故中焦氣滯用之者。乃脾胃得芳香則行也。肝氣鬱。則爲痛。大腸氣鬱。則爲後重。膀胱氣鬱。不化則爲癃淋。故下焦氣滯用之者。乃塞者通之也。所以類證方治氣閉不利而兩脇作痛。或寒冷積滯而胃脘作疼。或痢疾腹痛而後重赤白。或陰疝弦氣而攻引小腹。是皆太陰厥陰之證也。用木香治之最效。本草言治氣之總藥。和胃氣。通心氣。降肺氣。疏肝氣。快脾氣。暖腎氣。消積氣。溫寒氣。順逆氣。達表氣。通裏氣。管統一身上下內外諸氣。獨推其功。然性味香燥而猛。如肺虛有熱者。血枯

脈燥者。陰虛火上衝者。心胃痛屬火者。元氣虛脫者。諸
病有伏熱者。愼勿輕犯。
繆仲淳先生曰。木香稟木火之陽。具土大之精。淸明開
發。行藥之神。
盧子繇先生曰。木香。香草也。名木者。當入肝。故色香氣
味各具角木用。亦入脾。故根枝節葉亦各具宮土數。入
脾則奪土鬱。入肝則達木鬱。經云。木鬱則達之。土鬱則
奪之。奪土即所以達木。達木即所以奪土。土以木爲用。
木以土爲基也。凡上而霧露淸邪。中而水穀寒痰。下而
水濕淤留。爲痛爲脹。爲結爲滯之證。無不宣通。一涉燥
熱。務宜斟量。

○廣濟方。治女人一切血氣刺心痛不可忍。用木香。牽牛。
三稜。莪朮。一服即定。加雷丸。苦楝根。幷殺一切蟲積。○
治赤白痢疾。用木香。川黃連。白芍藥。惟身熱脣紅口渴
者。勿用。○治一切氣脈不通不順。及冷氣攻痛。作泄。大
怒後氣逆。胸膈脹滿。兩脇作痛。用木香。陳皮。砂仁。白豆
仁。紫蘇葉。防風。○治中氣不省人事。閉目不語。如中風
狀。用廣木香爲末。冬瓜子煎湯。灌下二錢。有痰盛者。加
竹瀝。薑汁。○治耳卒聾閉。用廣木香一兩。枸杞子三兩。
共爲末。每食後服二錢。白湯調服。○治一切下痢。不拘
男婦小兒。用木香一兩。川黃連一兩。二味用水一升同
煎乾。去黃連。將木香焙乾爲末。每用三錢。分作三服。第

服陳皮湯下。[illegible]下。三[illegible]甘草[illegible]。○治腸風
下[illegible]用木香[illegible]連各等分爲細末。入肥[illegible]大腸內。兩頭
札定。煑極爛。連藥共擣爲丸。每早服三錢。好酒下。○治
惡蛇虺傷。用廣木香二錢。煎服立效。○治腋下濕臭。用
廣木香爲末。不時搽之。自乾。○治思慮傷心脾。精神短
之。面黃肌瘦。飲食不甘。譫證。用木香。人參。白朮。黃耆。當
歸。茯苓。棗仁。遠志肉。龍眼肉各一錢。水煎服。名歸脾湯。
高元鼎先生曰。按木香圖經謂生永昌。又云廣州舶上
來。又云生大秦國。又云產崑崙。則所出地土各異。是名
同而實異。可知已。藥性論云。嘗以崑崙來者爲勝。此絕
不可得。又云西胡來者劣。今市肆所有。止白木香也。其

味辛。其氣溫。專主諸氣不順。求其能辟疫毒。殺鬼精邪
物。恐或未然也。肺虛有熱者。愼勿犯之。傷寒類要所載
治天行熱病。若發赤豆斑。用靑木香水煑服者。蓋指崑
崙來者一種。定非坊間所市。廣州舶上來。世所常用之
白木香也。（今之馬兜鈴之根。亦名淸木香。非是。）
○治婦人血瘀。血滯。血脹。血痛。或疝瘕。或癥癖痃發不常
者。用廣木香。小茴香。乳香。肉桂。玄胡索。香附。桃仁。砂仁
各一兩。牛膝二兩。當歸三兩。川芎一兩五錢。白朮四兩。
俱用酒拌炒過。研爲末。煉蜜丸梧子大。每服五錢。空心
白湯下。

白荳蔻。味辛，氣溫，無毒。味薄氣厚，輕清而升，陽也，浮也。入手太陰經。

○陳氏曰：白荳蔻出伽古羅國，今廣州、宜州亦有之，及番舶來者佳。其草本似芭蕉，葉似杜若，長八九尺[illegible]澤而厚，冬夏不凋，開花淺黃色，結子作朶，如葡萄，初[illegible]微青，熟則變白。其殼白厚，其仁如縮砂蔤也。七八[illegible]之。入藥去皮炒用。

○白荳蔻，溫中開胃，消食下氣之藥也（潛江稿）。凡冷氣哮喘，痰氣無時，或宿食停中，嘔吐腹脹，或瘴瘧寒熱，久發不休，或中酒中氣，眩暈煩悶，或暴發赤眼，翳膜遮睛，諸證皆脾肺二臟之氣，寒鬱不和之故也。用白荳仁辛溫開達，能行能運，能消能磨，流行三焦，榮衛一轉，諸證自平矣（李時珍）。凡喘嗽嘔吐，不因於寒，而因於火者，瘧疾不因於瘴邪，而

因於陰陽兩虛者，目中赤脈白翳，不因於暴病寒風，而因於久眼血虛血熱者，皆不可犯。又如火升作嘔，因熱腹痛，法咸忌之。

繆仲淳先生曰：白荳蔻感秋燥之令，而得地火金之氣，故其味大辛，性大溫，宜其入主手太陰、足陽明也。其治積冷吐逆，因寒反胃，煖能化物，故主消穀；溫能通行，故主下氣。義皐言之詳矣。東垣用以散肺中逆氣，寬膈進食，去白睛翳膜，亦散滯之功也。

盧子繇先生曰：脾胃之受盛水穀，以成醞釀，若甗中之糜爛，有形也。其所以成醞釀者，藉腎間動氣，曰先天，又若甗底之灼然薪炭耳。更藉肺氣，吸呼，曰後天，又若甗底薪炭，輪機動扇，乃得灼然薪炭耳。白者肺色，潔白以成休德也。豆曰腎穀，受盛膚肉之甗器也。味大辛，氣大熱，寧非火然泉達之機乎。

○廣濟方：治哮喘痰逆，不拘冷熱，用白豆蔻、麻黃、杏仁、桑白皮、甘草。（東垣）○治宿食不消，中滿嘔逆，用白荳蔻、紅麴、砂仁、枳實、白朮。（同上）○治瘴瘧寒熱，嘔吐，胃弱飲食不進，用白豆蔻、人參、白朮、陳皮、半夏、厚朴、生薑。（同上）○治中酒嘔逆惡心，用白豆蔻、陳皮、乾葛、木瓜、砂仁。（張文仲方）○治中氣厥逆眩暈卒倒，用白豆蔻、人參、黃耆、木香、半夏、烏藥。（普濟方）○治眼目赤障，用白豆蔻、桑皮、柴胡、生地、連翹、荊芥。（聖惠）○治脾虛白睛生翳障，用白豆蔻、白朮、白蒺藜、決明子、甘菊花、密蒙花、

木賊草。○治胃虛反胃，及因寒嘔吐，用白豆蔻、人參、生薑、陳皮、藿香、白朮。○治婦人一切氣逆不和，用豆蔻、藿香、烏藥、陳皮、木香。（婦人良方）○治人忽惡心，多嚼白豆蔻，立止。（危氏得効方）○治小兒胃寒吐乳，用白豆蔻、砂仁各十四顆，炙甘草二錢，共為細末，常摻入兒口中。（濟生方）○治脾虛反胃，用白豆蔻、砂仁各二兩，丁香一兩，陳白米一升，好淨黃土拌炒焦，去土細研，薑汁和丸，每二三錢，薑湯下。

香附子。味苦辛甘。氣溫濇。無毒。入足厥陰。亦入手太陰經。能行十二經八脈氣分。可升可降。陽中之陰。氣厚於味。血中之氣藥也。

（李時珍先生曰。別錄莎草不別根苗。後世僅用其根。名香附子。併不知莎草名矣。生田野下濕地。所在都有。惟隴西潞都兩浙最饒。又廣東高州者獨勝。苗似草蘭而柔。又似細韭而勁。葉心有脊。似劍。又似菖蒲吉祥草叢。光澤亦同。嫩綠蕭蕭。可以爲笠及雨衣。疎而不沾。五六月中抽一莖。三稜。中空。莖端復出數葉。開青色花。成穗似黍。中有細子。似葶藶車前子狀。根多白鬚。鬚下另結子一二核。轉相延生。外裏細黑茸毛。大者似羊棗。兩頭尖。耐水旱。雖分勞亦不死。采時燎去毛。暴乾用。凡用以童子小便浸焙。或以酒醋鹽水浸炒。諸法各隨証用之。又和稻草煑之。味不苦。）

〇香附開氣鬱。調血滯之藥也。善主心腹攻痛。積聚鬱結。痞滿癥瘕。崩漏淋血。乃血中氣藥。爲婦科之仙珍也。雖應病多方。妙在製法。得其所宜。故古方有鹽醋酒便四法之製。各因其所用也。如心腹攻痛。積聚痞塊。堅實而不消者。宜用鹽製。鹽之味鹹。鹹能潤下。鹹能軟堅也。若胎前產後。崩漏淋帶。汚濁而不清者。宜用醋製。醋之味酸而辛。酸可以斂新血。辛可以推陳物也。若跌撲損傷或腫毒未潰。瘀血死血。留滯而不散者。宜用酒製。酒之性溫而善行。溫能通血脈。行能逐留滯也。至如便製之法。童便陰之質也。陽之用也。味鹹而降。若血虛之證。或兼氣有所鬱。以致血脈衰少。夜熱骨蒸者。非便不能養其血。非附不能行其氣也。東垣又謂治一切氣。肝脹脇氣。腹痛腎氣。膀胱冷氣。陰疝弦氣。世醫專以治婦人崩

漏帶下。月經不調者。皆降氣調氣。散結理滯之所致也。蓋血不自行。隨氣而行。氣逆而鬱。則血亦凝澀。氣順。則血亦從之而和暢。此女人崩漏帶下。月事不調之病。所以咸需之耳。然須輔之以益血涼血之藥。氣虛者。兼入補氣藥。乃可奏功也。若陰虛血燥。火盛真氣衰微。乾咳咯血。及血熱經水先期者。法當用滋陰潤養之藥。慎用香附。病必轉甚。然損氣是香附之常道也。如本草稱爲充皮毛。長鬚眉。久服令人益氣。總屬行氣開導。散鬱結有餘之氣而使之和平。則氣自益也。

李氏綱目發明曰。古方不言治崩漏。而時方用治崩漏大有奇功。是行氣而又能止血也。能逐瘀血。是又推陳也。古方不言補虛。而時方言益老人者何也。蓋行中有補也。蓋天之所以爲天者。健運不息。所以生生無窮。香附之氣平而不寒。香而能達。利而不損。其味辛能散。苦能降。甘能和。週身經絡。無所不到。生則上行胸膈。外達皮膚。熟則下走肝腎。外徹腰足。炒黑則止血。酒浸炒。則行經絡。醋浸炒。則疎肝氣。薑汁浸炒。則化痰飲。童便浸炒。則入血分而補虛。鹽水浸炒。則入血分而潤燥。得參术。則補氣。得歸地。則補血。得木香。則疏滯和中。得檀香。則理氣醒脾。得沉香。則升降諸氣。得茯苓。則交濟心腎。得芎藭蒼术。則總散諸鬱。得梔子黃連。則降火清熱。得茴香骨脂。則引氣歸元。得厚樸半夏。則決壅消脹。得紫

蘇恭曰。則解散表邪。得三稜莪术。則消磨積塊。得艾葉。則治血氣煖子宮。乃氣病之總司。女科之主帥也。諸書皆云益氣。而俗有耗氣之說。宜女人。不宜男子者謬矣。蓋婦人以血用事。氣行則無疾。老人精枯血閉。惟氣是資。小兒氣日充。則形乃日固。凡病多屬氣滯而餒。故香附於氣分為君藥。臣以參芪。佐以甘草。治虛怯甚速也。經驗方有交感丹。凡人中年精耗神衰。蓋由心血少。火不下降。腎氣憊。水不上升。致心腎隔絕。榮衛不和。上則多驚。中則寒痞。下則虛冷遺精。庸醫徒知峻補下田。非惟不能滋陰。反見衰悴。但服此方半年。謝去一切煖藥。屏絕嗜欲。其效不可殫述。韓氏方。治百病黃鶴丹。治婦

人。青囊丸。隨宜用引輒效。黃鶴丹用香附一斤。黃連半斤。洗晒為末。水糊丸。如外感。薑湯下。内傷。米湯下。氣病。木香湯下。血病。當歸湯下。痰病。白湯下。青囊丸用香附一斤。略炒。烏藥五兩。略炮。為末。水醋煮麪糊丸。如頭痛。茶下。痰氣。薑湯下。多宜酒下。為妙。此皆行氣而益氣行血而生血也。又氣血聞香即行。聞臭即逆。凡癰疽瘡瘍。皆因氣滯血凝所致。宜服香附引氣通血。進食寬中。大有效也。

盧不遠先生曰。胸為肺金之部分。氣為肺金之所司。皮毛為肺金之所主。香附子。功能解表利水。所以泄金之鬱。解表而利小便也。用合衆香。能發諸香氣。是以性專押闔。開發上焦。宣五穀味。熏膚。充身。澤毛。若霧露之溉。中焦亦得藉之以宣化。下焦亦得藉之以宣瀆。而為諸藥之先聘通使。

張卿子先生曰。按韓氏方稱香附於氣分為君藥。統領諸藥。隨用得宜。為婦人氣病要劑。然性燥而苦。獨用多用。久用。反能耗氣損血。其所主治。調氣和血。皆取其治標。非治本也。如懼燥烈。以童便酒煮可也。

○聖惠方。治心腹攻痛。用香附子一斤。烏藥八兩。甘草一兩。俱酒洗炒。磨為末。每服二錢。○治積聚癥瘕。用香附子一斤。鹽水浸炒。莪术四兩。酒浸炒。共為末。每服二錢。○治血崩淋漏不止。用香附一斤。童便浸透炒。炒時不

住手。酒童便。火勿猛。炒一晝日為度。以木耳五兩。紙包裹。以新瓦兩片夾定。繩縛泥固。火煅存性。覺烟起良久。急去火。置冷地上。候冷取出。同香附研極細如麪。每用七八分。淡醋湯調。空心服。○治一切氣病。能升降諸氣。凡病壹塞。噫氣吞酸。痞脹喘滿。痰逆嘔噁。煩悶虛痛。走注。常服開胃消痰。散壅思食。早行山行。尤宜服之。去邪辟瘴。用香附子四十兩。炒。甘草八兩。炙。沉香二兩。砂仁五兩。共為極細末。每服一錢。白湯調服。○治癰疽腫毒初起。用香附子四錢。酒浸炒。乳香沒藥各一錢。白芷赤芍藥。當歸尾。金銀花各三錢。水酒各半煎服。○治跌撲損傷。瘀血凝滯腫痛。用香附子。酒浸炒。三錢。當歸尾。桃

仁泥。各二錢。乳香沒藥各一錢。酒水各半。煎服。○治婦人夜熱骨蒸。陰虛血少者。用香附一觔。童便浸三日。再用童便煮酥。搗成膏。懷熟地四兩。酒煮搗膏。沙參。麥冬。地骨皮。黃栢。牡丹皮。丹參。各三兩。共爲末。煉蜜丸。每早服三錢。白湯下。○治小腸疝氣。冲發。用香附子。玄胡索。小茴香。各二兩。共爲末。每服二錢。用海藻一錢。煎湯服○治肝膽脹痛。用香附子三錢。蘆薈一錢。白芥子五錢。牡丹皮二錢。共爲末。紅麴打糊。丸黍米大。每服二錢。白湯下。○治心胃痛。用香附。莪朮。各三錢。木香。檳榔。白牵牛。各二錢。共爲末。每服二錢。白湯下。○治婦人女子經候不調。一切諸病。用大香附子。去毛。水洗淨。一觔。分作四分。四兩醇酒浸。四兩醋浸。四兩鹽水浸。四兩童便浸。春三夏二。秋五冬七日。濾乾。晒燥。微炒。磨爲末。氣虛加四君子料。血虛加四物料。有痰加貝母。杏仁。有熱。加知母。黃栢。熱燥。加天麥冬。夜熱。加地骨皮。銀柴胡。牡丹皮。○治婦人氣鬱血衰。頭眩腹滿。用香附子。醋浸炒。四兩。茯苓。當歸。各二兩。陳皮。甘草。各一兩。共爲末。每服二錢。白湯下。○治婦人五色漏帶。或血崩。用香附子四兩。醋浸炒焦。爲末。每服三錢。白湯調服。○治婦人胎氣不安。惡阻不食。氣不升降。嘔吐酸水。起坐不安。用香附子四兩。醋浸炒。藿香葉二兩。甘草八錢。共爲末。每服二錢。白湯下。○治婦人一切頭痛。用香附子。醋童便浸炒。爲末。每服二錢。日二。除楊梅風毒頭痛不用。○治男婦大小目睛作痛。冷淚羞明。用香附子五兩。童便浸三日。水洗淨。晒乾。炒夏枯草三兩。微炒。俱研爲末。每早晚各食後服二錢。茶調下。○治聤耳出水。用香附子。炒黃爲極細末。以綿子作撚蘸入。○治牙疼。牙宣兼烏鬚。用香附子三兩。鹽水浸半日。炒。青鹽。生薑。各五錢。爲末。日擦牙。○治蜈蚣咬傷。嚼香附塗之。立效。○治婦人脾胃虛冷。子宮寒閉。氣盛痰多。不能生育。用香附子一觔。童便浸三日。濾乾。加蘄艾四兩。用醇酒同煮乾。晒燥。俱炒焦黑。研爲末。棗肉丸梧子大。每早服三錢。白湯下。

○家寶丹。專治產難。胎衣不下。或胎死腹中。或血暈。血脹。血煩。血悶。及產後小腹痛如刀刺。兼治產後一切雜病。或中風。中氣。乳腫。血淋。平時赤白帶下。嘔吐惡心。心氣抑鬱。經脉不調。或不通。番胃膈食。飲食無味。手足頑麻。一切風痰。俱效。香附子。童便浸二日。晒乾。川烏。草烏。用酒煮一日。晒乾。蒼朮。米泔浸一日。晒乾。各四兩。當歸。酒洗。白附子。各二兩。麻黃。滚湯泡去沫。桔梗。甘草。防風。白芷。川芎。人參。大茴香。黑荊芥。白朮。各三兩。木香。血竭。細辛。各一兩。共十九味。總在鍋內微炒燥。磨爲極細末。煉蜜丸彈子大。每丸重二三錢。酒化開。和童便化下。男婦年（久腹痛服一二丸卽愈。室女經脉不通者。用桃仁紅花煎湯下。勞熱肺有火者不宜用。）

縮砂仁。味辛甘濇。氣溫。無毒。陽也。浮也。入手足太陰陽明太陽。少陰。八經。

（蘇氏曰。生西海西戎波斯諸國。今從東安道來。嶺南山澤亦有。苗莖並似高良薑。高三四尺。葉長八九寸。闊半尺許。三四月開花在根下。五六月成實。五七十枚作一穗。似益智而圓。皮緊厚而皺。有粟紋。外刺。黃赤色。一團八隔。可四五十粒。形似黍。椶表黑裏白。辛香似白豆蔻仁。八月采取。氣味宗同也。修事。去殼。焙燥研細用。辛香亦可充調食味。）

○砂仁。溫中和氣之藥也。治脾胃虛寒。腹痛吐瀉。或脾胃鬱滯。水穀不行。或傷酒停飲。嘔吐惡心。或寒暑不調。霍亂吐利。或肺中受寒。上氣欬嗽。或腎氣泛溢。奔豚走疰。又若上焦之氣梗逆而不下。下焦之氣抑遏而不上。中焦之氣凝聚而不舒。用砂仁治之。奏效最捷。然古方多用以安胎。何也。蓋氣結則痛。氣逆則胎不安。此藥辛香而竄。溫而不烈。利而不削。和而不爭。通暢三焦。溫行六府。暖肺醒脾。養胃益腎。舒達肝膽不順不平之氣。所以善安胎也。又有不宜用者。凡腹痛由于內熱。泄瀉由于火邪。胎痛由于血熱。脹滿由于濕熱。上氣欬嗽由于火衝迫肺者。咸宜禁之。

韓氏醫通曰。縮砂。香而能竄。屬土與火。主啟脾調胃。引諸藥歸宿丹田。調合五藏沖和之氣。故入補腎藥。用同地黃蒸和。取其達上下。濟水火也。

沈則施先生曰。砂仁溫辛香散。止嘔通膈。達上氣也。安胎消脹。達中氣也。止瀉痢。定奔豚。達下氣也。與木香同

用。治氣病尤速。

繆仲淳先生曰。縮砂蔤。氣味辛溫而芬芳。香能入脾。辛能潤腎。故為開脾胃之要藥。和中氣之正品。若兼腎虛氣不歸元。非此為向導不濟。殆勝桂附熱毒之害多矣。

王氏謂得人參。山藥。益智。則入脾。得黃蘗。茯苓。則入腎。得酸棗仁。龍眼肉。則入心。得赤白石脂。則入大小腸也。

盧子由先生曰。其花實在根。若芙蕖之本。斂縮退藏之謂密矣。猶夫其息以踵。孕毓元陽。保任沖舉者也。是故升出降入。靡不合宜。寧獨對待陰凝。開發上焦。宣五穀味。蘇胃醒脾而已。即虛可補。胎可安。滑可濇。脫可收。滲可彌。奔豚可下。乃若解毒散滯。伸筋舒攣。化痞却痛。徹飲調中。開噎膈。攝吐逆。此正開發上焦。宣五穀味。蘇胃醒脾之功力也。

○集方治泄瀉兼嘔吐。及不思食。用縮砂仁。人參。橘皮。藿香。白茯苓。白芍藥。炙甘草。○治乾霍亂累效。用縮砂仁兩許。炒為末。入食鹽三錢。滾湯一碗泡浸。冷服。○治遍身腫滿。陰亦腫者。用縮砂仁。土狗一箇。等分。研和。白湯服之。○治子癇昏冒。用砂仁和皮炒黑。熱酒調下二錢。不飲者。米湯下。此方安胎止痛。其效不可盡述。○治妊娠胎動。偶因所觸。或跌墮傷損。致胎不安。痛不可忍者。用砂仁炒熱擣碎。每服二錢。熱酒調下。須臾覺腹中胎動極熱。即胎已安矣。○治傷飲食油膩瓜菓酒麵乳茶

等物。用砂仁、蒼朮、草菓、乾葛、陳皮、茯苓、生薑。○治奔豚氣，用砂仁、茴香、吳茱萸、川黃連。

安胎方（危氏家寶方）：初受孕時服，過五個月則不用。砂仁、藿香、陳皮、桔梗、益智仁、蒼朮、黃芩各二錢，甘草、蘇葉、厚朴各一錢，枳殼三錢，小茴香炒一錢五分，分作三服，每服水鍾半，煎七分，空心溫服。

○治男婦翻胃嘔吐，飲食不適，此是寒痰在胃脘，結阻諸藥不効，此方極驗。用砂仁、沉香、木香各二錢，血竭、乳香、玄胡索各一錢五分，沒藥、麝香各八分，共研極細末，煉米糊為丸，如彈子大，用辰砂末一錢五分為衣。見是患者，用燒酒磨服。男婦腹痛，諸氣作痛，產後諸氣攻心作

痛，用陳酒磨服。小兒冷氣作痛，啼哭不已，用葱湯磨服。

○治男子婦人一切七情之氣不和，多因憂愁思慮忿怒傷神，或臨食憂戚，或事不遂意，使抑鬱之氣留滯不散，停于胸膈之間，不能流暢，致心胸痞悶，脇肋虛脹，噎塞不通，吞酸噫氣，嘔噦惡心，頭目昏眩，四肢困倦，面色痿黃，口苦舌乾，飲食減少，日漸羸瘦，或大腸虛閉，或因病之後，胸中虛痞，不思飲食，並皆治之。用砂仁、茯苓、半夏、白朮、桑皮、大腹皮、青皮、紫蘇葉、肉桂、烏藥、木香、赤芍藥各二錢，甘草五分，生薑三片，黑棗三個，水煎服。如面目浮腫，加豬苓、澤瀉、車前、葶藶各一錢；氣塊耕痛，加三棱、莪朮各一錢五分。

蓬莪朮：味苦辛，氣溫，無毒。陽中之陰，降也。入足厥陰肝經氣分藥也。

蘇氏曰：蓬莪朮生西戎及廣南諸郡州，今浙江亦或有之。三月生苗，在田野中，其莖如錢大，高二三尺。葉色青白，長一二尺，大五六寸，頗類蘘荷。五月黃花作穗，花頭微紫。根如生薑，而朮在根下，狀如雞鴨卵，大小不常。九月采，削去粗皮，蒸熟曬乾用。此物極堅硬難擣，用溫紙包裹，于灰火中煨令透，乘熱擣之，即碎如粉。今人多以醋炒、酒炒亦良。好惡並生，惡者有毒能殺人，好者無毒能攻痰。土人取之，先放羊食，不食棄之。○陳氏藏器云：一名蓬莪，黑色；二名蒁，黃色；三名波殺，味甘，有大毒也。

○蓬莪朮行氣破血，為血中氣藥也。特破血中之氣，入氣藥，發諸香，主諸氣諸血積聚，為最要之品。若心腹攻痛，痞積氣塊，而彷發無時；若胃脘作疼，牽引背脇而痛難展側；若吞酸吐酸，刺心如醋，而胸膈不清；若停食停飲，霍亂吐瀉，而驀然暴作；若奔豚疝瘕，攻注小腹而挺痛

勿安；若盤腸內釣，肚腹絞痛，而面色青黑。凡病食、飲、氣、血、痰、火停結而不運，或邪客中下二焦，藏府壅滯，陰陽乖隔，不得升降，或鬱久不通，而致損脾元者，雖為泄劑，用此頃能撥邪反正，諸疾自平。通胃行食，故本草稱為益氣健脾，良有以也。又孫氏方治氣短不能接續，以集香丸及諸湯散中多用之，使結通滯行，陰陽和平，則短抑而不接續之氣自順矣。但行氣破血，散結消滯，是其功能之所長。若婦人小兒氣血兩虛，脾胃素弱，而無積滯者，不可妄投。即有血氣凝結，飲食積滯，亦當與健脾養胃補益元氣藥同用，方無虛虛之失。

○集方治胃脘及心腹攻痛連及背脇痛不可忍用蓬莪朮二兩醋煮木香一兩牽牛初次末五錢蓖仁霜五錢共和勻每服三錢白湯調服時發者可絶根○治霍亂吐利欲死用蓬莪朮藿香滑石檳榔厚樸葱頭水煎冷服○治吞酸吐酸用蓬莪朮一兩川黃連五錢吳茱萸五錢同煮去吳茱萸水煎服○治奔豚疝瘕用蓬莪朮肉桂小茴香各等分爲末服○治盤腸内釣面目仰視用蓬莪朮硼砂鈎藤膽星石菖蒲各等分水煎服○治婦女血瘕痞塊攻作用蓬莪朮一兩乾漆五錢共爲末紅麴打稀糊丸菉豆大每早服五分○治一切飲食停滯積聚及小兒癥瘕用蓬莪朮陳皮人參砂仁京三稜

肉豆蔻青皮麥芽穀芽木香○治小兒盤腸内釣痛以蓬莪朮五錢阿魏一錢化水浸蓬莪朮過時焙乾研末每用二分紫蘇湯下

○治痢疾初起裏急後重腹痛膿血窘迫壯盛人一劑尋愈用莪朮煨一錢五分生地赤芍藥歸尾檳榔枳殼牽牛微炒搗碎黃連大黃各二錢水煎空心溫服以利爲度如見上證虛弱人不便驟行者以化積藥消之用莪朮煨一錢白芍藥黃芩黃連各一錢五分升麻八分檳榔木香當歸枳殼各一錢二分○治下痢稍久宜調和氣用莪朮煨五分當歸白芍藥桃仁川芎黃連黃芩各（一[illegible]分升麻六分水煎服人虛者加人參黃耆各二[illegible]錢小便不利加澤瀉車前子各一錢）

荆三稜味苦辛性平無毒入足厥陰足太陰經（蘇氏曰荆三稜生荆襄江淮河陝皆有之多在淺水旁或荒廢陂池濕地間春時叢生夏秋抽莖莖端復出數葉開花六七枝色黃紫作穗細碎結子如粟莖葉花實俱有三稜與莎草一樣但極長大其末光滑中有白穰剖之織物柔韌如藤本下有魁初生成塊如附子亦有區形者從旁横貫一根復連數魁或作苗葉其形長區鬚皮黃褐削去鬚皮宛如鯽狀體重者京三稜也圓小如梅輕鬆而黑者黑三稜也其根不生苗根上又生細根鈎曲如爪者雞爪三稜也大小不常其色俱黑去皮即白三者本是一種因狀賦名各遵其用非二種也又河中府有石三稜根黃白色形如釵股葉綠如蒲苗高及尺四月開花色如蓼花五六月采根根色黃白堅重如石亦能消積○江氏云今所用三稜皆淮南之紅漸根也秦州尤多其體圓堅重亦有區者不復有三稜不知何緣命名爲三稜也雖御院醫亦不辨識流習既久并訛辨矣細辨之其根形區長多黃黑鬚削去鬚皮乃如鯽狀而有後者是也）

○荆三稜破血通經爲氣中血藥也蓋血隨氣行氣聚而

○血不流則生瘀滯之患若老癖癥瘕積聚結塊產後惡血血結或食積蠱疾臌脹痞堅腸癖肚疽凡病胸腹腸胃之間急疾不通非此不治此藥苦能泄辛能散入血則破血入氣則破氣故陳氏方謂能逐產後敗惡宿血在所必需血屬陰而有形此所以治一切凝結停滯有形之堅積也潔古氏用以治心膈痛飲食不消海藏氏用以行肝經積血皆與本經之意合耳但攻剛而至烈摧拉而不辭有斬關奪將之功者也能伐人真氣元虛者忌之

繆仲淳先生曰荆三稜蓬莪朮二藥俱能瀉真氣真氣虛者勿用此見諦之言也故凡用以攻導必資人參

术歸芍之力。而後可以無弊。觀東垣氏五積方。皆有人參。意可知已。何者。蓋積聚癥瘕。必由元氣不足。不能運化流行致之。欲其消也。必藉脾胃氣旺。能漸漸消磨運化。以收平復之功。如秖一味專用尅削。則脾胃之氣愈弱。後天之氣益虧。將見故疾不去。新病復至矣。可不畏哉。

○集方（李瀕湖）治一切堅癥老癖積聚。用京三稜。蓬莪朮。木香附。玄胡索。肉桂。牡蠣。人參。○（金鏡方）治嗽脹。用荊三稜。白朮。砂仁。少加川黃連。○（[illegible]）治蟲痰腹脹如鼓。內有蟲者。用荊三稜。烏梅肉。川椒各五錢。共爲細末。巴豆肉去油六分。和勻。梧子大。每早空心服一錢。白湯下。○（[illegible]氏方）治肚內癥瘕膿已成難出者。用荊三稜。穿山甲。紅蜀葵根。各等分。爲末。每早服二錢。生酒下。○（[illegible]方）治產後一切惡血停滯。及月水不通少腹作痛。用荊三稜。紅花。當歸尾。川芎。赤芍藥。肉桂。牛膝。玄胡索。五靈脂。○（[illegible]方）治一切食積。并氣壅塞不利。用荊三稜。陳皮。青皮。砂仁。紅麴。麥芽。肉荳蔻。山查。川黃連。○（[illegible]方）治乳汁不下。用荊三稜三箇。切片。水二碗。煎汁一碗。洗奶。取汗出爲度。極效。○（[illegible]方）治反胃惡心。藥食不下。荊三稜炮。一兩。母丁香三分。共爲末。每服一錢。白湯調下。

芎藭　味辛苦。性溫平。無毒。少陽引經藥。入手足厥陰氣分。（李時珍先生曰。芎藭。蘼蕪根也。此藥上行。專治頭腦諸疾。故名芎藭。出川中者爲勝。出胡戎者曰北芎。關中者爲西芎。蜀中者爲川芎。天台者爲台芎。江右者爲撫芎。皆因地而名也。○蘇氏曰。蜀地少寒。人多栽蒔。深秋莖葉亦不萎也。清明後宿根生苗。所分其枝。橫埋土中。則節節作根生苗也。四月生葉。似水芹。微窄有叉。又似芹而細。亦似胡荽而壯。叉一種葉細似蛇床者。藝非俱香。莖細節大。截茉叢翠。五月采葉作飲。夜香美。大七月開碎白花。如蛇床子花。八月後根下結芎藭。園圃種蒔者。根形塊大實而多脂。山生者細瘦。辛苦。十川采根非時則虛惡不堪用。關中出者。形塊重實。形如雀腦。蜀中出者。塊大色白。不油。嚼之味辛而香也。楚人謂蕭人但有麥麴乎。有芎藭乎。河魚腹疾奈何。二物皆能治水濕。故以禦之。月家治大鬱。瘀滯疏通。用此爲首品。）

○芎藭。上行頭目。下調經水。中開鬱結。血中氣藥也。嘗爲（[illegible]）當歸所使。非第治血有功。而治氣亦神驗也。凡散寒濕去風氣。明目疾。解頭風。除脇痛。養胎前。益產後。又癥瘕結聚。血閉不行。痛痒瘡瘍。癰疽寒熱。腳弱痿痺。腫痛却步。並能治之。味辛性陽。氣善走竄。而無陰凝黏滯之態。雖入血分。又能去一切風。調一切氣。凡鬱病在中焦者。須用川芎。開提其氣以升之。氣升則鬱自降也。凡血痢已通而痛不止者。乃血虛氣滯。須加川芎。則使氣行血調。其痛立止也。故同蘇葉。可以散風寒於表分。同耆术可以溫中氣而通行肝脾。同歸芍。可以生血脈而貫通營陰。若產科。眼科。瘡瘇科。此爲要藥。凡病人上盛下虛。虛火炎上。咳嗽痰喘。自汗盜汗。咽乾口燥。發熱作渴。內熱生煩。陰極發躁。中氣短怯。並禁用之。

陳廷采先生曰。安川芎。本草言不宜單服久服。單服久

服則走散眞氣令人暴亡無乃因其氣味辛溫發散之故歟前古醫工每於四物湯中用川芎十僅存一亦鑒此戒奈何鄉落愚民罔明藥性特采土芎烹茶自謂香美可以氣散稍有僥倖無虞儌滯虛羸鮮不蒙其禍者戒之愼之司業者無忽也

盧子由先生曰川芎古名芎藭穹高也藭究竟也言主治作用也故主風中頭腦或腦痛或頭腦俱痛此風氣通于肝亦即春氣者病在頭也力能直達肝用從踵徹巔一鼓而邪自退矣

○集方婦人氣厥頭痛及産後頭痛用川芎烏藥各等分爲末每服二錢茶調下○風熱頭痛用川芎黃芩各等分爲末每服二錢白湯下○經水三月不行驗胎法用川芎當歸蘄艾各二錢水煎服微動者是胎不動者非也○治酒癖脇脹不時嘔吐腹有水聲用川芎三稜俱酒炒各一兩爲末每服二錢白湯調下○小兒腦熱好閉目或太陽痛或目赤腫用川芎薄荷葉玄明粉各二錢以少許吹入鼻內○齒敗口臭川芎煎濃汁含之○牙齒腫痛用大川芎一箇陳糟內藏一月取焙入細辛同研爲末擦痛處○諸瘡腫痛用川芎五錢爲末入輕粉五分麻油調搽○治血瘕疼痛用川芎當歸乾漆玄胡索五靈脂白芍藥三稜牡蠣粉各等分爲丸每服三錢○治血虛頭痛用川芎甘菊花當歸白芍藥熟地黃各二錢水煎服火盛者加童便○治子死腹中用川芎當歸尾肉桂牛膝各三錢爲末服○血崩久不止用川芎續斷懷熟地鹿角膠杜仲山茱萸五味子人參黃耆酸棗仁各等分爲丸每服三錢

蘼蕪味辛氣香性溫無毒入手少陰足少陽厥陰經

（陳氏曰此芎藭苗也其莖葉靡弱繁蕪故名生雍州川澤及冤句今出歷陽處處多種之五月苗葉最茂蕃蕪苗未結根時則爲蘼蕪既結根後乃爲芎藭大葉似芹者爲江籬細葉似蛇床者爲蘼蕪亂人者若芎藭之與槀本蛇床之與蘼蕪亦皆細葉者相類而言也又言蘼蕪香草可藏衣中）

○蘼蕪主頭風風眩之藥也此藥氣味芳香淸潔故去風散濕本草所稱上欬逆定驚氣除蠱毒消鬼疰作飲止泄瀉皆辛香發越攄遏不正之氣歟

盧不遠先生曰蘼蕪辛溫虛達得春陽之氣通甲膽之精輔神明之用者也

冊 續修四庫全書 第8 版正內

當歸。味苦辛甘。性溫。無毒。入手少陰、足太陰厥陰經血分之藥也。

（別錄曰當歸生隴西川蜀山谷人多栽蒔爲貨及江寧滁州亦有之以蜀中者爲勝春生苗葉有三瓣七八月開花似蒔蘿花淺紫色根黑黃色以肉厚而不枯者爲勝二八月采根○李氏曰出當州宕州翼州松州秦州汶州以宕州者最勝有二種一種似大葉芎藭者名馬尾歸今人多用一種似細葉芎藭者名鑱頭歸乃溧陽出者不堪用按本草諸書以秦歸頭圓尾多色紫氣香肥潤者名馬尾歸最勝他處者頭大尾粗色白堅枯者爲鑱頭歸止宜入發散藥韓氏言川產者力剛而善攻秦產者力柔而善補是矣又江浙出一種土當歸氣芳香頭大尾少而短性堅硬肉色白即鑱頭歸之類○又頭尾功效各異凡物之根身半已上氣脈上行法乎天身半已下氣脈下行法乎地人身法象天地則治上當用頭治中當用身治下當用尾通治則全用乃一定之理也。）

○當歸。生血養血。止血活血之藥也。（[illegible]）若吐血、衄血、淋血、便（[illegible]）血或經漏失血。或產崩損血。皆血走也。必用歸頭以止之。如陰虛不足。精神困倦。或驚悸怔忡。健忘恍惚。皆血少也。必用歸身以補之。如瘡瘍目痛。癰疽腫毒。或跌撲損傷。或經閉淋瀝。皆血聚也。必用歸梢以破之。如筋骨牽强。遍身疼痛。皆血滯也。必用歸頭身梢全用以活之。蓋心主血。脾統血。肝藏血。歸爲血藥。故專入足三陰血藏。能引諸血各歸其所當歸之處。故名當歸。如產後氣血昏亂。倉卒之際。服之即定。能使氣血歸還也。又脉者。血之府也。諸血皆屬心。凡通脉者。必先補心。補心必先益血。故仲景治手足厥寒。脉細欲絶。雖用參附薑桂。必用當歸領之。即通脉歸旋之意也。又諸病夜甚者。血病也。宜用之。諸病虛冷者。陽無所附也。宜用之。又按本經主欬逆上氣。溫瘧寒熱洗洗在皮膚中。議者以當歸血藥。如何治欬逆上氣與溫瘧寒熱也。殊不知當歸非獨主血。按其味甘苦兼辛。辛中常有發散之意。乃血中氣藥也。況欬逆上氣。非止一端。亦有陰虛陽無所附。以致然者。用血藥補陰。則血和而氣降矣。何欬逆之不可已乎。溫瘧寒熱。不在皮膚外。肌肉內。而洗洗在皮膚中。觀夫皮膚之中。營氣之所會也。溫瘧延久。營氣中虛。寒熱交爭。汗出洗洗。用血藥養營。則營和而與衛調矣。營衛調和。何溫瘧之不可止乎。然性味溫辛。雖能補血養營。終是潤滑之體。大凡脾胃不實。泄瀉溏薄。與夫風寒未清。惡寒發熱。表證外見者。並禁用之。即在胎前產後。亦不得槩投。

沈則施先生曰。歸芍同用。可以養血而歛血。歸芎同用。可以養血而補血。歸术同用。可以療血而生血。或者用之凉血。非配生地芩連不能凉。用之止血。非配地榆烏梅薑炭不能止。用之破血。非配莪朮桃仁不能破。用之清血。非配蒲黃山梔不能清。

○集方　治婦人血分百病。（[illegible]）用當歸、川芎、白芍、地黃。名四物湯。治婦人產後百病。本湯加炮薑、炮黑豆、澤蘭、牛膝、益母草、蒲黃、玄胡索、香附。○治瘧在陰分。發久不止。（[illegible]）四物湯加牛膝、鼈甲、陳皮、生薑、白术、常山。○治心血虛不得（[illegible]）

眠。四物湯加酸棗仁、遠志肉、人參、茯苓。○治陰虛盜汗，四物湯加知母、黃耆。○治產難及橫生，四物湯加人參、益母葉，立安。○治產後血上沖心，四物湯加益母葉、紅花、蒲黃、牛膝、玄胡索、炮薑。○治婦人血閉無子，四物湯加鹿角膠、川續斷、杜仲、白芷、細辛。○婦人臍下氣脹，月經不利，血氣上攻，嘔不得眠，[illegible]物湯加乾漆各等分，為丸，每早服二十丸，溫酒下。○室女經閉，四物湯加真沒藥各一錢五分，為丸，溫酒下。○墮胎下血不止，用當歸一兩，葱頭二箇，酒煎服。○婦人胎動不安，或子死腹中，口禁欲死，用當歸二兩，川芎一兩，炒焦黑豆一兩，童便酒煎。○產後血脹，腹痛引脇，用當歸、炮薑各等分，為末，

每服三錢，白湯調服。○產後腹痛如絞，當歸末五錢，白蜜一合，水煎服。○產後中風，不省人事，口吐涎沫，手足瘛瘲，製附子、當歸、荊芥各五錢，煎服即甦。○頭痛如裂，用當歸二兩，水煎服。○血虛發熱，煩渴引飲，目赤面紅，其脈洪大而虛，重按無力，此血虛故也。得于饑困勞役，證象白虎，但脈洪大不長實為異，誤服白虎必死。用當歸身一兩，黃耆二兩，水煎頻頻服。○凡傷胎去血，產後去血，崩中去血，金瘡去血，拔牙去血，一切去血過多，心煩眩暈，悶絕不省人事，用當歸二兩，川芎一兩，水煎服。○肉虛人目暗不明，用當歸六兩，製附子一兩，煉蜜為丸梧桐子大，每服三十丸，溫酒下。○手臂疼痛，用薑黃二兩，酒炒當歸三兩，浸酒服。○治一切癰疽疔腫，不問陰陽虛實善惡，腫潰，太痛或不痛，然當服於未潰之先，與初潰之時。如毒已大潰，不宜服。初用此劑，大勢已退，然後隨證調理，其功甚捷。用當歸、乳香、沒藥、土貝母、甘草節、白芷、花粉、赤芍藥各一錢，防風、陳皮、皂角刺各一錢五分，金銀花三錢，穿山甲三大片，切碎，炒黃色，用好酒、清水各一碗，煎至一碗，隨病上下，以分饑飽服。能飲酒者，服藥後，再飲二三五杯，側臥片時，覺痛定回生。

治氣

渴飲（芍藥一片）

茅香

味苦，性溫，無毒。入足陽明、太陰經。

（李時珍先生曰：茅香生劍南福州道諸處，今陝西河東汴東州郡亦有，遂澤州充貢。三月生苗，似大麥，其莖葉綠色，五月開花，色白，亦有黃花者，有結實者，有無實者。並正月、二月采根，五月采花，八月采苗，日乾，其莖黑褐色，氣甚芬香，花葉一用，治風。一說茅香凡有二，此是一種香茅，地非南香；一種香名白茅香，與此各類。）

○茅香，溫胃祛寒之藥也。止嘔吐，療心腹之冷痛，而奔豚疾疝可醫；却瘴癘，去皮膚之風，而煮湯作浴必用。乃辟邪去穢之良品也。今時方湯液中，鮮有用者，入香料，每必需之。但氣香性熱，凡陰虛血熱，咳嗽與胃熱作嘔之證，不可用此。

白芍藥。味酸。性寒。無毒。可升可降。入手足太陰厥陰經。乃肝脾血分藥也。（李時珍先生曰。芍藥猶婥約也。婥約美好貌。此草花容婥約。故名。鄭風詩云。伊其相謔。贈之以芍藥。出中嶽川谷丘陵處處有之。出白山蔣山茅山者最好。今紹興金華亦有。昔稱洛陽牡丹廣陵芍藥甲于天下。今藥中惟取廣陵者為勝。十月生芽至春乃長莖至二三尺許三枝五葉花葉子實酷似牡丹名有三十餘件弟發芽在牡丹之前作花在牡丹之後夏初開花有紅白紫數種又有單瓣千瓣樓子之別白者名金芍藥赤者為木芍藥。入藥只取白花單瓣之根氣味全厚然根之赤白亦隨花之赤白也修用先別赤白白根固白赤根亦白每根切取一片各以法記燒酒潤之蒸過一宿白根固白赤根轉赤矣各以竹刀刮去皮用今市肆一種赤芍藥不知何物草根瘍科多用消腫毒大多不察其為害也殊甚又白芍藥老根年久色赤市人偽充赤芍藥亦非。○倪朱謨曰。本經言赤白芍藥。生山谷丘陵。後世多用人家種植者。乃欲其花葉肥大。必加糞壤。每歲八九月取根分種。今浙甯鎮陽尤多。根雖肥大而香味不佳入藥少效。）

○白芍藥。扶陽收陰。益氣斂血之藥也。酸能入肝。而苦寒亦能養木。酸能斂血。而氣寒尤能生血。然安血室。止崩漏。和營衛。斂虛汗。發痘疹。解毒痢。治胎產。止腹痛。其效甚捷。故同甘草。止氣虛腹痛。同芎歸。止血虛腹痛。同查樸。止積滯腹痛。同砂仁。止胎孕腹痛。同芩連。止熱痢腹痛。同薑附肉桂。止陰寒腹痛。同防風。發痘疹于已出未出之際。同薑棗。散風寒于表熱裏虛之時。又同白朮。補脾。同川芎。補肝。同參耆。補氣。同歸地。補血。同木香。行中有止。同冰黃。藏中有發。或問今人以酸澀為收。何以白芍藥能發邪氣。此藥春苗直上。挺透不屈。氣雖酸澀。用于發散藥中。又能助汗泄邪。取其斂而復伸。蓄而復逼之意。據本經主邪氣腹痛。除血痺。破堅積寒熱疝瘕。止疼。卽已世稱氣味酸斂。唯堪降入。此不識臭味。不顧名實矣。故仲景治傷寒多用白芍藥。以其退寒熱。利小便也。有謂產後不可用者。以酸寒伐生發之氣。無溫散之功。此說實齊東野人語也。況產後寒藥不避大黃。熱藥不避桂附。補澀藥不避歸地。流通藥不避烏藥木香。何畏白芍藥之酸收耶。況能安血室。和營衛。豈產後有不可用之理乎。知幾之士。當自得之。毋為耳食也。

繆仲淳先生曰。白芍藥養陰。凡中寒腹痛。中寒作泄。腹中冷痛。腸胃中覺冷。諸證忌之。赤芍藥破血。凡一切血虛病。及泄瀉。產後惡露已行。少腹痛已止。癰疽已潰。諸

證忌之。

沈則施先生曰。赤白二芍藥。主治略同。而白補赤瀉。白收赤散。白芍藥益脾。能于土中瀉木。赤芍藥散邪。能行血中之滯。二者稍有不同耳。

沈起愚先生曰。白芍藥斂虛汗。發邪汗。與黃耆白朮同性。會心者得之。

○集方。治血室不調。轉生百病。用白芍藥。歸身。地黃。川芎。四物湯。○治血崩漏下。用白芍藥。川黃柏。人參。蒲黃灰。○治虛汗頻出不止。用白芍藥。北五味。黃耆。人參。白朮。○治痘瘡不起發。用白芍藥。防風。牛蒡子。荊芥。○治痘瘡血虛發癢。用白芍藥。白芷。甘草。○治痘瘡熱甚作瀉。用

白芍藥。川黃連。甘草。○治瘧痢虛寒作瀉，用白芍藥酒炒。甘草。白朮土炒。肉桂。附子童便製。肉荳蔻。○治下痢不拘赤白，初起用白芍藥。川黃連。枳殼。甘草。青皮。木香。大黃。當歸。○治久痢，用白芍藥酒炒，於白朮土炒。木香。川黃連。升麻。人參。稨豆。○治腸風下血，用白芍藥。防風。荆芥。生地黃。蒼朮。○治產後血虛發熱，用白芍藥。熟地。牛膝。黃芪。麥門冬。川續斷。北五味。○治產後惡露不下，用白芍藥。牛膝。歸尾。玄胡索。澤蘭。紅花。五靈脂。

○治時行赤白痢疾，腸胃中有風熱邪毒，發熱不退，及時行瘟疫，沿門闔境皆下痢禁口者，服之神效。用白芍藥、羌活、柴胡、川芎、枳殼、桔梗、茯苓、薄荷、人參各一錢二分，甘草六分，黃連一錢五分，陳倉米三百粒，水煎服。○治童男室女身發潮熱，咳嗽吐痰，夜出盜汗，飲食少進，四肢無力，漸至消瘦，用烏雞丸。用白芍藥、茯苓、生地黃、當歸、黃耆、人參、白朮、黃芪、知母、川貝母、地骨皮、秦艽、沙參、銀柴胡、黃芩各二兩，俱用酒拌炒。天門冬、麥門冬俱去心各四兩，酒煮搗膏。前十四味俱研爲細末，配入二冬膏，煉蜜和爲丸，梧桐子大。每早晚各食前服三四錢，白湯送下。

赤芍藥。味酸苦，性寒，無毒。陰也，降也。爲手足太陰行經藥，入肝脾血分。

（王少峯先生曰：其生成出產未詳。客云與赤芍藥出並非形色未詳。）

○赤芍藥，瀉肝火，消積血，散瘀瘍之藥也。凡目痛赤腫，血脈纏睛，癰瘍腫潰，瘡疹痛癢，或婦人癥瘕腹痛，月經阻滯，或痢疾瘀積，紅紫不淸，均可用之。或云能行血中之滯，止痛不減當歸，原其氣性酸寒，疎肝通滯，解毒氣，散鬱火于血分也。

○治一切癰疽腫毒，用赤芍藥。乳香。沒藥。貝母。甘草。白芷。花粉。當歸尾。防風。紫花地丁。金銀花。皂角刺。穿山甲火煅。各二錢，共爲末，酒調服。○赤眼腫痛，用赤芍藥。柴胡。龍膽草。連翹。防風。荆芥。甘草。○治婦人癥瘕塊痛，用赤芍藥。玄胡索。木香。乾漆。莪朮。五靈脂。肉桂。○治經阻腹痛，并惡露不行，用赤芍藥。當歸尾。玄胡索。青皮。五靈脂。肉桂。紅花。○治赤血毒痢，疼痛不通，用赤芍藥。當歸尾。木香。大黃酒炒。枳殼。○治脚氣腫痛，用赤芍藥。木瓜。蒼朮。○治小便五淋，用赤芍藥。川牛膝。○治木舌腫滿塞口殺人，用赤芍藥。甘草。蒲黃各等分，煎水熱漱。

牡丹皮。味辛香。性溫平。無毒。入手足厥陰。手足少陽。手足少陰經。

（按本草別錄、蘇頌：牡丹出巴郡及漢中、劍南，今丹、延、青、越、滁、和、宣、亳州。其莖梗枯燥，黃白色，長五七寸，大如筆管。二月生苗，葉似芍藥。三月開花，有紅、黃、紫、白數色。狀善變，花雜正，五六瓦。五月結子，黑色，如雞豆大。此山牡丹也。大都丹、延以西及褒斜道中尤多，與荊棘無異，土人皆取以為薪。若劍南及合部、宣州諸處，其花千頁起樓，肉白皮丹，其莖梗柔料，秋質絲苓實節，上人謂之百兩金，長安謂之吳牡丹也。今作用者具于此，苗有脈氣血。宗奭曰：牡丹雖有紅、黃、白、紫數種，入藥惟取山中單瓣花紅者，取根皮用。若人家種植，色豔雖俱目娛，不堪入藥。專精于花色者，則力不足于根皮矣。今市人以他木根皮充之，大叢。閩中生一種牡丹，花夜開晝斂，其根長尺許，皮軟嫩，色紫白，入藥亦可用。○凡栽牡丹花，根下着白蘞末可辟蟲，穴中着硫黃末可殺蠹，以烏賊魚骨鍼之，其葉必枯。此物性，人不可不知也。○沈起思先生曰：此花雖結子，而苗乃附根而生，故曰牡；其花色赤，故曰丹。）

○牡丹皮，清心，養腎，和肝，利包絡，并治四經血分伏火。血中氣藥也。善治女人經脈不通，及產後惡血不止。又治衄血、吐血、崩漏、淋血、跌撲瘀血，凡一切血氣為病，統能治之。蓋其氣香，香可以調氣而行血；其味苦，苦可以下氣而止血；其性涼，涼可以和血而生血；其味又辛，辛可以推陳血，而致新血也。故甄權方治女人血因熱而將枯，腰脊疼痛，夜熱煩渴，用四物重加牡丹皮最驗。又古方用此以治相火攻衝，陰虛發熱。且地骨皮治有汗骨蒸，為腎與三焦用也。牡丹皮治無汗骨蒸，為腎與心包絡用也。故腎氣丸用之，稱善。此為血中氣藥，調血則氣自和，調氣則血自安者矣。又按本經，主寒熱中風，瘈瘲、驚癇邪氣諸疾，總屬血分為眚。然寒熱中風，此指傷寒熱入血室之中風，非指老人氣虛痰厥之中風也。其文先之以寒熱二字，繼之以瘈瘲驚癇，可知已。況瘈瘲驚癇正血得熱而變現。寒熱又屬少陽所主者也。○牡丹皮本入血分，涼血熱之要藥。然能行血，是其專職，雖有和血、生血、調血之功，必兼大滋養藥乃可。凡婦人血崩及經行過期不淨，並忌，與行血藥同用。

張潔古先生曰：葉為陽，發生也；花為陰，成實也；丹者赤色，屬火也。故能瀉陰胞之火。四物湯加之，治婦人骨蒸。然須與青蒿子、天麥門冬、沙參、地黃、牛膝、龜膠、枸杞、知母之屬，始得其力。

繆仲淳先生曰：神不足者手少陰也，志不足者足少陰也。故腎氣丸用之，治神志之不足。究竟牡丹皮為心經正藥，心主血，涼血則心不熱而陰氣得寧。用之腎經藥中者，陰陽之精互藏其宅，神志水火藏于心腎，即身中坎離也。交則陰陽和而百病不生，不交則陰陽否而精神離矣。欲求弗夭，其可得乎。

沈拜可先生曰：按深師方，用牡丹皮同當歸、熟地，則補血；同莪朮、桃仁，則破血；同生地、芩、連，則涼血；同肉桂、炮薑，則暖血；同川芎、白芍藥，則調血；同牛膝、紅花，則活血；同枸杞、阿膠，則生血；同香附、牛膝、歸、芎，又能調氣而和血。若夫陰中之火，非配知母、白芍藥不能去；產後諸疾，

非配歸芎、益母不能行、又欲順氣疎肝、和以青皮柴胡、達痰開鬱。和以貝母半夏。若用于瘍科、排膿托毒。凉血之際、必協乳香沒藥。白芷羌活、連翹。金銀花輩。乃有濟也。善治者、引用在乎臨證通變而已。

○集方治便毒。生于兩腿合縫之間。用牡丹皮歸尾金銀花天花粉白芷赤芍藥各一錢、僵蠶芒硝各二錢穿山甲三大片。火燒大黃三錢。木鼈子五個。右剉一劑。好酒二碗。煎滚空心服。渣再煎隨服。厚被蓋出汗。利一二次即消。

○治懸癰生於穀道之前、小便之後、初發其狀如松子、一月赤腫如桃。遲治則破。而大小便皆從此出、不可治矣。先服國老湯不消、再服將軍散。用牡丹皮大黃貝母白芷甘草滑石各五錢、共爲細末。酒調服二錢、空心吃。

白芷味辛苦、氣溫無毒。氣味俱輕、陽也。爲手陽明引經藥。（別錄曰生河東川谷今仁和筧橋亦種蒔矣春生苗葉葉對生花白微黃入伏後結子葉乾辛芳而合香料立秋後苗枯根長尺餘粗細不等。黃澤者爲佳四條并生者名澤公蓋勿用八月采曝乾去皮用近時用石灰拌蒸曬收藏不蛀并欲色白不特失其本性而燥烈之性愈深瘡家瘍家用之無益也）

○白芷上行頭目、下抵腸胃、中達肢體、遍通肌膚、以至毛竅、而利泄邪氣。如頭風頭痛、目眩目昏、如四肢麻痛、脚弱痿痺、如瘡潰糜爛、排膿長肉、如兩目作障、痛痒赤濇、如女人血閉、陰腫漏帶、如小兒痘瘡、行漿作痒、白芷皆能治之。但色白味辛、其氣芳香、能通九竅、入手足陽明手太陰三經、專發陽明表邪、爲汗不可缺。此其所主之病、皆三經之證也。如頭目昏眩之證、三經之風寒也。眉

面口齒之證、三經之風熱也。漏帶瘡瘍之證、三經之風濕也。白芷具春升發陳之令、滋蕃生物。風可以散、寒可以祛、濕可以燥、熱可以清、備治四邪、標本兼宜者也。○諸性味辛散、如頭痛麻痺、眼目漏帶、癰瘍諸證、不因于風濕寒邪、而因于陽虛氣弱者、陰虛火熾者、俱禁用之。方龍潭先生曰、白芷辛溫發散、得紫蘇乾葛、可以解表閉寒邪。得防風荆芥、可以祛皮膚風疾。得羌活川芎、可以上行頭目。得天麻殭蠶、可以追逐面風。得山梔黃芩、可以清風熱于肌表。得獨活蒼术、可以燥風濕于四肢。得黃芩黃連、可以清濕于腸胃。得白微白术、可以除白帶于經年。至若陽明引經、無升麻乾葛不能行。腸風泄

瀉，無防風白术不能止。

○集方：治頭風頭痛，侵目淚出，用白芷、甘菊、細辛、荊芥、羌活。○治老人血虛痰眩，頭風淚出，用白芷、天麻、膽星、半夏、當歸、熟地、枸杞子。○治四肢痿痺，麻木不仁，用白芷、黃芪、白术、羌活、牛膝。○治癰疽未潰，排膿止痛，用白芷、連翹、乳香、没藥、歸尾、甘草、貝母、赤芍藥、穿山甲、皂角刺、金銀花。○治癰疽已潰，膿水清稀，胃弱不食，用白芷、人參、黃耆、肉桂、白术、木香、砂仁。○治乳癰結核，用白芷、乳香、没藥、瓜蔞、蒲公英、歸尾。○治暴赤時眼，腫脹痛痒，用白芷、乾菊、防風、荊芥、赤芍、柴胡、龍膽草、連翹、草決明。○治女人血閉，陰腫，寒熱帶下，用白芷、黃耆、當歸、生地、續斷、香附、牛膝、丹皮。○治瘡疹作痛作痒，用白芷、白芍、防風、甘草，隨證加入。○治十八種風邪，用白芷、羌活、防風、菊花、胡麻仁、何首烏、蘄蛇。○治牙痛，用白芷、吳茱萸二味浸湯漱涎。○治婦人難産，用白芷五錢，水煎服，立産。○蝕膿方：用白芷一兩，單葉紅蜀葵根二兩，枯白礬五錢，俱爲細末，黃蠟鎔化，入麻油少許，和藥爲丸，梧桐子大，空心服十五丸，俟膿盡，再以他藥隨證補之。○治毒蛇惡蝮傷人，即昏死，傷處腫大如股，少頃遍身皮脹，黃黑色，用白芷八兩，新水調灌，覺臍中搰搰然，口出黃水，腥穢逆人，良久消縮，仍以末搽患處。一人蛇咬腿足，腐敗見白筋，水洗淨，揩乾，以白芷四兩，膽礬末一錢，麝香少許，研勻，摻之，惡水滴出，一月平復。

山柰。味辛甘，性溫，無毒。入足陽明、太陰、厥陰經。（李時珍先生曰：山柰出廣中，人家亦多種蒔，根葉如薑，作樟木氣。土人食其根，如食薑，切斷暴乾，皮赤肉白。古之所謂廉薑，恐其類也。酉陽雜俎云：柰祇出佛林國，長三四尺，根大如鴨卵，葉長似蒜，叢中心抽莖甚長，莖端開花，六出，色紅白，心赤黃，不結子，其草冬生夏死。取花壓油塗身，去風氣。按此說頗似山柰，故附之。）

○山柰，暖中氣，辟寒癘之藥也。辛溫而香，去寒暖胃。凡入山行，宜常佩之，除瘴癘惡氣。治心腹冷病，寒濕霍亂，停食不化，一切寒中諸證，用此宣散中黃之生氣，袪除瘴癘之死氣耳。

○集方：治心腹冷痛，用山柰、丁香、當歸、甘草等分，爲末，醋糊丸梧子大，每服五十丸，酒下。○治一切牙痛，用山柰一錢，麪包煨熟，入麝香一字，共爲末，隨左右喻少許入鼻内，口含溫滾水，漱去，立效。○治面上雀斑，用山柰、蜜陀僧、鷹糞、蓖麻子肉等分，研勻，以乳汁調之，夜塗，旦洗去。○醒頭去垢，用山柰、甘松、零陵香各一錢，樟腦五分，滑石五錢，共爲末，夜擦頭，旦篦去，立淨。

藁本。味辛苦。氣溫。無毒。氣厚味薄。升也。陽也。足太陽本經藥。

（別錄曰。藁本生崑西川。及河東兗州杭州江南山谷中。苗葉皆似白芷。又似芎藭而稍細。五月開白花。七八月結子。根色紫。苗下根上似禾藁。故名藁本。春月采根晒乾用。今香料中多用。近來市中以芎藭根鬚僞充。其形狀氣味相似也。細究其莖葉。但芎藭似水芹葉。而大藁本似芎葉。而葉少細弱。出古州者雄。）

○藁本。升陽而發散風濕。上通巔頂。下達腸胃之藥也。其氣辛香雄烈。能清上焦之邪。辟霧露之氣。故治風頭痛。寒氣犯腦以連齒痛。又能利下焦之濕。消陰瘴之氣。故兼治婦人陰中作痛。腹中急疾。疝瘕淋帶。及老人風客于胃。久利不止。大抵辛溫升散。袪風寒濕氣于巨陽之經爲尚功。若利下焦寒濕之證。必兼下行之藥爲善。凡

陽病頭痛發熱。口渴者。產後頭痛。血虛火炎者。傷寒濕邪發于春夏者。皆不宜服。

李瀕湖先生曰。藁本乃太陽經風藥。一人病泄。腎以虛治不効。一醫云。風客于胃也。飲以藁本湯而止。蓋藁本能去風濕故耳。

沈則施先生曰。按廣濟方。治寒邪鬱于足太陽經頭痛。及巔頂痛。用藁本川芎細辛葱頭。○治霧露清邪中于上焦。用藁本木香。○治小兒疥癬不愈。用藁本煎湯浴之。并以浣衣。○治大人小兒乾白頭屑。用藁本白芷等分爲末。夜擦旦梳。垢自去也。○治

各二錢。共微　爲末　酒調下

蛇床子。味苦。性熱。無毒。乃右腎與命門。手少陽。足厥陰。四經氣分藥也。補足少陰之虛。去足少陰之濕。疏足厥陰之滯。扶命門之衰。

（別錄曰。生臨淄川谷及田野墟落間。三月生苗。高二三尺。葉似蘼蕪。枝上有花頭百餘。同結一窠。四月開花白色。結子攢簇。兩片合成。似蒔蘿子。亦有細稜。凡花實似蛇床者。當歸芎藭水芹藁本胡蘿之類也。）

○蛇床子。壯陽助陰。益命門之藥也。暖子藏。壯陰器。于融和厚丹田。壯陽元而久健。其氣味香溫而燥。逐冷痺。利關節。止腰痛。健四肢。頑軟疼痛。除婦人冷帶黃白。及陰瘙濕痒。陰中腫痛等疾。凡經久一切虛寒濕閉。氣滯陰霾之病。厥陰隱僻之疴。此藥鼓舞生陽。宣導寒道。不獨補助男子。且能有益婦人。世人捨此而覓補藥于他品。

豈非棄和璞而碔砆是求乎。然醫家有火下部有熱者。勿用也。

○集方。治男子陽道不起。用蛇床子。五味子。兔絲子。枸杞子。冬青子。各等分和勻。用黑豆煮濃汁拌五子。日曬乾。再拌再曬。以五次爲度。微炒燥。磨爲末。煉蜜丸梧桐子大。每早服三錢。酒送下。○治婦人子宮寒冷。用蛇床子爲末。水和爲丸。如棗核大。綿裹納陰戶中。自然溫也。并服前五子丸尤善。○治產後陰脫。用蛇床子蒸熱。盛以絹袋。乘熱熨之。又以蛇床子五兩。用烏梅十四箇。煎湯日洗五六次。洗方并治婦人陰痛。○治小兒頭瘡頭面耳邊連引。流水。極癢。久不愈者。用蛇床子一兩。輕粉三

錢。共爲細末，油調搽之。○治耳內濕瘡，用蛇床子二錢、川黃連一錢、輕粉五分，爲末吹之。○治冬月喉痹腫痛，不可下藥者，用蛇床子燒烟于瓶中，口含瓶嘴吸烟。

甘松香。味甘，性溫，無毒。入足太陰、陽明經。（李時珍先生曰：産于川西松州，其味甘香，故名。廣志云：出姑臧、涼州諸山，今黔蜀州郡及遼州亦有。葉細如茅，引蔓叢生，根極繁密，八月采根，作湯沐浴，令人身香，用合諸香，可以薰衣。）

○甘松醒脾暢胃之藥也。開寶方主心腹卒痛，散滿下氣，皆取溫香行散之意。其氣芳香，入脾胃藥中，大有扶脾順氣、開胃消食之功。入八珍散、三合粉中，治老人脾虛不食，久瀉虛脫，溫而不熱，香而不燥，甘而不滯，至和至美，脾之陽分用藥也。與山奈合川芎治

香薷。味辛甘，性溫，無毒。可升可降，陽也。入足陽明、太陰，手少陰經。（寇氏曰：香薷生山野間，荊湖南北、二川皆有之。中州人作圃，三月種之，稱月可作蔬食。四月生苗，葉似茵陳穗，似荊芥花，似水蘇，其莖方，其葉尖，有鋸，似黃荊葉而小。九月開花，花色紫，作穗，凡四五十房爲一穗，香氣清烈可愛。丹溪氏惟取大葉者，又有細子細葉者，僅高數寸，葉如落帚，蔓延生，臨水附岸，芬芳更甚，即石香菜也。九月開花著穗時采之，更佳。凡修治去根留葉，剉曬乾，勿令犯火氣。）

○香薷和脾治水之聖藥也。主山嵐瘴癘，寒熱蠱毒，脚氣血氣，水腫濕熱等證。又傷暑用之即消，蓄水霍亂用之即定，煩躁水腫用之即行小便。其辛溫利水，有徹上徹下之効；甘溫和脾，有撥濁回清之功。所以肺得之，則清氣化行而蘊熱自下；脾得之，則濁氣不干而水道流行也。世醫治暑病，以香薷飲爲首藥。凡暑月乘凉飲冷，致陽氣爲陰邪所遏，遂病頭疼發熱，惡寒煩躁，口渴，或吐或瀉，或霍亂者，宜用此藥以發越陽氣，散寒和脾可也。若飲食失節，饑飽傷脾之人，或大暑行途，赤日負重之人，或勞傷氣力，房帷斵喪之人，如傷暑邪，大熱大渴，汗泄如雨，煩躁喘促，或吐或瀉者，乃內傷勞倦發熱之證，必用清暑益氣湯、人參白虎湯、桂苓甘露飲之類，以清火益元可也。然中熱不吐瀉者，宜人參白虎湯；吐瀉者，亦宜桂苓甘露飲。若用香薷之藥，是重虛其表而又濟之以熱，大謬矣。蓋香薷乃夏月解表之藥，表無所感而中熱爲病，何假于此哉？誤用則損伐表氣，戒之。令人但

如暑月宜用香薷飲，不問有病無病，在表在裏，或虛或實，或陰或陽，槩用此飲，謂能辟暑，互相傳服，殊非無病者能免，而氣虛有他病者，蒙害多有不覺，且其性溫，若湯熱飲，反至吐逆，苟明此理，則香薷可用不可用，無惑也。

孫行甫先生曰：暑與熱同義，而異名。中暑即中熱也。何分之有？歷代醫家乃有中暑中熱之分，吾不知其所謂。假如道中行人，酷日趲程，野中農夫，暄天勞力，津竭汗盡，咽喉如燒，饑未得食，渴未得飲，勞未得息，卒然昏冒，不省人事，身體發熱，名爲中熱，雖謂之中暑，亦可也。至于素享富貴之人，其性不耐寒暄，每至暑月，即池亭水閣以安其身，浮瓜沉李以供其口，環氷揮扇以袪其熱，藤簟竹牀以取其凉，炎蒸不來，淸風滿座，內有伏陰，外受凉氣，汗不流而肌理緻，陰愈侵而陽不發，卒然昏冒，寒熱交作，嘔吐腹痛，乃爲夏月感寒，非中暑也。法當溫以理其中，辛以散其表，不可執中暑之說，而用治暑之劑也。宜以生薑、葱白、木香、陳皮、羌活、紫蘇之類。

○集方　治感蒸濕氣，寒熱或嘔瀉脹滿，用香薷四兩，厚朴、薑水炒，大腹皮酒洗，各一兩，俱炒燥爲末，每服三錢，白湯調服，得吐即解。○治暑熱受寒濕，因食水果油膩等物，隨病腳氣，或疝氣，用香薷一兩，橘核、厚朴、檳榔、木瓜、小茴香、蒼朮各八錢，共爲末，每服三錢，白湯送下。腳氣疝氣兼治。○治陰暑霍亂，吐瀉不止，惡寒不渴，手足厥逆，用香薷一兩，木香、肉桂、人參各三錢，共爲末，每服三錢，生薑湯下。○治熱霍亂，大熱大渴，煩渴引飲，用香薷一兩，川連、滑石各三錢，共爲末，每服二錢，白湯下。○治水病浮腫，用香薷八兩，車前二兩，茯苓三兩，共爲末，白湯調冷服三錢。○治暴水風水，氣水通身浮腫，用香薷一觔，熬爛去渣，再熬成膏，加白朮末八兩，和丸梧子大，每服一錢，白湯下，服至小便通利爲效。○治水腫，以香薷爲君，當同人參、苓、朮、木瓜、陳皮、白芍、桑皮、車前子良。○治一切傷暑，或暑月臥濕當風，或生冷不節，眞邪相干，便致吐利，或發熱頭痛體痛，或心腹痛，或轉筋，或乾嘔，或四肢逆冷，或煩悶欲死，用香薷五兩，厚朴（薑製）、扁豆（微炒）各二兩，川黃連五錢（炒），水五大碗，煎二碗，頓冷服，立效。○香薷飲有十味者，有六味者，有加黃連者，雖同爲袪暑之藥，然脾胃腎俱虛之人，當以十味者爲準，除有肺熱咳嗽病者，去人參、白朮、黃耆。○治心煩脇痛，連腹欲死者，用香薷擣汁二升，服。○治鼻衄不止，香薷研末，水調服一二錢。○治口臭，以香薷一把，煎汁含之。○衍義云：治霍亂，香薷不可缺，用之無不效。

藿香味辛。性温無毒。氣厚味薄。可升可降。陽也。入手足太陰經。（劉雲密先生曰藿香生海邊國及交趾九真武平興古諸國今嶺南亦有之二月宿根亦可子種苗似都梁方莖叢生中虛外節葉似茄葉邊有縱紋七月作穗開花似蓼房似假蘇子似茺蔚五六月未作穗時采莖葉曝乾甚芳香古人用藿葉爲能散布氣發後世因雜葉多偽并枝莖用之今枝莖尤多以外市家多雜排花梁茄葉偽充不可不擇）

○藿香温中快氣。開胃健脾之藥也。然性味辛温。而清和芬烈之氣。故上開胃進飲食。辟穢氣爲專用。凡嘔逆惡心而泄瀉不食。或寒暑不調而霍亂吐利。或風水毒腫而四末虛浮。或山嵐蠱瘴而似瘧非瘧。或濕熱不清而吞酸吐酸。或心脾鬱結而積聚疼痛。是皆脾肺虛寒之

證。非此莫能治也。故海藏氏治寒痺于三焦。温肺理脾和肝益腎。意在斯歟。但氣味辛熱。雖能止嘔治吐逆。若病因陰虛火升作嘔者。或胃熱作嘔者。或少陽温病熱病作嘔者。或陽明胃家邪實作嘔。并作脹作瀉諸證。並禁用之

○葉正華先生曰。芬芳蘿烈。定寒暑二氣。交發爲祟。并中惡客忤。變亂于俄頃。致反正氣者。乃可立定。命名曰藿者。以此入烏藥順氣散則理肺。入黃芪四君子湯則理脾。入正氣散。治傷寒在表之邪。入桂苓甘露飲。治中暑安吐瀉也。

集方　治氣逆不和。升降諸氣。用藿香葉一兩。香附子四兩。俱炒燥爲末。每服一錢。白湯調服。○治陰寒吐瀉。并傷生冷者。用藿香葉一兩。廣陳皮五錢。丁香三錢。俱研細末。白湯調下。○治暑月吐瀉。用藿香葉五錢。滑石三錢。俱研細末。白湯調。冷服。○治胎氣不安。氣不升降。嘔吐酸水。用藿香葉。香附。甘草。各二錢。廣陳皮一錢。共爲末。每服二錢。白湯下。○治口臭。用藿香葉煎湯。時時噙漱。

○續補集方。治久瘧久痢不止。用藿香。甘草。人參。茯苓。半夏。陳皮。厚朴。當歸。草菓仁。白朮。川芎。各一錢。烏梅二個。白芍藥一錢五分。水煎服。○瘧疾熱多。加柴胡。黃芩各一錢。寒多。加官桂七分。乾薑一錢。汗多。加白朮。黃耆。知

母各一錢。口渴加麥門冬。天花粉。各一錢五分。胸中脹悶。加青皮。砂仁。各八分。◎痢疾腹痛。加枳殼一錢。木香五分。痛甚。加川黃連一錢。不食。加麥芽。神麴。各二錢。其加減大暑瘧痢兩可互用。此方係龔雲林先生常用便手得効者。故借而錄之。

蘭草味苦辛，性平，無毒。入手足太陰經。又名孩兒菊（藏器陳氏曰蘭草澤蘭一類二種也俱生水澤旁下濕地南北江浙皆有二月宿根生苗成叢綠而微紫莖微方節短而葉有毛者為澤蘭非蘭草也若莖微圓節長葉對節生面光而邊有歧者是蘭草非澤蘭也蘭草高三四尺入九月後漸老枝頭成穗作花紅白色如雞蘇花久之花瓣轉白絨裂如毬毬中有子一苗絨若子上色黑味苦臭香氣烈禮記佩帨蘭茝楚辭紉秋蘭以為佩西京雜記藏衣書中辟蠹皆此二蘭也李時珍曰離騷言其綠葉紫莖素枝可紉可佩可藉可膏可浴鄭詩言秉蕑風俗通言尚書奏事懷香握蘭禮記言諸侯贄薰大夫贄蘭漢書言蘭以香自燒也非若江浙之幽蘭葉如麥冬而春花福閩之蕙蘭葉如菅茅而秋花者也切肉翦蕙蘭有葉無枝可翫而不可紉佩好若秉崔藉若膏焚何所皆取古之香草必花葉俱香而燥濕不變故可刈佩今之幽蘭蕙蘭但花香而葉乃無氣質弱易萎不可刈佩必非古人所用甚明古之蘭係蘭草澤蘭今之蘭是幽蘭蕙蘭而似麥冬似菅茅者明矣熊太古言世俗之蘭生于深山窮谷決非古時水澤之蘭也）

○蘭草芳香馥郁，開鬱行氣，利水道之藥也。本草謂殺蠱○氣，辟不祥，除胸中痰癖，辟諸寶，取其苦辛以散結滯，芳香以除穢惡，行氣通竅，清肺消痰者也。又東垣氏謂能生津液，止消渴，潤肌肉，養營氣，皆取辟邪氣以全眞氣故也。又按素問云：五味入口，藏于脾胃，以行其精氣，津液在脾，令人口甘，此肥美所發也。設其氣不能上溢，轉為消渴，治之以蘭，除陳氣也。陳氣既除，新液自生，何消渴痰癖蠱氣之病有焉。今人不恒用之，實缺典也。

○集方　治蠱氣，用孩兒菊莖葉搗汁一鍾，生白酒沖服送。

○治天時瘟疫瘴氣，用孩兒菊取葉焚燒，辟穢氣不染。

○治胸中痰癖成積，用孩兒菊取葉日乾，切片煮湯代茶飲。

○治胃氣不開，用孩兒菊葉日乾、藿香、枇杷葉、石斛、竹茹、橘紅各等分，水煮服。

○治噎膈將成，能下氣開鬱，用孩兒菊葉、白豆蔻、廣鬱金、眞蘇子、蘆根，共煮汁，磨沉香數分，每日飲之，愈。

○治消渴不止，用孩兒菊、天花粉、川黃連、麥門冬、竹葉，煮湯，和蘆根汁服。

○治食牛馬肉毒能殺人，速用孩兒菊連莖葉根水煎湯服，即解。

○十仙靈應散。治男子陰濕陽痿，每逢不舉。用孩兒菊一兩，黑附子、蛇床子、紫梢花、水菖蒲、白芷、海螵蛸、木鱉子、丁香各二錢，樟腦一錢五分，共為末。每用五錢，水五碗，煎三碗，溫洗陰囊并濕處，日洗二次，留水溫洗，多洗更好。

○治鼻不聞香臭，用孩兒菊曬乾、羌活、獨活、升麻、白芷、防風各一錢，黃耆、川芎、白朮、人參、當歸各一錢，甘草、川椒各六分，加黑棗三個，水煎服。○鼻淵者，膽移熱於腦，本方加辛夷、薄荷、連翹，去人參。

澤蘭　味苦甘，性溫，無毒。陰中之陽。入足厥陰、太陰經。又名都梁香。（別錄曰：澤蘭生汝南諸大澤旁，故名。出土便分枝梗，斯南當角、徐、隨、壽、蜀、梧州、河中、近新等處皆有。二月生苗，高二三尺，莖方，節青紫色，作四稜。葉生相對，如薄荷而尖長，微有香。枝葉間微有白毛。七月作蕊，色純紫，作花色紫白，根色青紫，與蘭草同類異種，故蘭草為大澤蘭，澤蘭名小澤蘭也。但蘭草生水旁，葉光潤，根小紫，五六月盛；而澤蘭生水澤中及下濕地，葉尖微有毛，不光潤，方莖紫節，此為異耳。陶氏曰：多生濕地，葉微香，可煎油潤髮及作浴湯。今山中有一種，甚相似，葉但不甚香。既云澤蘭，則山中出者為非。市家多不出售，不可不擇。又青州出者微香而無花。）

○澤蘭，活血氣，通關節，消水腫之藥也。（陳一齋）治產後宿血積血，而癥瘕積聚；或產後血阻，而內衂上攻；或大腹水氣，而面目虛腫；或水留骨節，而痿痺不通；或肝鬱成勞，而虛羸瘦怯；或脾滯面黃，而舉動艱難。凡血氣留滯等證，用澤蘭推陳致新，不傷元氣，為婦人方中要藥。李氏云：其氣香而溫，其味辛而散。脾喜芳香，肝喜辛散。脾氣舒，則三焦通利而正氣和；肝鬱散，則營衛流行而病邪解矣。總其減熱和血，行而兼補之功也。○蘭草走氣道，故能利水道，除痰癖，殺蠱辟惡，而為消渴良藥；澤蘭走血分，故能消瘀血，去癥瘕，治水腫，而為婦人珍方。一類二種，功用少殊。

繆仲淳先生曰：苦能泄熱，甘能和血，專入血分，攻擊稽留。其主水腫者，乃血病化為水之水，非脾虛停濕之水也。若脾虛土敗成水腫者，寧敢輕投。○根色紫黑，名為

地筍。與葉根相同，通血脈，利九竅，止產後腹痛。產婦可作蔬菜食之。婦科方中，有澤蘭湯丸，用之甚多。除婦人產後，他用甚少。

沈則施先生曰：按古書云，二蘭須要辨識明白。大澤蘭即蘭草，名孩兒菊也，莖葉皆圓，根色青黃，能生血調氣，養營氣。小澤蘭即澤蘭，名都梁香也，莖方葉斑，根尖，能破血通積。但二蘭形色有殊，用治迥別。

○集方　治產後水腫。用澤蘭葉、漢防己等分為末。每服二錢，醋湯下。○治產後惡露不盡，少腹作痛，俗名兒枕。用澤蘭葉（炒）、黑豆（炒）、乾薑、當歸、川芎、熟地、牛膝、益母葉、五靈脂、蒲黃、香附等。冬寒加肉桂。如內熱虛勞人，去肉桂、五靈脂，加鼈甲、膠、麥門冬、沙參。虛極加人參、蒼朮。○治小兒蓐瘡。用澤蘭搗爛敷之。○治產後陰腫翻。用澤蘭葉四兩，煎湯薰洗二三次即安。

○治心胃作痛，嘔吐發熱，胃脘有寒痰食氣也。用澤蘭一錢，乾薑、良薑、官桂各一錢，蒼朮、木香、茴香、枳殼、砂仁、香附、玄胡各二錢，俱醋炒，加葱頭五個，水煎服。痛甚，加乳香、沒藥。四肢厥逆，脈沉伏，加製附子。○（如心胃痛日久不止，胃中有鬱熱也，本方去乾薑、良薑、木香，加黑山梔、川黃連、黃芩、甘草。○如痛久連胸膈背脇，或有死血積滯，或吐血強止，內有蓄積，心胃作痛者，前方加當歸、桃仁數錢，韭菜汁一鍾和服。○如有蟲積，前方加烏梅五個，花椒三錢。○如痛久不愈，服辛熱藥過多，太陽結燥，宿垢不行者，前方去乾薑、良薑，加酒製大黃二錢。○一人久患心胃痛，經年不愈，吳醫沈心田用澤蘭、人參、製附子各一錢五分，黃連五分，烏梅二個。一服即止。）

益智子。味辛。性熱。無毒。可升可降。陽也。入手足少陰、手足太陰四經。

（陳氏曰益智子出崑崙國及交阯今嶺南州郡往往有之顛微廣州記云葉似蘘荷長丈餘根上有小枝高七八寸無花萼莖作葉如竹箭子從心出一枝有十子叢生形如小棗核黑皮白核小者佳含之能攝涎穢或四破去核取外皮蜜煮爲粽味極辛美昔人稱益智粽即此是矣○草木狀云益智子二月連花着實五六月方熟子如筆頭兩頭尖長七八分雜五味中飲酒芬芳亦可鹽曝及作粽食顧微言無花者誤矣今之益智子形如棗核皮及仁皆如草豆蔻云○李時珍先生曰脾主智此物能益脾胃故名與龍眼名益智義同。一說海南產益智子花實皆長穗而分爲三節觀其上中下節以候歲早中晚禾之豐凶大豐則皆實小豐則半實大凶皆不實然罕有三節並熟者。）

○益智子。養胃扶脾溫中暖腎之藥也。蓋脾土之爲性。得芳香高暢則行。遇鬱閉卑寒則塞。又脾爲倉廩之司。胃爲水穀之海。胃主受納。脾主消導。一納一消。運行不息。○抑心脾肺腎。遞相滋生。皆藉脾土之氣以榮養也。不善調理。或飲食失節。寒熱不調。則脾胃受病矣。益智辛香溫達。使鬱結宣通。陰退陽行。古方進食開胃藥中必用益智。爲其于土中能益火故耳。觀開寶方。能安神益氣。乃養心肺之陽也。通利三焦。乃調諸氣之滯也。若遺精若虛漏。若小便餘瀝諸病。用此辛香溫濇之性。乃固之濇之。止之之意也。然施于老人陽虛。命門火衰。脾腎虛冷者合宜。若少壯火盛。陰虛龍火方熾。而爲遺精。爲虛漏。爲小便餘瀝者。禁之。

王紹隆先生曰。經言心藏神。肝藏魂。肺藏魄。腎藏志。然四臟各守神則一。而獨脾舍神有兩。曰意與智也。然意者脾土之體。智者脾土之用。能益脾土之體用。故名益智云。日華子謂客寒犯胃。嘔吐自利。胃衰脾冷。食飲不入。腸府氣脫。大便久滑。腎氣衰虛。遺精虛漏。小便餘瀝。益脾腎以陰爲體。以陽爲用也。此藥味辛氣溫。功齊火熱。故能養胃扶脾。溫中暖腎者以此。若與參耆苓朮並用。培補土元。與鹿茸枸杞肉桂同用。添續陽髓。有何精遺漏之不止乎。

劉默齋先生曰。益智辛溫陽藥也。主君相二火之正氣。入脾肺腎三經。在四君子湯則入脾。在集香丸則入肺。在鳳髓丹則入腎。三經而互有子母相關之義。

○集方。治脾腎虛弱。胃敗不能飲食。用益智子。人參。黃耆。白朮。砂仁。廣陳皮。穀芽。○治心虛神怯。睡中多魘寐。用益智子。人參。川黃連。半夏。酸棗仁。石菖蒲。白茯苓。栢子仁。白朮。當歸身。硃砂。羚羊角。各等分。共爲末。每睡時服二錢。燈心湯下。○治老人腎陽不固。無故遺精。或滑泄。或小便後時時滴瀝。或白濁。用益智子。人參。鹿茸。枸杞子。肉桂。附子。懷熟地。麥門冬。赤石脂。龍骨。牡蠣粉。各等分。共爲末。蜜丸梧桐子大。每早晚各服三錢。白湯下。或少年人本元虛冷無陽者。亦可用此。不在禁例。○治小便頻數。脬氣不足也。用益智子鹽炒去鹽。台烏藥。各等分。共爲末。山藥粉打糊爲丸梧子大。每早服三錢。白湯下。

○治客寒犯胃，嘔吐自利，用益智子倍用，吳茱萸湯泡二次，肉桂、木香、白朮、蒼朮各等，俱微炒燥，爲末，每早晚各服三錢，好酒下。○治腹脹忽瀉，日夜不止，諸藥不效，此氣脫也，用益智子二兩，濃煎飲之立愈。○治勞形勞神，脾腎心氣久傷，或傷饑失飽，飲食失節，用資生丸，或歸脾湯方中倍加益智子，大效。○治衄血大衝，或吐血盈盆，用人參二兩，益智子五錢，濃煎冷服，立止。

○續補集方（方脈正宗）治痰飲濕熱，火鬱三者滯于胃口，爲嘈雜痞悶者，用益智子、半夏、陳皮、茯苓各一錢五分，甘草七分，黑山梔、黃連、黃芩、厚朴、砂仁、香附子、白豆仁各一錢，麥芽三錢，加生薑二片，食鹽一分，水煎服。○治胃虛有寒痰（同上）成噯氣者，用益智子、乾薑、肉桂、半夏、陳皮、人參、白朮各二錢，甘草七分，俱用酒拌炒，水二碗煎一碗，溫和服。有挾火鬱者，即本方加薑汁炒黃連一錢。○治婦人噯氣胸緊，連十餘聲不盡，噯出氣，心頭略寬，不噯即緊，是火挾氣鬱也，用益智子、莪朮、檳榔、青皮、瓜蔞仁、蘇子各一兩，黃連薑汁炒二兩，枳實麩炒、黑山梔、香附、醋拌炒，各四兩，共爲細末，水發爲丸梧子大，每早晚（各食後服三錢，白湯送下。）

高良薑味辛，性大熱，無毒。純陽浮也，入足太陰陽明經。（葛氏云：此薑始出高良郡，故名。今嶺南諸州、浙閩諸處及黔蜀皆有之。春末始發，叢叢生，葉瘦如碧蘆。未開花先抽一幹，有大籜包之，籜拆花見，一穗數十蕊，淡紅鮮妍，如桃杏花蕊，重則下垂，如葡萄，又如火齊瓔珞，及剪綵鸞枝之狀。有花無實，不與草豆蔻同種。每蕊有兩瓣相並，如比目連理也。○蘇氏曰：出嶺南者形大虛軟，出江左者細緊，亦不甚辛，其色則一。二三月采根，形氣與杜若相似。春生莖葉，如山薑，高一二尺，花紅紫色，如山薑花，結子名紅豆蔻。）

○高良薑，袪寒濕，溫脾胃之藥也。別錄方主冬月卒中寒冷，陰寒霍亂，腹痛瀉利，及胃寒嘔吐，山嵐瘴瘧，逆冷諸證。若老人脾腎虛寒，泄瀉自利，婦人心胃暴痛，因氣怒因寒痰者，此藥辛熱純陽，除一切沉寒痼冷，功與桂附同等。苟非客寒犯胃，胃冷嘔逆，及傷生冷飲食，致成霍亂吐瀉者，不可輕用。如胃熱作嘔，傷暑霍亂，火熱注瀉，心虛作痛，法咸忌之。

葉正華先生曰：古方治心脾疼，多用良薑。寒者，與木香、肉桂、砂仁同用至三錢；熱者，與黑山梔、川黃連、白芍藥同用五六分，于清火藥中，取其辛溫下氣，止痛有神耳。若治脾胃虛寒之證，須與參、耆、半、朮同行尤善。單用多用，辛熱走散，必耗沖和之氣也。

○集方治冬月中寒，霍亂吐利，逆冷不溫，用高良薑一兩，酒半升，煮滾五六沸，頻頻服。○治胃寒嘔吐，并治泄瀉逆冷不溫，用高良薑、白豆蔻、白朮各五錢，黑大棗五枚煨，水二大碗煎七分服。○治山嵐瘴瘧，兼吐瀉逆冷者，

用高良薑草菓仁炒薑製半夏厚朴。蒼朮。炒。各三錢。烏梅三枚。煎服。○治老人虛寒多瀉。用高良薑補骨脂乾薑炒。白朮。各三錢。炙甘草五分。人參二錢。水煎服。○治脾虛寒瘧。寒多熱少。飲食不思。用高良薑切片。麻油拌炒。炮薑。各一兩。共爲末。每服五錢。用猪膽汁調成膏。臨發時熱酒沖服。立驗。○治風牙腫痛。用高良薑二錢。全蠍一箇。焙。共爲末。搽之。吐涎。以鹽湯漱口。立効。

○治一切滯氣。心腹脹悶疼痛。腸肋脹滿。嘔吐酸水痰涎。頭目眩暈。并食積酒積及米穀不化。或下利膿血。大小便結滯不快。或風壅積熱。口苦咽乾。涕唾稠粘。此藥最能推陳致新。散鬱破結。活血通經。治氣分之聖藥也。用高良薑。檳榔。黃連。木香。枳殼。青皮。莪朮。各二兩。黃柏一兩。香附。大黃。各三兩。俱用酒拌炒。磨爲細末。加黑牽牛頭末四兩。水發丸如梧桐子大。每服一錢五分。臨臥時淡薑湯送下。以利爲度

凡上吐下瀉　人參白朮茯苓藿香木香

肉豆蔻各七

肉豆蔻。味辛。性溫。無毒。入足太陰。手陽明。足陽明經。

（陳氏曰。肉豆蔻。即肉果也。生崑崙及大秦國。中國無之。今嶺南人得種。種蒔矣。春生苗。夏抽莖。開花結實。酷似草豆蔻。皮肉之顆則不同。其顆外有皺紋。內有斑纈紋。宛似檳榔紫白相間。以油色肥實者佳。枯白瘦虛者劣。修製用麪麴。熱湯和搜。包裹其實。煨火中。煨熟。去麪用。）

○肉豆蔻。暖胃消食。止泄瀉之藥也。凡病寒中積冷。陰寒霍亂。嘔吐涎沫。心腹脹痛。中惡冷氣。大腸滑泄。及小兒胃寒。乳食不消。或吐乳。或下瀉。諸證此藥。其氣芳香。其味辛烈。其性溫散。故入脾胃藥中。療寒滯爲要劑。爲和平中正之品。運宿食而不傷。非若枳實萊菔子之有損真氣也。下滯氣而不峻。非若香附大腹皮之有泄真氣也。止泄瀉而不濇。非若訶子罌粟殼之有兜澀掩伏

而內閉邪氣也。日華子稱爲寒可散。邪可逐。滯可行。泄可止。實可寬。虛可補。斯言厥有義哉。○如大腸素有火者。中暑熱氣火之邪。熱泄暴注者。濕熱積滯方盛痢疾初起者。皆不宜用。

沈則施先生曰。肉果溫中補脾。而兼運化。治傷食瀉利大有殊効。

○集方治腎泄及冷泄。用肉果麪裹煨熟。砂仁。人參。補骨脂。吳茱萸。北五味子。○治胃氣不和。宿食不消。新食不進。大便久瀉。用肉果。砂仁。厚朴。人參。白朮。紅麴。麥芽。穀芽。藿香。廣陳皮。○治冷痢久不止。腹痛不能食。用肉果一兩。去皮。米醋和麪裹煨。搗細。粗紙內去油爲末。每用

一錢，米湯下。○治陰寒霍亂吐利，用肉豆蔻麪裹煨研，去油為末，冷薑湯調服一錢。○公子登席散，用肉豆蔻去油為末，棗肉為丸，服一二錢，砂仁湯下。其開胃進食消導之功烈矣。○治久瀉不止，用肉豆蔻煨熟去油一兩，熟附子五錢，木香二錢，棗肉丸，米湯下二錢。○治小兒泄瀉，用肉豆蔻火煨去油六錢，乳香二錢，生薑五片，同炒黑色，去薑研為膏，丸如菉豆大，每量大小，米飲下。○脾腎雙補丸，治天明腎泄，用肉豆蔻、車前子各十兩，人參、蓮肉、兔絲子、北五味、山茱萸肉、補骨脂、巴戟天、懷山藥各一觔，廣陳皮、縮砂仁各六兩，俱炒燥黃，為末，餳糖為丸，如菉豆大，每服五錢，早晚各食前服。如元虛而

有火者，或火盛肺熱者，俱去人參、肉荳蔻、巴戟天、補骨脂。無錫秦公安患中氣虛，不能食，食亦難化，時作泄瀉，胸膈不寬。一醫誤投青皮、枳樸等破氣藥，下利完穀不化，面色黯白。仲淳即用脾腎雙補丸，一料而愈。○一人患泄

瀉，凡食一應藥粥蔬菜入喉，覺如針刺，下咽即辣，因而滿腹絞辣，隨覺腹中有氣，先從左升，次從右升，氤氳暴腹，即欲登廁，彈響大泄，糞門恍如火灼，一陣方畢，一陣繼之，更番轉廁，踰時方得離圊，諦視所泄，俱清水盈器，白脂上浮，藥粥及蔬菜俱不化而出，甚至夢中大泄，[illegible]不收攝。諸醫或云停滯，或云受寒，或云中寒，百藥[illegible]，竟如沃石。乃徐大肉盡脫，求[illegible]淳診其脈洪大而[illegible]，知其為火熱所生，以川黃連三[illegible]芍藥二錢，甘草五分，水煎服，即止。

草豆蔻　味辛甘苦濇，性熱，無毒。浮也，陽也。入足太陰、陽明經。

別錄曰：草菓生南海及交阯，今嶺南皆有之。苗似蘆葉，似山薑、杜若，根似高良薑，氣如木香。二三月開花作穗，房生于莖下，嫩葉卷之而生，如芙蓉花，微紅，穗頭深色，其葉漸展，花漸出，而色漸淡，亦有黃白色者。南人多采花以為果，尤貴其嫩者，并穗入鹽淹，疊疊作朵不散，又以木槿花同浸，欲其色紅耳。其結實至秋成殼，而堅，秋方老，殼方黃，若龍眼而銳，皮殼厚，有稜如梔子稜，無鱗甲，皮中子如石榴，白豆蔻多稜，夏月熟時采之暴乾，入藥劑，殼取子用。李氏曰：草豆蔻、草果雖是一物，細分辨，微有不同。今建寧所產草豆蔻，大如龍眼而形微長，其皮黃白，薄而有稜峭，其仁大如縮砂仁，其氣辛香而和。滇廣所產草果，長大如訶子，其皮黑厚而稜密，其仁粗而味辛臭，如斑蝥之氣。廣人取生草豆蔻入梅汁鹽漬令紅，暴乾薦酒，其初結小者，名鸚哥舌。元朝飲膳皆以草豆蔻為上供。南人復用一種山薑實偽充草豆蔻，其形圓而粗，氣味辛猛而不和，不可不辨。凡入藥，用草豆蔻，取蒂帶皮連仁者，打碎微炒黃，研細用之。

○草豆蔻，和中暖胃，消宿滯之藥也。專主中脘不和，吞酸吐水，心疼肚痛，泄瀉積冷。凡一切陰寒壅滯之病，悉主治也。其功用與白豆蔻相同。白者入脾胃，復入肺經，行氣而又有益氣之妙；草者但入脾胃二經，長于利氣破滯而已。

○集方：治傷寒濕暑氣，或停積水菓，油膩魚麪酒茶，一切外感內傷，瘧痢癖氣，為嘔吐，為痞脹，為噫噦諸證，用草豆蔻五錢，蒼朮、厚朴、陳皮、甘草各三錢，俱炒燥，研細末，每早晚各服三錢，濃煎薑湯調下。

草菓仁。味辛苦濇。性熱無毒。浮也。陽也。入足太陰陽明經。（陳延采先生曰。生閩廣。長大如荔枝。其皮黑厚有直紋。內子大粒成團。凡入劑。取子炒研用。但其氣熏人。最辛烈。夏月造生魚鮓。多用此釀成。故食餌大料方中。必以此爲要品也。）

○草果仁。治脾胃寒濕。逐痰癖之藥也。蓋脾胃喜溫而惡寒。喜燥而惡濕。喜利而惡滯。喜香而惡穢。草果氣味香辛而熱。香能達脾。辛能破滯。熱能散寒與濕。故凡濕鬱于中。胸滿腹脹。濕積于脾。吞酸吐酸。濕聚于胃。嘔吐惡心。濕蒸于內。黃疸黃汗。是皆濕邪之爲病也。又有避暑受涼而爲脾寒瘴瘧。或中寒感寒。而爲腹痛吐利。或食瓜桃魚腥生冷。而爲冷積泄瀉。是皆寒與濕之爲病也。用草果並能治之。又思東南土地卑下。每多山嵐霧瘴。

又因飲啖魚腥水果酒茶粉麪。脾胃常多寒濕鬱滯之病。故服食草果與之相宜。或云。草果治濕之功大。治脾之効速。常與知母同用。治瘴瘧寒熱有驗。蓋草果治太陰獨勝之寒。知母治陽明獨勝之熱。正以一陰一陽合用。無偏勝之虞也。但草果性熱味辛。本是祛寒散濕破滯消食除瘴之藥。凡瘧疾由于陰陽兩虛。不由于瘴氣者。心痛胃脘痛由于火而不由于寒濕飲食瘀滯者。泄瀉暴注。口渴由于暑熱。不由于魚腥生冷傷者。痢疾赤白。後重裏急。小水不利。因作脹滿。由于暑氣濕熱。不由暑氣濕寒者。皆不當用。用之增劇。

繆仲淳先生曰。草菓仁能消一切宿食。開拓中焦滯氣。故入參養胃湯配之。

藥性論云。草菓仁單用。能主一切冷氣。

李時珍先生曰。草菓治病。取其辛熱浮散。能入太陰陽明。除寒燥濕。開鬱化食之力而已。

葉正華先生曰。草菓辛溫。能散滯氣。膈上冷痰。若明知身受寒邪。口食冷物。胃脘作疼。方可溫散。用之捷如影響。或濕痰鬱結者亦効。若熱鬱者不可用。必用梔子之劑。

○集方　治氣虛瘧疾。寒多熱少。或單寒不熱。或大便泄而小便多。不能食者。用草菓仁二錢。熟附子一錢。生薑七片。黑棗三枚。煎服。○治脾胃兩虛。虛寒泄瀉。用草菓仁、大茴香。吳茱萸湯炮。豆蔻。補骨脂。胡蘆巴。山茱萸肉。各一兩。俱炒黃爲末。飴糖丸梧子大。每早晚各服三錢。人參湯下。

補骨脂。味辛，氣香，性熱，無毒。陽中微陰，降多升少。入手厥陰、足太陰及命門諸經。

（王景雲先生曰：補骨脂即破故子也。生波斯國及嶺南諸州，今嶺外山坂間多有之。四川合州亦有，皆不及番舶者佳。莖高三四尺，葉尖小，似薄荷，花微紫色，實如麻子，圓扁而黑。九月采。其性燥，須用鹽酒浸一宿，曬炒用。）

○補骨脂，補腎命，煖丹田，壯精髓之藥也。夫腎與命門，水火眞陽之所司也。何也？蓋腎有兩枚，而命門又居兩腎之中，脊骨十四椎之間，與臍相對。人身眞陽之精，于此藏焉，火之源也，取象于坎，以一陽居于二陰之間耳。陰陽和平，則水火交濟而無患矣。陰陽離決，人變病焉。如陽虛腎冷，精道不固而自流；或脾腎衰敗，大便虛瀉而久泄；或肝腎流濕，陰囊濕漏而浸淫；或風濕冷痺，腰膝

不用而痿躄等證，用補骨脂。辛香而熱，以鹽酒浸炒，香熱使鹽入腎經，酒行陽道，香則通氣，熱則溫補。故四神補腎諸丸內，加此藥以治脾腎虛寒者，用無不驗。凡病陰虛火動者，陽事妄舉者，夢遺尿血者，小便短赤者，口苦舌乾者，大便燥結者，內熱作渴者，火升目赤者，心嘈易饑者，溫熱成痿，以致骨乏無力者，均不宜用。

楊士行先生曰：古書言今人多以胡桃肉合服。用補骨脂十兩，如前法修製，搗篩令細，用胡桃肉二十兩，湯泡去皮，細研如泥，以飴糖和丸梧子大，溫酒服之。久則益氣明目，悅顏色，延壽年，補筋骨。但禁芸薹菜、羊血，餘無所忌。按白飛霞方云：補骨脂屬火，收斂神明，能使心胞之火，與命門之火相通，使元陽堅固，骨髓充實，濇以治脫也。胡桃屬木，益命門，補三焦，油潤以利血脈也。佐破故子，有木火相生之妙。孫眞人言：補腎不若補脾。又云：補脾不若補腎。腎氣虛弱，則陽氣衰少，不能薰蒸脾胃。脾胃氣寒，令人胸膈痞塞，飲食難入，雖強進，終遲于運化，或腹脇虛脹，或嘔吐痰涎，或腸鳴泄瀉。譬之釜中之物，無火力，雖終日不能腐熟。故濟生二神丸，治脾胃虛寒泄瀉，用補骨脂補腎，肉豆蔻補脾，二藥雖皆補二臟之陽，但無斡旋培養之力。加木香以順其氣，使之斡旋運動，或加人參以充其氣，使之培養元基，則倉廩開通，水穀行運，而脾胃自能受物消物矣。

繆仲淳先生曰：胃猶釜器也，腎命猶火薪也。補骨脂稟火土之氣而生，專煖水臟，壯火土，能補腎命眞陽之氣。眞陽之氣得補而上升于胃，則能腐熟水穀；下應于脾，則能蒸糟粕而運化精微，以榮養五臟之陽。如脾之陰濕而不食，腎之寒冷而精流，心之怯悸而默默，大腸虛陷而溏泄，婦人血冷水帶而腹疼，皆無陽也。此藥辛香燥烈，能起脾腎命門之陽氣，則五臟諸寒之病自除矣。若施于腎虛陰虛，血虛火盛者，反致取咎。豈云五勞七傷，槩可用乎。

○集方：治陽虛腎冷，精道不固。用補骨脂，酒浸一宿，青鹽炒，各二兩；兔絲子，酒炒，三兩；黃耆、白朮、肉桂、石斛各一

兩。萆薢四兩。共爲末。煉蜜丸。每早服三錢。○治脾胃虛。天明溏泄。久泄。用補骨脂酒製。肉豆蔻去油。白术土拌炒。訶子肉去油。吳茱黃湯炮三次。去苦味。肉桂。炙甘草各一兩。○治肝腎虛寒。濕氣下流。陰囊濕漏多水。用補骨脂酒浸一宿。炒。於白术土拌炒。各四兩。蒼术米泔水浸炒。一兩。小茴香三兩。○治風濕寒氣襲于足三陰經。腰膝痠疼。用補骨脂酒浸一宿。萆薢。防風。牛膝。木瓜。虎骨。當歸。川芎。羌活。白术。蒼术。黃芪。甘草。海桐皮。桂枝。酒煎溫和服。○治婦人陽氣不足。精神疲敗。白帶白淫。用補骨脂酒浸炒四兩。當歸。白术。人參。各一兩。肉桂。藁本。白芍藥。枸杞子。各二兩。龍骨細末八錢。○治腎氣虛寒。小便無度。用補骨脂酒浸一宿。小茴香鹽水炒。各一兩。共爲末。每服三錢。丸散湯三法皆可治。○腎虛牙痛日久。用補骨脂三兩。青鹽一兩。共炒勻爲末。每服二錢。丸散湯三法隨用。○治風蟲牙痛。上連頭腦。用補骨脂五錢。乳香二錢。炒研擦之。或爲丸塞孔內。○治打墜腰痛。瘀血凝滯。用補骨脂三兩。酒浸半日。晒乾炒。大茴香炒。三兩。肉桂一兩。不見火。共爲末。每服二錢[illegible]

荊芥　氣香。味辛。性溫。無毒。升也。陽也。入足厥陰。足少陽陽明經。氣分藥也。

（寇氏曰。荊芥。本草呼爲假蘇。又云薑芥。因其氣味辛芳如蘇。如薑。如芥也。今在處有之。多野生。古方稀用。今爲俗尚。莖多栽蒔。二月布子生苗。方莖細葉。葉狹小而色淡黃若綠。似落藜而細。初生炒食。香辛可啖。或作生菜。八月開小花。作穗成房。房內有細子如葶藶子。色黃赤。連穗收用。又有胡荊芥生北地。又有石荊芥生山石間。體性相近。入藥亦同。）

○荊芥。輕揚之劑。散風清血之藥也。主傷風。肺氣不清。喉風腫脹。難開。頭風腦痛。眩運。血風。產後昏迷。痰風卒痹。仆厥。驚風。手足搐搦。目風腫澁。流淚。濕風黃疸。悶滿。熱風斑疹痘。瘖瘡疥。疙瘩。疥寒熱。鼠瘻。瘰癧生瘡之類。凡一切風毒之證。已出未出。欲散不散之際。以荊芥之生用。可以清之。又腸風便血。崩中淋血。暴吐衄血。小腸溺血。凡一切失血之證。已止未止。欲行不行之勢。以荊芥之炒黑。可以止之。大抵辛香可以散風。苦溫可以清血。爲血中風藥也。但氣味香辛而發。主升主散。不能降下。亦不能收入。凡病表虛有汗者。血虛寒熱者。氣虛眩暈者。老人腎陽虛而目昏流淚者。少年陰虛火炎。因而面赤頭痛者。咸宜禁之。

繆仲淳先生曰。荊芥輕揚。得春氣而善走散。春氣升。風性亦升。故能上行頭目。風木通肝。故能遂肝氣。行血分而去血分之風。辛以散之。溫以行之。若風痰。若血暈。若斑疹。若疸黃。若目瞖流淚等疾。皆藉此以流通也。

○秦方治傷風寒，肺氣不清，咳嗽氣促，用荆芥、前胡[illegible]、杏仁、紫蘇葉、桑白皮、桔梗、生薑、葱白，煎服。如傷風熱咳嗽氣促，聲啞者，用荆芥、薄荷、玄參、乾葛、杏仁、黃芩、桑白皮、連翹、鼠粘子、桔梗、甘草。○治喉閉咽腫，水飲不下，用荆芥八兩，水五六碗，煎汁二碗，徐徐飲之，立消。○治頭風痛攻腦中，用荆芥、天麻、防風、白芷各一錢，甘草六分，全蠍五箇，水煎服。○治一切偏風，口眼喎斜，用生荆芥一觔，生薄荷一觔，同搗汁，于磁器中熬成膏，配入天麻、茯苓末，以膏和丸，如梧桐子大，每服百丸，白湯下。○治産後血風眩暈，用荆芥八兩，當歸、川芎各二兩，共爲末，每服三錢，白湯調服。○又方用荆芥搗汁，加童便少許

立甦血暈。○治中風口噤，用荆芥穗爲末，白湯調服三錢，立效。○治風痰卒時仆厥，痰涎壅塞，用荆芥、殭蠶、全蠍、膽星、半夏、陳皮各一錢，煎服。○治小兒卒患驚風，手足搐搦，目睛不正，用荆芥、殭蠶、膽星、半夏、天竺黃、川黃連、薄荷、鈎藤。○治肝經風熱，眼澁流淚，用荆芥、玉竹、防風、草决明、川芎、白芷、生地、牡丹皮。○治風濕熱蒸，肌膚成疸，用荆芥、蒼朮、茵陳、防風、猪苓、茯苓、黑山梔、川黃連。○治熱風斑疹，用荆芥、玄參、黃芩、防風、羌活、薄荷、桂枝減半。○治痘瘄已出未透，用荆芥、蟬退、牛蒡子、桔梗、甘草、川芎、山查、防風（痘加紅花[illegible]　瘄加黃連石膏）。○治一切瘡疥，用荆芥、金銀花、土茯苓等分爲末，熟地黃蒸膏爲丸，梧子大，每早晚各服百丸，茶酒任下。○治腸風便血，不拘糞前糞後，用荆芥炒黑、槐花炒、蒼朮米泔浸、熟地黃酒蒸、北五味炒各等分，炮薑減半，共爲末，煉蜜丸梧桐子大，每早服五錢，白湯下。○治女人血崩不止，用黑荆芥、牡丹皮、玄胡索醋炒、人參、當歸、川芎、白芍藥、甘草、熟地黃各等分，水煎服，或作丸亦可。○治男婦血淋尿血，用荆芥、牡丹皮、茜草、川黃連、薄荷、生地黃、甘草等分，煎服，或作丸亦可。○治吐血衂血暴出不止，用荆芥四兩，生地黃三兩，白芍藥一兩，水十碗，煎三碗，徐徐服。○治産後衂血，用荆芥，水煎，童便和服。○治婦人産後中風口噤，手足瘈瘲如角弓，或産後血暈，不省人事，四肢强直，或

心眼倒築，風縮欲死，或兼吐瀉，用荆芥穗微焙爲末，每服三錢，童便調服。口噤則挑齒灌之，齒噤則灌入鼻中，其效如神。大抵産後虛甚，則汗出而腠理疏，易于中風也。○治産後迷悶，因怒發熱而得者，用荆芥穗半炒半生爲末，童便調服二錢。若角弓反張，用豆淋酒下，或童便煎服，極妙。蓋荆芥乃産後要藥，而角弓反張乃婦人急候，得此證者，十存一二而已。○倒換散，治癃閉不通，小便急痛，無問久新，用荆芥、大黃爲末等分，小便不通，大黃一錢，荆芥二錢；大便不通，荆芥一錢，大黃二錢，白湯調服。○治瘰癧潰爛，牽至胸前兩腋，塊如茄子大，或牽至肩上，四五年不能瘥者，其項不能回顧，用此數日

減可。如瘡爛破者，用荊芥根下一段，剪碎煎沸，待溫洗，良久，看破爛處紫黑，以針一刺去血，再洗三四次愈。用樟腦、雄黃等分，爲末，麻油調，鵝羽掃上，出水，次日再洗再掃，以愈爲度。○（普濟方）治小兒痫風寒煩熱，有痰不省人事，用荊芥穗五錢，焙爲末，加片腦五釐，每用薑湯調服五分。

○治腸風便血，不問新久，及糞前糞後，皆可服。用荊芥四兩，炒黑，槐角三兩，蒼朮米泔水浸炒，黃柏、防風、當歸、川芎、懷熟地、山茱萸肉、白芍藥各二兩，升麻、細辛各八錢，分作十劑，每劑加蓮子十枚，水二碗煎八分，食前服。

○治婦人腸風便血，用荊芥四兩，炒黑，當歸、川芎、白芷、牡

丹皮、川續斷、白朮、黃耆、香附、童便浸，曬乾，白薇、杜仲各二兩，共爲末，煉蜜丸，每服三錢，食前白湯送下。

治脫肛，翻出不收，有寒有熱。凡瀉痢內熱氣虛，或老人氣血虛憊，或產婦用力過度，或小兒臟氣不足，氣陷不舉，俱有脫肛證也。以參耆湯加減，用荊芥、人參、黃耆、當歸、生地黃、白朮、白芍藥、茯苓、升麻、桔梗、陳皮各一錢，甘草五分，黑棗頭十個，水煎服。內熱加黃芩、黃連各一錢，內寒加乾薑、肉桂各一錢二分。小兒減半。

紫蘇，味辛甘，性溫，無毒。升也，陽也。入手少陰、太陰，足陽明經。（李時珍先生曰：紫蘇處處有之，喜生水旁。春二月以子種，或子著地間，次年自發。莖方，葉圓，葉有尖，遶作鋸齒。肥地者其葉面背色俱紫，瘠地者僅背紫而面青。七八月開花，紅紫色，成穗作房，結實如芥子，臭香色褐。之綫液作油，甚甘美，燃燈極明亮也。若葉面背俱色白者，即荏也，名白蘇也，子不甚香，而葉顛亦若紫而青背白者，即薺苧也，葉上有毛而氣臭。又有魚蘇，即佳卑同類，狀似茵陳，葉大而香，吳人用煮魚食。又有雞蘇，名回回蘇，莖葉俱紫，葉邊鋸齒極細密，葉面縱紋如剪綵狀，苑如雞冠，因名雞蘇，即紫蘇之同種而異形者，治療諸疾亦相同也。凡用蘇，五月采葉，七月采莖，九月采實，各取得氣之全。今市中蘇葉多霜後採取，此已藁之本氣味俱失，効不及也。○夏月取紫蘇嫩葉，日乾，和鹽糖梅滷作菹食，甚香美，可充茶餌。）

○紫蘇，散寒氣，清肺氣，寬中氣，安胎氣，下結氣，化痰氣，乃治氣之神藥也。蘇者，疏也，舒暢鬱蘇之謂也。一物有三用焉。如傷風傷寒，頭疼骨痛，惡寒發熱，肢節不利，或

腳氣疝氣，邪鬱在表者，蘇葉可以散邪而解表；氣鬱結而中滿痞塞，胸膈不利，或胎氣上逼，腹脇脹痛者，蘇梗可以順氣而寬中；設或上氣喘逆，蘇子可以定喘而下氣；痰火奔迫，蘇子可以降火而清痰。三者所用不同，法當詳之。

茹真仲先生曰：紫蘇葉味辛，入氣分；色紫，入血分。氣香入脾胃，性溫去寒痰，體輕則行陽道。用散則發鬱滯。故同橘皮、砂仁，則行氣溫中；同當歸、川芎，則和血散瘀；同蒼朮、白朮，則健脾散濕；同防風、前胡，則發汗解肌；同荊芥、薄荷、升麻，則升達巔頂之陽；同連翹、木香、黑山梔，則

啓拔沉滯之鬱。乃宣通四旁之藥也。但其氣味芳辛而溫，其陽和之性，善發散解肌出汗爲治功。若屬陰虛因發寒熱，或惡寒及頭痛者，愼勿投之。以病宜斂宜補故也。火升作嘔作喘者，亦不宜用。惟可用子。如腸滑氣虛者，子亦勿用。

○集方治傷風（[illegible]）傷寒，頭疼骨痛，惡寒發熱，或腳氣病氣類傷寒者，用紫蘇葉、羌活、前胡、防風、厚朴、乾葛。腳氣加木瓜、山查、玄胡索。疝氣加青皮、木香、小茴香。○治霍亂（肘後方）脹滿，未得吐下，用生紫蘇，搗汁飲之。或乾蘇葉，煮汁冷飲亦可。○治中氣（[illegible]）不運，胸膈不利，或腹脇脹痛，或胎氣不安，用蘇梗爲藥，柴胡、白朮、茯苓、陳皮、黃芩、砂仁。○治上

氣（[illegible]）喘急，痰咳不利，用蘇子、白芥子、杏仁、橘紅、半夏麴、川貝母、白前、茯苓、黃芩、天花粉。元氣虛者，加人參、白朮、麥門冬。○治氣虛（[illegible]）發喘，用蘇子合四君子湯。○治陰虛（[illegible]）發喘，用蘇子配六味地黃湯，加麥冬、知母。○治上氣（[illegible]）欬逆，用紫蘇子入水研，濾汁，同白米煮粥食。○治風濕（[illegible]）腳氣并一切冷氣，用紫蘇子、良薑、陳皮等分，蜜丸梧子大。每服五十丸，空心酒下。○治大腸（濟生方）風閉不大便，用紫蘇子、麻子仁各一升，微炒，杵，以生絹袋盛，以白湯絞汁，煮續飲之。

荏（白蘇）味辛苦，性溫，無毒。入手足太陰經。（即蘇之色白者，別錄主欬逆下氣，溫中，去臭氣。今人多以此爲充紫蘇入發散藥，大謬，不可不辨。）

薺薴味辛苦，性溫，無毒。入手足陽明經。（即蘇之色青者，陳藏器主冷氣泄痢，除胸中酸水。）

盧不遠先生曰：三蘇同一種類，但有家蒔野生，及色香氣味之殊，故主治功力，似異而同也。皆宜于水，質都柔潤，雖色香氣味稍分厚薄，而辛溫芳烈則一。嘗以本經紫蘇爲正，顧蘇之有荏有薺，若朮之有蒼有白也。

薄荷，味辛甘苦，氣香涼，性溫燥，無毒。氣味俱薄，浮而升，陽也。入手太陰、少陰經氣分藥也。（李時珍先生曰：薄荷多栽蒔，亦有野生者，莖葉氣味皆相似也。經冬根不死，二月抽苗，清明分株排種，方莖赤節，兩葉對生，初則圓長，久則葉尖，略漸銳，似荏蘇葉背。夏秋采取，日曬乾用。先期以糞水澆灌，候雨後刈收，辛香殊絕，不爾氣味不辛涼也。○蘇氏曰：薄荷處處有之，惟蘇州產者莖小葉細，香勝諸方，宛如龍腦，即稱龍腦薄荷。江右者莖肥，蜀漢者更肥大，葉總不及蘇產者良。吳越川湖以之代茗。一種葉圓小如錢，稱金錢薄荷，兒科多用之。一種葉小耐霜雪，至冬莖葉純紫，生江南山石間。一種胡薄荷，形狀無異，但味小別，多生江浙。新薄荷同薤作齏，清爽可口。瘦弱人久食，動消渴病。新病瘥人勿食，令虛汗不止。貓食之醉，若貓薄荷猶酒也。）

○薄荷辛涼發散，清上焦風熱之藥也。主傷風咳嗽，熱壅痰盛，目風赤隱澀腫痛，賊風關節不利，頭風頭皮作疼，驚風壯熱搐搦，喉風咽痛腫閉等病。蓋辛能發散，涼能清利，專于消風散熱，故入頭而眼、耳、咽、喉、口、齒諸經，及小兒驚熱風痰爲要藥。唐本草主賊風傷寒發汗惡風，心腹脹滿，霍亂宿食不消等疾，亦取辛涼香散之意云爾。如病人汗多表虛者，咳嗽因肺氣虛寒而無熱者，陰虛發熱盜汗，并氣虛血虛頭痛者，皆不宜用。

繆仲淳先生曰：薄荷，食療方謂能去心家熱，故爲小兒驚風風熱家爲要藥。辛香走散，又主傷風頭腦風，通關節，故逐賊風發汗者，風從汗解也。

盧不遠先生曰：氣溫性涼，具轉夏成秋，爲高爽清明之象，則氣有餘，自與薄弱虛寒、陰營不足者不相類也。第氣炎爍鑠傷陽明之上爲病，併在所忌。

沈則施先生曰：輕清涼薄，慮揚上達，故能去高巔及皮膚風熱。又能引諸藥入營衛，故能發散風寒，行關節而祛賊風。

○集方：治咽膈不利，風熱痰結。用薄荷爲末，煉蜜丸芡子大，每噙化一丸。○治肺傷風熱，咳嗽痰盛。用薄荷五錢，杏仁、蘇子、前胡、桑皮、桔梗、荊芥、黃芩各一錢，水煎服。○治風熱侵肝，眼赤弦爛。用薄荷、荊芥、防風、甘草、柴胡、生地黃煎服。外用薄荷葉以生薑汁浸一宿，曬乾爲末，研用一錢，沸湯泡洗。○治風入筋骨關節，疼痛或成痿痹。用薄荷葉四兩，萆薢、威靈仙、金銀花、虎骨、當歸、羌活、獨活、桑寄生、二蠶沙、白术、黃芪各二兩，草烏八錢，炒黃，浸酒服。○治頭風頭痛。用薄荷葉、天麻、真川芎、當歸、熟山梔、膽星、防風各等分，水煎服。○治小兒驚風壯熱搐搦。用薄荷葉、荊芥、殭蠶、膽星、半夏、天竺黃、川黃連、鉤藤、前胡。○治咽喉急風，腫閉不通。先以米醋汩漱，吐去涎痰，隨用薄荷、荊芥、桔梗、甘草、射干各等分，水煎服。○治大麻風及紫雲風。用薄荷、漆葉、苦參、胡麻仁、荊芥穗、生地黃、皂角刺、刺蒺藜。○治中風失音不語，痰壅。用薄荷搗自然汁灌之，立甦。○治瘰癧結核，未破或破。用薄荷二觔，取汁；皂莢二挺，水浸搗取汁，同熬膏。用青皮、黑牽牛半生半燒、皂莢仁各一兩，連翹五錢，共爲末，和入薄荷皂莢汁膏內，每早晚各服十茶匙，白湯化服。○又方用

薄荷、川貝母、荆芥穗、肥皂肉各一兩，斑猫去頭翅八錢，每服六分，治瘰癧神效。○治血痢不止，用薄荷煎湯頻飲之。

○治一切面上諸病，用薄荷、防風、連翹、白附子、白芷、川芎、甘草、升麻各一錢，細辛五分。面上生瘡者，上焦火也，加黑山梔、黄芩。面紫黑者，陽明風痰也，加葛根、半夏。面生粉刺者，肺經鬱火也，加貝母、桔梗、桑皮、荆芥、苦參。面熱者，陽明經風熱也，加葛根、荆芥、黄連、黄芩、白芍藥、犀角屑。○治面上酒皶紅紫，腫而有刺者，陽明經風熱有蟲也，用薄荷末三錢，半夏、硫黄、枯礬、雄黄、鉛粉各一錢，小麥麪二匙，水調敷患處。○治面上并鼻準有赤皰者，三陽風毒內蘊也，用薄荷末、蜜陀僧共六錢，爲細末，臨臥以人乳調敷面上，次日洗去，五六次即愈。○治面上生癬或黑紫癜點，用薄荷、白附子、蜜陀僧、白芷、官粉各八錢，共爲細末，以白蘿蔔煎汁洗面，後用羊乳調成膏，敷患處，早晨洗去。○治口瘡疼痛，或口舌腫大，或破裂，俱屬三焦火盛，用薄荷、連翹、山梔、黄芩、生地黄、當歸、白芍藥各一錢，黄連、甘草各八分，燈心三十根，食鹽三分，水煎服。○治口舌生瘡糜爛，痛不可忍，用薄荷三錢，黄連、黄栢、細辛、炮薑各一錢，共爲細末。先用苦茶洄口，後添藥於患處，或吐或嚥不拘。

鬱金。味苦辛，性溫，無毒。氣味俱薄，陰也，降也。入酒亦能升。入手少陰、足厥陰、足陽明經。

（李時珍先生曰：鬱金出大秦國及西戎，今蜀地、廣南、江西州郡亦有，不及蜀中者佳。四月生苗，叢類似薑黄，秋末復從莖心抽莖，黄花紅質，亦有白花紅質者，不結實。根如指頭，長寸許，體圓無枝，兩頭尖長，寬如蠟殼核也。剝之外黄內赤，芳香可愛。修治：取根下四畔子根，去浮皮用。○朱氏曰：鬱金無香而性輕陽，能致達逆氣于高遠。古人用治鬱遏不能升者，恐命名因此也。浸水染衣，其鮮麗微有香氣，經久不變其色。或云形如蜚蠊，兩頭尖，面有横紋如蟬肚者是。薑黄非鬱金也。）

○鬱金清氣化痰，散瘀血之藥也。其性輕揚，能散鬱滯，順逆氣，上達高巔，善行下焦，爲心肺肝胃氣血火痰鬱遏不行者最驗。故治胸胃膈痛，兩脇脹滿，肚腹攻疼，飲食不思等證。又治經脉逆行，吐血衄血，唾血血腥。此藥能降氣，氣降則火降，而痰與血亦各循其所安之處而歸原矣。前人未達此理，乃謂止血生肌，錯謬甚矣。凡病屬真陰虛極，火亢吐血，溢出上竅，而非氣分拂逆，肝氣不平者，不宜用也。如脹滿如膈逆，如疼痛關乎胃虛血虛者，亦不宜用也，即用之亦不效。

○集方：治心胃作痛，因寒者，用鬱金、木香、莪术各等分，白湯磨服。○治婦人脇肋脹滿，因氣逆者，用鬱金、木香、莪术、牡丹皮，白湯磨服。○治肚腹攻疼，因血滯者，用鬱金、木香、莪术、玄胡索，白湯磨服。○治胃氣不和，停痰停火，飲食不思，用鬱金、川黄連、木香、白芥子、紅麴、麥芽、茯苓、甘草、白术。○治經脉不和，逆行于上，或吐血衄血，用鬱

金、木香、烏藥、牡丹皮、玄胡索，白湯磨服。○治男婦失心癲狂，用鬱金二枚，明礬泡湯磨服。此因驚憂痰血絡聚心竅所致。鬱金入心，去惡血；明礬化頑痰故也。○治蠱毒中人，嶺南之處有之，于飲食行蠱法也。初覺腹中微痛，次日刺人，十日則猶魚蛇蟲之蠱生在腹中也。凡覺胸膈脹痛，即用升麻煎汁，或膽礬泡湯吐之。若膈下痛急，以米湯調鬱金末二錢服，即瀉出惡物。或合升麻、膽礬同服，吐瀉並作。昔李巽巖爲雷州推官，鞫獄得此方，活人甚多也。○治怒傷肝，吐血、衄血，用鬱金、當歸、牡丹皮、生地黃、韭菜煎汁，調降香末服。○治痘疹始有血泡，忽搐入腹，漸作紫黑色，無膿，日夜叫喊，用鬱金二枚，甘草一錢，水一碗，煮乾，去甘草，切片，微火烘燥爲末，入真冰片五分。每用一錢，以生豬尾血五七滴，和新汲水七八匙調下。不過二服，甚者毒氣從手足心出，如癰狀，乃瘥。此乃九死一生之候也。

蒁黃，味苦辛，性燥而溫，無毒。陰中陽也，降也。入足太陰、厥陰經。

蘇氏曰：蒁黃出西番及海南，今江廣川蜀亦有。葉莖都類鬱金，其花春生，色紅白，與苗並出，即綴根際，入夏即爛，亦不生子。葉如紅蕉，色青綠，長一二尺，闊三四寸，上有斜文，枝莖堅硬。根盤圓匾而扁，似薑而小，色一頭有節，味苦臭重，爲別異也。辨之鬱金，根形雖圓，無蘆技形狀，如榧子肉，兩頭頗尖，隱隱有節稜，黃赤，傳染滲木，並堪染色。若裴朮色白微青赤，無氣臭。蘇氏言與婦稱者謬矣。○倪朱謨曰：蒁黃色比鬱金甚黃，形較鬱金稍大。鬱金味苦寒，色赤，形如蠶繭而圓尖。蒁黃味辛溫，色黃，似薑瓜而圓大。鬱金最少，蒁黃常多。今市家惟收多者欺人，謂原本一物，當大者爲蒁黃，小者爲鬱金，誤極矣。近時有偏如乾薑形者，爲片子蒁黃，功用同等，治臂痛更有効。

○蒁黃破血氣，利筋脈之藥也。其味苦辛，其性燥利。辛能散，苦能泄，燥利能行，故日華子治癥瘕血塊，腹中停痰，善通月經，及跌撲瘀血。蘇氏治氣脹，及產後敗血攻心。蓋氣分走氣，入血分行血。古方同肉桂、枳殼治兩脇痛、兩臂痛有効。何莫非下氣破血，辛走苦泄之功歟？察其氣味治療，乃介乎鬱金、京三稜之中也。但其性燥烈，消耗有損無補。凡病血虛臂痛，血虛腹痛，而非瘀血凝滯，氣逆壅脹者，切勿亂投，悞投則愈傷血分，令病轉劇，慎之慎之。

葉正華先生曰：其形似薑，其色純黃，故名。雖爲破血通瘀，導奪土鬱者也。然功力固烈于鬱金，但鬱金泄金鬱，蒁黃奪土鬱，爲別異耳。

○集方（曾氏方）治一切積血在腹中作痛，用蒁黃、歸尾、牡丹皮、生

脨。生地黃。玄胡索。肉桂。香附子。○治跌撲（[illegible]）瘀血，或痛或腫，疼痛不已。用蒲黃、蘇木、歸尾、紅花、大黃、乳香、沒藥。○治產後（[illegible]）敗血攻心，胸脇脹滿，煩悶嘔惡。用蒲黃、玄胡索、沒藥、硫黃、火硝二味，醋炙乾。各等分，共爲末。每服二錢。白湯化下。○治中寒（[illegible]）心痛難忍。用蒲黃一兩，肉桂二兩。共爲末。醋湯調服一錢。○治產後（[illegible]）血痛有塊。用蒲黃、肉桂、五靈脂，各等分爲末，酒調方寸匕。血下盡即愈。○治兩脇痛（[illegible]）有血瘀氣滯者。用蒲黃、柴胡、紅花、蘆薈、白芥子。各等分。○治臂（[illegible]）痛有血瘀氣滯者。用蒲黃、柴胡、桂枝、白朮、威靈仙、白芷、甘草，各等分。

○治耳（[illegible]）邊發腫，連太陽腮齒俱痛，不可忍。用蒲黃、青木香、檳榔各三錢，大黃一兩，共爲細末，米醋和蜂蜜調勻，敷患處，中留一孔出氣。

本草彙言卷之三

錢塘　倪朱謨純宇甫集選　男倪洙龍冲之氏藏稿
沈　琯西璵甫校正

草部（濕草類上）

菊花　味苦甘辛，氣溫微寒，可升可降，陰中微陽。入手足太陽、陽明、少陽、太陰、少陰、厥陰，十二經。

（陸氏埤雅云：菊本作蘜。蘜，窮也。月令九月菊有黃華。華事至此而窮盡，故謂之蘜。蘇氏曰：生南陽山谷及田野間。宿根再發，初春發苗，清明前三日分種，喜向陽。葉莖花根種種不同，即菊譜所載，凡百餘種，亦不能盡收也。其莖有株蔓，紫赤青綠之殊；葉有大小厚薄尖圓之辨；花有大朵小朵，千瓣單瓣，有心無心之異；色有黃白紅紫正間深淺之別；味有甘苦辛酸，蒿腥之辨；又有夏秋冬菊三時之殊。取用其色不拘黃白，惟以單瓣味甘者入藥，即菊譜所載鄧州黃、鄧州白者是矣。始生山野，今則人家栽植之。其花細小，單瓣，品不甚高，蕊如蜂窠，又

種開小花，瓣下如小珠子，入藥亦佳。正月采根，三月采葉，五月采莖，九月采花，修治惟陰乾用。○菊類繁多，惟紫莖氣香，葉厚至柔，嫩時可食，花微大，味甚甘者爲眞。隨可入藥，一種莖青肥大，葉似蒿艾，花小，味極苦者，名爲苦薏，供服損人元氣。與甘菊花大不同也。）

○甘菊花，祛風清熱（[illegible]），養肝明目之藥也。此得天地清陰之氣，獨稟金精，專制風木，故爲去風要藥。觀夫風邪爲病，先入乎肝，肝開竅于目，又風爲陽邪，勢先走上，又熱甚則生風，風火相搏，爲頭風頭痛，眩暈懸旋，爲目睛遮障，畏風羞明，或腫痛難開，或珠脹欲脫，或胞沿浮爛，或淚流不止。菊能清風清熱，養血養肝，故頭目諸疾所用必需者也。本草又謂解疔腫，去濕痺，散遊風，丹毒疔腫丹疹，風火之毒也；遊風濕痺，濕熱之證也。菊花清陰純

潔得木體之柔。順受金制。木平風息。疔丹癰風之疾自渙然消釋　若氣虛胃寒。食少泄瀉之病。宜少用之。與溫補之類同用。無傷也

李時珍先生曰。菊花發生于春。長養于夏。秀英于秋。含章于冬。備受四氣。飽經露霜。葉枯不落。花槁不零。味甘兼苦。性稟中和。昔人謂其能除風熱。益肝補陰。蓋不知其得金水之精英尤多。能益金水二藏也。補水。即所以制火。益金。即所以平木。木平則風息。火降則熱除。用治諸風頭目。其旨深微。黃者入金水陰分。白者入金水陽分。紅者。行婦人血分。皆可入藥。神而明之。存乎其人。其苗可蔬。葉可啜。花可餌。根實可藥。囊之可枕。釀之可飲

自本至末。罔不有功。宜乎前賢比之君子。神農列之上品也。

金靈昭先生曰。頭風者。本于風寒。入于腦髓也。蓋頭爲諸陽之會。其人素有痰火。風寒客之。則熱鬱而悶痛。雖有偏正之殊。不外痰火之證。菊花性稟秋清。火痰風鬱。七劑自通。間有氣虛血虛者。耆朮歸芎。一任加入。

○集方。治風熱頭痛。用甘菊。川芎。荆芥。黃芩。薄荷。連翹。玄參。生地黃。柴胡。羌活。甘草各三錢。爲末。每服一錢。茶調下。再飲童便一鍾更妙。○治血虛風熱頭風頭痛眩暈。用甘菊花三錢。當歸。天麥門冬。生熟地黃。川芎。防風。荆芥。天麻。藁本。白芍藥。白芷各減半。如有痰結而作者。本方加薑水浸半夏。膽星。白芥子各二錢。○治目睛遊障羞明。用甘菊花。防風。木賊草。白芷。柴胡。草決明。穀精草。○治目睛腫痛難開。暴發者。用甘菊花。玉竹。防風。白芷。荆芥。薄荷。草決明。龍膽草。赤芍藥。○治目病珠脹欲脫。用甘菊花。玉竹。防風。荆芥。蟬蛻。白芷。○治淚流不止。胞治作痒。用甘菊花。密蒙花。白芷。防風。荆芥。羌活。○治老人虛人。氣血兩虛。目睛昏暗不明。用甘菊花。牛膝。枸杞子。懷熟地。川椒。山茱萸。牡丹皮。澤瀉。○治肝腎俱虛目痛。用甘菊花三錢。熟地黃。黃柏。枸杞子。白蒺藜。北五味子。山茱萸肉。當歸。白芍藥。羚羊角屑各二錢。如有翳障。本方加草決明。木賊草。穀精草。柴胡各一錢五分。水煎

服十劑。効。或用十劑料作丸。每食後服三錢。白湯送亦可。○治風熱目痛。用甘菊花二錢。川黃連。玄參。甘草。生地黃。荆芥穗。草決明。連翹。柴胡。川芎。桔梗。蒼耳子。羌活。各一錢。水煎服。沖童便半盞更妙。○治無名疔腫。用甘菊花一握。紫花地丁。半枝連。益母草。金銀花。夏枯草。各二兩。搗汁。再以貝母。連翹。天花粉。共爲細末。用諸汁調服。如無生葉搗汁。隨用乾者。共九味。煎服亦可。○治四肢濕痺痛難動履。用甘菊花。萆薢。枸杞。杜仲。白朮。薑黃。半枝連。獨活。當歸。秦艽。豨薟草。各二兩。草烏八錢。酒炒。○治赤遊風丹毒。用甘菊花。防風。白芷。赤芍藥。菉豆。金銀花。半枝連。各等分。水煎服。須用磁鋒。砭去惡血爲妙。

○治終身無目疾，兼不中風，及生疔疽。用甘菊花、枸杞子，相對蜜丸，每早服五錢，白湯過，久久有効。

野菊花，名苦薏。葉莖花根，味苦辛，氣涼，有小毒。薏乃蓮子之心，此藥味苦似之，故名。

藏器陳氏曰：苦薏生澤畔，處處原野山陂極多，莖如馬蘭，花如菊，但葉薄而多尖，花小而蕊多，如細蜂窠狀，味極苦辛，氣甚慘惡。

○野菊花，破血疏肝，解疔散毒之藥也。主婦人腹內宿血，解天行火毒丹疔，搗汁和生酒服之，或取滓敷罯亦効。煮湯洗瘡疥，又能去風殺蟲。但性寒味劣，無故而飲，有損胃氣，非若甘菊花有益血脉，和腸胃之妙也。

○治腸風下血。用野菊花二錢，黃耆、白芍藥、麥門冬、當歸、地榆各四錢，甘草、人參、白芷、北五味、黑荊芥各二錢，河水二大碗，煎七分，食前服。服六七劑全愈。○又方治腸風，用野菊花六兩，曬乾，炒成炭，懷熟地八兩，酒煮搗膏，炮薑四兩，蒼朮三兩，地榆二兩，北五味一兩，煉蜜爲丸，梧桐子大。每服五錢，食前白湯送下。

艾葉，味苦，氣溫，無毒。可升可降，陰中之陽。入足太陰、少陰、厥陰經。（李時珍先生曰：艾可乂疾，久而彌善，故字從乂。削冰令圓，舉而向日，以艾承其影則得火。凡醫家用此草灸百病。所在處處皆有，或生山原，或生田野。二月宿根生苗，其莖直上，高四五尺。其葉四佈，狀如蒿，分爲五尖，椏上復有小尖，面青背白，有茸而柔。七八月葉間出穗，如車前穗，細花，結實累累盈枝，中有細子，霜後始枯。宋時以湯陰複道及寧波者佳。自明成化以來，則以蘄州者爲勝。又以陳久者更良。五月五日連莖刈取，暴乾，揀摘淨葉，揚去塵屑，入石臼內，木杵搗熟，羅去渣滓，再搗如綿，則灸火得力。如入丸散，將茯苓作片同研，即時可作細末。亦一異也。）

○艾葉，煖血溫經、行氣（李）開鬱之藥也。主婦人（集）血氣久冷，肚腹作痛，或子宮虛寒，胎孕不育；或寒氣內襲，胎動不安；或濕熱內留，白帶淋瀝，腰脊痠疼；或男子風鬱大腸，下痢膿血，及腸風便血諸證。又燒則熱氣內行，通筋入骨，走脉流經，故灸百病，開關竅，醒一切沉痼伏匿內閉諸疾。若氣血痰飲積聚爲病，哮喘逆氣，骨蒸痞結，癱瘓癰疽，瘰癧結核等疾，灸之立起沉痾。若入服食丸散湯飲中，溫中除濕，調經脉，壯子宮，故婦人方中多加用之。揉碎入四物湯，安胎漏腹痛；搗汁和四生飲，止嘔血吐血衄血也。日華子又謂能利陰氣，保胎娠，須以之導引涼血補血藥爲宜。然性氣雖芳香烈而燥熱，凡婦人胎動不安，由于熱而不由于寒者；淋帶由于氣虛內熱，而不由于濕熱者；肚腹疼痛由于烟火石藥炙煿酒醪積熱傷腸胃，而不由于寒冷者；嘔吐衄血由于心肺暴熱

妄行。不由于陽鬱陰乘而致者。年久不孕。由于精虛血燥。血熱血少。不由于風寒入子宮者。咸戒用之。

繆仲醇先生曰。艾葉。生凉熟熱。其氣芳烈。性能開達竅戶。辟除陰厲鬼邪。純陽之草也。可以取太陽眞火。可以回垂絕元陽。服之則走三陰。而逐一切寒濕冷氣。轉閉藏肅殺之氣為融和。灸之則透諸經。而治百種病邪。起沉伏之疾。其功大矣。老人丹田氣弱。臍腹畏冷者。入布囊裹其臍腹。及寒濕脚氣。亦須夾入襪內用之。夫用藥以治病。中病即止。于婦人內寒血冷。及病腹中疼痛。滯涌諸疾。以艾附丸。或歸艾、耆艾、术艾諸方。夫何不宜。若服久不輟。辛熱過偏。致使燥熱之毒。攻發為病。遂以菉

豆粥食之即解。

○集方　治婦人血氣寒冷。四肢少熱。胎孕不育。用蘄艾一觔。杵如綿。揚去塵末。弁梗。酒煮一週時。川芎、白术、當歸身。香附醋煮。各四兩。共為末。煉蜜丸。每早服三錢。○治藏氣虛冷。胎動不安。用艾葉（製法如前）、砂仁、殼。當歸、白术、川芎。阿膠各一兩。甘草五錢。分作十劑服。○治婦人白帶淋瀝。用艾葉六兩（製法如前）、白术、蒼术各三兩。俱米泔浸。晒乾炒。當歸身。酒炒。二兩。砂仁一兩。共為末。每早服三錢。白湯調下。○治男子腸風臟毒。大便下血。用艾葉八兩（製法如前）、蒼术四兩。米泔浸炒。懷熟地六兩。酒蒸搗膏。同五味子二兩。炒。共為丸。每早服三錢。白湯下。○治妊娠下血。仲景曰。婦人有漏下者。有半產後下血不絕者。有妊娠下血者。並宜膠艾湯主之。艾葉（製法如前）、阿膠、熟地、當歸各三兩。川芎、甘草各一兩。白芍藥四兩。分作十劑。每劑加阿膠。俟藥熟。投入烊化服。○治妊娠胎動不安。或腰痛下墜。或胎上搶心。或下血不止。或横生倒產。或子死腹中。用艾葉一兩（製法如前）、當歸、川芎、益母葉各五錢。水煎。少加清酒半盞服。○治產後瀉血不止。用乾艾葉一兩（製法如前）、炮薑炭一兩。水煎。一服立止。○治產後腹痛欲死。用陳艾葉一兩（製法如前）。水煎服。再用一觔。熱酒拌濕。鋪臍上。以布覆住。用熨斗火熨之。待口中艾氣出。痛自止矣。幷治中風卒病。○治背發諸毒。幷各處生毒。或一切無

頭熱腫。用艾葉（製法如前）作炷。于腫痛處灸。輕者七炷九炷。重者百十炷。不痛者灸之痛。痛者灸之不痛。其毒即消。不消。亦免內攻。此神方也。○治咽喉腫痛。以嫩艾搗汁。細嚥之。或再以渣和米醋。敷喉上。冬月以乾艾葉煎汁飲亦可。○治小兒臍風撮口。以艾葉一兩。燒灰塡臍中。以帛縛定效。○治頭風久痛。以陳艾揉為丸。時時嗅之。以黃水出為度。○中惡鬼擊。卒然着人。胸脇腹內切痛如刀刺。不可按。或吐血。或下血。或鼻中出血。以陳艾三兩。水洗淨。甘草五錢。水五升煎二升。徐徐服。○治蚘蟲攻心作痛。口吐清水。或脾胃受冷作痛。用陳艾燒存性為末。白湯調服數分。○治火眼腫痛。以陳艾一兩。燒烟

起，以盌覆之，候烟盡，取盌上煤，白湯調散，洗服即瘥。○治鵝掌風癬。（陸氏方）用陳艾四兩，水四盌，煮十餘滚，連艾并湯入瓶內，用麻布二層縛瓶口，將手心放瓶口上薰之，如湯冷再熱，如神。○治婦人面瘡，名粉花瘡。（譚氏方）以定粉五錢，菜子油調塗盌內，用艾一二團，燒烟熏之，候烟盡，覆地上一夜，取出調搽，永無瘢痕，亦易生肉。○治面上皯䵟。（外臺秘要方）用艾灰、桑灰各半升，以水五碗淋汁，再淋至三遍，煎令稠糊，每以鵝翎點少許傅之，自爛脫落，甚效。○治癰疽（直指方）年久，瘡口冷滯不合，用陳艾煎湯頻洗，自斂。○治諸蛇（集簡方）蟲咬傷，用艾炙數壯，自解。○治風蟲牙痛。（普濟方）用黃蠟少許攤紙上，鋪艾，以筋捲成筒，燒烟，隨左右熏鼻，令烟滿口，呵氣，即疼止腫消。○治遍身風麻。風麻是氣虛，宜炙用蘄艾、黃耆、白朮、陳皮、半夏、天麻、人參各二兩，茯苓、熟地黃、當歸各四兩，枸杞子六兩，俱炒燥浸酒飲。○治遍身風木。風木是濕痰死血，宜鍼用蘄艾、白朮、當歸、川芎、半夏、天麻、紅花、桃仁、蘇木、蒼朮各二兩，白芥子、殭蠶、牡丹皮各一兩，俱炒燥，草烏三錢，炒焦黃，浸酒飲。○治遍身麻痺，不能屈伸，謂之不仁，是氣血兩虛，受風濕也。用蘄艾、人參、黃耆、白朮、防風、蒼朮、當歸、熟地黃、枸杞子、川芎、秦艽各二兩，俱炒燥，土鱉蟲二十個，浸酒飲。

茵陳蒿　味苦辛，氣寒，無毒。陰中微陽，入足太陽、陽明、太陰經。

（陶隱居曰：茵陳生太山及丘陵坡岸上，今在處皆有，不及太山者佳。冬初莖枯，至初春又生，故名茵陳。苗高七八寸，似蓬蒿而葉緊細，九月作花結實，與菴䕡花實相似，亦有無花無實者。修治：以五七月葉有八角者，采莖葉陰乾，去根用。○又江寧府一種茵陳，葉大根粗，至夏作花，色黃白，結實如艾子。又和州及南山嶺谷中出一種石茵陳，今江南山石中亦有，療傷寒腦痛絕勝。今諸醫議論，謂家茵陳亦能解肌，下膈，去胸中熱煩，再詳本草正經，但以功較之，則亦稱江南者為勝，療黃疸利小便更最也。李時珍先生曰：茵陳，昔人多蒔為蔬，故入藥用家茵陳，所以別山茵陳也。今淮揚亦有野茵陳，其莖如艾，其葉如青蒿，淡色而背白，葉歧緊細而扁，九月開細花，色黃，結實亦如艾子。）

〔〕茵陳蒿　清黃疸，（本經）利小便，（別錄）為黃家君主之藥也。治風濕寒熱邪氣，熱結黃疸，小便不利，關節不通，又傷寒熱甚發黃者，每多用之。他如伏瘕水脹，及太陰裏邪，瘴瘧寒熱等疾，總屬濕熱者，無不相宜。但苦寒沉降，能清熱利濕，濕熱去則諸證自退矣。中病即已，若過用，不免有伐脾損氣之弊。

邵纖山先生曰：按黃疸之病，多起于飲食勞倦，致傷脾土，脾土不能運化，濕熱內鬱，無由發泄，流于皮肉，遍于四肢，黃色如染，淡黃易愈，深黃難愈，焦黃者死。凡抑鬱不得志之人，多生此病。雖云濕熱，不可純用寒涼，必佐之以辛甘溫散，君之以滲泄，則濕易除，熱易解，其病自愈。若純用涼藥，重傷脾土，濕熱反甚，變為水腫腹脹者，多有之矣。

沈則施先生曰茵陳芬芳疎利味苦善行邪在內者出結者散故去濕熱退黃疸也然疸證雖有五種之分同爲濕熱所成仲景方有茵陳梔子大黃湯治濕熱也茵陳梔子柏皮湯治燥熱也如苗澇則濕黃苗旱則燥黃濕則瀉之燥則潤之之意也又有陰寒發黃用茵陳附子湯蓄血發黃用茵陳桃仁湯（隨證和入可也）

○集方同防風羌活治疸黃兼風同蒼朮厚朴澤瀉治疸黃兼濕同生薑白豆仁治疸黃兼寒同川黃連龍膽草滑石治疸黃兼熱又同陳皮菊花乾薑治傷酒發黃同檳榔枳實山查麥芽治小兒食積發黃隨證加用可也

○（千金方）治遍身風癢疥瘡用茵陳煮湯洗之○（千金方）治遍身黃疸

用茵陳一把生薑五錢搗爛水煎服以渣于胸背四肢日日擦之○（同方）治壯人酒疸用茵陳四兩山梔子七箇大田螺一箇連殼俱搗爛取汁以百沸白酒一大盞沖汁飲之○（直指方）治眼熱赤腫用茵陳草車前子各等分水煎內服外洗○（河間方）治穀疸用茵陳蒼朮白朮澤瀉車前神麴紅麴麥門冬各等分水煎服○（同方）治酒色過度成女勞疸者用茵陳石斛木瓜牛膝黃蘗熱服效○（王氏正訣）又五苓散加茵陳車前總治諸疸○治濕熱發黃疸用茵陳梔子赤茯苓蒼朮各一錢滑石二錢乾薑一錢五分燈心三十發熱加柴胡一錢二分有宿食加枳實便閉結加大黃一錢

青蒿味苦氣寒無毒乃少陽厥陰血分藥也

（李時珍先生曰青蒿生華陰川澤所在有之得春最早望春便發莖如指肥葉極纖細色並青翠似茵陳蒿而背不白至夏漸高五六尺許秋深開細淡黃花花下結子如粟米莖柔韌根白硬苗葉花實並分芳功力亦相若也嫩時醋淹爲菹香凉可口沈氏筆譚云青蒿一類自有二種一黃色一青色青者入藥即農經所指青蒿亦有所別然內銀綴間見青蒿叢中時有一兩叢迥然特青如松檜翠碧可觀至秋諸蒿轉黃此蒿翠碧更倍古人取深青者爲勝此獨得蒿力之尊精者也不然諸蒿何皆不青但青而色淡耳雷公云凡使惟中爲妙到膝即仰到腰即俛使子勿使葉使根勿使莖四件若同使翻然成痼疾修事其葉或莖實用七歲兒七箇溺浸七晝夜取出晒乾用）

○青蒿清熱凉血退骨蒸勞熱之藥也（本經）此藥（日華）得初春少陽之氣以生去肝膽腎經伏熱故明目消疥退骨節間內蒸留熱熱去則血分和平陰氣日長故勞熱骨蒸專主

之也大抵諸苦寒藥多與胃氣不宜惟青蒿芬芳清潔氣先襲脾故獨宜于血虛有熱之人以其不損胃氣故爾是以蓐勞虛熱非此不除又陳氏方治傳屍鬼疰瘧痢寒熱齒痛皆本少陽木鬱火鬱之病以此芳潔苦寒之藥用相宜耳若專于真陰內損營氣衰弱成勞者當與大滋養藥同劑方善倘勞熱之人有胃虛不食泄瀉者產後氣虛內寒作瀉者咸宜戒之

陳廷采先生曰諺云三月茵陳四月蒿人每誦之疑是兩藥一種因分老嫩而異名也殊不知葉雖近似種却不同青蒿葉背面俱青且結花實茵陳葉面青背白花實全無況遇寒冬尤大差異茵陳莖除不凋至春舊榦

上復發葉。因幹陳老。故名茵陳。青蒿莖幹俱凋。至春。再從根下發苗。如草重出。發舊幹者。三月可採。產新苗者。四月纔成。是指採從先後爲云。非以苗分老嫩爲說也。綱目發明云。青蒿得春木少陽之氣最早。故所主之證皆少陽厥陰血分之病也。故治骨蒸熱勞爲最。古方每單用之。

○集方。治一切虛勞寒熱。陰虛五心煩熱。腎水真陰不足。以致骨蒸勞熱者。并除産後一切虛熱寒熱。淹延不解。用青蒿葉。鱉甲。生熟地黃。牛膝。枸杞。麥門冬。北五味子。各等分。水煎服。○治時眼赤腫。用青蒿葉。防風。連翹。甘草。荊芥。各等分。水煎服。○治瘡疥瘙痒。皮膚一切風疹

用青蒿爲末。每服三錢。白湯調服。再取葉煮湯頻洗。○治男婦勞熱肌瘦。用青蒿葉。細切一觔。水三十碗。童便五十碗。同煎。取十碗去渣。入砂鍋內煎成膏。每早服五茶匙。白湯調送。○治虛勞寒熱。肢體倦怠煩疼。不拘男婦。用青蒿成實時採之。取葉以童便浸三日。曬乾爲末。每服三錢。烏梅一箇。煎湯服。○治虛勞盜汗。煩熱口乾。用青蒿二觔。取汁。入沙參。麥門冬。各四兩。同煎。將稠濾去沙參。麥門冬。將汁熬稠糊。收貯磁器內。每早晚各服數茶匙。白湯調送。○治濕瘧痰盛。但熱不寒。用青蒿。四兩。童便浸焙爲末。每服三錢。白湯調下。○治暑瘧熱痢。用青蒿葉一兩。甘草一錢。水煎服。○治齒牙腫痛。用青蒿葉煎湯汩漱。○治鼻衄。用青蒿搗汁飲之。將渣塞鼻中。極驗。○治酒痔便血。用青蒿葉爲末。每服三錢。糞前血白湯調。糞後血白酒調服。俱食前。○治毒蜂螫人。嚼青蒿葉敷上即瘥。○治金瘡撲損出血。用青蒿搗敷之。一方用青蒿葉。陳石灰。共搗千下。晒乾爲末。臨撲損出血者。傅之即止。○治鼻中息肉。用青蒿灰。石灰。各等分。淋汁熬膏點之。即落。

青蒿子。味甘。氣寒。無毒。陰乾。研成細末。空心每服二錢。白湯調服。治積熱眼澁。久服明目。可夜看書。并治虛勞瘦弱。

黄花蒿。俗名臭蒿。與青蒿相似。色綠帶淡黄。氣腥臭。不可

食。人家采以罨醬黄酒麴者是也。味辛苦。氣寒。無毒。煮汁治小兒風寒驚熱有驗。其子味性。與黄蒿同。但下氣消痰服更殊捷爾。

白蒿。味辛。氣平。無毒。生中山川澤。先諸草發生。葉似細艾。粗于青蒿。上有白毛錯澁。從初生到秋。白于衆蒿。主風寒濕氣成痺成脹成疸成痢成膈噎。成癩癬諸疾。并解河豚魚毒。神農列白蒿于上品。有功無損。而古今醫家不知用。惜哉。

周氏曰。白蒿香美可食。今人以白蒿誤指爲茵陳。但茵葉相似。實非也。○李氏言白蒿有水陸二種。本草所用蓋取水生者。故曰生中山川澤。不曰山谷平地也。二種

形狀相似。但陸生辛薰，不及水生者香美爾。詩云：呦呦鹿鳴，食野之苹。食野之蒿。苹，即蒿之初生大者，青色白莖鮮嫩時也。蒿即苹之長大，至秋老成衰變時也。鹿食九種解毒之草，白蒿其一也。詩云：于以采蘩，于沼于沚。左傳云：蘋蘩薀藻之菜，可以薦于鬼神，羞于王公。並指水生白蒿而言。則爾雅之皤蒿為白蒿無疑矣。

劉氏禹錫曰：白蒿即蓬蒿，可以為蔬，生挼醋淹為葅食之，益人。曝乾釀酒，治痿痺腳氣及惡瘡癩疾遍體頭面俱生者，為末，白湯調服一二錢。治濕熱脹滿，搗汁可退黃疸并熱厥心痛，赤白痢疾。熬膏燥窨收，可治膈噎。

蒿類繁多，難以盡收。除青蒿、黃蒿、白蒿外，又有角蒿、廩蒿、馬矢蒿、牡蒿、邪蒿諸種類。本書所選只取青黃白三蒿，其餘無所要用，姑刪去之。

○續補集方：治中暑，用青蒿嫩葉搗爛，手撚成丸，黃豆大，新汲水吞下數丸，立愈。

益母。（古名茺蔚）味苦甘，微辛，氣溫，無毒。陰中之陽，手足厥陰經藥也。為婦人產後血分之要劑，當以童便酒煎。

（李時珍先生曰：古方用實，今方用葉，蓋茺蔚專精在實，取充盛密蔚之義。其功宜于婦人胎產、眼目，故有益母之稱。生江海湖濱地，澤及園圃田野，近水濕處甚繁。春初生苗，如嫩蒿。入夏漸長，至三四尺，莖方，有四稜，如黃麻莖。葉有尖岐，如艾葉。莖有節，寸許，節節生穗，叢簇抱莖。四五月間，穗內開小花，紅紫色，亦有白色者。每萼內有細子四粒，似蒿子，黑褐色，有三稜。藥肆往往作巨勝子貨之。其草生時有臭氣，夏至後葉莖皆枯，其根白色。雖有白花、紅紫花二種，葉莖子穗皆同，但白者入氣分，紫紅者入血分，別而用之可也。入藥取葉，以酒拌蒸曬乾用；取子微炒黃，舂簸去殼取仁用。）

○益母草，行血養血，行血而不傷新血，養血而不滯瘀血，誠為血家之聖藥也。（李時珍）婦人臨產之時，（方吉人稿）氣有不順而迫血妄行，或逆于上，或崩于下，或橫生不順，或子死腹中，或胞衣不落，或惡露攻心，血脹血暈，或瀝漿難生，或溲溢不下，或嘔逆噁心，煩亂眩暈，是皆臨產危急之證。惟益母草統能治之。又瘡瘍科以之消諸毒，解疔腫癰疽，以功能行血而解毒也。眼目科以之治血貫瞳人及頭風眼痛，以功能行血而去風也。習俗以益母草有益于婦人，專一血分，故屢用之。然性善行走，能行血通經，消瘀逐滯甚捷。觀其治疔腫癰疽、眼病血障，則行血活血可知矣。產後諸疾，因血滯氣脈不和者，用之相宜。若執益母之名，施于胎前之證，血虛形怯，營陰不足者，肝虛血少，瞳人散大者，血脫血崩，陽竭陰走者，槩而與之，未嘗不取咎也。

陳廷采先生曰。益母草活血行氣。有補陰之功。凡胎前產後。有所恃者血氣也。胎前無滯。產後無虛。用此以其行中有補。補中有行。故有益母之稱。子名茺蔚。益肝膽。有明目之功。潤腎髓。有益精之力。利水實脾。調經順脉。功兼該矣。

紅娘婦家寶方云。益母草苗葉莖根花子。取全體總用。酒浸蒸晒乾。搗極爛。再碾為末。煉蜜丸如彈子大。治胎前安生胎。去死胎。治產後行瘀血。生新血。又明目精。散水蓄。消丹疹。破乳癰。止尿血。利小便。功全備矣。

繆仲淳先生曰。茺蔚草。味陰而氣陽。輕潔之品。補而能行。辛散而兼潤者也。于婦人氣分血分諸病。頗宜。

○集方濟陰返魂丹。治婦人胎前產後。危急諸證。用益母草。紅紫花者。端午小暑。或六月六日。或七月七日。連根收采。陰乾。以石器內碾為細末。煉蜜丸如彈子大。隨證嚼服。用白湯送。其根燒存性。為末。酒服。功與黑神散等。其藥不限丸數。以病愈為度。或丸如梧桐子大。每服百餘丸。又可搗汁濾淨。熬膏服之。○治胎前臍腹痛。或作聲者。米飲下。○治胎前產後。臍腹刺痛。胎動不安。下血不止。當歸湯下。○治產後。以童子小便化下一丸。能安魂定魄。血氣自然調順。諸病不生。又能破血痛。養脉息。調經絡。並溫酒下。○治死胎不下。及橫生不順。胞衣不出。或經閉脹滿。心悶心痛。並用炒鹽湯下。○治產後。血暈眼黑。血熱口渴。煩悶。如見鬼神。狂言不省人事。以童子小便和酒化下。○治產後結成血塊。臍腹奔痛。時發寒熱。有冷汗。或面垢顏赤。五心煩熱。並用童便酒下。○治產後惡露不盡。結滯刺痛。上衝心胸滿悶。童便酒下。○治產後瀉血水。以棗湯下。○治產後痢疾。米湯下。○治產後血崩漏下。糯米湯下。○治產後赤白帶下。阿膠艾湯下。○治月水不調。溫酒下。○治產後中風。牙關緊急。半身不遂。失音不語。生薑湯下。○治產後氣喘咳嗽。胸脇不利。惡心吐酸水。面目浮腫。兩脇疼痛。舉動失力。溫酒下。○治產後月內咳嗽。自汗發熱。久則變為骨蒸。童便下。○治產後鼻衄。舌黑口乾。童便下。○治產後兩太陽穴痛。呵欠心忪。氣短羸瘦。不思飲食。血風身熱。手足頑麻。骨節疼痛。並米飲下。○治產後大小便不通。煩躁口苦者。薄荷湯下。○治婦人久無子息。溫酒下。

治產婦一切諸病。及折傷內損。有瘀血。每天陰則痛。神方也。三月采益母草。連根葉莖花。水洗令淨。于箔上攤暴水乾。以竹刀切長五寸。勿用鐵刀。置于大鍋中。以水浸過二三寸。煎煮。候草爛水減三之二。漉去草。取汁約五六斗。入盆中澄半日。以綿濾去濁滓。以清汁入釜中。慢火煎取一斗。如稀餳狀。瓷瓶封收。每取數大匙。暖酒和服。日再服。或和羹粥亦可。服至七日。則疼漸平復也。產婦惡露不盡。及血暈。一二服便癒。其藥無忌。又能治

風益心丸

治血熱經行先期及胎漏下血用益母草生地黃白芍藥麥門冬枇杷葉青蒿子五味子阿膠〇治胎不安腹痛用益母草杜仲阿膠川續斷當歸身川芎熟地白芍藥各等分爲丸服〇治臨產血崩不止用益母草當歸身懷熟地各五錢炮薑炭人參各一兩〇治婦人經前經後感冒頭痛發熱譫語妄見煩躁類傷寒此熱入血室證用益母草柴胡半夏當歸丹皮黃芩〇治胎死腹中或胞衣不下用益母草搗熟以熟水少許和絞取汁頓服之〇治產後血閉血暈心氣欲絕用益母草搗汁和熟水少許灌服立甦〇治產後血暈瘀血薄心惡露

不行腹痛少腹兒枕痛兼催生及胞衣不下并氣閉經阻經行作痛用人參琥珀乳香沒藥血竭沉香丹砂五靈脂各等分爲末用益母草取汁拌晒乾三拌三晒爲度加煉蜜搗成丸如彈子大用白湯化服〇治一切癰疽并婦人乳癰急慢疔瘡及小兒頭瘡浸淫黃爛及陰疽陰蝕以益母草煎汁患處淋洗再以新鮮者絞汁頻頻飲之解毒消散〇又方治疔瘡用益母草四月連花采之燒存性先以小尖刀十字劃開疔根令血出次遶根開破捻出血拭乾以稻草心蘸藥撚入瘡口令到底良久當有紫血出捻令血淨再撚藥入見紅血乃止一日夜撚藥三五度重者二日根爛出輕者一日出有瘡

根脹起即是根出以針挑之出後再敷生肌散易愈忌風寒房室酒肉一切毒物〇治一切疔腫發背及無名腫毒益母草蒼耳草夏枯草金銀花紫花地丁各一握鼠粘子白芷殭蠶白及白斂甘草連翹生地各五錢水十碗煎去十分之七取汁飲之〇治勒乳成癰用益母草爲末水調塗乳上一宿自瘥搗汁飲亦得〇治血風眼障血污瞳人用益母草木賊草蒼耳子草决明當歸尾荊芥穗水煎服〇治血風攻頭頭痛頭風并眼痛用益母草防風羌活天麻蒼耳子薄荷連翹各等分水煎服〇治小兒疳痢垂死者用益母草嫩葉同白米煮粥食之甚佳絞汁亦可

夏枯草。味苦辛。氣寒。無毒。陰中之陽。可升可降。乃足厥陰少陽經。血分藥。

（別錄曰。夏枯草生蜀郡川谷。今所在皆有。原野平澤間甚多。冬至後生苗。漸高至一二尺許。莖微方。葉對節生。似旋覆葉而長大。邊有細齒。而背白。三四月莖端作穗。長一二寸。穗中開淡紫碎花。似丹參花。結子亦作穗。一穗四子。五月便枯。宜四月收采用。丹溪翁言無子。亦欠察矣。其嫩苗瀹過。浸去苦味。油鹽拌之可食。寇氏曰。茺蔚有臭味。自秋便生。經冬不悴。春開白花。夏結子。夏枯草無臭味。春末開淡紫花。夏結子。兩物俱生于春。俱枯于夏。但夏枯草更早枯一月矣。）

○夏枯草。涼血清肝。疏鬱散結之藥也。（朱丹溪）此藥得金水之體。少陽之氣。善治肝鬱血燥爲病。故前人主寒熱瘰癧鼠瘻瘿核。目疼痛瘡疹諸疾。及腳腫濕痹等證。但性味寒而苦辛。寒能除熱。苦能下泄。辛能散滯。專入肝膽二經。攻熱逐濕。則前證自除矣。除肝膽血鬱氣滯之病。成瘰癧濕痹等證之外。並無別用。久服亦損胃家。謂苦寒降散多也。

沈則施先生曰。夏枯草。大治瘰癧。散結氣。有調養厥陰血脉之功。及觀其退寒熱。虛者以滋補藥和之。實者以行散之藥佐之。外以艾灸。亦漸取效。此平易簡要之言也。○一男子病目羞明。至夜目珠大痛。連眉稜骨。及頭半邊痛。且腫。灸厥陰少陽二穴。痛隨止。半日痛又作。以夏枯草四兩。香附一兩。甘草五錢。共爲末。每用二錢。茶清調服。下咽則痛減半。至四五服。全愈也。

繆仲淳先生曰。瘰癧鼠瘻。由肝鬱筋結之所生。寒熱毒氣之所成。留于脉中。着于肌肉。其本在藏。其末出于頸腋之間。久則內潰膿血。多成勞瘵。面黃少食。肌消骨立。不可爲矣。諸方用夏枯草。配四物湯。宜早服。多服。屢獲效。

○集方。治肝火血鬱成勞。（方脉正宗）用夏枯草。入逍遙散良。○治瘰癧馬刀。不論已潰未潰。或日久成漏。用夏枯草六兩。切細。酒浸蒸晒五次。爲末。配十全大補湯料。再加香附。貝母。遠志。尤善。○治肝虛目睛痛。或冷淚不止。或血脉纏睛。或羞明怕日。用夏枯草十兩。切細。酒浸蒸晒三次。配甘菊花。草決明各二兩。蜜蒙花三兩。枸杞子五兩。共爲末。煉蜜丸。早晚各食前服三錢。○治腳氣頻發。腫痛難履。以夏枯草。酒浸一宿。曬乾炒。木瓜。醋拌炒。各等分。爲末。每早食前服三錢。白湯調。○治乳癰初起。用夏枯草。蒲公英。各等分。酒煎服。或作丸用亦可。○治一切癰疽腫毒。用夏枯草二觔。甘菊花。紫花地丁。忍冬藤。連翹。白芨。甘草。生地。白芷。各五兩。半枝蓮六兩。水大鍋。煎汁三次。總和熬膏。每服大匙五匙。白湯引。止痛消毒如神。

劉寄奴草。味苦，氣溫，無毒。

（蘇氏曰：劉寄奴草，出河中、孟州、漢中、滁州、江南、越州。山側高崖道傍所在皆有。春時卽生苗，高二三尺。一莖直上，葉似蒼术葉，尖長糙澁，面青背白。九月莖端分數枝，每枝攢簇小花十數朵，蕊黃瓣白，宛如秋菊。經數日花心折裂，白絮如苦蕒花之絮。隨結子，細長亦如苦蕒之子。修治：揀去莖葉，只用子，粗布拭去薄殼，酒拌蒸用。李氏曰：莖葉花子，性類相同，皆可用。又按南史云：宋高祖劉氏，小字寄奴，在軍中療金瘡最驗，軍人遂以此呼之，故名。）

○劉寄奴，消血脹，止血痛，活血破血之藥也。其性溫散，善走，流行血脈。故別錄主撲損折傷，血凝脹痛，金瘡血出不止，婦人血癥血結，及產後血證餘疾，用此可下血止痛。正以其行血迅速故也。但行散之性，專入血分，如病人氣血兩虛，與脾胃薄弱易作泄者勿用。

沈則施先生曰：此藥古方罕用，元本草始附隰草部。其葉揉之有香氣，乃破血之仙藥。爲末，酒和服數錢，治跌撲打傷極效。不可過多，令人吐利。

○集方（千金方）：治血氣脹滿，或杖打，或跌蹶，或從高下墮，血汚心胸，遍身上下內外作痛者，用劉寄奴爲末，每服三錢，酒調服。○（同前）治金瘡出血不止，用劉寄奴爲末，內服外敷效。○（同上）治折傷瘀血在腹內者，用劉寄奴、骨碎補、延胡索各一兩，水二升，煎七合，和好酒及童便各一合，溫服。○（婦人良方）治婦人血癥血結，用劉寄奴爲末，每食前一錢，酒調服，漸漸化解。并治產後一切腐敗留血爲病。○（本事方）治湯火灼傷，先用食鹽末摻之，護肉不壞，後以劉寄奴爲末，雞子清調塗，不痛不爛，亦無瘢，大效。○治大小便血，（聖惠方）用劉寄奴爲末，茶調，空心服二錢，卽止。○治風入瘡口腫痛，用劉寄奴爲末，摻之卽止。

○治筋骨疼痛甚，如夾板狀，痛不可忍，用劉寄奴草五錢，煎湯，將騾子修下蹄爪，燒灰存性，研末，劉寄奴湯調服三錢，服後飲熱酒半鍾，不過三五服愈。

○神仙化痞膏，專貼一切積聚痞塊如神。用劉寄奴草四兩，晒乾當歸、川芎、白芷、黃柏、建黃連、蘇木、川烏各二兩，肉桂、丁香、巴豆肉、草烏各一兩，大黃、蜈蚣、穿山甲各三兩，白花蛇一條，桃枝、柳枝各三十寸，右剉細，以香油二觔，浸五七日，桑柴慢火熬黑色，去渣，放冷，濾淨澄清，取

六觔，再入鍋內，桑柴火熬至油滾，陸續下飛過黃丹炒燥三兩、密陀僧研細末一兩，仍慢火熬至沸止，再下黃蠟八兩，熬至滴水成珠，方離火，待微冷，下後細藥：乳香、沒藥各一兩，硇砂一錢五分，麝香、輕粉各二錢，血竭五錢，阿魏五錢，右七味共爲末，陸續入膏內，不住手攪勻，以冷爲度。用桑皮油紙攤膏，貼患上，時時以炭火烤熱，手磨熨之。

旋覆花、味苦、微鹹、氣溫。無毒。一云有小毒、可升可降、乃手太陰肺、手陽明大腸藥。

（方氏曰：旋覆花、圓而覆下、故名。生平澤川谷、及近道濕地、所在皆有。二月生苗、長一二尺。莖柔細、似紅蘭而無刺。葉如大菊、及小蘇蒿艾之類。六月開深黃色花、亦如菊、香亦如菊、故別名夏菊。根細而白、極易繁衍。生水澤邊者、花小瓣單。人家栽植者、花大蕊簇。蓋土地肥瘠使然。修治、去蕊蒂及殼皮用。）

○旋覆花、消痰逐水、利氣下行之藥也。主心肺結氣、脇下虛滿、胸中結痰、痞堅噫氣、或心脾伏飲、膀胱留飲、宿水等證。大抵此劑味鹹、以軟堅散痞硬、性利、以下氣行痰水、實消伐之藥也。本草有定驚悸補中之說、竊思痰閉心胞脾絡之間、往往令人病驚。旋覆破痰逐飲、痰飲去、則胞絡清淨而無礙、五志自寧、驚悸安矣。又飲消則脾健、脾健則能運行飲食、中氣自受其益而補養矣。然行痰水、下結氣是其專功、病人涉虛者不宜多服、冷利大腸、虛寒人禁用。

女醫童玉峯先生曰：若熱痰則多煩熱、濕痰則多倦怠軟弱、風痰則多癱瘓奇證、驚痰則多心痛癲疾、冷痰則多骨痺痿疾、飲痰則多脇痛臂痛、食積痰則多癖塊痞滿。其爲病狀、種種變見、用旋覆花、虛實寒熱、隨證加入、無不應手獲効。

李時珍先生曰：仲景治傷寒汗下後、心下痞堅、噫氣不降、用旋覆代赭湯、胡洽居士治痰飲兩脇脹滿、用旋覆花丸、皆破堅也。

○集方：治諸濕腫、痰脹水脹、以五苓散加旋覆花。如氣實者、加葶藶子一二錢。○治風濕痰飲上攻、頭目眩脹眵職、用旋覆花、天麻、甘菊花、各等分、爲末、每晚服二錢、白湯下。○治中風後痰涎壅滯、結如膠漆、用旋覆花洗淨焙、研爲末、煉蜜丸梧子大、每臥時以茶湯下三十九。

○治小便不行、因痰飲留閉者、用旋覆花一握、搗汁、和生白酒服下、立通。

紅藍花。味辛苦甘。氣寒平。無毒。陰中之陽。爲手少陰足厥陰經血分藥也。（蘇氏曰。紅花色紅。葉似藍。故有紅藍花之名。李時珍曰。生西域。及梁漢間。人家場圃所種。二月八月十二月皆可下種。雨後布子。于熟地。存生苗。脆嫩可食。二月作葉。形如小薊。五月開花。花色深紅。如大薊花。花下作毬。彙生多刺。花出毬上。圃人乘露采之。采已復出。至盡而罷。毬中結實。白顆如小豆。搗煎其汁。入醋拌蔬。極鮮美。蒸熟搗淘。亦可爲燭。其花曝乾。搗熟。以水淘。布袋絞去黃汁。又搗又絞。其黃汁盡。可染緋紅。上供御服。入藥用花末。經搗絞收汁者。搽碎用。）

○紅花。破血。行血。和血。調血之藥也。主胎產百病。因血爲患。或血煩血暈。神昏不語。或惡露搶心。臍腹絞痛。或瀝漿難生。或蹊[illegible]不下。或胞衣不落。子死腹中。是皆臨產諸證。非紅花不能治。若產後血暈。口噤指搦。或邪入血室。譫語發狂。或血悶內脹。僵仆如死。是皆產後諸證。非紅花不能定。又如經閉不通。而寒熱交作。或過期腹痛。而紫黑淋漓。或跌撲損傷。而氣血瘀積。或瘡瘍痛癢。而腫潰不安。是皆氣血不和之證。非紅花不能調。蓋血之爲物。生化于脾。總統于心。藏納于肝。宣布于肺。施泄于腎。分爲任衝。灌溉一身。紅花汁與之同類。故能活男子血脉。行女人經水。又少用則養血。多用必行血也。但性本行血。如血暈已定。留滯既行。即止後服。過用能使血行不止。毋忽也。

劉默齋先生云。新昌一婦。病產暈已死。但胸膈微熱。有醫陸氏曰。此血悶也。速購紅花數十觔。乃可活。以大鍋煮湯。盛三桶于牕格之下。舁婦寢其上。薰之。湯冷再加。有頃指動。半日乃甦。按此方亦得唐許胤宗。以黃耆湯薰柳太后風病之法也。

潘鄧林先生曰。紅花行血活血。入產科。人所共知之也。而傷寒家有發熱表汗不出者。營虛血燥。不能行汗也。用紅花一二錢。入解表藥中。行血助汗最妙。人所未知。

○集方（女科集言方共九方）。治血煩血暈。神昏不語。用紅花一兩。當歸五錢。川芎三錢。水五碗。煎二碗。徐徐服。○治產後惡露搶心。臍腹絞痛。或經阻不行。少腹作痛。并成結塊。亦良。用紅花。玄胡索。當歸。牛膝。川芎。益母葉。五靈脂。木香。或丸或煎。皆可。○治臨產瀝漿難生。或胞衣不落。或子死腹中。用紅花二兩。當歸。川芎。各三錢。水煎服。如行死胎。本方加芒硝五錢。即下。○治熱病胎死腹中。用紅花三兩。煎汁。和童便。乘熱飲之。立效。或胞衣不下。產後血暈。並用此法。極驗。○治產後血暈。口噤指搦。如風狀。用紅花二兩。○黑荊芥三兩。當歸身八錢。川芎三錢。水煎服。和童便亦妙。○治傷寒初起。經水適來。或適斷。因而病寒熱譫語。如見鬼狀。名曰熱入血室。用紅花。牡丹皮。加入四物湯中飲之。效。○治血悶閉內脹。僵仆如死。用紅花二兩。草烏五錢。酒炒黃。當歸。川芎。五靈脂。各一兩。水煎。溫和。徐徐灌之。○治經水閉絕不行。寒熱晡熱。用紅花一兩。柴胡。黃芩。丹皮。香附。生地。當歸。各三錢。川芎一錢。如咳嗽

加麥門冬。天花粉。知母。各一錢五分。水煎服。○治經水過期方來。腹中痛。血色紫黑。淋漓不斷。用紅花。牡丹皮。玄胡索。五靈脂。生地。白芍。當歸。川芎。香附。內熱加黃連。知母。○治六十二種風證（圖經本草）。用紅花一味。三錢。水煎。日服一盞。一月見効。

紅花子。治天行痘瘡。血熱不能起發。用數十粒。研爛。和生犀角。貫衆。紫草。生地黃。同煎服。

大薊。味甘。微苦。氣寒。無毒。

（陳氏曰。薊門猶多。以薊得名。當以北方薊州者爲勝。大薊生山谷。即虎薊也。二月生苗。高二三尺。葉皺多軟刺。中心出花。其花如髻。色赤。微似紅藍花。）

○大薊。涼血止血之藥也（朱丹溪）。本草（[illegible]）主吐血。衄血。凡血熱妄行。溢出上竅。用此立止。因其性涼故也。但涼而利。止血而又能行瘀。故外科方。以此消癰腫。可知矣。前人謂爲安胎。令人肥健（別錄）。不知何所取義云。

○集方。治吐血（[illegible]氏方）。衄血。崩中下血。用大薊一握。搗絞取汁。服半升。立止。○治腸癰（外科方）。腸腹癰。內疽諸證。用大薊根葉。地榆。牛膝。金銀花。俱生搗絞汁。和熱酒服良。如無生鮮者。以乾葉煎飲亦可。○治崩中（千金方）下血。用大薊根葉。搗汁半升。和炒蒲黃。棕皮灰。各五錢。調汁服。○治跌撲損傷瘀（張氏本生）血作痛。用大薊汁。和熱酒飲。

小薊。味甘。微苦。氣寒。無毒。

（蘇氏曰。小薊生平澤。處處有之。即貓薊也。又名青刺薊。二月生苗。僅一二寸。併根作菜食。甚美。四月即高尺餘。而多刺。中心出花如髻。亦如紅藍花。色青紫。與大薊根苗相似。但不若大薊之肥大耳。寇氏曰。大小薊形狀相似。但大薊高三四尺。葉皺。小薊僅高一尺。葉不皺。此爲異。作菜雖有微苦。不害人咽喉。二薊取用。三月采苗。九月采根。俱晒乾用。）

○小薊。涼血止血。保新血。去陳血之藥也（孫景元）。故陳氏方主暴下血。嘔血。衄血。崩血。金瘡出血不止等證。又治崩漏煩悶。虛損內熱。及胃閉不食等疾。諸因血熱爲眚。搗絞汁溫服。立瘥。按大小二薊。性寒下行。以其能下氣。故主崩

衄熱血多効。惟不利于氣虛血虛及脾胃虛泄瀉飲食不思之證。

沈則施先生曰。按二薊治血止血之外。無他長。不能益人。如前人云。養精保血。補虛開胃之說。不可依從。

○集方治心（聖惠方）熱吐血口乾。用小薊葉幷根搗汁。每溫服二小盞。○治卒（梅師方）瀉鮮血不止。用小薊根葉搗汁。以酒半和溫服。如無鮮者。以乾葉爲末。人參湯調服二三錢。○治小（聖惠方）便熱淋下血。用小薊根葉搗汁。和生白酒服一二盞。○治乳（寇氏方）石發毒壅熱心悶吐血。以生小薊根葉搗汁。每服三合。入煉蜜三五匙。攪勻服之。○治九竅（簡要濟衆）出血。以小薊根葉。搗絞汁一二盞。以酒半和溫服。如無鮮汁。搗乾者爲末。白湯調服三錢。○治金瘡（寇氏本草）出血不止。取小薊苗葉根搗爛。敷上卽止。

○續補方治下疳。用新鮮小薊新鮮地骨皮各五兩。煎濃汁浸之。不三四日卽愈。○（家秘）凡肺氣實火盛之人。吐血衄血咳血咯血唾血。並皆治之。用大薊或小薊。並取苗葉一把。生地黃一兩。黃芩三錢。甘草牡丹皮犀角屑各一錢。燈心一團。水二碗。煎一碗服。

續斷味苦甘辛。微溫。無毒。可升可降。入足厥陰少陰經。理腰腎之要藥。

（蘇氏曰。續斷生陝西河中。舒越晉絳諸州。江南諸郡。皆有之。三月生苗。幹有四稜。葉似苧麻。兩葉對生。四月開花紅白色。似益母花。根如大薊。赤黃色。出川中者。味兼甘更佳。色赤而瘦。折之有烟塵起者。然名爲南續斷。非川產也。功少不及。藥錄云。草延蔓。葉細。莖如荏。根黃白有汁。今用莖葉節節斷。皮黃皺如雞腳者。八月采根。橫切剉之。去向裏硬筋。酒洗晒乾用。又一種草茅根。貌似續斷。悞服令人筋軟。須審之。）

○續斷補續血脈之藥也。總療婦人胎前產後。一切諸病。故本草主內傷補不足。續筋骨。調血脈。活關節。止腰痛。治金瘡。益子宮。安胎孕。又治崩中淋血。腸風下血。痔瘻留血。折傷瘀血諸疾。大抵所斷之血脈非此不續。所傷之筋骨非此不養。所滯之關節非此不利。所損之胎孕非此不安。久服常服。能益氣力。有補傷生血之効。補而不滯。行而不泄。故女科外科。取用恒多也。

盧子由先生曰。斷者續之。因名續斷。故枝莖根葉。宛如經脈骨節者也。是主續筋骨。進肉理。貫經脈。利乳難。散乳癰。續之功用大矣哉。

李時珍先生曰。一人病血痢。一醫用平胃散一兩。入川續斷末三錢。每服二錢。水煎服。壬子。會稽時行痢疾。疏方示人。往往有驗。嬰兒病痢。服之更効。

○集方治胎產一切諸病。用四物湯加續斷。○如欲止血補不足。療崩中。當以白膠。阿膠。麥門冬。杜仲。五味子。山茱萸。人參。枸杞子。黃耆。同用。○欲行血理傷。則與牛膝。

肉桂、玄胡索、紅花同用。○欲安胎，則與白朮、杜仲、黃芩、生地、砂仁殼、廣陳皮同用。○治跌撲折傷，用川續斷、當歸各一兩，自然銅五錢，火煅酒淬，土鼈蟲三十箇，火烘爲末，俱研細，紅麴打糊丸，如黍米大，每早午晚各服五分，溫酒送下。○治乳癰初起可消，久患可愈，用川續斷八兩，酒浸炒，蒲公英四兩，日乾炒，俱爲末，每早晚各服三錢，白湯調下。○治乳汁不行，用川續斷五錢，當歸、川芎各一錢五分，麻黃、穿山甲火煨，各二錢，天花粉三錢，水二大碗，煎八分，食後服。○治妊娠胎動欲墮，用川續斷四兩，川杜仲二兩，俱酒浸炒，共爲末，棗肉丸梧子大。每早晚各服三錢，當歸一錢煎湯下。

漏盧　味苦鹹，氣寒，無毒。入足太陽、陽明、少陽，手太陰、陽明經。

（蘇氏曰：漏盧出京東州郡及秦海州，皆有之。舊說莖葉似白蒿，花色黃白，莢莖若筯大，結子作房，類油麻而小。根生如蔓菁而細，山西單州出者爲勝，八月采莖陰乾，黑于衆草。南方常用莖苗，北方常用根。沈存中云：今方家所用漏盧，乃飛廉也。苗似苦芺，根如牛蒡，綿頭者是也。采時用根。今閩中所謂漏盧，莖如油麻，高四五尺，秋深枯黑如漆，采時用苗，乃真漏盧也。又按諸郡所云，惟單州者差相類。沂州者花葉頗似牡丹。秦州者花似單葉菊，花紫色，五七枝同一條。海州者花紫碧色，如單葉蓮花，花蕚下及根旁有白茸裹之，根如蔓菁而細，又類葱，黑色。三州所生，花雖別而葉頗相類，但秦海州又葉作絲齒狀，一物而殊類如此。又本草飛廉一名漏盧，與苦芺相類，其根生則皮黑肉白，乾即黑如玄參。六七月采花陰乾，即所說與秦州海州所圖漏盧花葉及根頗相近，然彼人但名漏盧，不曰飛廉也。）

○漏盧去風熱，解瘡癀，寒而通利之藥也。苦鹹屬陰，性惟

涼散，故本草主皮膚瘙癢，隱疹風毒，惡瘡及乳癰，發背痔毒，腸風諸證。能理血排膿，引經脉，利筋骨，行臟府而古方以漏盧湯爲瘡瘍科初起瘡毒之首劑也。又宋人治癰疽，并預解時行熱毒痘疹。今但知其寒能解熱之義，蓋不知其能入陽明之故也。設患人胃寒不食，并泄瀉者，瘡瘍陰證，平塌不起發者，有妊娠者，俱禁用之。

○集方：治皮膚瘙癢，隱疹風毒，瘡疥，用漏盧、荊芥、白蘚皮、浮萍、牛膝、當歸、蘄蛇、枸杞子各一兩，甘草六錢，苦參二兩，浸酒蒸飲。○治癰疽發背，一切腫毒初起，及時行熱毒，赤腫丹痃，用漏盧、連翹、白斂、枳殼、升麻、甘草、麻黃、朴硝各一兩，大黃八錢，共爲末，每服三錢，白湯調服，取利

爲度發背初起二三日但有裏實熱證便宜服此退毒下膿乃是宣熱拔毒之劑熱減即住服○治癰疽排膿長肉生肌用漏蘆人參各五錢黃耆二兩○治時行痘疹預防染患用漏蘆五錢菉豆白芍藥各二錢甘草三錢俱微炒黃研末每服一二錢白湯調服○治乳汁不下用漏蘆一兩同猪蹄煮汁飲立通○治乳癰紅腫初起立消用漏蘆一兩甘草五錢水煎服○治肥實婦人乳汁不下乃氣脉壅塞也或經絡凝滯乳內脹痛邪蓄成癰服之自然內消用漏蘆五錢蛇蛻一條炙焦共爲末瓜蔞一箇和皮搗極爛總和一處先取一半熱酒調服以利爲度○治瘰癧排膿止痛生肌用漏蘆連翹紫花地丁貝母金銀花甘草夏枯草各等分水煎服○治歷節風痛筋脉拘攣痛如虎咬身難展動用漏蘆五錢地龍[illegible]條去土炒共爲末生薑五錢取汁生蜜[illegible]錢水[illegible]碗共煎滾取漏蘆地龍末各一錢調服○治小兒無辜疳病肚脹或時泄利冷熱不調以漏蘆[illegible]兩炒爲末每用一錢以猪肝[illegible]兩入鹽少許同煮熟空心頓食之

苧根味甘氣寒無毒（蘇氏曰苧麻生閩廣江浙間宿根不死至春再發一科數十莖亦可分根種高七八尺葉如楮無叉面青背白有短茸毛夏秋間著細穗青花其根黃白而輕虛八九月采剝其皮可以績布諸處歲再刈推捌傷悶歲可三刈取皮以竹刮其表則厚處自脫○李氏曰苧麻家苧也又有山苧野苧也又有紫苧葉面紫白苧葉面青其背皆白剝洗煮食可救荒味甘美其子茶褐色九月收之二月可種宿根亦自生）

○苧根涼血解毒之藥也別錄主小兒赤遊丹毒大人癰疽背發及一切無名毒腫搗敷即解又天行熱病大渴發狂或婦人胎藏蘊熱漏胎下血或氣血砂膏五種淋證或服金石熱藥性發煩悶等患用此煎嘗諸病立効皆以其性寒涼血解熱化毒故也如病人胃弱泄瀉者勿服諸病不由血熱者亦不宜用（其葉與皮筋主治略同）

朱彥修先生曰苧根大能養陰而活瘀血方藥或惡其賤似未曾用也古方以苧麻産婦枕之立定血暈安腹上立止腹痛況服食乎

盧不遠先生曰苧質直而縷如經如絡故易長則氣勝理順則血流治胎捷于益母世人未之識也

李時珍先生曰苧麻葉極散血五月五日收取和石灰搗作團曬乾收貯遇有金瘡跌傷撲傷研末敷之即時血止且易痂也又方凡諸損傷肉破血瘀不散者五六月收野苧麻葉與紫蘇葉二味搗爛敷上傷處如有瘀血在腹內不散者以二葉搗汁和酒服即通血皆化水也

○集方。治五色丹毒。苧根煑汁。日浴三次。或濃煎汁少許飲之亦良。○治癰疽腫毒（阿經水平）。初起未成者。用苧根。熟搗敷上。日夜數換。○治天行熱病（大氏方）。大渴狂妄。用苧根濃煎飲之。○治妊娠（梅師方）胎動不安。或漏血不止。或下黃水如膠。或如小豆汁。腹中痛者。用苧根。去黑皮。切碎。十兩。水煎稠。徐徐飲。○治五種淋（斗門方）證。莖中澁痛。或白淫白濁。用苧根搗爛。煎水飲立效。○治小便不通（聖惠方）（共二商）。用苧根搗爛。攤布上。貼少腹連陰際。須臾即通。○治小便淋血（同前）。用苧根煎湯。頻服大效。并治諸淋。○治肛脫不收。用苧根搗爛。煎湯薰洗。○治跌撲（林氏和方）打傷。或從高失脚下墮。內傷瘀血者。用苧根或苧麻燒灰。五錢或一兩。熱湯或熱酒調服。瘀血立散。○治夏月驟然水瀉（[illegible]方）。日夜不止欲死。不拘男婦。用五月五日采苧麻葉。陰乾。為末。每服二錢。冷水調下。勿喫熱物。令人悶倒。小兒用五分。○治痢白凍。方同上。○治蛇虺咬傷（胡玄方）。用苧麻嫩頭搗汁二三盞。和酒一半服。以渣敷咬處。毒從竅中出。看傷處有竅是雄蛇。無竅是雌蛇。以針挑破傷竅處。再敷紫金錠末。○治臨杖預服藥。用苧麻皮燒灰存性。乳香、沒藥各五錢。胎髮圓一枚。微炒焦。黑犬對前脚上邊頂骨一副。火炙酒淬酥。五味俱研細末。煉蜜丸如彈子大。每丸重四錢。酒化下。杖後煎劑用苧麻皮二兩。大黃、桃仁、延胡索、肉桂、牡丹皮、紅花、（紅麴各二錢。牛膝五錢。降香末二錢。甘草一錢。水酒各一大碗。煎八分服。）

大青。味苦。氣大寒。無毒。

（陶隱居曰。出東境邊道及江東州郡。今荊南、眉、蜀、濠州所在亦有之。春生青紫莖。似石竹。高二三尺。對節作葉。長三四寸。面青背淡。七八月開花如蓼。色紅紫。亦如芫花狀。結實青碧。大若椒粒。霜降則紅。三四月采莖葉。陰乾用。）

○大青。解時行熱毒之藥也。（別錄）（陳象光稿）別錄主溫疫寒熱。時行大熱。熱毒頭痛。狂悶煩渴。喉痺口瘡。風疹丹毒。熱毒血痢。單熱瘴疾。熱極疸黃諸病。此皆胃家實熱之證。此藥乃對病之良方也。但其性味苦寒。止用以祛除天行熱病。而不可施之于虛寒脾弱之人。善用者毋忽忽也。

蘇氏曰。古方治傷寒內熱。黃汗黃疸。有大青湯。傷寒頭身強。腰脊痛。有葛根湯。亦加大青。大抵時行熱疾。尤多用之。

李時珍先生曰。大青氣寒味苦。善解心胃熱毒。不特治傷寒也。活人書治傷寒發赤斑。煩熱而痛。有犀角大青湯。大青四物湯。故象先指掌賦云。陽毒則狂斑煩亂。以大青升麻。可回困篤。

○集方。治溫疫（孫氏方）寒熱。用大青、柴胡、黃芩、生半夏、桔梗各一錢。葱頭三箇。水煎服。○治時行（陶氏方）大熱。熱毒頭痛。狂悶煩渴。用大青一兩。石膏五錢。知母三錢。甘草一錢。牛旁子三錢。水煎服。○治喉風（[illegible]）喉痺。用大青葉搗汁灌之。取効止。○治大人（千金方）小兒口內生瘡。用大青一兩。黃栢五錢。黃連三錢。水一大升。煎三合服之。○治風疹（大氏方）丹毒。用大青

搗爛。罯之即散。（先以磁鋒砭去惡血。）○治熱毒血痢困篤。用大青曝乾。四兩。甘草、一兩。眞赤石脂、三兩。阿膠、二兩。水三升煎一升。徐徐服。○治熱盛時疫。單熱不寒者。用大青嫩葉。搗汁。和生白酒沖飲。○治熱甚疸黃。用大青、二兩。茵陳、秦艽。各一兩。天花粉、八錢。水煎服。○治熱盛發斑。赤色。心煩作痛。用大青四物湯。以大青、一兩。阿膠、甘草、各二錢。淡豉二合。分作三服。每用水二盞。煎八分服。又犀角大青湯。用大青七錢。眞犀角、二錢。山梔子十箇。淡豉二撮。分作二服。每用水二盞煎八分。溫和服。

小青。味苦。氣寒。無毒。

（蘇氏曰。小青生與大青異種。惟產福州。三月開花。）

○小青。解毒殺疳。清熱之藥也。治痧熱。退小兒疹後骨蒸止血痢。療男子酒積腸紅。陰寒清利之品。然過服亦尅脾氣。

○集方。治小兒痘瘄後羸瘦骨蒸。用小青草、銀柴胡、各一兩。白朮、地骨皮、甘草、胡黃連、青蒿、各五錢。爲末。每服一錢。早晚白湯調送。○治酒毒血痢腸紅諸證。用小青草、秦艽、各三錢。陳皮、甘草、各一錢。水煎服。○治癰疽瘡癤用小青草搗爛。敷上即消。

胡盧巴。味苦。氣熱。無毒。爲足少陰。與命門之藥也。

（劉氏曰。胡盧巴。生海南諸番。今廣州黔州亦有。不及舶上者佳。春生苗。夏結子。秋采莢。酒浸曬乾用。或云是番中蘿蔔子。未審的否。）

○胡盧巴。壯元陽。補腎命之藥也。能斂左水火兩腎之元陽。故主元臟虛冷。命門火衰。不能生土。以致脾胃洞泄不禁。精冷自遺。又治寒疝沖心。及奔豚瘕癖。寒濕脚氣諸陰冷證。無不奏功。因其益命門之力。所謂益火之原以消陰翳是也。若腎藏有鬱火內熱者。還宜斟酌。

薛立齋先生曰。一人病目不覩物。一醫教服胡盧巴。頻頻不缺。不十月。而目中微痛。如蟲行。出大眥。漸明而愈。又一人病寒疝陰囊腫痛。服五苓諸藥不效。與胡盧巴。

數服而平。

沈拜可先生曰。今醫家治元臟虛冷。冷氣潛伏。陽氣不能歸原者。以胡盧巴爲要藥。與人參、蒼朮、歸、地、桂、附、補骨脂、大茴香、等藥。大有回天再造之功。老弱虛羸之人宜日用之。

○集方。治脾胃虛寒。洞泄不止。用胡盧巴四兩。補骨脂三兩。白朮二兩。人參、一兩。俱炒黃爲末。飴糖爲丸。每服三錢。湯酒任下。○治腎虛精冷自遺。用胡盧巴四兩。枸杞子三兩。配入六味地黃丸。每早服五錢。淡鹽湯下。○治寒疝沖心。及奔豚瘕癖。腹中攪痛。用胡盧巴、吳茱萸、川椒、肉桂、蒼朮、各二兩。炒爲末。每服三錢。早晨白湯調下。

〇治偏墜𤸷痛，或小腸疝氣，下元虛冷者，用胡盧巴、小茴香，俱酒浸炒，各二兩，沉香、木香各五錢，爲末，紅麯和酒，打糊丸，每服二錢，白湯下。〇治寒濕腳氣，腿膝疼痛，行步無力，用胡盧巴酒浸一宿，焙，補骨脂炒香，各四兩，爲末，以木瓜一箇，切頂去穰，放藥在內令滿，用頂蓋住，簽定，蒸爛擣，丸如梧子大，每空心用百丸，溫酒下。〇治小腸氣痛，用胡盧巴炒研末，每服二錢，茴香湯下。〇治腎藏虛冷，腹脇脹滿，用胡盧巴炒二兩，熟附子、硫黃各七錢，爲末，酒和紅麯爲丸梧桐子大，每早服百丸，白湯下。〇治冷氣疝瘕，用胡盧巴酒浸晒乾，蕎麥炒，各四兩，小茴香二兩，共研爲末，紅麯糊爲丸梧子大，每早服百餘丸，空心鹽酒送下。服至兩月，大便出白膿，則除根。

惡實（即牛蒡子）味辛苦，氣寒，無毒。陽中之陰，可升可降。入手太陰、足陽明經。

（李時珍先生曰：惡實其狀惡而多刺鉤，故名。其根葉皆可淘爲蔬，或取根煮曝爲脯，食之可充飢，且益人。其殼多刺，鼠過之則綴惹不可脫，故謂之鼠粘子。此草處處有之。三月生苗，高三四尺，葉如芋而長，四月開花作叢，淡紫色，實如楓毬而小，萼上細刺百十攢簇。其毬作子數十粒，色黑褐，秋後采取，時著人衣也。）

〇惡實散風解熱，透疹毒之藥也。味苦性潤，苦能泄熱，潤能散結。別錄方主明目，除風。臟器方主風毒斑熱。元素方主潤肺止咳，散結氣，利咽喉，開毛竅，去皮膚風，通行十二經。甄氏方定煩熱，去傷寒鬱熱不解。錢氏方治斑疹時毒等證，總是拔引鬱毒，凡風火痰氣內結，不能透達者，此藥宜利發揚，故今人用以發隱疹痘瘡，開咽喉諸疾，尤獲奇驗。但性冷而滑，用于痘瘡家，惟宜血熱便閉之證；若氣虛色白，大便瀉利者，愼勿輕投。又痘疹不忌泄瀉，故始終用之無虞。

盧不遠先生曰：此以承制之品，宜助肝木，則凡病從風生，或因風寒濟鬱，乃成痙者，取之捷如影響，設形層之外與上部者，功力尤勝。

〇集方：治頭痛連睛，并目昏澀不明，用牛蒡子、蒼耳子、甘菊花各三錢，水煎服。〇治風癧斑毒作痒，用牛蒡子、玄參、殭蠶、薄荷各五錢，爲末，每服三錢，白湯調服。〇治風火內閉，痰鬱作嗽，用牛蒡子、桔梗、前胡、薄荷、防風、桑皮、杏仁各二錢，甘草五分，水煎服。〇治咽喉腫閉不利，用

牛蒡子三錢，桔梗一錢，甘草七分，荆芥五錢，水煎服。○治傷寒邪鬱不解，延引多日，用牛蒡子二錢，柴胡，防風，黑梔子，連翹各一錢，葱頭二莖，水煎服。○治斑疹時毒及痄腮腫痛，用牛蒡子，柴胡，連翹，川貝母，荆芥各二錢，水煎服。○治痘瘡不起發，用牛蒡子，桔梗，甘草，蟬蛻，殭蠶，黄芩，玄參，羌活，各等分，水煎服。○單治瘄疹不起透，用牛蒡子研細，五錢，檉柳煎湯，調下立透。○治天行痘瘡血熱乾枯不出者，用牛蒡子三錢，犀角，紫草，生地黄，各二錢，水煎服有神。○治歷節風痛，攻走手足，甚則肩背膂膝，攻鑿疼痛，用牛蒡子五兩，爲末，每用三錢，白湯調下。○治暴中風，用牛蒡子根，取時避風，以竹刀刮去土搗爛絞汁一升，和煉蜜四合，溫分二服，得汗出便瘥。○治熱毒風氣內攻，頭面忽腫，或連手足，赤腫觸著即痛者，用牛蒡子根洗淨研爛，成膏，絹攤貼腫處，再以白湯調服二三錢，即腫消痛減。

枲耳實（詩人謂之卷耳，爾雅謂之蒼耳，廣雅謂之枲耳。）味甘微苦，氣溫，有小毒。

（陶隱居曰：枲耳，生安陸川谷及田野間，今所在有之。與麥互相爲候，古人謂麥黃種枲，枲黃種麥，是也。細莖蔓生，高二三尺，有黑斑點，葉如葵。七八月開細白花，結實如婦人耳璫，外殼堅韌，多刺，中有兩仁，宛如人腎。修治炒黃，去外皮刺，取仁用。其莖葉可煑爲茹，滑而無味，隨醃作食尤佳。又救荒，水洗浸焙熟，食可救飢。其實炒磨去皮殼，其內仁可作餅食，又可熬油作燈。郭氏云：今一種叢生，如盤，高三四尺，不作蔓生，其莖花實與蔓生者亦異。）

○枲耳實通顛頂，祛風濕之藥也。主風寒、風濕三氣爲病，或頸項牽攣，四肢拘急，一切關節屈伸不利之證。故前人有久服益氣脈，補虛弱之功，上而散頭腦諸風。凡風寒頭痛，鼻塞腦漏，或血風眩暈，痰火懸旋，或目痛目腫，目瞖目昏，或耳癢耳疼，耳濕耳聾諸疾；下而利腰膝之濕。凡痿痺痲木不仁，或疹疥，或血痔，或黃水膿濕諸瘡，或脚氣疝腫諸疾，咸宜用之。但甘能和血，苦能燥濕，溫能通暢，故上中下一身風濕衆病，不可缺也。

○集方：治疫病不染，五月五日午時，多采蒼耳莖葉子，各等分，陰乾，臨時冷水調服三錢，或水煎，衆家皆服，能辟惡。○治赤白下痢，用蒼耳不拘多少，洗淨，用水煑爛，去滓，入蜜，用武火熬成膏，每服一二錢，白湯下。○治諸風眩暈，或頭腦攻痛，用蒼耳仁三兩，天麻，白菊花各三錢。○治頸項牽痛，用蒼耳仁三兩，當歸，淨身，白芍藥，懷熟地，各三錢。○治四肢拘急，用蒼耳仁五兩，枸杞子五，加皮各五錢。○治鼻塞不利，香臭不聞，用蒼耳仁一兩，辛

夷。石菖蒲。各一錢。（如患楊梅結毒不在此例。）○治腦漏鼻淵、穢汁下流、用蒼耳仁三兩、白朮。石首魚腦骨、滋泥封裹火煆。各二錢。○治赤目生瘡。用蒼耳實二兩。乳香、五分、每用一錢燒烟嗜鼻。○治目病經年。昏暗腫痛用蒼耳仁二兩。草决明。兔絲子、各二錢。○治耳病痛癢濕爛、或腫或聾。用蒼耳仁二兩、香白芷二錢。○治腰膝痠疼。腿足麻痺用蒼耳仁、四兩、牛膝、虎骨、肉桂。白朮。當歸、萆薢。各八錢。○治疥疹瘡癢、用蒼耳仁二兩。白癬皮、懷生地、防風、枸杞子、各五錢。○治血痔痛脹下墜。用蒼耳仁、三兩。地榆。升麻。牡丹皮。黃柏。各一兩。○治脚氣腫痛重墜難履。用蒼耳仁、二兩。木瓜。五加皮、威靈仙、白朮。牛膝。各四錢。○

治疝氣攻痛。止發不常。用蒼耳仁三兩。胡盧巴。川楝子。青皮、橘核。枸杞子各一兩。○治一切疔腫危困者。用蒼耳根葉搗和童便絞汁。冷服一升。拔根甚驗。○治反花惡瘡。有肉如飯粒。破之血出。用蒼耳葉搗汁。服三合。日三服。并用渣塗之。○治卒得惡瘡。用蒼耳仁。研末敷之。○治毒攻手足。腫痛欲斷。用蒼耳子。搗汁漬之。再以渣敷之。立效。○以上諸方。或丸或散。隨病酌用。

本草綱目方云。治一切癰疽發背。無頭惡瘡。疔瘡腫毒。一切風癬臁瘡。杖瘡。牙疼喉痺。五月五日。取蒼耳根葉數擔。洗淨晒萎。細剉。以大鍋五口。入水煮爛。以篩濾去粗渣。布絹再濾。復入淨鍋。武火煎滚。文火熬稠。攪成膏。以新磚封貯。每以敷貼。即愈。牙疼。即敷牙上。喉痺。即敷舌上。或噙化。二三匙即効。癰疽、瘡毒。每日取酒服一匙。極効。

蠡實（即馬蘭子）味甘。氣寒平。無毒。（別錄曰、蠡實生河東川谷、今陝西諸郡及鼎、澧州亦有之。蘇氏曰、近汴尤多、葉似薤而長厚、三月開紫碧花、五月結實作角、子如麻大而赤色、有稜、陰乾用、根細長、黃色、而通人取以為薦、按救荒本草。言其嫩苗味苦、煠熟、換水浸去苦味油醬調和食之、可代蔬。）

○蠡實。治血氣。去風寒濕痺之藥也。（本經）蘇氏曰、此藥甘寒平潤。止吐血、鼻衄血、熱妄溢。消一切瘡瘯癰腫。煮湯飲。或炒黃酒吞一二合。良驗。又莖葉搗汁。汨喉治喉痺腫痛。毒死。又治大便不通。及小便秘。石淋瀝諸證。外臺秘要往往用之。屢奏奇効。

豨薟草。味苦。氣溫。有小毒。入手足少陽經。（俞氏曰。韻書。楚人呼豬爲豨。呼草之氣味辛毒者爲薟。此草氣臭如豬。而味腥惡如薟。故謂之豨薟。多生沃壤。所在有之。春生苗。節葉相對。高三尺許。葉似蒼耳而微長。又似地松而稍薄。金稜鋸線。素莖紫荄。莖葉皆有細毛。肥壤一株。分枝數十。八九月開小花。深黃色。結實如茼子。外萼有細刺。粘人衣。采時以五月五日。六月六日。七月七日。九月九日。刈。剪去地三寸。以水洗淨泥土。摘葉及枝頭。用酒潤。以九蒸九曬爲良。蒸曬經久。濕潤無薟薟氣。自然香美可食。非若生時腥薟可惡也。）

○豨薟草。祛風濕。活滯血之藥也。（李秋江生）故祛風藥每推首用。唐本草療中風口眼歪斜。四肢麻木。筋骨拘攣。或濕痺腰腳痠疼。及腸風藏血等證。此乃春升之藥。得少陽風木之令。風能勝濕。故上件諸病。悉主之也。但性味走泄。疏散獨專。補養稍遜。凡患四肢麻痺。骨間疼痛。腰膝無力。由于脾腎兩虛。陰血不足。不因風濕而得者。不宜服也。

沈則施先生曰。按方書言成訥進豨薟丸方表云。有弟訢年三十一歲。中風。伏枕五年。百醫不瘥。有道人鍾某者。因覩此患。令服豨薟草一味。取嫩枝葉九十觔。酒浸九日。上甑蒸一次。晒一次。計蒸晒各九次。或晒或焙乾。搗爲末。煉蜜丸。如梧桐子大。空心用溫酒或米湯下百餘丸。至四千丸。所患愈加。勿得疑慮。是藥攻之。故服至八千丸。必得復舊。服至萬丸。當復強壯。依法修製。令訢服之。果如其言。鍾某又言。此藥與本草所述功効相異。然悟服後。須喫飯六七匙壓之。又益州張氏豨薟丸方云。喫至百服。眼目清明。積至千服。髭鬚烏黑。筋力輕健。効驗奇異。一人中風。墜馬失音不語。與十服。其病立瘥。又一老僧。年七十。忽患偏風。口眼喎邪。時時吐涎。與十服。亦便得痊。誠仙方也。

○集方。（方脉正宗）治中風口眼喎斜。手足不隨。語言蹇澁。口角流涎。筋骨攣强。腰腳無力等證。用豨薟草。酒浸蒸晒九次。取三觔。配蘄蛇二條。人參。黃耆。枸杞子。川萆薢。於白朮。當歸身。各八兩。蒼耳子。川芎。威靈仙。半夏麯。各四兩。以上諸藥俱用酒拌炒。沉香二兩。不見火。共十三味。俱爲細末。煉蜜丸。如梧桐子大。每早晚各服三錢。白湯送下。○治腸風下血。（同前）用豨薟葉。酒蒸爲末。煉蜜丸。每服三錢。白湯下。○治發背疔瘡。一切癰疽腫毒。（乩中生方）用新鮮豨薟葉一二兩。小薊。大蒜。各一兩。搗爛。入熱酒一碗。絞汁服。得汗立解。

李士材先生曰。古方云豨薟能宣能補。故風家珍之。本草相傳。功用甚奇。然近世服之。經年罕效。意者製法未盡善歟。風氣有分別歟。藥產非道地歟。亦以見執方者之失也。愚按此藥長于理風濕。畢竟是祛邪之品。恃之爲補。吾未敢信也。

麻黃味苦辛。氣溫無毒。氣味俱薄。輕淸而浮。陽也升也。手太陰之藥。入足太陽。兼走手少陰陽明經。

（陶隱居曰，麻黃生晉地。及河東。今鄭州鹿臺及關中沙苑河旁。沙州最多。其青州徐州者。不佳。蜀中出者。亦不堪用。惟彭城滎陽中牟者爲勝。所在之處。冬不積雪。夏五月則長及一尺。纖細勁直。外黃內赤。中空作節如竹。四月稍頭開黃色花。六月結實如百合瓣而緊小。又似皂莢子。而味甜。微有麻氣。外皮色紅。裏仁色黑。根色紫赤。俗說有雌雄二種。雌者開花結子。雄者無花無子。至立秋後收莖。陰乾。修治。折去節根。水煑十餘沸。以竹片掠去上沫用。恐令人煩。節根。又能止汗液也。）

〇麻黃主傷寒。有大發散之功。專入太陽之經。散而不止。能大發汗。非若紫蘇前葛之輕揚。不過能散表而已也。所以東垣云。泄肌表。泄衛中之實邪。達玄府。去營中之寒鬱。凡六淫有餘之邪。客于陽分皮毛之間。腠理閉拒。營衛不通。其病爲實。麻黃其形中空。輕淸成象。入足太陽寒水之經。以泄皮毛氣分。直徹營分之寒邪。無麻黃寒邪不能盡出也。故本經主中風傷寒。頭痛溫瘧。及欬逆上氣諸病。悉屬太陽衛實之邪。用此藥爲解表第一。推而廣之。若痱疹之隱見不明。惡瘡之內陷不透。哮喘之壅閉不通。產乳之凹滯不行等證。悉用麻黃。累累奏効。但此藥禀陽剛淸烈之氣。味大辛。性大熱。體輕善散。故專治風寒之邪在表。爲入肺之要藥。而發表最速。若發熱不因寒邪所鬱。而標陽自盛之證。或溫瘧不因寒濕瘴氣。而風暑虛熱之證。或虛人傷風。虛人發喘。陰虛火炎。血虛頭痛。以致眩暈。中風癱瘓。或肺虛發熱。多痰欬嗽。以致鼻塞瘡疱。及平素陽虛。腠理不密之人。悉皆禁用。倘用則汗多亡陽。損人元氣。戒之慎之。

李時珍先生曰。仲景治傷寒無汗。用麻黃。有汗。用桂枝王海藏謂麻黃治衛實。桂枝治衛虛。二物雖爲太陽經藥。其實營衛藥也。心主營爲血。肺主衛爲氣。故麻黃爲手太陰肺之劑。桂枝爲手少陰心之劑。似亦得其槩矣。而未豁然。夫津液爲汗。汗卽血也。在營則爲血。在衛則爲汗。夫寒傷營。營血內濇。不能外通于衛。衛氣閉固。津液不行。故無汗發熱而憎寒。夫風傷衛。衛氣外泄。不能內護于營。營氣虛弱。津液不固。故有汗發熱而惡風。然風寒之邪。皆由皮毛而入。皮毛者。肺之合也。肺主衛氣包羅一身。是證雖屬乎太陽。而肺實受邪氣。其證時兼面赤怫鬱。欬嗽有痰。喘而胸滿。諸證非肺病乎。蓋皮毛外閉。則邪熱內攻。而肺氣膹鬱。故用麻黃。甘草。同桂枝引出營分之邪。達之肌表。佐以杏仁。泄肺而利氣。又汗後無大熱而喘者。加以石膏。活人書夏至後。加石膏知母。皆是泄肺火之藥。是則麻黃湯。雖太陽發表重劑。又爲發散肺經火鬱之藥也。如腠理不密。則津液外泄。而肺氣自虛。虛則補其母。故用桂枝同甘草。外散風邪以救表。內伐肝木以防脾。佐以芍藥疎木而固脾。泄東所以補西也。使以薑棗行脾之津液而和營衛也。下後微喘者。加厚朴。杏仁。以利肺氣也。汗後脉沉遲者。加人參。

以益肺氣也。朱肱方。加黃芩。爲陽旦湯。以瀉肺熱也。皆是脾肺之藥。是則桂枝雖太陽解肌輕劑。實爲理脾救肺之藥也。此千古未發之秘旨。愚特表而出之。又少陰病發熱脈沉。有麻黃附子細辛湯。麻黃附子甘草湯。然少陰與太陽爲表裏也。卽前人所謂熟附配麻黃。補中有發之意云。又仲景治傷寒。六七日大下後。脈沉遲。手足厥逆。咽喉不利。唾膿血。泄利不止者。用麻黃湯平其肝肺。兼升發之。卽斯理也。神而明之。存乎人矣。

○集方。仲景治傷寒。有麻黃湯。有大小青龍湯。○治少陰病發熱脈沉。有麻黃附子細辛湯及麻黃附子甘草湯○治肺病上氣。有射干麻黃湯。厚朴麻黃湯。○治寒邪

鬱于肺經。以致喘滿欬嗽。用麻黃。石膏。杏仁。桑皮。甘草。○治時行溫瘧。寒多拘急者。用麻黃。杏仁。桂枝。柴胡。生薑。○治風痺冷痛。用麻黃。桂枝。甘草。○治冬月瘧疾。爲寒風所鬱。以致倒飽喘悶。用麻黃。桂枝。俱蜜水炒。杏仁。紫蘇葉。葱頭。一服立解。○治冬夏冷哮痰喘。用麻黃。半夏。蘇子。皂角。白芥子。配二陳湯立驗。○治痘瘄斑疹不起透。用麻黃。荊芥。牛旁子。桂枝。前胡。甘草。○治乳汁不行。用麻黃一兩。蜜水炒。天花粉。當歸身。各五錢。水煎服。○治楊梅惡瘡。毒氣不起。瘡腳冷停。不攻發者。用麻黃一兩。蟬蛻。殭蠶。肉桂。當歸。皂角刺。白芷。紅花。各五錢。羊肉湯煎服。

麻黃根節。味甘氣平。無毒。

陶隱居曰。止一切虛汗。爲末。和面粉撲之。

李時珍先生曰。麻黃發汗之氣。速不能禦。而根節止汗。捷如影響。物理之妙。不可測度如此。凡自汗有傷風風濕。風溫氣虛。血虛陽虛陰虛。并亡陽中暑。柔痓。胃熱痰飲。諸證皆可隨證加而用之。如當歸六黃湯加麻黃根。治盜汗。黃耆六一湯加麻黃根。治自汗。蓋其性能行周身肌表。故能引諸藥。外至衛分而固腠理也。陶氏但知撲之之法。而不知服餌之功更妙也。

○治感冒寒冷風邪。鼻塞聲重。語音不出。嗽咳多痰。胸滿喘急。用麻黃根節。杏仁不去皮尖。搗碎。甘草生用。各二錢。右剉一劑。生薑三片。葱頭二個。水煎服。加荊芥。桔梗各一錢。名五拗湯。

水葒草。味鹹苦，氣寒，無毒。（陶隱居曰：水葒草生下濕地，極似馬蓼而甚長大。詩所謂隰有游龍者是也。似蓼而葉大，高丈餘，其莖粗如拇指，有毛。其葉有大如商陸葉者，色淺紅，成穗。秋深子成，可采。扁如酸棗仁而小，其色赤黑而肉白，不甚辛，炊爆可食之。）

○水葒草子，消血積，化癖散癧之藥也。其味鹹苦而寒，性善消磨，能入血分，逐留滯，去痺氣，清血障，明目疾。如血分中無所留滯，脾虛胃寒者禁用。

○集方：治瘰癧，用水葒花子不拘多少，一半微炒，一半生用，同研末。食後好酒調服二錢，日三服。破者亦治。久則效，效則止。○治痞癖腹脹，及堅硬如盃盌者，用水葒花子一升，另研，獨顆蒜十五箇，去皮，狗腦一箇，皮硝四兩，石臼搗爛，攤在患上，用油紙蓋定，長帛束之。酉時貼之，次日辰時取去，未效再貼二三次。倘有膿潰，以滑石研細末摻之，自乾，痞服漸消除矣。○治胃脘血氣作痛，以水紅花一大撮，水二鍾，煎一鍾服。○治心氣疞痛，用水紅花為末，白湯調服二錢。又法，男病用酒水各半煎服，女用醋水各半煎服。

木賊。味甘苦，氣平，無毒。中空而輕，陽中之陰，升也，浮也。入手足三陽經。（劉氏禹錫曰：木賊出秦隴華成諸郡，所在近水地亦有之。苗長尺許，叢生直上，一根只一幹，無花葉，狀似鳧茈苗及椶心草，寸節中空，又似麻黃莖而稍粗，經冬不凋。四月采之，莖幹糙澁，治木骨器，以此磋擦則光淨而滑，猶云木之賊也。）

木賊草，治目疾，退翳膜，治腹疾，消積塊之藥也。目爲肝之用也。風熱勝則翳膜生。此草性體輕揚，中空直幹，故能上達肝竅，以祛目疾之風淫火勝，爲翳爲障，爲努肉，爲疳淚諸疾。嘉祐本草又謂治隱癖積塊、喉痺腸痔，即去翳障努淚之意。又謂去節能解肌發汗，功過麻黃，亦即取其輕空陽象之用，而有升散之力也。然多服損肝，不宜久用。如前古謂益肝膽，止婦人月水不斷，崩中赤白，此說似屬奇謬，不可信從。

○集方：治目障昏蒙多淚，用木賊去節一兩，爲末，和羊肝搗爲丸，早晚各食後服二錢，白湯下。○治小兒疳眥肚大目盲，用木賊草二兩，蕤仁一兩，共爲細末，羊肝搗和丸彈子大，每服一丸，白湯化下。○治急喉閉塞，用木賊草[illegible]炒成[illegible]，白湯調服一錢。血出[illegible]，用木賊草[illegible]節一兩，[illegible]○治小[illegible]氣[illegible]木賊草去節一兩，[illegible]服一錢。○治[illegible]下[illegible]多年不[illegible]一兩[illegible]一[illegible]

大黃。三錢。並于鍋內炒黑。爲末。每食前用米湯下三錢。甚効也。

青葙。味苦。微寒。無毒。入足厥陰肝經用藥。（寇氏曰。青葙出江淮州郡近道。亦有之。生平谷道旁。及田野下濕處。其花葉似雞冠。嫩苗似莧。故謂之雞冠莧。二月抽青色苗。可食。漸長至三四尺。莖色青紅。若蒿狀。葉闊似柳而軟。六七月生花。上紅下白。作實黑而扁。大于莧子而光。根似蒿根而白。直下獨莖生根。近時指雞冠花子爲青葙子。誤矣。○李氏曰。青葙苗葉花實與雞冠花一樣無別。但雞冠花穗或有大而扁或團者。此則梢間出花穗。尖長四五寸。狀如兔尾。水紅色。亦有黃白色者。子在穗中。與雞冠子及莧子一樣難辨。蘇氏言其結莢者非。）

○青葙。清解風熱之藥也。青。東方木色也。葙。是草似木。其花紅白相映。可悅人目也。上古主邪氣。皮膚中熱。以致風瘙身癢。生蟲。別錄治惡瘡疥瘡。及下部一切䘌瘡。爲厥陰風藥。其子又治肝臟熱邪。眼目赤障。昏盲失明。

李時珍先生曰。青葙子。經言治唇口青。不言治目。惟藥性論有治肝明目之功。今人多用治眼。往往有驗。竊意目乃肝之竅。唇口青。乃足厥陰之證。推而論之。除熱明目。爲厥陰藥可知矣。

燈心草。味甘。氣寒。體輕。無毒。入手少陰太陰。足太陽厥陰經。（寇氏曰。燈心草。生江南澤地。他處雖有野生。但不多耳。叢生圓勁。與龍鬚草同類。龍鬚草莖小堅實。燈心草莖肉瓤虛。爲別也。土人選長大者。蒸熟待冷。劈取白瓤。爲燈炷。細者堪織席。用皮作蓑。可爲雨具。修治入藥。取生劈者良。或飲。或膏。或末。或圓。各隨方製。若研末用研。用生劈白瓤。以米粉調煮稀薄漿糊。拌潤。一時晒燥碾末。入水澄。去漿粉。取浮起者。晒乾收用。拌乳鉢中。易于細而不潤。拌冰片幾分。兩下耗。）

燈心草。通陰竅。利小水之藥也。故開竇閉。治癃閉五淋諸疾。其味甘。其性寒。其體輕。乃清肅之品。善能通利小腸熱氣不行。從小便出。然小腸爲心之府。故亦能除心經熱也。又張氏方謂能消水腫。散喉痺。定驚悸。止小兒夜啼。療大人痰熱。皆取其輕凉清肅之性。以治熱鬱爲諸病。悉主用焉。但性專通利。凡虛脫之病。不宜多用。

盧不遠先生曰。外剛內柔。表青裏白。具乙木之氣。稟燥金之化。體浮用升。故善齊通竅穴。咸徧府藏。奇力之輕劑通劑也。

皇甫雲洲先生曰。按小便之爲竅。水液滲于膀胱。而泄于小腸。熱則不通。冷則不禁。理之常也。亦有虛熱而遺瀝。氣虛而不通者。不可不知。如熱而不通。牛膝、車前、瞿麥、燈心草之類治之。冷則不禁。益智子、補骨脂、[illegible]巴戟之類治之。如虛熱遺瀝。生地黃、地骨皮、黃耆、[illegible]冬。黃柏、知母之類治之。如氣虛不通。人參、白术、黃耆、[illegible]肉桂之類治之。諸治者。宜審證按脉而用。又不可泥

一第十一册　續修四庫全書　第　版反外

以燈心一物也。

○集方（已下五方出方脈正宗）治小水熱閉不通，用燈心草五錢，煎湯頻頻飲之。

○治五淋癃閉，用燈心草一兩，麥門冬、甘草各五錢，濃煎飲。○治水腫，用燈心草四兩，水煎服。○治喉痺腫痛，用燈心草燒灰，和冰片一二釐，研細吹入喉內。○治喉風痺塞，用燈心草一握，陰陽瓦燒存性，又加炒鹽一匙，每吹一捻，日數次立愈。○治破（方脈）傷出血，用燈心草嚼爛敷之立止。○治無（同前）故夜不合眼，用燈心草煎湯代茶飲即得睡。○治濕（同前）熱黃疸，用燈草根四兩，酒水各半，入瓶煮半日，溫服。○治小（同前）兒夜啼驚悸，用燈心草煎湯飲之。

○續補方治下疳[illegible]梗糝方。用燈心草一兩，燒灰，[illegible]攪十五個蓮核燒灰，共研勻細末，糝上即收。○治一切口中苦甘辣鹹酸諸味爲病，以燈心草一握爲君，佐以五經清火藥治之。如口苦者心熱，加黃連、山梔；口甜者脾熱，加黃連、黃芩；口辣者肺熱，加桑白皮、地骨皮；口鹹者腎熱，加黃栢、知母；口酸而苦者，肝膽有鬱火，加龍膽草、柴胡、青皮。配諸藥俱在燈心草見證加煎，漱口，徐徐嚥下。

本草彙言卷之四

錢塘　倪朱謨純宇甫集選　男倪洙龍沖之氏藏稿

沈　琯西雍甫校正

草部（隰草類下）

生地黃，味甘，氣寒，無毒。氣薄味厚，沉而降，陰也。入手足少陰、厥陰，及手太陽經。酒浸上行外行。日乾者平，火乾者溫，功用相同。蒸熟者溫平而補，少滯氣泥膈，惟和砂仁酒而蒸乃佳。

陳藏器曰：地黃出江南懷慶及浙杭，今咸陽、渭城亦有，以江南者爲上。二月生苗，高者不及尺，餘低者僅四五寸，葉似車前葉，上有皺文而毛澀，又似小芥葉而頗厚，中心撮莖，莖上有細毛，莖稍開小筒子花，紅黃色，亦有紫色、白色者，結實如小麥粒，甚細而色沙褐。根長四五寸，如人手指，通黃色，粗細長短不一，間有枝重一

兩外者，汁液最多，雖暴焙極燥，頃則轉潤。古人種子，今惟種根，入土即生。種宜肥壤寬地，則根大而多汁液。其法以葦席圍編如車輪，徑丈餘，以土實葦席中爲壇，壇上又以葦席實土爲一級，比下壇徑收一尺，如此數級。乃以地黃根節多者寸斷之，蒔壇上，層層令滿，逐日水灌，令茂盛。至春秋分時，自上層取之，根皆長大而不斷折，不被斸傷故也。本草以二月、八月采根，殊未窮物性。八月殘葉猶在，莖中精氣未盡歸根；二月新苗已生，根中精氣已上滋于葉。不如正月、九月采者氣全也。又曰：江浙種者受南方陽氣，質雖光潤而力微；懷慶山崖種者稟北方純陰，皮有疙瘩，中有花心，而力大也。李時珍曰：鮮地黃搗汁，治吐血、熱疹及傷寒陽毒熱極，其性涼；日曝乾者爲生地黃，其性平；蒸熟色純黑，其性溫補。蒸熟地法：取地黃百觔，擇肥大者六十觔，洗淨，土氣曝令微皺。以揀下者四十觔，亦洗淨，木石臼中搗爛，絞汁，拌前燥乾地黃，日中再曬乾，甑上蒸半日，即成熟地黃矣。生乾地黃與熟地黃，惟取粗大者爲佳，如細小者恐能滑脾胃，惟入滋潤涼藥料中，[illegible]熱涼血，當用之。

○地黃，涼血補血之藥也。生則入手少陰，涼血而生血；熟則入足少陰，補血而滋陰。所以嘔吐、咯衄、唾血之證，非

也不除。驚悸怔忡，煩熱之證，非此不效。蓋心腎之要藥也。復入厥陰肝經，生則涼血而明目，熟則補肝而益膽。但入少陰心，與太陽小腸經，爲陽分之藥，宜生而不宜熟。是以崩漏淋帶，吐血衄血，溺血便血，瘡疥熱血，或胎動下血，或小便赤澁，大便閉結諸證，當以涼血解熱降火潤燥之劑，生地黃足以治之。入少陰腎經，爲陰分之藥，宜熟而不宜生。是以陰虛不足，血氣有虧，情慾斲喪，精髓耗竭，腎水乾涸，或血虛勞熱，或產後血分虧損，或大病之後，足膝乏力，諸證當以補血滋陰，益腎塡精之劑，熟地黃足以補之。

又按，生地稟仲冬之氣，得北方之正色，合地之堅凝，爲補

腎要藥，益陰上品，故涼血補血有功。血得補，則筋受榮；腎得之而骨强力壯。又胎產勞傷，皆血之愆，血得其養則胎產獲安。又腎開竅于二陰，而血主濡之，二便所以潤也。熟地稍溫，其功更溥，六味丸以之爲首，天一所生之本也；四物湯以之爲君，乙癸同源之義也。久病陰傷，新產血敗，在所必需者也。但二地之性，涼而泥膈，凡產後惡食作瀉，雖見發熱，惡露作痛，不可用。誤用則泄不止。胃氣者，後天元氣之本也。胃困則飲食不運，精血不生，虛熱何自而退？凡見此證，宜多用炮薑、桂心、人參、白朮，必自愈也。凡陰虛咳嗽，內熱骨蒸，或吐血等候，一見脾胃薄弱，大便不實，或天明溏泄，產後泄瀉，產後不食，久病不食，俱禁用地黃。凡胸膈多痰，氣道不利，升降窒塞，藥宜通而不宜滯，湯丸中亦禁入地黃。設有氣證當用而不可無者，則以桂心少佐可也。痰證當用而不可少者，則以薑汁拌炒可也。

盧不遠先生曰：地黃，別名地髓，苗不能高，生意在根，味甘色黃，沉重多汁，當入脾，爲脾之腎藥。熟之則色黑，能入腎塡髓，反爲腎之脾藥。形如血脉，本經用主傷中，塡骨髓，長肌肉，療折跌絕傷諸疾，思其命名地髓，質潤膏肥，可知矣。又謂逐血痺，除寒熱積聚者，何耶？蓋血者，取中焦水穀之液，變化赤色，以行經隧，如水，如汁，如經隧。皆象其形。痺者，閉而不通，隨其血之不通而爲病，如在

目則赤，在齒則痛，在肉理則癰腫，在心則昏煩，在肺則欬血，壅遏而爲身熱，枯耗而爲燥濇痿軟，泛濫而爲吐衄崩漏，血痺顛蹷，各以類推。逐者，俾其流通之義也。觀其入土易生，可知矣。鬚髮爲血脉之餘，血痺則黃赤易見，可使之黑者，痺去而血華也。性惟潤下，功力到時，無便通利，以爲外徵，如血中有痺，則骨髓不滿，肌肉不長，筋脉斷絕，均謂傷中，若塡滿若生長，若接續，皆克成血液之流通者也。所云寒熱積聚，惟從痺字中生出，加一轉語耳。因彼不通，所以積聚，若作五積六聚，用地黃以除之，未有不反益其積聚者。如寒中陽虛，胃弱之證，在所必忌，否則膩膈滑腸，中滿減食矣。

陳廷采先生曰。按丹溪方云。氣病補血。雖不中病。亦無害也。讀之不能無疑焉。夫補血藥劑。無逾地黃當歸。若服過多。其性纏滯。每于胃氣亦有虧爾。嘗見胃虛氣弱不能運行。血越上竅者。用此合成四物湯以爲凉血補血之劑。多服調治。反致胸膈痞悶。飲食少進。上吐下瀉。氣喘嘔血。日漸危迫。去死幾近。此皆因血藥傷其沖和胃氣。安得謂無害耶。大抵血虛。固不可專補其氣。而氣虛亦不可過補其血。所貴認證的真。量劑佐助。庶幾不失于偏損也。

○集方。（方脉正宗共四方）治血崩。血漏。血淋。血帶。不拘新久。用地黃三觔。煎濃汁數碗。再加川黃連。眞阿膠。丹參。牡丹皮。人參。各一

兩。同汁煎稠。濾去渣。緩火慢煎熬成膏。每早晚各服十餘匙。白湯下。如久病虛極。本方再加鹿膠四兩。如法服。

○治吐血不止。用生地黃搗汁一升二合。入眞鹿角膠三兩。砂鍋內煎。以膠化盡爲度。每服一二杯。○治心熱吐衄。以脉數能食者。用生地黃汁一升。入酒煮大黃膏。一兩。同熬將稠。濾去大黃。以生地膏汁頻頻飲。○治鼻出衄血不止。用生地黃和地龍共搗成膏。以薄荷湯調服。每次半盞。徐徐飲。即止。○治吐血便血。以生地黃汁一升。銅器煎沸。入牛皮膠一兩。待化。再入薑汁半盞。分五服。即止。或微轉一次不妨。○治腸風下血。用生地黃酒煮搗膏三兩。北五味子。薑炭各一兩。蒼朮二兩。共爲末。搗和地黃膏爲丸。每早晚各服三錢。○治小便血以生地黃三兩。建蓮肉二兩。麥門冬去心一兩。水五碗煎一碗。徐徐服。○治諸瘡熱血痛痒。用生地黃。土茯苓。各三兩。金銀花。紫花地丁。各一兩。枸杞子四兩。用水十碗煎四碗。徐徐飲。○治胎動下血。用生熟地黃四兩。甘草五錢。雞子清十箇。共煎汁。徐徐飲。○治小便赤澁疼閉。用生地黃一兩。茯苓。車前子。各五錢。燈心百枝。水煎如熱甚。加川黃連一錢。○治大腸血熱。血燥。虛閉不通以生地黃八兩。酒水各四碗。煎汁飲。○治陰虛不足。腎水乾涸。用熟地黃。山茱萸。枸杞子。白茯苓。麥門冬。鼈甲膠。龜板膠。人參。知母。○治產後血分虧損。精神衰憊。用

熟地黃。杜仲。當歸。白朮。白芍藥。丹參。黃耆。枸杞子。阿膠。○治大病後。足膝乏力。精神困倦。用熟地黃於白朮。黃耆。麥門冬。石斛。枸杞子。山藥。山茱萸。○治心虛驚悸怔忡健忘。用熟地黃。人參。遠志。麥門冬。酸棗仁。栢子仁。茯神。甘草。○治產後一切血虛發熱。用熟地。當歸。川芎。蒲黃。炒黑豆。炮薑。澤蘭。益母草。牛膝。續斷。杜仲。鹿角膠。○治鬚髮黃白不黑。用熟地黃。何首烏。桑椹子。甘菊花。蜀椒。○治小兒齒牙不生。用熟地黃。鹿茸。五味子。人參。人乳粉。白茯苓。○治婦人經事不調。用熟地黃。白芍藥。當歸身。川芎。阿膠。蘄艾。香附子。○治男婦子嗣虛少。用熟地黃。人參。枸杞。五味子。麥門冬。鹿茸。車前。覆盆子。兎絲子。

○治男婦精血不足。用熟地黄、沙苑蒺藜、肉蓯蓉、鹿茸、山茱萸、北五味子。○二地入瓊玉膏，爲陰陽兩補之劑。

○治肝腎二經目疾。用懷慶大生地一觔，酒洗淨，真甘州枸杞一觔，用淡水砂鍋內煎汁，以渣無味爲度，去渣，將濟汁裝大瓶內，重湯煮，以汁十耗其九，入煉蜜六兩，收入淨磁瓶內，早晚白湯調服十餘茶匙。○治多思謀慮心神不寧，不能眠者。用懷生地、麥門冬，俱酒煮搗膏，棗仁、茯神、丹參、沙參各二兩，竹茹、遠志、甘草、北五味子，各二錢，俱炒過，共爲末，和入麥冬、地黄膏內，煉蜜爲丸，如彈子大，每早晚各服一丸。此藥安養心神，滋陰補腎，有水火既濟之妙。

六味丸。（治形體虛弱，五藏齊損，腎氣久虛，寢汗發熱，無力；或多因眩暈眼花，耳聾咽燥，腰腿痠軟等證；及腎虛發熱，自汗盜汗，吐血便血，陰虛津液不降，木爲損血虛發熱咳嗽，或爲咳逆，敗濁爲痰；又治小便不禁淋瀝，濕濁，收精氣之虛，撥定妄火之攻冲，使後關利而脾土健藏。又）用熟地黄八兩，酒煮搗膏，山茱萸肉、山藥、白茯苓各四兩，牡丹皮、澤瀉各三兩，俱爲細末，和入地黄膏內，煉蜜丸梧子大，每早服五錢，白湯下。

加肉桂、便製附子，各一兩，名八味丸。（治命門火衰，不能生土，以致脾腎虛寒，飲食少思，大便不實，或下元冷憊，臍腹疼痛。）

加牛膝、車前子，名金匱腎氣丸（治脾腎虛，腰重腳腫，肚腹脹滿，四肢浮腫，小便不利，或喘急痰壅，已成水腫脹蠱之證，非此藥不能救。）

牛膝。味苦微甘，氣寒，性滑無毒。味厚氣薄，陰也，降也。入足三陰經。引諸藥下行甚捷。

（別錄曰：牛膝生河內川谷及臨朐、江淮、閩、粵、川、陝等處。蔡州者最長大柔潤，其莖有節，節大者爲勝。河北者色白，然不及懷慶者爲妙。家栽者爲良。冬初收子，至春種之。春生苗，方莖高二三尺，紫色有節，如鶴膝。葉皆對生，頗似莧而長且尖，秋月節上開花成穗，結實如小鼠負蟲，有澀毛，貼莖倒生。根柔潤而細，一直生下，長者約二三尺。九月采根，洗淨日乾用。凡使須去蘆頭，酒浸入藥。又蘇州者色紫，與江浙並稱土牛膝，性寒，破血通經，利小便閉濁、淋瀝諸證。）

○牛膝健腰膝，壯筋脉，活滯血之藥也。其滋補筋脉之功，如牛之多力也。入厥陰、少陰二經。主風濕寒熱之邪，留滯血脉肢節之間，醞釀成熱，爲病痿痺，拘攣不可屈伸，腰膝軟弱，脚氣腫脹，或夢遺精滑，淋濁澁痛，或產後惡

血留滯不行，或瘧疾久發，血氣凝澁，是皆足三陰風濕寒熱之邪，壅閉成痺之證，惟牛膝可以治之。又逐瘀血，通經脉，落死胎，消癰腫，續折傷，散喉痺，止尿血淋脹，及男婦意念所動，積鬱成勞，血敗精凝諸病，是皆足三陰氣滯血瘀之證，惟牛膝可以行之。大抵牛膝之劑，功在去風活血，故腰膝骨病，與痛風在下者，宜多用之。欲其補腎滋肝，必倍杞、朮、歸、地、山茱萸、鹿角膠，可也。然慎用：傷血墮胎，經閉未久，疑似有娠者勿用；上焦藥勿用；血崩不止者勿用；胃寒溏泄者勿用。

繆仲淳先生曰：牛膝體燥性潤，獨理肝腎二經。肝爲血海而主筋，血海得潤，則經脉通而攣急者解矣；又骨者，

胃所主也腰者腎所府也精者腎所藏也小便者腎所司也理腎則衆疾咸安淋濁澁痛之患除矣有墮胎者以其破血下行耳（以下九方見方脉正宗）

○集方治腰脊軟弱疼痛及一切痿痺四肢拘攣筋骨牽強不能屈伸用牛膝一觔白朮仙茅木瓜石斛石楠葉五加皮萆薢生地黄黄耆白芍藥虎骨杜仲續斷黄柏白蘚皮各四兩酒浸蒸飲或作小丸每早服三錢白湯送亦可○治一身血脉壅滯爲腫爲脹爲痛用牛膝八兩川貝母（去心）製半夏各二兩肉桂五錢共爲末每早晚各服三錢白湯調送○治風寒濕熱四氣相合爲病脚氣腫脹難履用牛膝十兩萆薢蒼朮石斛木瓜各三兩龍膽草一兩分撮十劑水煎食前服○治鶴膝風用牛膝木瓜五加皮骨碎補金銀花紫花地丁黄栢萆薢甘菊根水煎服○治夢遺精滑淋瀝或莖中澁痛用牛膝二兩遠志蓮肉生地黄甘草滑石牡蠣粉各五錢共爲末燈心湯調服○治小便不利莖中痛欲死兼治婦人血結腹堅用鮮牛膝三四兩白酒煎濃服之立愈○治產後惡血留滯不行用牛膝紅花各一兩乳香沒藥當歸尾川芎玄胡索五靈脂各三錢草烏二錢酒洗炒水煎服○治久瘧不愈用牛膝白朮鱉甲當歸半夏各五錢生薑五片黑棗五箇水煎服○治婦女經水不通用牛膝當歸各四兩爲末煉蜜丸食前白湯下五錢○

治胎死不下或胞衣不出用牛膝八兩冬葵子一合朴硝五錢當歸尾一兩水六升煎二升分三次服○治熱毒癰癧或卒得惡瘡不辨識者用新鮮土牛膝八兩搗爛取汁和生白酒飲以渣敷毒處可減大勢○治跌打閃肭折傷節骨用牛膝當歸尾各八兩水煎頻頻飲可止痛消腫續折○治喉痺乳蛾用鮮牛膝根一握艾葉七片搗和入乳汁灌入鼻內須臾痰涎從口鼻出即愈○治小便帶血用牛膝四兩生地二兩水煎頻頻服立止○治婦人陰痛用牛膝五兩酒三升煎取一升去渣溫服○治生胎欲去用牛膝一握搗以無灰酒二碗煎八分空心服仍以獨根土牛膝塗麝香插入牝戶中○治消渴不止下元虛損以牛膝五兩生地黄汁五兩水煎徐徐服久服駐顏色黑髩髮津液自生也○治金瘡作痛用牛膝生搗敷立瘥

海上方治眼科諸疾用川牛膝五錢蟬退甘菊花各三錢燈心二十根水煎服○治暴發赤腫者暴赤失明者暴生翳膜者暴發風淚者暴發疼痛連及頭腦者發熱惡寒嘔逆者俱加荊芥薄荷白芷前胡羌活防風乾葛黄芩木賊白蒺藜葳蕤甘菊內熱甚者加石膏黄連大便秘結者加酒煮大黄如久病目昏冷淚黑花視物目珠疼痛或勞傷目力或色慾傷神俱加生熟地黄當歸川芎枸杞知母白朮黄耆甘草白芍葳蕤麥冬

紫菀。味苦，氣溫，無毒。入手太陰，兼入足陽明經。（蘇氏曰：紫菀生漢中房陵山谷及眞定邯鄲，今所在處有。三四月布地生苗，其葉二四相連，五六月開黃白紫花。本有白毛，結黑子。根極柔潤，色紫有節，宛如茈劉之下垂也。又白色者名女菀，治療相同。按陳自明云：紫菀以牢山所出，根如北細辛者爲良，沂兗以東亦有之。今人多以車前、旋覆根以赤土拌染僞充，不可不辨。修治去鬚頭及土，水洗淨，曬乾用。）

○紫菀順肺氣，散鬱結，止勞嗽之藥也。（朱丹溪）其色紫，其性潤，其味苦辛，故本草主欬逆上氣，胸中寒熱結氣，欬逆肺痿也。胸中，肺部也。肺中有火，清氣爲熱所結，內鬱而爲欬喘痰涎膿血之證，外發而爲痿躄體軟脊强之證，皆屬火傷金鬱之病也。如別錄治小兒驚癇，大人虛損，老人血枯氣燥，大便不通，悉能治之，總解金鬱之用也。觀斗門方，謂能開喉痺，取惡涎，則行散之功烈矣。而其氣溫，如肺病欬逆喘嗽，皆陰虛肺熱證也，又不宜專用及多用，即用之，亦須與天麥門冬、生熟地黃諸寒潤藥并劑方善。

李士材先生曰：紫以色名，菀以功名。菀，鬱也，解肺金之鬱也。又味苦兼辛，苦能下達，辛可清金，故吐血保肺，收爲上品。雖入至高，善于下趨，使氣化及于州都，小便自利，人所不知。

○集方：治肺傷風寒，氣閉咳嗽，用紫菀、前胡、杏仁各三錢，生薑三片，葱頭三個，水煎服。（方大全，共四方）○治陰虛勞嗽，用紫菀、款冬花各一兩，川貝母、百部各五錢，共爲末，作散，每服三錢，北五味五粒泡湯送下，或蜜丸噙化亦可。○治虛勞咳嗽胸脹，氣逆寒熱諸證，用紫菀、銀柴胡、北沙參各三錢，麥門冬五錢，水煎，日服一劑，漸效。○治虛勞肺癰膿血，聲音不亮，用紫菀、百合、麥門冬、懷熟地各四兩，煎膏服。○治虛勞肺痿，漸至四肢痿躄者，用紫菀八兩，百合、麥門冬、懷熟地、葳蕤、於白朮各四兩，爲丸，食前服三錢，漸效。○治小兒欬嗽聲不出者，（全幼心鑑）用紫菀、杏仁等分，爲末，煉蜜丸如芡實大，（錢氏方）每服一丸，北五味子三粒泡湯化下。○治小兒驚癇，用紫菀煎湯，調抱龍丸，立效。○治產後（聖惠）下血，用紫菀末，水煎服。○治婦人（千金方）小便卒不得出者，用紫菀爲末三錢，白湯調服，即通。又小便出血，服五錢，立止。○治纏喉（斗門方）風閉，不通欲死，用紫菀并莖洗淨，納入喉中，待取惡涎出，立瘥。更以馬牙硝五分，用津唾嚥下，即除根。

續補方：治婦人手足麻痺不仁，是七情六鬱滯經絡也。用紫菀四錢，紫蘇、陳皮、香附、烏藥、川芎各一錢，白朮、半夏、當歸、葳蕤各二錢，桂枝、紅花、甘草各七分，黑棗三個，水煎服。○治婦人癲疾，歌唱無時，踰墻走屋，不避親疏，是七情六鬱鬱結所致，乃瘀血凝痰迷于心包絡也。用紫菀三錢，柴胡、半夏、膽星、蘇木、桃仁各二錢，白芥子、白朮、當歸、川芎、生地黃、酸棗仁各一錢五分，水煎服，臨服時調辰砂末三分。

麥虋冬。味甘微苦，氣寒，質潤，無毒。入足陽明，兼手太陰、少陰經。實陽明之正藥也。（李時珍先生曰：麥鬚曰虋，此草根似麥而有鬚，其葉如韭，麥冬不凋，故謂之麥虋冬。從門，便于字也。可以服食救饑，故又有禹餘糧之稱。又按別錄：葉如韭，冬夏長生，生函谷川谷及隄坂肥土石間者，多野生；出江寧、新安及仁和筧橋者，多種蒔。七、九、十一月上糞及耘灌，夫年夏至前發采。前人皆用野生者，細纖香美，宛如麥粒，功力更勝也。四季不枯，秋冬根葉轉茂，叢生如韭，青似莎草，長尺餘，多縱理。四月開花如蓼，結實翠綠如珠。根鬚叢冗，如蟬貫綴，連絡纍若琅玕，色白如瑩玉，中心堅勁，最多脂液也。修治以熱湯潤軟，抽去中心用。如作丸劑，蒸爛搗膏，入藥內。）

○麥門冬，清心潤肺之藥也。主心氣不足，驚悸怔忡，健忘恍惚，精神失守；或肺熱肺燥，咳聲連發，肺痿葉焦，短氣虛喘，火伏肺中，咯血咳血；或虛勞客熱，津液乾少；或脾胃燥涸，虛秘便難。此皆心肺腎脾，元虛火鬱之證也。然而味甘氣平，能益肺金；味苦性寒，能降心火；體潤質補，能養腎髓，專治勞損虛熱之功居多。如前古主心腹結氣，傷中傷飽，胃絡脈絕，羸瘦短氣等疾，則屬勞損明矣。故孫真人方，治六七月間暑熱方熾，人病汗多，氣乏，筋弛骨怯，甚則軟痿無力，用生脈散，以麥門冬配人參、北五味子，補其天元真氣，復脈通心。又與熟地黃、枸杞子、龜甲、阿膠、黃耆、白朮同爲潤經益血之劑，但火盛氣虛之人服之相宜。若久病虛寒泄瀉，痘瘡虛寒泄瀉，產後虛寒泄瀉，胃滯濕痰泄瀉，咸忌之。

王紹隆先生曰：麥門冬，具稼穡甘，稟春和令。當入足陽明，爲陽明之體用藥，故本經所陳諸證，皆屬陽明之上爲病，若痿躄又屬陽明之下爲病。經云：陽明爲闔，闔折則氣無所止息，而痿疾起矣。是以治痿獨取諸陽明。陽明爲五藏六府之本，五藏六府皆受氣于陽明故爾。

盧子由先生曰：保心之神，定肺之氣，安肝之魂，補腎之精，因脾轉鬪者，無所不宜。若肺傷則蒸，經絡斷絕，致血液妄行，經水枯竭，變生煩熱，焦渴者，必須潤經益血之品，其惟麥門冬乎。

○集方。治心氣不足，驚悸怔忡，健忘恍惚，精神失守。用麥門冬、人參、茯苓、遠志、棗仁、白朮、當歸、甘草、半夏。○治肺燥作咳，用麥門冬、知母、川貝母、桔梗、懷生地、百合、款冬花、桑白皮、杏仁、前胡。○治肺痿葉焦，短氣虛喘。用麥門冬、百合、米仁、款冬花、天門冬、紫菀、懷熟地、桔梗、沙參。○治火伏肺中，咯血咳血衄吐血衄血。用麥門冬、知母、生地、熟地各二兩，煎膏，不時徐徐用白湯調服，不可蜜收。○治虛勞客熱，用麥門冬一斤，熬濃汁，時時飲。○治心肺虛熱，虛勞客熱，用麥門冬五兩，北五味、北沙參、知母、川貝母各二兩。○治脾胃虛燥，便難，用麥門冬、當歸身、懷熟地各四兩，麻仁、桃仁、杏仁、棗仁各去外皮，各一兩，搗如泥，共爲丸，每食前服五錢。○治消渴飲水不止，用新鮮麥門冬八兩，去心，搗爛，宣州黃連二兩，爲細末，和入麥門冬膏內，以[illegible]手和丸，如梧子大，每食後，米湯下三百丸。○

治陽明熱瘧，大渴引飲，用麥門冬三兩，知母二兩，石膏一兩，竹葉五錢，煮汁飲之。如人虛，加人參五錢；痰多，加川貝母、橘紅各五錢。○治下痢口渴，引飲無度，用麥門冬去心五兩，烏梅肉二十箇，以水二升，煎濃汁，徐徐呷之。（本草匯編）○治金石藥發，用麥門冬四兩，甘草一兩，菉豆三合，三味共為丸，蜜和，每服三錢，燈心湯下。○治骨蒸勞熱，用麥門冬四兩，青蒿、鼈甲、牛膝、熟地、白芍藥、枸杞子、北五味子、胡黃連、山藥、茯苓、山茱萸各二兩，蜜丸梧子大，每服三錢。

補中益氣湯，加麥門冬方。（治中氣不足，或誤服尅伐，四肢倦怠，口乾發熱，飲食無味，或飲食失節，勞倦身熱，脉洪大無力，或頭疼惡寒自汗，或氣高而喘，身熱而煩，脉微細軟弱，自汗體倦少食，或中氣虛弱而不能攝血，或飲食不調而患瘧痢等症，因脾胃久虛而不能愈者，或元氣虛弱，感冒風寒，不勝發表，用此代之，或入房而後勞役感冒，或勞役感冒而復入房者，急加附子。愚謂人之一身，以脾胃為主，脾胃氣實，則肺得其所養，肺氣既盛，水自生焉，水升則火降，水火既濟，而合天地交泰之令矣。脾胃既虛，四臟既無生氣，故東垣先生著脾胃內外傷等論，諄諄以固脾胃為本。所製補中益氣湯，又冠諸方之首，觀其立方本旨，可知矣。故曰補腎不若補脾，正此謂也。）人參、黃耆、白朮各一錢五分，當歸一錢，甘草八分，柴胡七分，陳皮六分，升麻五分，生薑三片，黑棗三個，水煎服。魏正菴加麥門冬二錢更妙，故錄而附之。

石龍芮　味苦，氣平，無毒。（子根亦同）

（別錄曰：石龍芮生太山川澤石邊。蘇氏曰：出四川益州，葉芮芮短小，有缺，子綴綴色黃，味辛。李氏曰：石龍芮有兩種，水中生者，葉光而子圓；陸地生者，葉毛而子鋭，入藥用。水生者為佳，陸生者有毒，不可食，似水堇，名胡椒菜者，真也。處處有之，多生近水下濕地，高尺許，其根如薺，二月生苗，叢生，圓分枝，一枝三葉，葉青而光滑，有三尖，多細缺，四五月開細黃花，結實如大豆，狀又如初生桑葚，青綠色，搓散則子甚細，如葶藶子，即石龍芮也。宜半老時采之。江淮人三四月采苗，名水堇，瀹過曬乾，蒸黑色為蔬，甚美。收采以三月采苗，六月采子，八月采皮，用。）

○石龍芮，補陰精，祛風燥之藥也。原生水旁，性寒而潤，凡相火熾盛，陰虧精虛者，以此充入諸滋補藥，服食甚良。故本草主風寒濕熱成痺，有潤養筋脉之功；主補腎益精，明目，有育嗣延齡之妙。古方多用之，其功與枸杞、覆

盆子相等，而世人絕不知用，惜哉。

沈則施先生曰：石龍芮，古方稱為補劑，而人不知用者，何也？此物原有兩種，水中生者，取用補劑甚佳；而陸生者，形狀與水生者無異，而葉稍有細毛為別，另名天灸，有大毒，誤食害人。取少葉揉爛，繫臂上，一宿即起大泡，狀如火疔，焮赤。一物兩種，善惡懸隔如此，因其形狀相似難辨，今人疑畏，故多不用也。

冬葵子：味甘，氣寒，無毒。氣味俱薄，淡滑爲陽。其苗葉根功用與子相同。（別錄曰：葵生少室山中。今郊野園圃，不拘肥瘠地都有，四時可以子種，[illegible]根亦再發。秋深布子，覆養經冬者，曰冬葵，入藥最良。[illegible]葉作紫莖，甚甘美。內經云：脾之菜也。又云：葵爲百菜之主，味尤甘滑，故爲馬膳。其子雖經年不浥。微炒令爆炸，[illegible]着濕地，遍蹈之，朝種暮生，遠不過宿。實如指頂，皮薄而扁，實內子輕虛如榆莢仁。採必待露解，收必待霜降，[illegible]則黃爛，早則黑濕。其莖挺生，莖疎葉密，傾向太陽，而不照其根。其芽裂，其花繁，花具五色間色，單瓣千瓣[illegible]。農書云：本豐耐旱，可防荒儉，以作葅臘，拮拮可以傍[illegible]根子，又能療疾，成無遺棄，蔵蔬茹之要品，民生之衣[illegible]也。種類亦多，有露葵、莧葵、黃葵、錦葵、蜀葵，皆有功用。入藥者只宜蜀葵。今市肆一種充冬葵子者，氣味濁惡，[illegible]不禍，質沉重，形如循孩，服之令人腸[illegible]，且損脾傷胃也。）

○冬葵子，滑腸利竅之藥也。故古人主五癃，利小便。而別錄又通乳閉，出痘瘡，消水氣，滑胎催生。此乃流氣脈、通

營衛、行津液，爲先鋒也。又按婦科良方云：治乳婦氣脈壅塞，乳汁不行，乳房脹痛，留畜作癰者，用此藥炒香爲末，熱酒調服三錢，立時消散，則其性之滑利，善行經絡可知矣。其苗葉作菜食，甘美可口，能去腸胃積熱。若毒痢，若斑疹，若痧脹，若黃疸，若腸癰膿血留難，若服餌丹石熱藥，並宜食之。但性寒善利，如裏虛胃寒人，并風疾宿疾，天行病後，曾被大傷者，咸忌之。世人但知能發宿疾，不知不許人有久癥患害，爲他日卒中之虞耳。

○集方：治大小便不通，欲死者，用冬葵子一升，水二升，煮取一升，納雞子清二箇，頓服，渣再煮，效即止。○治乳汁不通，用冬葵子二兩，炒香，配砂仁各等分，爲末，熱酒調服三錢。○治癰疽無頭，用冬葵子二百粒，白湯吞之，當日即開也。○治水腫身重，小便不利，洒淅惡寒，起即頭眩，用冬葵子、茯苓各三兩，爲末，每服二錢，白湯調下，日三服，小便利則愈。○妊娠足月不產，或臨產崎嶇難下，用冬葵子一合，搗末，水一升，煮汁半升，頓服，即產。○治血毒痢，用冬葵子炒黃爲末，每服二錢，白湯調服。○治斑疹痧脹，用冬葵子二合，煮汁溫服。○治黃疸心胸脹滿，用冬葵子炒黃爲末，每白湯調服二錢。○治腸癰內潰，膿血脹悶不行，用冬葵子二合，爲末，白湯調服。○治服食丹石毒熱等藥，用冬葵子、菉豆各一合，爲末，溫湯調服。○治胎死腹中，用冬葵子一合，熱酒調服。若口噤

不開者，灌之立甦。○治胞衣不下，用冬葵子一合，牛膝一兩，水二升，煎一升服。

蜀葵：味甘，氣寒而滑，無毒。陰中陽也。（蘇氏曰：蜀葵生江南、湖北園圃中，惟蜀產者更勝。葉似葵葉，又似絲瓜葉，有岐叉，過小滿，岐長莖，高五六尺。花似木槿而大，有深紅、淺紅、紫、黑、白、蜜合等色，又有單瓣千瓣之異。昔人謂其疎莖密葉，翠萼艷花，金粉檀心者，頗善狀之。惟紅白二色入藥。其實似芋薺而扁，內仁如馬兜鈴，輕虛易種，其皮可緝布作繩。又一種，其花大如五銖錢，粉紅色，有紫縷文，名曰錦葵，入藥功用與蜀葵更勝。五月人家供于庭前，俗云碎米。）

○蜀葵、錦葵，苗葉子功用與冬葵同等，茲不復贅。惟采根用，治腸胃生癰，極驗。若方治內癰，臍腹冷痛，敗血腥穢不行者，用單瓣蜀葵根、白芷各一兩，枯礬五錢，共爲末，黃蠟溶化爲丸，梧子大，每空心米湯下二錢。（待膿盡，而服調補藥。）

酸漿草。苗葉莖。味苦。氣寒。無毒。（別錄曰。酸漿。生荊楚川澤及人家田園中。或故墟垣塹間。高二三尺。苗如天茄子。三月開小白花。旋結青殼。熟則深紅。殼中子大如櫻桃。從熟時亦變深紅。核中復有細子。如茄子。食之有青草氣也。四月采莖葉。五六月采子。可食。）

○酸漿草。苗葉。治熱毒。解煩渴。利水道之藥也。搗汁服。散黃疸。淸濕熱。其子研爛。白湯調服。催生立時分娩。小兒食之。能除熱疳骨蒸。

漆姑草。味甘辛。氣寒。無毒。（別錄曰。漆姑草生蜀郡山谷。方不入用。人無識者。所在平澤有之。生陰濕地。亦生石縫間。葉似菊花。子類枸杞子。根如遠志。無心有棱。三四月採苗葉。陰乾用。）

○漆姑草。治熱血疥癬。風毒瘡疹之藥也。觀其苦辛寒烈。苦能泄。辛能散。前人治一切熱毒惡瘡。禿瘡蟲疹。及大人小兒丹毒齲齒。并諸蟲毒。水成瘡。漆毒溪毒等瘡。宜療之。搗汁和酒服。即見効也。

敗醬草。味苦。氣寒。無毒。乃手足陽明厥陰四經藥也。（陶隱居曰。敗醬。一名苦菜。又名苦蘵。諸家本草混入敗醬。苦蘵龍葵同條。種類則迥別矣。生江夏川谷。所在溪澗近水處。或高岡土陵。亦有。江東人采作菜。漂去苦味。有陳醬氣。故名。李時珍曰。春初生苗。鋪地。葉似菘菜葉而狹長。有鋸齒。綠色。面深背淺。夏秋莖高一二尺。數寸一節。節間生葉。各抱小枝。四散如繖。五月白花成簇。如芹花蛇床子花狀。結小實成簇。其根白紫色。形似柴胡。八月采取。曬乾用。）

○敗醬。解鬱熱。破宿血之藥也。甄氏方治癰腫結熱。毒風瘰痺。破多年宿血。能化膿為水。善催生落胞衣。或產後血凝腹痛。及赤熱障眼。努肉凝結。并暴熱吐血。失血丹毒熱毒等疾。但苦寒之物。如久病胃虛脾弱。泄瀉不食之證。一切虛寒下脫之疾。咸忌之。

繆仲淳先生曰。仲景公治腸癰為病。其身甲錯。腹皮急。

按之濡。如腫狀。腹無積聚。身無大熱。此為腹內有癰膿。不獨焦燥肺金之形。殺并毀敗府合之大腸矣。敗醬獨當其鋒。可一鼓而愈也。

李時珍先生曰。敗醬善排膿破血。故仲景治腸癰。及婦人科血疾。古方皆用之。極驗。乃易得之物。而後人不知用。惜哉。

○集方。（方脉正宗）解三焦鬱熱。用敗醬一把。配黃芩。甘草。各三錢。燈心。百根。煎服。○治產後宿血內病。用敗醬。二兩。沒藥。乳香。各三錢。當歸。川芎。各一錢。香附。續斷。俱酒洗。各五錢。共為末。每早服二錢。白湯調服。○治腹癥有膿。用敗醬。二錢。薏苡仁。五錢。附子。八分。水三升。煎一升。頓服。大小

便一行即愈。○治產後血氣流入腰腿，小腹痛不可轉側者。用敗醬三錢，當歸二錢，川芎、白芍、肉桂各一錢，水三升，煎一升，徐徐服。○治產後腹痛如錐刺不可忍者，用敗醬八兩，水五升，煮取升半，每服二合，日三服。○治臨產催生。用敗醬二兩，酒水共三碗，煎一碗，服。○治赤眼障痛，弩肉攀睛。用敗醬一握，荆芥草、决明、木賊草各二錢，白蒺藜一錢五分，水煎服。○治吐血衄血因積熱妄行者。用敗醬二兩，黑山梔三錢，懷熟地五錢，燈心草一錢，水煎，徐徐服。

款冬花　味甘辛，氣溫，無毒。陰中有陽，降也。入手太陰經。（蘇氏曰：款冬花，出關中，及雍州南溪水、華州山谷水澗，澗多叢生。葉似葵葉而大，又如荷葉而斗直，大可容升，下可容數合。冬月積雪中，開花紅色。一種去土一二寸，出萼如箭，色青紫，通直而肥，開黃色花，花在莖。近舊氏曰：十一月採花，陰乾，須取微見花者，如已開泛，則無氣力。揀去向裏裏花蕊殼，所向裏實如粟零殼及枝葉。傅咸云：予于仲冬之月，登北山，冰凌盈谷，積雪深厓，見款冬燁然華艷，寒秀斯時是也。）

○款冬花：溫肺潤肺，清肺斂肺，調肺補肺之藥也。故本草主欬逆上氣，喘嗽喉痺，寒熱邪氣諸證，以其辛溫而潤，散而能降，補而能收，爲治嗽要藥。于肺無分寒熱虛實，皆可施用。又得生薑、前胡、白豆仁，可溫肺寒；得天麥門冬、知母、玄參，可潤肺燥；得黃芩、桑白皮、薄荷葉，可清肺熱；得人參、麥門冬、北五味子，可斂肺脫；得蘇葉、桔

梗、陳皮、杏仁，可調肺逆；得黃耆、人參、甘草，可補肺虛；得葶藶、麻黃、桑白皮，可泄肺實；得百合、茯苓、甘草、枇杷葉，可保肺急；得前胡、防風、杏仁、葱白，可退肺中寒熱邪氣；得生熟地黃、天麥門冬、知母、貝母，可療肺中痰血咳嗽，爲調肺之總司，治嗽之良劑也。

繆仲淳先生曰：款冬花，其味辛甘，溫而無毒，陰中含陽，散也，降也。辛能散而能潤，甘能緩而能和，溫則通行不滯，善能降下。欬逆上氣，喘嗽喉痺，寒熱邪氣，消渴喘息，呼吸諸病，一皆氣升火炎之勢也。氣降則火自降，氣降則陽交于陰，水火既濟，既濟則火不上炎，氣不逆升，時不交離，得清肅之令，而諸證自退矣。

李士材先生曰：雪積冰堅，欵花偏豔，想見其純陽之質，故其主用，皆辛溫開豁也。却不助火，可以久任。

○集方：治痰嗽帶血。用款冬花、百合，各等分，焙燥，爲極細末，煉蜜丸如龍眼大。每臥時嚼一丸，薄荷湯下。

久嗽噙化丸：用款冬花蕊、甘草、百部、川貝母、桑白皮、天花粉、玄參、紫菀各二兩，俱用蜜水拌炒；北五味、陳皮、桔梗各一兩；龍膽、薄荷葉三兩，俱微炒。共爲細末；眞柿霜四兩另研；麥門冬、天門冬俱去心，各三兩，酒煮，搗膏，和入前末子内，再加煉蜜丸如彈子大。每日不拘早晚，不時噙化，隨津液嚥下，臨臥更佳。

海上方：治咽喉諸證腫痛生瘡者，閉塞者，紅腫結核脹痛者，閉塞不能言語者，結蛾水漿難食者，俱是風熱痰氣爲患。俱用款冬花五錢，土牛膝三錢，射干二錢，水煎服。先用米醋噙口中，泪漱，咯拔涎痰後，服此藥即消。

明子。味鹹苦，氣平，無毒。足厥陰肝經正藥也。又入膽腎二經。（李氏曰：決明以能明目，故名。生龍門川澤，今處處有之。爲園圃所蒔。夏初生苗，高三四尺，本小末大，根微紫色。葉似苜蓿而大，晝開夜合，兩兩相貼。七月開花，淡黃五出，結莢如初生細豇豆，長二三寸。莢内結子，其色青碧，味苦。一莢十數粒，參差相連，狀如馬蹄，下大上銳。十月收采。一種莖葉根形酷似，但本小末尖，葉不夜合者，名爲茳芒。救荒本草所謂山扁豆是也。花亦黃色，五出，結莢如小指，長一二寸。莢中子如黃葵子而扁，其色褐，味甘滑。二種苗葉花皆可瀹茹及點茶食。如入藥用，惟用長蹄決明子爲佳。外又有一種草決明，葉黃銳，赤華，結實如山茱萸，蜀中謂之蘇薺荏，與此二種實不類。）

○決明子：祛風散熱，清肝明目之藥也。肝開竅于目，因而清肝，故本草單主目疾，去赤障白膜，淚出青盲，搗爛水調，熁太陽穴，治頭風頭痛。又貼心胸，止吐血衂血。作枕，統治頭腦耳目一切風熱諸病。又敷蛇咬，解蛇毒。其葉湯淪作蔬食，利五藏，解一切蘊熱，甚良。但味鹹走血，氣寒而散，治目疾因熱傷血分，致血液凝滯者，罔不相宜。倘屬氣分及風冷致目中諸證者，非所宜也。

王紹隆先生曰：決明子稟陰精之體，具青陽之用，宜入肝腎。肝開竅于目，瞳子精腎所司也。

○集方：治肝虛目昏。用決明子、沙蒺藜、甘菊花，俱酒拌炒；枸杞子，鹽水洗；槐實、穀精草、女貞實，童便拌炒，各二兩；生地黃切片，酒水洗炒，各六兩。共爲末，煉蜜丸梧子大。每早服三錢。○治暴赤風眼淚痛。用決明子、蔓荊子、甘菊花、生地黃各二錢，荊芥、甘草、玄參、連翹、木賊各一

錢水煎食後服。○治積年失明，用決明子三升，磨為末，每食後粥湯調三錢服，久有效。○治癬瘡延蔓，用決明子一兩為末，入水銀二錢，研不見星，擦破上藥立瘥。○治發背諸癰毒初起，用決明子生用一升，搗爛，生甘草一兩，水三升，煎一升，分二服。

○茳芒生道旁，葉如決明而小。性平，無毒。火炙作飲極香，能除痰止渴。

（治一切頭風頭痛，用決明子、蔓荆子、柴胡、防風、天麻、黃芩、當歸、川芎各一錢五分。肥人頭痛是溼痰，加半夏、白术、茯苓、陳皮。瘦人頭痛是血虛痰火，加生熟地黃、白芍。感熱惡心嘔吐頭痛是頭中風寒，加羌活、藁本、白芷。頭痛偏左者屬風與血虛，倍防風、當歸，加芍、熟地黃。頭痛偏右者屬痰與氣虛，倍天麻、決明子，加白朮、黃耆。頭旋眼黑，惡心兀兀欲吐，頭痛者是痰厥頭痛，倍天麻、蔓荆子，加半夏、膽星、甘菊花、白附子。偏正頭痛者是風邪上攻，倍防風、蔓荆子，加薄荷、荆芥、白芷、羌活。日重夜輕，見寒涼頭痛稍止者是熱厥頭痛，倍柴胡、黃芩，加黃連、石膏、大黃、黑山梔。頭項強急者是風痓頭痛，加桂枝、白芷。頭痛多起核塊者是雷頭風，痛連目赤痛，發熱惡寒，狀如傷寒，加升麻、薄荷、羌活、細辛。○治耳鳴鼻塞，頭風頭痛，牙齒痛，目中出淚，用決明子、乳香、沒藥、川芎、雄黃、白芷、玄明粉各二錢，共為細末，吹鼻孔中即止。）

瞿麥。味苦辛，氣寒，無毒。沉而下降之藥。入手少陰、太陽二經。

（李氏曰：瞿麥即洛陽花也。所在有之。莖細有節，高一二尺。葉似石竹，又似地膚。稍頭開花，田野生者花大如錢，紅紫色。人家栽者花稍小而嫵媚，有紅紫粉藍斑爛數色。結實如燕麥，內子紫黑而扁，根紫黑色，結實與麥同形，故名。秋後收采，陰乾用。雷氏曰：只用蕊殼，不用莖葉。若一時同使，令人氣噎及小便不禁也。）

○瞿麥，破血下氣，通利下竅而行小便之藥也。寒能散熱，苦能利便，辛能破血，故本草主關格諸癃結，小便不通，決癰腫，破胎，下閉血，為急方通劑也。但性味苦辛而寒，氣猛利，善下逐。凡腎氣虛而小腸無大熱者，忌之。胎前產後，一切虛人，患小便不利者，法並禁用。如水腫臌脹，脾虛胃弱者，亦不得輕施。

李東垣先生曰：瞿麥利小便，為君主之用，故八正散專之。若心經有熱而小腸氣虛，脹滿，心熱未除而小腸作病矣。

李時珍先生曰：古方治產難，有石竹花湯，取其破血利竅也。

○集方：治小便不利，有水氣者，用瞿麥一兩，天花粉二兩，雞子一箇，茯苓、山藥各三兩，共為末，煉蜜丸梧子大。每服百餘丸，白湯下，日三服。○治癰腫疔瘡，瞿麥燒灰，菜油調敷。○治子死腹中，或產經數日不下，以瞿麥煎汁飲之立下。○治下焦結熱，小便淋閉，或有血出，或併大便出血，用瞿麥穗一兩，炙甘草七錢，黑山梔五錢，共為末，每

服四錢，白湯調服。○治目赤腫痛，浸淫成瘡，用瞿麥搗汁點大眥內。

淡竹葉味甘，氣寒，無毒。入手太陽經。（根名碎骨子。）

（李氏曰：淡竹葉所在田野俱有，春生苗，高數寸，莖小葉綠，細竹莖，如竹米落地所生，但柔嫩爲異耳。八九月作穗，細長，一窠數十鬚，鬚上結子，如麥門冬根，而但堅硬。土人采其根苗，搗汁造麯，釀酒甚芳冽也。名竹葉，象形。碎骨言其下胎也。）

○淡竹葉清心火，利小便，通淋閉之藥也。淡味，五臟無歸，但入太陽，利小便爲專用，有走無守。證因氣壯火鬱，小水不利，用無不宜。如陰虛清氣不化者，又不可用。根性極冷，善能墮胎催生，妊婦勿輕試也。

○集方：治小便不利，淋閉不通，因氣壯火勝者，用淡竹葉一兩，甘草一錢，木通、滑石各二錢，水煎服。

○治小兒胎熱，母孕時多食炙煿之物，生下面赤眼閉，口中氣熱，焦啼燥熱，用淡竹葉、甘草、黑豆各三錢，燈心廿根，水一碗，濃煎三四分，頻頻少進，令乳母亦服。○治小兒胎寒，母孕時受寒，兒生下面色青白，四肢厥冷，大便青黑，口冷腹痛，身起寒慄，淡竹葉五分，燒灰，白术、桂心、細辛、黃耆、甘草各一錢，俱研細末，每服一分，以乳汁調下。

王不留行味苦，氣平，無毒。陽中陰也。入足厥陰，又陽明、衝任之藥也。

（蘇氏曰：王不留行生江浙、河東諸處，苗莖俱青，高五六尺，葉對莖生，似松藍葉。四月開花，黃紫色，或紅白色，如鈴鐸狀。實殼若酸漿子，殼有五稜，殼內包一實，大如豆，內細子大如黍粟，形圓色黑。根黃如薺。三月收苗，五月摘子，根苗花子通用。）

○王不留行，行血止血之藥也。古方治金瘡出血不止，解心熱鼻衄横流，又通乳汁，散乳癰，催生達產，行留血，住淋血，兩有奇驗。或人言性走而不守，雖有王命不能留其行也。古云：穿山甲、王不留，婦人服此乳常流，乃行血之力耳。如失血病、崩漏病，及孕婦，並須忌之。

盧不遠先生曰：命名之義亦奇。吾身有王，所以主吾身之氣血，及主氣血之流行者。氣血之留，王不留，則留者行矣；氣血之行，王不行，則行者留矣。顧血出不止與難產無乳者，兩可用此，其義自見。

○集方：治血閉不行，經脈淋澀，不行不止，用王不留行一兩，當歸稍、紅花、玄胡索、牡丹皮、生地黃、川芎、烏藥各三錢，共爲末，每早服三錢。○治血淋不止，臥久，諸藥不效，用王不留行一兩，當歸身、川續斷、白芍藥、丹參各二錢，分作二劑，水煎服。○治金瘡出血不止，或被刀斧傷損亡血，用王不留行一兩，川椒三錢，甘草、炮薑、白芍藥各三錢，俱炒黃，爲末，每服三錢，白湯調下。○治鼻衄不止，用王不留行五錢，濃煎服，立效。○治婦人乳少，因氣鬱

者用王不留行五錢。穿山甲。瞿麥穗。麥門冬。各三錢。濃煎汁。徐徐飲。再食豬蹄羹。又以木梳梳乳。一日三次。○治乳癰初起。用王不留行一兩。蒲公英。瓜蔞仁。各五錢。當歸稍三錢。酒煎服。○治難產。用王不留行五錢。當歸川芎。生地黃。白芍藥。各三錢。立產。○治疔腫初起。用王不留行子。蟾酥。各等分。共爲末。丸黍米大。每服三丸。酒下。汗出即愈。

三白草。味甘辛。氣寒。有小毒。（蘇氏曰。三白草出荊襄南北吳越間。今所在亦有。凡田澤溝畔間尤多。三月生苗高數尺。葉如薯蕷葉。對生。小暑後莖端發葉純白如粉。五月葉旁遂開花成穗如蓼花狀。色白微香。結子細小。葉根先青延至葉尖則盡青矣。）

（根長而白。虛軟有節。根間白鬚宛如菖蒲根。根汁搜麥麪造餹釀酒。色氣味甘香殊勝也。）

三白草利水除濕。化痰逐瘧之藥也。此藥性味苦寒。善降。故唐本草稱治水腫腳氣可知矣。陳氏方。又言搗汁服。可吐痰瘧。散胸中熱涎。則辛寒又善湧也。總療濕熱痰三證。在下者。降而抑之。故水腫腳氣除。在上者。湧而散之。故痰瘧胸涎退。此乃流利消蕩之劑。寒而有毒。如脾虛久病。胃弱少食者。宜審用之。

○集方。治濕熱侵四肢。水腫。用三白草連根莖葉一把。大腹皮一兩。生薑皮五錢。白茯苓二兩。水煎服。○治痰瘧久不愈。用三白草連葉莖根。一總搗爛。絞汁燉湯頓溫。飲一二碗。胸中痰涎盡出也。

葶藶子。味苦辛。氣寒。有毒。氣味俱厚。沉也。陽中陰也。爲手太陰經正藥。亦入手陽明足太陽經。

（別錄曰。葶藶子出藁城平澤田野間。汴京陝西河北州郡亦有之。近以彭城曹州者爲勝。他處者不堪用也。春生苗葉高六七寸。似薺。根白色。枝莖俱青。三月開花微黃色。結角列子。色深黃。類紫。細小如黍粒。味苦入頂微帶甘者。名狗薺。即甜葶藶也。月令流夏靡草死。靡草即葶藶狗薺之屬也。一種單莖向上。葉端出角。其實肥大而短。一種葉近根下。作奇生。如芥葉。其角細長。此皆異種。不可不辨。）

○葶藶子。泄肺氣。下結痰。消腫脹之藥也。蓋肺主皮毛。膀胱主出納津液。肺氣鬱閉。則津液不行。膀胱病焉。譬之上竅閉。則下竅不通。下竅不通。則水氣泛溢。爲喘滿。爲腫脹。爲痰飲積聚。種種之病生矣。按十劑云。泄可去閉。葶藶大黃之屬。此二味皆大苦寒。而利一泄氣閉。一泄

血閉。若葶藶之苦寒。氣味俱厚。不減大黃。又性烈于諸藥。以泄陽分肺中之閉。亦能泄大便。但其性急迅。善逐以行痰決水爲用。走而不守。誠急方之泄劑也。凡脾胃虛弱。及眞陰不足之人。不可混用。如腫滿由于脾虛不能制水。水氣泛溢者。如小便不通由于膀胱虛。無氣以化者。如痰嗽由于中氣虛。生陽不布。而或成喘脹者。法皆忌用。悞用。則輕病轉重。重病必危矣。愼之愼之。

錢仲陽先生曰。近時瘖疹流行。閉悶不發。發熱喘促。勢甚危迫。用苦葶藶二錢。配麻黃。延荽。荊芥。薄荷。甘草。桔梗。熱甚加石膏。黃連。各一錢。一劑。瘖疹即發。喘嗽旋止。此神方也。

沈則施先生曰。方書言諸氣膹脹滿急者。非此不除。宜審要在能食而六脉不強急。和平而尚有神者。投之。如陰竭陽敗。氣結不能自主者。去生不遠矣。何用醫爲。故淮平子云。大戟行水。葶藶泄脹。用之失時。爲害莫量。斯言可玩。

○集方（外臺秘要）治陽水暴腫。面赤煩渴。喘急。小便短澁。用甜葶藶一兩。炒研。須漢防已二兩。共爲極細末。以綠頭鴨血并腦。合和搗萬杵。丸黍米大。甚者空腹白湯下九十丸。輕者五六十丸。日三夜一。五日止。其效如神。○治痰飲咳（篋中方）嗽。用葶藶子一兩。川貝母一兩。薑製半夏一兩。甘草五錢。牙皂二錢。共爲末。煉蜜和爲丸。彈子大。早晚夜。各以

一丸。含之。徐徐嚥下。甚者。不過五丸。○治欬嗽上氣（[illegible]方）不得卧。或偏體氣腫。或單面腫。肢足腫。並主之。以葶藶一升。微火炒。研細。以絹袋盛。浸清酒三升。冬七夏三日。徐徐飲。日三次。夜一次。量其氣力。取微利爲度。如患急者。不待日滿。即可絞服。如不便用酒。水煎服亦可。○治肺（仲景金匱方）壅喘急不得卧。用葶藶五錢。炒黃爲末。每用大棗二十枚。水三大碗。煎取一碗。調入葶藶末。再煎取一碗。徐徐服。亦主支飲不得息。○治頭風（肘後方）頭疼。用葶藶子一兩。煎湯沐頭。三四度即愈。

車前子。味苦微甘。氣寒。無毒。爲肝腎膀胱三經之要藥也。（別錄曰。車前出眞定平澤丘陵阪道中。今江湖淮甸近汴北地處處有之。好生道旁及牛馬足跡中。春初生苗。綱葉布地如匙面。累年者長尺許。中抽數莖。作穗如鼠尾。花極細密。色青微赤。實如葶藶。色正黑。五六月采苗。七八月采實。圃人或種之。蜀中尤尚。土人取根日乾。作紫菀。市人不可不辨。嫩苗可作茹。大潤腸滑。）

○車前子。利水道。徹溲便。通精氣之藥也。主小便淋瀝癃閉不通。赤白帶濁。或陰莖腫脹澁痛。精道熱結不通。去穢濁而澄源。利小便而不泄精氣。與茯苓同功者也。又明目疾。療疝痛。行肝疏腎。暢鬱和陰。同補腎藥用。令強陰有子。同和肝藥用。治目赤目昏。同清熱藥用。止痢疾火鬱。同舒筋藥用。能利濕行氣。健運足膝。有速應之神驗也。但性寒善走下竅。若內傷勞倦。陽氣下陷之病。皆

不當用。腎氣虛寒者。尤宜忌之。

繆仲淳先生曰。前陰屬肝木。疏泄之竅也。氣化則溺自出。情動則精乃行。氣閉火鬱。溺自停矣。芣苡之子。寒降下行。若車行而前。孰不開讓。何溺之不自出乎。疏泄之義明矣。設情動過節。膀胱虛氣。艱于化而津不行。溺不出者。單用車前疏泄。閉愈甚矣。必加參苓甘麥。養氣節欲。則津自行。溺乃出也。

○集方。治小便血淋作痛（普濟方）用車前子。晒乾。甘草減半。共爲末。每服二錢。車前葉煎湯下。○治小便熱秘不通（[illegible]）用車前子一兩。川黃柏五錢。白芍藥二錢。甘草一錢。水煎。徐徐服。○治石淋作痛（肘後方）用車前子一升。水五碗。煎湯二碗

用白菓三十箇，去殼衣淨，搗汁和入，徐徐飲。○治老人淋澁不通，身發熱，用車前子一兩，川牛膝八錢，生甘草三錢，水五碗，煎二碗，徐徐飲。○治孕婦熱淋，用車前子五合，黃芩八錢，水煎，徐徐飲。○男婦久不生育，用車前子、當歸各二兩，川芎一兩，鹿膠、龜膠各二兩，作丸，侵晨各服二錢，白湯下。○治暴赤時眼，用車前子一兩，柴胡、防風、龍膽、決明子、蔓荆子、荆芥、羌活各二錢，水煎，食後服。○治勞欲過度，肝腎空虛，眼目昏蒙，用車前子一兩，甘菊花、熟地黃、枸杞子、密蒙花、淮山藥、決明子、羊肝，爲丸，每早晚各服三錢，白湯下。○治久患內障，用車前子、熟地黃、麥門冬，等分爲丸，每早晚各服三錢。○治風熱

目暗澁痛，用車前子一兩，川黃連五錢，共爲末，每食後服一錢，日二服。○治熱痢澁痛，小水不通，用車前子、白芍藥各一兩，川黃連五錢，黃芩、黑山梔、澤瀉、滑石各八錢，分作二帖，水煎，食前服。○治四肢痿痺，作痛，筋脈不舒，用車前子二兩，木瓜、川牛膝、虎骨、萆薢、葳靈仙、紅花各一兩，浸酒飲。○治產難，并橫逆不出，用車前子、川牛膝各二兩，當歸、川芎各五錢，俱酒炒爲末，每服三錢，酒調下。如不飲酒，白湯調下。○治瘖疹內閉，入腹身腫，舌强，用車前子爲末，白湯調服一錢，日三次。

○車前葉，味甘，氣寒，無毒。

凡使須一窠九葉者良，亦可作蔬食。

主金瘡出血不止，小便不通，尿血、血淋，熱痢膿血，乳蛾喉閉等證。甘寒，能散，能利，能疏之藥也。

○集方：治金瘡出血不止，用車前葉搗爛敷之。○治小水不通，用車前葉一觔，水三升，煎取一升服。○治小便尿血、血淋，用車前葉搗汁五合，空心服。○治熱毒膿血痢疾，用車前葉搗汁五合，入蜜一合，溫服。○治乳蛾喉痺，用車前葉、鳳尾草各等分，搗爛，入霜梅肉五箇，生酒各少許，再搗絞汁，以雞羽刷患處，隨手吐痰即消。○治目赤作痛，用車前葉自然汁，調朴硝末，臥時塗眼胞上，次早洗去。

治心經蘊熱，藏府閉結，小便赤澀，癃閉不通，及熱淋血淋諸證，因本氣壯實，有火滯者，宜服此。如酒後恣慾而得者，則小便將出而痛，既出而癢，亦以此藥主之。用車前子、瞿麥、萹蓄、木通、滑石、生梔子、大黃各一錢五分，生甘草二錢，川牛膝三錢，加燈心二十根，水煎，食前服。○一方治諸淋不分虛實，以車前子四兩，川牛膝三兩，懷熟地、山茱萸、山藥、茯苓各二兩五錢，牡丹皮二兩，澤瀉二兩，俱用鹽水拌炒，磨爲末，煉蜜丸梧子大，每早服五錢，燈心湯送下。

鱧腸味甘酸。氣平。無毒。純陰之草也。入腎肝胃大小腸五經。（李時珍曰。鱧。烏魚也。其腸黑。此草柔莖。斷之有墨汁出。故名。生江南下濕地。所在坑渠間多有。苗似旋覆。此有二種。一種葉似柳而光澤。莖似馬齒莧。高一二尺。開花細白。其實若小蓮房。一種苗頗似蓮花而黃色。實亦作房而圓。南人謂連翹。二種折其苗皆有墨汁出。須臾而黑。俗謂之旱蓮草。八月采。陰乾用。）

旱蓮草。涼血解毒。固齒烏鬚髮之藥也。益鬚髮易白者。血虛有熱也。齒牙不固者。腎虛有熱也。此藥純陰涼血。則鬚髮變白爲黑。而齒亦因之而固矣。故古今黑汁之草。當以此爲勝。若前人之治血痢。止針灸瘡中發洪血。解一切瘡疹痛痒。除頭風頭痛。去目疾翳障。治腸風下血。定風熱牙疼之數者。何非涼血止血之功也。但陰寒之性。沉降之質。雖善涼血。不益脾胃。亦見脾胃虛弱。飲食少進。及腸胃溏薄不實者。雖共溫辛補養藥。亦勿輕與服。

〇集方　治鬚髮早白。七月收取旱蓮草連根一斤。酒洗淨。青鹽四兩。淹三日。同汁入鍋中。炒焦如炭。存性。研末。日用擦牙。連津嚥之。〇治飲食甘肥。炙煿過度。成血痢病。用旱蓮草一握。切碎。川黃連二錢。白芍藥五錢。水煎服。〇治針灸瘡中出血不止。用旱蓮草搗爛敷之。立止。〇治一切疔腫癰疽惡瘡。用旱蓮草一斤。連根洗淨。搗爛取汁。以熱酒一碗和飲。渣敷患處。不過三服乃安。〇治頭風頭痛不拘偏正。用旱蓮草搗汁。滴鼻中。或飲汁亦可。〇治一切眼疾翳膜遮障。并頭風頭痛。用鮮旱蓮草一把。澤蘭葉一把。水洗淨。略乾。俱搗汁。入淨磁瓶內。密封。埋土中一尺。計五十日取出。每臥時以骨簪挑少許。點兩眥。摩頂上四十九遍。久久自效。〇治腸風臟毒下血。用旱蓮草。水洗淨。用薑汁酒浸一宿。晒乾爲末。每早服二錢。米湯下。〇治小便下血。用旱蓮草。車前草。各等分。搗汁。空心服三盞。自愈。〇治風熱牙疼。用旱蓮草數莖。入鹽一匙。于掌心揉擦。即止。或云煎湯嗽口。亦可。

〇治烏鬚神方。取鱧腸草採鮮者五十斤。搗汁。浸真女貞實。馬料黑豆。各一斗。浸七日。濾出晒一日。再浸再晒。以鱧腸草汁盡。上甑蒸一日。再晒乾。少酒陳酒微濕。再蒸再晒。計九次。微炒燥。磨爲末。拌生薑自然汁八兩。好川椒去閉口及蒂者。爲末五兩。和勻。煉蜜丸梧桐子大。每早晚用五錢。食後酒送下。

治一切齒病。用鱧腸草。炒焦黑成炭。研末。見證配後藥擦之。〇如齒痛牽引頭痛。配石膏細末、芽茶末。如齒痛治風。配乾薑、藁本末。如齒痛有蟲。配乾薑細末、花椒末。如齒痛兼牙齦出血絲者。配人參末。或千年古石灰末。配人參可嚥。配石灰末擦齒不可嚥。用白湯泪漱吐之。如齒痛成牙疳。配硼砂、黃連、枯礬末。如齒痛動搖不堅。無力嚼食物者。配補骨脂、沒石子、青鹽末。已上所配諸藥。俱爲細末。和鱧腸草末擦之。

連翹味苦，氣平，無毒。氣味俱薄，輕清而浮，升也，陽也。入手足少陽、手足陽明、手少陰經。（別錄曰：連翹出太山山谷。今汴京及河中、江寧、潤、淄、澤、兗、鄂、岳、利諸州皆有之，蜀中者爲勝。蘇氏曰：有大翹、小翹兩種。大翹生下濕地或山岡上，葉青黃如榆葉、水蘇輩，莖高三四尺而色稍赤。獨莖梢間開花，黃色可愛。三秋著子，似蓮實之房，亦若椿實之未開者。翹出衆草，殼小堅，外完無附萼，剖之中解，氣甚芳香，實纔乾，振之即落，若不著莖。根如青蒿之白硬也。小翹生岡原之上，莖葉花實皆似大翹但細小耳。古人兼莖葉花實並用，今惟用實，未見用莖葉也。今南方一種莖短葉小，實惟黃黑，子如粟粒，乃旱蓮也。又一種如菡萏，殼柔軟，外有附萼抱之，且無解脉，亦不芳香，乾之不落，久著莖上，此則殊別也。）

○連翹，散風清熱，解瘡毒之藥也。（沐孔臣集）主瘰癧結核，諸瘡癰腫，熱毒熾盛，未潰可散，已潰解毒。眼證腫赤澀痛，耳證昏塞聾閉，頭證頭風眩痛，喉證脹閉不通，或腮腫齒疼，或舌破生瘡，或痘瘡斑疹隱現出沒。以上諸證，皆心肝膽胃四經之病。此藥清標芳馥，善解風火痰氣鬱結所因。其輕揚之性，上行最專；苦寒之氣，下行更力。所以耳目口鼻、咽喉齒舌之間，頸腋背膂、胸腹皮脇、足膝之處，靡不奏功。但涼散之性，清而無補。如癰疽已潰者，火熱風痰由于虛者，脾胃薄弱易于作瀉者，俱不可投。

李東垣先生曰：連翹于十二經瘡藥中，不可無此，謂表裏上下氣血之分，咸需之耳。

盧不遠先生曰：連翹治鼠瘻癧腫瘡核，皆從結氣所生，取其象形，易落而能自散也。

沈則施先生曰：連翹從荊芥而治風熱，從芩連而治火熱，從大黃而治燥熱，從蒼栢而治濕熱，從歸地而治血熱，從貝母而治痰熱，從山梔而治鬱熱，從升麻而治煩熱，從金銀花、紫花地丁，而治疔腫瘡毒之熱。

○集方（沈氏簡便方）：治瘰癧結核及馬刀諸瘡，用連翹、半夏、川貝母、金銀花、玄參、甘草、薄荷、夏枯草、白芨、白芷各等分，爲末，食後白湯調服二錢。（此下十方[illegible]）○治乳癰乳核，用連翹、雄鼠糞、蒲公英、川貝母各二錢，水煎服。○治熱毒初起，用連翹、甘草各一兩，酒水各半煎服，可散。○治目病腫赤澀痛，用連翹、柴胡、荊芥、白芷、羌活、防風、草決明、蟬蛻各一錢，甘草六分，水煎服。○治耳病忽然昏閉不聞，用連翹一兩，蒼耳子二兩，水煎濃汁，徐徐服。○治頭風眩痛，用連翹、天麻、防風、橘紅、半夏各三錢，白朮一錢，水煎服。○治咽喉閉脹不通，用連翹、[illegible]、半夏、陳皮、桔梗各三錢，荊芥三兩，水煎數碗，徐徐服。○治牙腮腫脹作痛，用連翹、白芍藥、半夏各二錢，桔梗、甘草各五分，水煎服。○治一切風火寒蟲四種牙痛，用連翹五錢，黃連一錢，防風、荊芥、白芷、蔓荊子各二錢，吳茱萸、川椒、細辛各五分，水煎服。○治舌破生瘡，用連翹五錢，黃柏三錢，甘草二錢，水煎，含嗽即愈。○治痘瘡欲起未起，用連翹、桔梗、甘草各一錢，防風、荊芥、蟬蛻、羌活、薄荷各二錢，水煎服。○治赤遊瘋毒，用連翹一味，煎湯飲之。

（連翹根，味甘微苦，氣寒，有小毒。治傷寒瘀熱在裏，欲發黃者，有麻黃連翹根赤小豆湯，此張仲景方也。）

藍澱味苦辛。氣寒。無毒。（其滓澄殿在下。故名。或作淀。俗作靛。）

（李氏曰。南人以地窖中貯水一石。以藍葉數十觔浸一宿。入石灰若干。攪之千轉。澄去水。則青黑色。亦可乾收。用染青碧。其攪浮沫。掠出陰乾。謂之澱花。即青黛。見後。）

○藍澱解熱毒。散腫結。殺蟲積之藥也。乃藍與石灰作成。其氣味與藍稍有不同。而拔毒散腫殺蟲之功。似勝于藍也。古方有謂能止血者。乃金瘡跌撲傷損皮肉出血也。一敷即止。時人悞認止血。投入吐衄血證服食藥中。內有石灰。雖凉而燥。何堪入口。悞食反致燥毒入咽。轉加躁動血藏。蒙害者多。審之慎之。

陳廷采先生曰。按靛花治小兒疳蝕消瘦發熱。屢有奇功。歌曰。小兒雜病變成疳。不問強羸女與男。腹內時時

如雨。痢青黃赤白般般下。眼澁面黃鼻孔赤。穀道開張不忍看。煩熱毛焦時可渴。皮膚枯槁四肢癱。唇焦嘔逆不乳哺。壯熱憎寒臥不安。此方只是青黛散。取效猶如服聖丹。

○集方。治時行天泡瘡。用靛青和甘草末。猪膽汁調敷。○治小兒腹內疳蟲癖積。用靛青一兩。配入白牽牛子末三錢和入靛青內。作粟米大。每服五分。白湯下。○治口鼻急疳。用藍靛敷之。令遍。日十次。夜四次。○治誤吞水蛭。并一切毒蟲。用靛青調水飲。自消。

藍味苦微甘。氣寒。無毒。至陰之藥。入心肝肺脾四經。

（別錄曰。藍生河內平澤。其莖葉可以染青。以大葉者爲勝。今處處有之。人家園圃作畦種。至春末生苗。高二三尺。葉似水蓼。花紅白色。實亦若蓼子而黑色。五六月采實。但可染碧。不堪作澱。此名蓼藍。即醫方所用者也。李氏綱目曰。藍凡五種。各有主治。惟藍實專取蓼藍者。蓼藍葉如蓼。五六月開花成穗。其形細小。其色淺紅。其子亦如蓼。歲可三刈。故先王禁之。菘藍葉如白菘。馬藍葉如苦蕒。即郭氏所謂大葉冬藍。俗所謂板藍者。二藍花子並如蓼藍。吳藍長莖花白。木藍長莖如決明。高者三四尺。分枝布葉。葉如槐。七月開花。淡紅色。結角長寸許。纍纍如小豆。其子亦如馬蹄決明子而微小。迥與諸藍不同。而作澱則一也。別有甘藍。可食。見本條下。）

○藍通治解熱毒。化蟲癖。蘇敗血之藥也。雖有五種之別。而味性不遠。總能解毒除熱。若藍實者。解諸毒。殺蠱蚑。通關節。消毒腫。治經絡中結氣。若蓼藍葉汁者。殺百藥毒。解狼毒。射罔。蜂蠆。斑蝥。芫青。樗雞。蠼螋。蜈蚣。蜘蛛。朱

砂。砒石。諸般毒物。飲之並解。若馬藍者。治婦人敗血留滯。不能分斷經絡。僅此十端之效。若吳藍者。主治甚廣。如時行瘟疫。頭痛寒熱。時行赤眼。腫痛畏明。時行丹毒。遊走皮膚。時行瘄疹。紫赤悶脹。時行暴熱。吐血鼻洪。時行災癘。小兒壯熱驚癎等疾。如中藥箭毒。中金石毒。中百草毒。中狼毒毒。中射罔毒。中蛇蟲諸毒。煎汁即飲立効。若甘藍者。甘滑可食。利五臟。調六府。通閉結。明耳目。可作蔬食。諸藍性冷。虛寒人。及久泄者勿用。諸藍功効。方書久未分列。按蜀刻舊本。特表而出之。以俟後之君子。再加詳正可也。

○集方。治毒箭傷人。用藍實。或藍葉。搗汁飲之。滓敷患上。

○治大人小兒中蠱毒，絞下血欲死，搗蓼藍汁飲之。○治飛絲赤目熱痛，用吳藍葉八兩，車前葉二兩，黃芩葉一兩，水煎服。○治天泡熱瘡，用吳藍葉搗敷之。○解一切諸藥毒，并毒禽獸毒蟲螫諸毒，俱用蓼藍葉汁飲之。○治痘疹不出，快用吳藍根一兩，甘草一錢，爲末，每服五分，或一錢，取雄雞冠血二三滴，同溫酒調下。○治齒齦腫痛，用吳藍燒灰敷之，日五度。○治唇口生瘡，積年不瘥，以蓼藍葉一觔，搗汁洗之，三度瘥。○治一切毒蛇毒蟲所傷，并一切毒藥毒食，俱用蓼藍葉搗汁飲之。冬月用湯頓服。

青黛

味鹹，氣寒，無毒。（李氏曰：黛，眉色，古人婦女眉滅，以此描之，故謂之黛。此物從波斯國來，色紫碧，鐵輕浮者佳。今以太原并廬陵、南康等處藍靛花浮沫用之，與青黛同功。然究其波斯國青黛，亦是藍靛花。既不可得，則中國靛花亦可用。貨者常以乾靛花充之，然有石灰，入服食藥中，須以水飛淨灰，晒乾用。○世人以其色青，爲天行清解之藥，謬甚矣。真青黛出波斯國，既不可得，不知用藍實或藍葉搗自然汁，[illegible]細者良。）

○青黛，清臟府鬱火，化膈間熱痰，爲大人之聖劑；定驚癇，殺蟲氣，消癖積，乃童稚之靈丹。其味鹹寒，稟水土之氣以成，主一切熱毒瘡癤，并蛇虺蟲螫毒物，及鼠犬所傷，敷貼立奏效也。既稟水土陰寒之氣以成，解毒除熱，固其所長。古方多有用之，如陰虛內熱，火氣因客上炎，發爲熱病，或爲吐衄咯唾血證，用之非宜，司醫者當詳審之。

○集方。（朱氏方）治五臟鬱火，外寒內熱，口渴便閉，用青黛、黑山梔、炙甘草、白芍藥、川黃連、防風各等分，水煎服。○治胸膈有頑痰鬱熱，用青黛、貝母、知母、天花粉、甘草各等分，水煎服。○治小兒驚癇，用青黛三五分，量大小，白湯調服。○治諸毒蟲，用青黛一兩，雄黃、蕪荑各五錢，爲極細末，蜜水調服。○治小兒癖積，肚大青筋，用青黛一兩，研極細，以雞肝爲丸，每早晚各服一丸，白湯化下。○治小兒耳疳出水，用青黛、黃柏各等分，共爲末，乾糝。○治風弦爛眼，用青黛、黃連，泡湯日洗。○治產後發狂，用青黛三錢，爲末，煎四物湯調灌。○治瘰癧未破，用靛花共馬齒莧搗爛，日塗數次，效。

蓼實味辛，氣寒，無毒。陰中微陽。

（蘇氏曰：蓼生雷澤川澤，雖生各處，多在水旁。苗葉高尺餘，莖大，色淡綠，莖節間如鼠膝，有紅色。蓼穗長，多有花香。水蓼、紫蓼、赤蓼、木蓼七種。紫赤二蓼，葉小狹而厚；青香二蓼，葉亦相似而俱薄；馬水二蓼，葉俱潤大，上有黑點。木蓼又名天蓼，蔓生，葉似柘葉。六蓼花俱紅白，子皆大如胡麻，赤黑而尖扁。惟木蓼花黃白，子皮青滑。諸蓼皆冬死，惟香蓼宿根重生，其苗可爲生菜。李氏曰：古人種蓼爲蔬，收子入藥，故禮記烹雞豚魚鱉，皆實蓼于腹中而和羹膾，亦須加蓼也。後世飲食不用，人亦不復栽，惟造酒麴者用其汁。凡今但以平澤所生香蓼、青蓼、紫蓼爲良。）

○蓼苗葉生用，搗汁和酒飲，能入腰腳，治熱壅氣滯諸疾（朱丹溪）。日乾釀酒，能行周身，主風熱風冷、頭風目障諸疾（李東垣）。但性冷善攻善行，不可多食，恐傷胃氣。病寒熱少氣損髓之證，忌之。

蓼實散鬱火，除目障，下水氣，消癖瘕之藥也。凡濕熱痰疾有干血分者，服之尤良。但性寒伐胃，中病即止，不可多食。

○集方：治胃脘冷，不能飲食，耳目不聰明，四肢有浮氣，冬臥足冷。八月取蓼苗葉，日乾，計五十觔，水六石，煮取一石，去滓，拌糯飯，如造酒法，待熟，日飲之。半月後，目明氣壯也。○治血氣攻心，痛不可忍，用蓼根洗，切，浸酒飲。○治惡犬咬傷，用蓼葉搗爛敷之。○治霍亂轉筋，因暑熱濕熱者，用蓼葉一觔，水三升，煮取一升，入香豉一合，更煮半升，分三服。○治目障不明，以蓼子炒，每食後服三錢，白湯過。○治水氣浮腫，用蓼子生擣汁，和白湯飲。○治瘰癧，用蓼子炒黃，每食後吞二錢，酒過。

外有馬蓼、水蓼二種。馬蓼又名大蓼，生下濕地，高四五尺，莖斑，葉大，中有黑跡如墨點，記其最大者，名水葒草也。水蓼生淺水澤旁，葉長五六寸，比水葒葉稍狹，比家蓼葉稍大，莖赤色。今造酒家以水浸葉取汁，和麵作麴，亦取其辛香耳。諸蓼苗葉子，其功彷彿，亦可通用。

水英

（蘇氏曰：唐天寶方言此草生永陽池澤及江湖河海邊。土人呼爲牛葒草，河北河內呼爲水節，又爲水棘。劍南遂寧等郡呼爲龍移草，淮南諸郡名海荏，嶺南名海精，又名魚津草。云莖葉肥大。）

○按蘇氏言：蜀人采其花合面藥。凡丈夫婦人無故兩腳腫滿，連膝脛中痛，屈伸急強者，名骨風。其疾不宜鍼灸及服藥，每日取此草五觔，以水一石，煮至三斗，入缸內，熱通和，將兩腳浸并淋膝上，日夜三四度，不經五日即瘥，屢用神驗。其藥春取苗，夏取葉及花，秋冬用根。腫甚者，加生椒目二升，淋洗畢，即避風，并忌雞、鵝、豬、魚、羊肉、鴨蛋、生菜等物。○李氏曰：此草不著形狀氣味，無以考證。許棄亦名水英，不知是否，以俟考正可也。

萹蓄。味苦。兼澁。微甘。氣平。無毒。降也。入足太陽膀胱經。

（別錄曰。萹蓄生東萊山谷。處處有之。春時蔓延布地。好生道旁。苗似瞿麥。弱莖促節。節紫赤似釵股。葉細綠似竹。三月花開節間。甚細微。色青黃或淡紅。似蓼藍花。狀結細子。根似蒿。弱[illegible]。即此也。）

○萹蓄。利濕熱。通小便之藥也。其性直遂。下行。故本草治五淋癃閉。黃疸。瘙疥。小兒蚘蟲。女人陰蝕諸疾。凡屬熱濕壅閉為患。如物偏而易藏。蓄而不出者。此藥推而下流。使淋者止。閉者通。疸黃者散。瘙疥者淨。而蚘蟲陰蝕必自已矣。但味性苦澁而消耗。如胃弱脾虛而作黃疸。陰虛而至淋閉者。宜詳用之。

○集方。治熱淋澁痛。用萹蓄煎湯頻飲。○治熱濕黃疸。用萹蓄擣汁一二碗。食前後皆可飲。○治遍身熱血疥瘡。用萹蓄三兩。歸尾一兩。水煎頻飲。○治痔發腫痛。用萹蓄汁服一二碗于食前。○治惡瘡痂痒。或作痛。用萹蓄擣爛。封痂上即止。○治蚘咬心痛。（食療本草）面青。口出白沫。垂死取萹蓄十觔。剉碎。水一石。煎至一斗。去滓。入砂鍋內緩火熬如餳。隔宿勿食。空心服一碗。蟲即下也。歌云。心頭急痛不能當。我有仙人海上方。萹蓄醋煎通口嚥。管教即刻便安康。○治婦女陰蝕。用萹蓄煎湯。乘熱通手頻洗。

刺蒺藜。味甘。微苦。氣溫。無毒。

（李氏曰。蒺疾也。藜利也。其刺傷人。甚疾而利也。此藥于山東諸路及秦州。多生道旁。春時布地蔓生。細葉。入夏作碎小黃花。秋深結實。三角四刺。實有仁也。人行多着木屐。易云。據于蒺藜。言其凶傷。詩云。牆有茨。不可掃也。又有一種細蒺藜。生同州沙苑。牧馬草地上。亦作蔓生。莖間密布細刺。葉如初生皂莢葉。整齊可觀。七月開黃紫花。如豌豆花而小。九月結實作莢。子長寸許。內子如麻。碧綠色。狀如羊腎。嚼之若新茶香。頗則轉作豆腥氣。隔紙微炒。色香勝於微火煎者。津液不竭者。乃真也。沈則施。凡刺蒺藜與沙苑細蒺藜。名雖同而實二種。功用氣性亦異也。刺者有稜刺。以蒺藜稱。固宜。不知沙苑出而細粒。形如羊腎。大如黍粒。無稜無刺。以蒺藜稱何所取義而云然。今附錄刺蒺藜下。以便分辨爾。）

○刺蒺藜。去風下氣。行水化癥之藥也。其性宣通快便。能運能消。行肝脾滯氣。多服久服。有去滯之功。別錄主身體風癢燥澁頑痺。一切眼目翳障等疾。甄氏方。主筋結瘰癧肺癰肺痿。欬逆膿血等疾。蘇氏方。主水結浮腫氣膈喘滿。疸黃腳氣等疾。李氏方。主血結成癥奔豚瘕疝喉痺胸痺乳難乳岩等疾。總而論之。別錄所主者風。甄氏所主者氣。蘇氏所主者水。而李氏所主者。即取其化癥之意也。然四家之說雖有不同。究其三角四稜。善于磨運去滯生新。是其專成。故婦科方中。以此催生墮胎。良有以焉。但其性溫多燥。如陰虛不足。精髓血津枯燥致疾者。俱禁用之。

○集方。治身體風癢燥澁頑痺。用刺蒺藜四兩。帶刺炒。磨為末。胡麻仁二兩。湯泡去衣。搗如泥。葳蕤三兩。金銀花一兩。炒磨為末。四味煉蜜丸。早晚各服三錢。白湯下。○

治眼疾翳障不明。用刺蒺藜四兩、帶刺炒、葳蕤三兩、炒、共爲散。每早服食後三錢、白湯調服。○治瘰癧膿潰不乾。用刺蒺藜八兩、帶刺炒、牡丹皮三兩、炒、當歸身四兩、炒、共爲末、蜜丸。早晚用。○治肺癰肺痿、欬唾膿血腥穢。用刺蒺藜五兩、帶刺炒、百合、川貝母各一兩、炒、每早晚各服三錢。白湯調送。○治水結四體虛浮、或膨脹喘急。用刺蒺藜一觔、帶刺炒、葶藶子三兩、炒、白茯苓四兩、炒、共爲末、作散。每早午晚一日三次、每次白湯調服三錢。○治黃疸。用刺蒺藜五兩、帶刺炒、茵陳草四兩、炒、俱爲末。每早晚各取五錢、水二碗、煎湯飲。○治一切脚氣、不問虛實寒熱。用刺蒺藜八兩、帶刺炒、木瓜五兩、炒、共爲末。每早服五錢、白湯調服。○治惡血積聚、或成癥瘕。用刺蒺藜一觔、帶刺炒、乾漆二兩、炒、俱爲末、水發爲丸、如菉豆大。每晚飯後臨睡服二錢、酒下。○治奔豚瘕疝。用刺蒺藜十兩、帶刺炒、小茴三兩、炒、乳香、沒藥各五錢、瓦上焙出汗、俱爲末。每服三錢、白湯調服。○治喉痹不通。用刺蒺藜四兩、帶刺磨爲粗末、煎湯徐徐飲之。○治胸痺膈中脹悶不通、或作痛。用刺蒺藜一觔、帶刺炒、磨爲細末。每早午晚各服四錢、白湯調服。○治乳脹不行、或乳岩流癧、作塊腫痛。用刺蒺藜二三觔、帶刺炒、爲末。每早午晚不拘時、白湯作糊調服。○治難產、或胞衣不下、或胎死在腹中。用刺蒺藜四兩、帶刺炒、五靈脂、水淘淨、

砂土、二兩、川貝母二兩、共爲末。白湯調服三錢、未下再服。○治百病積聚。用刺蒺藜帶刺炒、一觔、爲末、水發丸。早晚食前後服三錢。○治鼻塞出水、或多年不聞香臭。取刺蒺藜二兩、研極細、水二大碗、煎取半碗、仰臥、先含飯滿口、以蒺藜湯一合灌入鼻中、不通再灌。令嚏出息肉似赤蛹蟲狀即愈。○治齒牙動搖、或打磕損傷者。用刺蒺藜帶刺生研五錢、以鹽湯稀調、漱口甚效。或以根燒灰揩牙、即牢固也。○治一切疔瘡腫痛。用刺蒺藜帶刺研末、熬膏、以醋和調、封頭上、拔根減毒。

沙苑蒺藜

（味甘、兼苦。色黑、氣溫。形如羊腎、細如蠶子、與藁子酷相類、但馬藁子形非羊腎、稍粗大耳、須細辨之。）

○沙苑蒺藜、補腎澁精之藥也。其氣清香、能養肝明目、潤澤瞳人。色黑象腎、能補腎固精、強陽有子。不烈不燥、兼止小便遺瀝、乃和平柔潤之劑也。

○集方沙苑蒺藜同蓮鬚、山茱萸、五味子、覆盆子、鹿角膠、龜膠、魚膠、枸杞子、熟地黃、決明子、白茯苓、薯蕷、作膏丸服之、駐顏色、益氣力、明目疾、延年種子。○治脾胃虛、飲食不消、濕熱成膨脹者。用沙蒺藜二兩、酒拌、以真茅山蒼朮八兩、米泔水浸一日、晒乾炒。（共研爲末、每服三米湯調服）

穀精草味苦微辛，氣寒，無毒。入足厥陰、陽明經。（李氏曰：穀精草生江湖南北，俱有，春生荒穀田中。叢葉似穀秧，抽莖高五七寸，八九月莖端開花，白色點點如乳星。喂馬令肥，又主蟲顙毛焦之疾。一種莖長有節，根微赤者，出秦隴間，亦可入藥。）

○穀精草，祛風清火之藥也。開寶方主喉痺、目障、齒痛、頭風、瘡疥諸疾。五證皆君相二火上壅攻作，熱則生風，風火相扇，故爲是病。此藥輕浮潔白，秋成得辛清肅之品也。喉齒頭目瘡疥之疾，本乎風火爲患，故悉主之。其喂馬主蟲顙毛焦等病者，以馬性多熱，又爲風熱所傷，故爲是病，宜其用之。原其入肝清調肝氣，又爲眼科散目翳之要藥，而兒科諸疳雀目之證，亦必需之。除喉齒頭目疾之外，餘無他用。

繆仲淳先生曰：此藥于田中收穀後多有之。田低而穀爲水腐，得穀之餘氣而生，故曰穀精。其亦得天地之和氣者歟。兔喜食此草，故兔糞爲目疾家收用。如此草未出時，兔糞又不可用也。

○集方：治喉痺急脹，用穀精草洗淨搗汁，和米醋漱泊喉間，一二次隨消。○治目生翳障，隱澁淚出，用穀精草爲末，以羊肝煮熟，竹刀切片蘸食。此方治痘後翳障更宜。○治小兒雀目，至晚不能視物，用獨羊肝一具，竹刀剖開，入穀精草一把，瓦罐煮熟，日食之極效。如不肯食，搗爛作丸菉豆大，每服三十丸，茶下。○治風熱齒痛，以穀精草搗爛，加食鹽少許，搭痛處，半日效。○治瘡疥痒痛異常，用穀精草，搗爛擦之旋消。或日乾，同金銀花各半，煎湯飲。○治偏正頭風痛，用穀精草一兩爲末，以麵糊調攤紙上，貼痛處，乾再換。或用穀精草末、銅綠各一錢，火硝三分，共研極細，隨左右搐鼻。○治頭腦痛并眉骨痛，用穀精草二錢，地龍三錢，乳香一錢，共爲末，每用五分，以紙裹筒燒烟，隨左右熏鼻。

海金沙　味甘淡微苦，氣寒，無毒。沉也，降也。入足少陰、手足太陽經血分藥也。

（李氏曰：海金沙出黔中、江浙、湖湘、川陝皆有。生山林下。莖細如線，引竹而上，高尺許。葉如圓荽，細而且薄，而背俱青。皺紋中有沙，狀似蒲黃，不作花實，根細堅強。沙及莖葉皆可入藥。七月采其全科，日中曬之，少乾，用紙承覆，以杖擊之，有沙落紙上。且曬且擊，以沙盡爲度。）

○海金沙，淡寒利竅之藥也。專通利小便，主熱血、膏淋、莖中澁痛等病。又主陽明氣熱，傷寒熱狂之疾。此釜底抽薪之義也。但其性淡滲，而無補益。小便不利及諸淋病，由于腎水眞陰不足者勿用。

盧不遠先生曰：似金而體輕，似沙而質滑。草氣之生沙，猶水體之成冰。合入足少陰腎、足太陽膀胱，主溺沙石者恰當。

○集方　治小便不通，臍下滿悶。用海金沙一兩，臘茶五錢，共爲末，每服三錢，甘草湯調下。○治血淋澁痛，但利水道，則淸濁自分。用海金沙末，蜜湯調服一錢。○治膏淋如油。用海金沙、滑石各一兩，甘草梢二錢，共爲末，每服二錢，麥門冬煎湯調下，早晚各一次。○治熱淋急痛。用海金沙一兩，滑石三錢，車前子五錢，三味共研極細，每服三錢，白湯調下，加生白果汁五六匙，早晚各一次。○治傷寒陽明實熱。用海金沙五錢，配山梔子、牙硝、硼砂各三錢，共研細，每服三錢，早午晚各一次，白湯調下。○治濕熱腫滿，腹脹如鼓，喘不得臥。用海金沙五錢，白茯苓二兩，甘草二錢，黑丑頭末一兩，共爲末，每服一錢，仃湯調下，早晚各一次。

見腫消　味酸苦澁，有微毒。

（蘇氏曰：見腫消，古生筠州，今南北地俱有。春生苗葉，莖紫色，高一二尺。葉似桑而光，面青紫赤色。采不拘時。）

見腫消，消癰疽腫毒，及犬咬傷，杵搗葉貼上，即消。（蘇頌）

○集方　治一切腫毒，及傷寒遺毒，發于耳之前後，及項下腫硬。用見腫消，配白及、白斂、大黃、大薊根、山慈姑、苧麻根，各等分，生搗成餅，入芒硝一錢，和貼患上，留頭，乾即易之。

紫花地丁。味苦辛，氣寒，無毒。（李氏曰：紫花地丁，處處有之。其葉似柳而微細，夏開紫花，結角。平地生者起莖，溝渠邊生者起蔓。又鄉村籬落邊生一種，夏秋開小白花，如鈴兒倒垂，葉比紫花者稍短，恐與紫花者相反，宜辨明用。）

○紫花地丁，解一切惡瘡疔毒（李時珍）之藥也。故綱目方治癰疽諸發疔腫，一切無名惡毒，搗汁和生酒服，將滓敷患上，立時消解，此仙方也。（楊氏經驗方）

○集方：治癰疽惡瘡，用紫花地丁草，連根，同蒼耳葉各等分，搗爛，和生酒一鍾，絞汁服。（孫天仁方）○治癰疽發背及無名諸腫，用紫花地丁，三伏時收，搗爛，以白麵和成餅，用鹽醋浸一夜，貼之。（十全方）○治疔瘡惡毒，用紫花地丁搗汁服，雖極者亦效。（普濟方）○治喉痹腫痛，用紫花地丁葉，入醬少許，研膏點入喉間，取吐。（乾坤[illegible]）○治黃疸內熱，用紫花地丁為末，白湯調服三錢。○治瘰癧潰爛，取白花地丁，搗汁，熬湯溫服半盞，立時解毒。（[illegible]）

半邊蓮。味辛苦，氣平，無毒。（李氏曰：半邊蓮生陰濕塍塹邊，就地細梗細葉，引蔓節節而生。秋開小花，淡紅色，蓮花狀，只有半邊，故名。）

半邊蓮，治蛇虺及諸蟲所傷，絞汁飲，以滓罨塗患上，立效。（李時珍方）

本草彙言卷之五

錢塘　倪朱謨純宇甫集選　男倪洙龍冲之氏校梓
　　　沈珵西瑛甫校正

草部　（毒草類）

大黃。味苦，氣大寒，性微毒。氣味俱厚，沉而降，陰也。入手足陽明、太陰、厥陰六經，血分之藥。生用性烈，酒醋蒸汁製，其性稍緩，各因其用也。（陶隱居曰：出河西山谷及隴西者為勝，益州北部汶山西山者次之。二月卷生，黃赤族葉，特四四相當，似羊蹄葉，粗長而厚，莖高三尺許，味酸而脆。三月花黃，五月實黑。八月采根，大者如碗，小者如拳，長二尺許，切片陰乾，文理如錦，質色深紫，修淨，切作薄片，以文如穀紋緊厚者佳。剉細，又以水潤透，蒸之，曬乾，再潤再蒸再曬，凡七遍，色加烏存者為度。）

○大黃蕩滌腸胃，通利閉結，攻擊積聚，破散瘀血，催逐留飲，并宿痰宿食之藥也。味大苦，氣大寒，其性沉而不浮，走而不守。凡病在五臟腸胃之間，痰血食飲，有形之物，及天行君火之邪，銷鑠津液，痞閉癥府，或傷寒溫病熱病，實熱聚熱，熱結中下二焦，二便不通，諸證咸宜用之。故經曰：實則瀉之。大黃氣味大苦大寒，性稟直遂，長于下通，峻利猛烈，撤堀直搗，一往不返，得有將軍之號。故凡腸胃積聚，由于脾虛中氣不運，而不由于食飲停滯者；閉結由于血少腸燥，而不由于熱結不通者；瘀血由于胃虛脾弱，而不由于宿滯停留者；留飲由于胃陽其氣不化而生，而不由于陰寒水濕成者；宿食由于脾弱

不瘀而不由于邪熱內結者，亦人腹痛由于厥陰血虛，而不由于經阻不行者，利疾由于風客胃腸而有表證未清，而不由于裏實有積滯者。吐衄失血由于陰虛火起于下。炎爍乎上，熱血妄行，溢出上竅，而不由于血分實熱者，腰痛腳氣由于下元先虛，濕熱下流，而不由于風濕外侵，瘀血內閉者，癰疽腫毒由于心氣不舒，肝氣鬱逆，以致營氣不從，逆于肉裏，乃生癰腫，而不由于膏粱厚味，醇酒炙煿，血分積熱成者，咸宜忌之，以其損傷胃氣故也。故傷寒方調胃承氣湯中用甘草以和之，正謂是也。輕發誤投，多致危殆，戒之慎之。

方龍潭先生曰：凡蘊熱之證，藏府堅澀，直腸火燥而大便結，癰腫初發，毒熱熾盛而大便結，肥甘過度，胃火盛而大便結，縱飲太甚，脾火盛而大便結。必用苦寒，以大黃可也。至若跌撲損傷，血有所瘀，閉而不行，用桃仁紅花之劑，必加酒炒大黃。又，有陽明胃火，痰涎壅盛，喉閉乳蛾，腮頰腫痛，及連口齒，用清痰降火之劑，必加薑製大黃。若光明科以之治目，在時眼初發時，以之瀉火可也。瘡腫科以之散熱拔毒，在紅腫時解毒可也。如產後去血過多，血虛閉而便不行，當用養血潤腸之劑，必禁大黃為要。又若老人氣虛血閉，當用麻仁丸，肥人痰閉，當用半硫丸，大黃亦所必戒。有不可畏而不用，亦不可忽而輕用。若元虛不足者，不可用，恐正氣耗而亡陰

也。風寒表證未解，不可用，恐裏氣一虛，表邪內陷也。裏證當下，脈勢無力，不可用，恐熱邪去而正氣脫也。故陽證當下，誤下早而表邪內陷，成結胸。裏證當下，誤下早而餘邪留結，成痞氣。是用大黃之慎也。要訣曰：氣血者，有形無形之分也。如熱在氣分，無形之邪也；熱在血分，有形之邪也。有形之邪，當用大黃蕩滌之；若無形之邪，而用大黃，是謂誅伐無過，悞之甚矣。然張仲景立大陷胸湯丸，皆用大黃，實瀉胸胃血分之邪；若結胸在氣分，則用小陷胸湯；痞滿在氣分，則用半夏瀉心湯，如是則氣分血分之別，若冰炭之不同矣，可忽乎哉。又按仲景治心氣不足，吐血衄血，用瀉心湯，以大黃黃連黃芩。或曰：心氣既不足，而不補心，更瀉心，何也。曰：若心氣獨不足，則不當吐衄血矣。惟有邪熱客之，因而不足，故令吐衄血也。芩者，以苦泄其熱，以苦補其心，蓋一舉而兩得之也。朱丹溪又云：瀉心湯者，因本經之陽火亢甚，以致陰血妄行飛越，故用大黃瀉去亢甚之火，使之和平。且心之陰不足，則肺與肝各受火邪而病作，故用黃芩救肺，黃連救肝。又肺者，陰之主；肝者，火之母；肝肺之火既退，則陰血歸其原矣，何吐血衄血之有耶。

沈則施先生曰：凡病在氣分，及胃寒血虛，并妊娠產後，及久病年高之人，並勿輕用大黃。其性氣苦寒，能傷元氣，耗陰血也。

○集方。治腸胃中一切壅滯。或痰血隱癖內伏之疾。用大黃四兩。黑牽牛末二兩。用酒共煮一日。以酒乾頻添之。搗膏爲丸如梧桐子大。每早服三十丸。白湯下。○治久患積聚。用大黃二兩。酒煮一日。曬乾爲末。和白芍藥末二兩。煉蜜丸菉豆大。每早晚各服百丸。白湯下。○治跌撲傷損瘀血。或從高墜下。或木石壓傷。及一切傷損瘀血凝滯痛不可忍。用大黃酒蒸一兩。杏仁去皮三七粒。二味俱研細。酒一大盞。煎六分。五更時服。至曉取下瘀血即愈。○治杖打腫痛。或作潮熱者。用大黃末。薑汁調敷。一夜黑者紫。二夜紫者白也。○治實熱濕痰留飲爲病。以錦紋大黃酒蒸八兩。入前胡八兩。橘紅四兩。外另

以青礞石二兩。同焰硝二兩。入砂罐固濟。煅紅研末。二兩。右各取末。以水發爲丸梧子大。每常服一二十丸。小病五六十丸。緩病七八十丸。急病一百二十丸。溫水吞下。即臥勿動。候藥逐上焦痰滯。次日先下糟粕。次下痰涎。未下再服。惟妊娠水泄忌之。○治宿食停滯。腹中脹滿。用大黃八兩。酒浸九日。蒸一次曬一次。計蒸曬共九次。如乾燥添酒蒸曬。九次畢。爲末。紅麯打糊丸如菉豆大。每服一錢。空心白湯送下。○治傷寒熱病。邪結中焦。用大黃枳實厚朴。爲小承氣湯。○治傷寒病發于陰而反下之。心下滿而不痛。按之濡。此爲痞也。以大黃黃連瀉心湯主之。用大黃二兩。黃連一兩。水二升。煎半升頓

○治腸胃實熱閉結不通。用大黃八兩。酒煮三時。曬乾爲末。配杏仁霜。蔞仁霜。各一兩。紅麯打糊丸如黍米大。每早服六分。白湯下。○治婦人經脉血滯不通。腹中常痛。用大黃四兩。酒煮三時。曬乾爲末。配玄胡索。桃仁。三稜。蓬莪术。俱酒炒各五錢。爲末共爲丸。每早服一錢。酒下。○治痢下赤白。腹中脹滿。閉澀不通快。用大黃二兩酒煮。配枳殼。檳榔。當歸。甘草。滑石。白芍藥。各五錢。分作四劑。水三大碗。煎七分。空心徐徐服。或作丸。每早服三錢。是迎奪之法也。然不可過劑。過劑恐傷胃氣。○治吐血衄血。由于胃實火升者。用大黃。黃芩。黃連。各一兩。水五升。煎取一升。熱服取微利爲度。○治腰痛而重。坐臥

痛。愈甚行則痛止。此內有瘀血也。用大黃三兩。酒煮。桃仁三兩。去皮。紅花五錢。分作五劑。每劑用水二碗。煎半碗。食前服。○治脚氣紅腫。痛重難履。方同腰痛。○治膏粱厚味。酒食煿炙。積熱日深。發爲癰腫。用生大黃研末。醋調塗之。燥即易。不過數易即退。○治跌撲損傷。瘀血內閉。用大黃。桃仁。紅花。各五錢。酒水各半煎服。○治陽明胃火。痰涎壅盛。及喉閉乳蛾。或腮頰腫痛。或齒牙攻痛。用大黃三錢。鹽水製。硼砂二錢。山豆根。川貝母。各五錢。或煎湯服。或作散服。○治暴赤時眼腫痛。大便閉結者。用大黃三錢。酒製。防風。柴胡。乾葛。甘菊花。各一錢。蔓荆子。荆芥。各二錢。水煎服。○治小兒無辜疳癖。面乾黃

毛髮徧或瘰癧或作痢下止。用大黃四兩，搗為細末，以米醋一升，和置瓷器中，隔湯蒸一晝夜，加廣木香末一兩，輾成丸，如梧子大。三歲兒一服十丸，日再服，以下青白膿為度。如不下，或下少，稍稍加之；若下多，又須減之。病重者，十餘服除根。大人亦可服。此藥雖下宿膿，不令兒利也。○治赤白濁淋，痛澀不通，用大黃為末，每用六分，用雞子一箇，破頂入藥，攪勻蒸熟，空心食之，不過三服愈。○治婦人陰戶腫痛，用大黃五錢，酒煮乾，加水二碗，煎半碗服。○治風熱牙痛，或有蟲，或齦根出血，或漸至崩落，或口中作臭，用大黃酒浸，晒乾，炒極焦，研為細末，每早晚擦牙，以熱湯汨漱，大有奇效。○治湯火傷灼，

用大黃為末，蜜調塗之，不惟止痛，又且免潰。○治大風癩瘡，用大黃炒一兩，皂角刺焙二兩，共為細末，每服三錢，空心白湯下。取出惡毒物，如魚腦狀，或如亂髮之蟲。末下再服，服後再服雄黃烏蛇散，除根也。取大烏稍蛇一條，去皮腸，露天砂鍋內，水煮熟，去骨，漉搗如泥，和入飛細雄黃末三兩，為丸梧桐子大，每早午晚各食前服一錢五分，人參湯下。○治跌撲打傷瘀　三錢乳

（香沒藥桃仁陳皮甘草各）

蒲黃各二錢，老酒、清水各二碗煎

商陸，味辛苦，氣寒，性平，有毒。沉也，降也，陰也。（別錄曰：商陸生咸陽山谷，今四方皆有。根如人形者有神。春生苗，高三四尺，莖青紫赤，[illegible]葉相當，葉如牛舌而長。夏秋白花作朵，[illegible]亦有赤花者，根赤；白花根白。白者入藥，根如萊菔，有似人形者有靈。可以作鬼[illegible]。爾雅謂之蓫薚，[illegible]之說，陸陰當取白花之根，銅刀刮去皮，切薄片，和黑豆蒸透，[illegible]曬乾，取用。）

○商陸，疏利臟腑，行水，水氣之藥也。故前人主治水腫、水瘕，十種水病，喉閉不通，小便脹急。赤者敷癰疽疔瘡，拔根。用此藥寒而沉降，疏泄峻利，急如弃裂，與大戟、甘遂蓋其種同功。如胃虛陽弱人服之立斃，非氣結水壅急脹不通者，不可輕用。

陳廷采先生曰：商陸讀云，其味酸辛，其形類人，行水消

毒，其效如神，斯言盡之矣。

李士材先生曰：商陸行水，有排山倒海之勢，胃弱者痛禁。赤者搗爛，敷癰疽疔瘡，入麝香少許，貼臍，亦能利便消腫。脹證因脾虛者多，若誤服食，一時雖效，未幾再作，決不可收，慎之慎之。

○集方：治水氣腫滿，喘不能臥，用商陸白根去皮，切如豆大二兩，和白米二兩，水二升，煮一升，成粥，取湯，每日空腹服之，取微利數次，半月後方可吃淡粥，忌鹽味甜味百日。一方治水腫，用白商陸根一觔，羊肉八兩，水一斗，煮取三升，去滓飲之。○治腹滿脹急，不得臥，喘息上攻心胸，兩脅腸肋脹痛，或紫黑而悶，用商陸根搗爛炒熱

以帨盛，更互熨之，立効。○治喉卒攻痛，用商陸根擣爛，炒熱，布裹熨之，冷即易，立愈。○治小兒將痘欲出不得出，發熱腹脹痛，努氣不安，用商陸根一兩，和葱白五莖，擣敷臍上，即內止，痘出可免難疹。

蘇氏曰：治人心昏塞，多忘多臥，取商陸花陰乾百日，擣末，每日暮白湯服一錢，乃臥，如思念所欲事，即于臥中醒悟也。

毒，味苦辛，氣平，有毒。（李氏曰[illegible]其[illegible]曰假毒，出秦隴州郡山谷中及[illegible]州亦有之，莖葉[illegible]似商陸及大黃，莖葉上有毛，根皮黃色，肉色白，形似防葵，沉水中然者[illegible]蔄茹[illegible]也。今人多以草蔄茹偽充，不可不辨[illegible]）

狼毒性酷，有毒，破積聚，消水穀，殺蟲氣，治疥癬之藥也。故前人主殺飛鳥走獸，并逐水穀積聚，及癥瘕寒熱蠱毒，與不殺之蟲，無以轉輸皮毛，致生惡瘡鼠瘻疥癩者，皆宜遂而。然此之毒餘悍矣，雖非良藥，善治酷疾，如脾元不足，真氣用乏者，不可妄施。

○集方：治腹中冷痛，水穀陰結，心下停痰，兩脇痞滿，按之鳴轉，逆害飲食。用狼毒、旋覆花各一兩，附子五錢，切片，俱用童便浸三日，焙乾為極細末，蜜丸梧子大。每服五

丸，食前後白湯送下。○治九種心疼，及久年積冷，流注心胸，并治馬墜車，瘀血中惡等證。用狼毒、附子俱童便浸一宿，曬乾，吳茱萸湯泡，乾炒，人參各一兩，巴豆五錢，去油，共為末，紅麯打糊為丸梧子大。每遇此患，用三丸，白湯吞下。○治陰疝丸縮入腹，急痛欲死，用狼毒、附子各五錢，俱童便浸炒，研爛成丸，如梧子大。每服十丸，早晚白湯下。○治腹中一切蟲積，用狼毒微炒，研末，空心服一錢，沙糖湯下，半日即下蟲也。○治乾濕蟲疥，用狼毒一兩，微炒，研細末，清油調，遍身擦之，臥時勿以被蒙頭，恐藥氣傷目也。○治久年乾疥乾癬，及一切癩瘡

用狼毒，微炒，研細末，輕粉減半，和勻，治疥癬瘡[illegible]搽之。濕者乾糝，數次效。○治癘風癩瘡，用狼毒[illegible]等，俱浸炒，研末，每早晚各服五分，溫酒下。

狼牙　味苦辛，氣寒，有毒。

（別錄曰：狼牙生淮南山谷及冤句，今江東汴東州郡皆有。苗者似蛇莓而厚大，深綠色，根黑若獸之牙。又范子云：出建康及三輔，色白者善。葉苗根黃赤，六七月作花，八月結實黑色，十一月采根，日乾。如中濕腐爛生衣者殺人。）

○狼牙：殺蟲去瘡，消一切疥癬之藥也。此藥氣烈有毒，凡瘡瘍濕熱生蟲，如疥癬，如血痔，如小兒頭瘡，婦人陰蝕䘌癢諸疾，煎湯淋洗，立時見效。凡服食湯散中，不多用也。

○集方：治寸白諸蟲，用狼牙一兩，微炒，搗末，米糊為丸，如綠豆大。隔宿不食，次早以白湯下五錢，蟲下即愈。○治疥瘡痛癢，濕爛不收，用狼牙一兩，煎湯洗。○治[illegible]疥瘍，用狼牙根葉俱可，搗爛，炒熱搽之。○治丈人陰癢，用狼牙煎湯，乘熱洗。○治婦人陰蝕瘡爛，用狼牙煎湯，以筯頭纏綿子，攪洗陰中，即愈。○治小兒陰囊濕癢成瘡，或莖頭瘡爛，用狼牙煎湯洗。○治蛇毒蟲傷，用狼牙根與葉俱可，搗爛敷上，立效。○治射工中人有瘡，用狼牙，冬取根，夏取葉，搗汁四五合飲之。

狼毒、狼牙二物，原非一種，偶以類及，姑并及之。

山慈姑　味辛，氣寒，有小毒。

（藏器陳氏曰：山慈姑生山中濕地，惟處州遂昌縣所產者良。冬月生苗，如秋葉而稍小，二月中抽一莖，高尺許，莖端作花，有白、黃、紅色三種，瓣上俱有黑點，開雜衆花攢簇成朵，如絲紐結，狀甚可愛也。三月結實，子有三稜。四月中苗枯，即掘取其根，形似水慈姑而小，又似小蒜而有毛。遲則苗腐難覓矣。一種葉如車前草並茶花，實則一也。酉陽雜俎云：花與葉不相見，又謂之無義草。今人多以金燈花、老鴉蒜俱偽充之，但山慈姑有毛包殼，老鴉蒜根無毛而光，為異也。修治：采時晒乾，去毛殼用。）

○山慈姑：消癰腫，解諸毒之藥也。化蟲毒，解蟲傷，療犬咬蛇毒，散癰疽無名疔腫，出隱疹有毒惡瘡，又醋磨敷面，善剝面皮，除皯䵳，化疣贅。但其味辛氣寒，專散熱消結，快利而無鈍滯者也。除此數證之外，並無別用，不可輕施。

盧子由先生曰：山慈姑之性，嚴厲威猛，而命名慈姑者，何然？狂犬蛇蟲惡毒疔腫，生死旦夕，此以猛毒攻毒藥物，乃復化毒排兇，造人命于危急之頃，若肝腸既潰，面目可憎，厥形亦無生情，兇劇之滅之，全面目終身之大功，益兩端非慈憫姑恤，焉能如是乎？其命名者以此。

○集方：治粉滓面䵟，用山慈姑根研爛，夜塗旦洗，數次即淨。○治癰疽疔腫，一切惡瘡及黃疸疾，山慈姑、蒼耳草等分，搗爛，和好酒一鍾，濾汁溫服，或乾用為末，每酒調服三錢。○治風痰癇疾，用山慈姑二個，研如泥，以茶調下，即臥良久，得吐出雞子大痰一塊，永不發，如不吐，以熱茶投之，即吐痰塊也。○入紫金錠，磨敷并服，稱神效。

凡一切飲食藥毒、蠱毒、瘴氣、河豚、土菌、自死牛馬等毒，並用凉水磨服一錠，或吐或利，即愈。癰疽發背、疔腫，一切惡瘡、風疹、赤遊、痔瘡，並用凉水磨塗，日數次，立消。陰陽二毒、傷寒狂亂、瘟疫、喉痺、喉風，並用冷水入薄荷汁數匙化下。心氣痛并諸氣，用生薑湯化下。泄瀉痢下、乾霍亂、絞腸沙，用薄荷湯冷化下。中風中氣、口噤眼歪、五癲五癇、鬼邪鬼胎、筋攣骨痛，並溫酒化下。自縊溺水、魘迷死、心頭溫者，生薑湯磨灌下。傳尸癆瘵，凉水化下，取下惡物蟲積爲妙。久近瘧疾將發時，桃枝湯化下。女人經閉，紅花酒化下。小兒驚風、五疳五痢，薄荷湯化下。頭風頭痛，酒浸研爛，貼兩太陽上。諸腹脹，服麥芽湯化下。風蟲牙痛，酒磨塗之。毒蛇、惡犬并一切蟲傷，並用凉水磨塗，仍服之。（以上主治諸證，此指紫金錠而言，非爲山慈菇言也。）

蚤休　味苦，氣寒，無毒。入足厥陰肝經。（一名螫休，一名重臺，一名金線重樓，一名草河車）

（別錄曰：蚤休生山陽川谷及冤句。今河中、河陽、華、鳳、文州及江淮間亦有之。生深山陰濕地。李氏曰：蟲蛇之毒，得此治之即止，故名。又名重臺，因其葉狀也。名金線重樓，因其花狀也。名草河車，因北功用也。生無旁枝，一莖挺生獨上，莖當葉心，似王孫、鬼臼、芍藥輩，對並叢，凡一莖三層，獨王屋山產者至五七層，每層七葉，葉色碧綠。夏月莖頭作花，一花七瓣，上有金絲下垂，蕊長三四寸。秋結紅子。根如鬼臼及紫參、蒼朮、菖蒲等狀，外紫中白，堅細質脆，有粳糯二種。修治洗淨，切焙用。諺云：七葉一枝花，深山是我家。癰疽如遇着，一似手拈拏。）

○蚤休，凉血去風，解癰毒之藥也。前古主小兒熱氣在腹，發爲驚癇，搖頭弄舌等證，本肝經藥，凉而沉靜，故療熱極動風之疾。以醋摩敷癰腫諸蛇毒蟲傷，良驗。但氣味苦寒，雖云凉血，不過爲癰疽瘡疹，血熱致疾者宜用。中

病即止，又不可多服、久服，如熱傷營陰，吐衄血證忌用之。

○集方：治小兒胎風，手足搐搦。（衛生易簡方）用蚤休微炒爲末，每服半錢，薄荷湯下。○治驚風發搐（錢氏方）用蚤休一錢，天花粉二錢，俱炒黃，研勻，每服三分，薄荷湯下。因熱極生風，宜用此方；如因吐者、瀉者、發熱久病者，元氣虛耗，發驚搐，不宜用。○治中鼠莽毒（集簡方）用蚤休磨水服，即愈。

大戟味苦辛，氣寒，有毒，陰中微陽之藥也。

李[illegible]以大戟出常山，今近道亦有，多生平澤。二三月發芽紅色，漸長，葉微有紫，莖中空，折之有白漿，葉狹長似柳，梢頭葉攢密而上，三四月開黃紫色花，如杏及蕪荑，根如苦參而細，川淮甸者似百合而葉黃，江南者葉似芍藥而苗短，州杭州者色紫而柔，為上品，江南又一種土大戟次之，北方一種綿大戟，皮韌如綿而色白，氣味酸利，能傷人，俱為下品，弱人服之，吐血損氣泄，使勿用附生者，誤服令人泄氣不禁，即用薺苨湯解之。修治以米泔水浸去骨，曬乾用。

○大戟除蠱毒，行水脹之藥也。若能滑泄，辛能橫散，故逐諸有餘之水，濕熱，及留飲伏飲在中下二焦，為蠱毒，為腫滿，為大小便不通，用之立時奏效。觀大氏方乘主天行黃病，溫瘧寒熱，頸腋癰腫，無非濕熱伏飲為患，故宜服之。但氣味苦陰而寒，性善下泄，未免有損真氣，如

患水腫諸證，不由乎受濕停水，而由乎脾虛者，若不補脾而復用疎泄追逐之藥，是重虛其虛也，鮮無夭枉之咎。果元氣壯實之人，留飲伏飲停滯中焦，乃可一暫施耳。

李瀕湖先生曰：痰涎之為物，隨氣升降，氣逆痰滯則為病矣。滯于心則迷亂而成癲癇，或妄言妄見；滯于肺則喘逆而成欬唾稠粘，胸脹背冷；滯于肝則留伏蓄聚而成脇痛乾嘔，寒熱往來；滯于脾則腫滿脹急，食飲不入；滯于腎則腰股重滯，二便不通；入于經絡則麻痺疼痛；入于筋骨則頸項胸背腰脇手足牽引隱痛；而不知所在，似乎癱瘓，不可誤作風氣、風毒及瘡疽施治。故陳氏三因方，並以控涎丹主之，殊有奇功。此治痰之本。痰之本，水也，濕也，得火與氣逆，則凝滯而為痰、為飲、為涎、為涕、為癖。故用大戟能泄臟腑之水濕，甘遂能行經隧之水濕，白芥子能散皮裏膜外之痰涎飲積，俱微炒，各一兩，為末，薑汁水發為丸，如綠豆大，每服十五丸至三十丸，以津唾嚥下。若取利，服二百丸，白湯下。惟善用者能收奇功也。

○集方：治水氣腫脹如鼓，或遍身浮腫，用紅棗五升，入鍋內，以水浸過，用大戟八兩，蓋之，瓦盆合定，煮熟，去大戟，取棗，無時食之，以十日內聚盡必愈。○又方，以大戟二兩，廣木香一兩，為末，五更時白湯調服二錢，取下碧水，

數次，十日後漸以淡補粥食之，忌一切鹹味。○又方，用大戟、白牽牛各等分，為末，每服二錢，以豬腰子一對批開，摻藥末在內，濕紙煨熟食之。○治黃疸，小水不通，用大戟一兩，茵陳二兩，水浸，空心服。○治瘧疾寒熱腹脹，用大戟五錢，柴胡、薑製半夏三錢，廣皮一錢，生薑三片，水二大碗，煎七分服。○治頸項腋間癰疽，用大戟三兩，酒浸炒，曬乾，當歸、白朮各二兩，共為末，生半夏薑米炒為末，打糊丸如梧子大，每服二錢，食後白湯下。

澤漆味苦辛。氣微寒。有小毒。

（李氏曰澤漆是貓兒眼睛草生江湖原澤平陸多有之春生苗一科分枝成叢柔莖如馬齒莧葉如苜蓿葉圓而黃綠色頗似貓眼睛故名頭凡五葉中分中抽小莖五枝每枝開細花綠色復有小葉承之齊整如二脅莖有白汁能下其根白色有硬骨或以此為大戟苗者誤也大曰澤漆利水功類大戟人見其苗有白汁遂誤以為大戟耳然大戟苗有毒而瀉人澤漆苗無毒而不傷人可作菜食大戟根有骨去骨而飲澤漆根有骨去骨仍不可用二者甚不相侔也）

○澤漆散積逐行瘀利水腫之藥也。主治功力與大戟同。較之大戟。澤漆稍和緩而不甚傷元氣也。然性亦猛走泄。如胃虛人亦宜少用。

甘遂味苦。微甘。氣寒。有毒。入脾腎二臟。

（別錄曰甘遂生中山山谷。中山在代郡惟太山江東者良一說此用來京口者更勝江東者次之蘇氏曰苗似澤漆莖短小而葉有汁根皮色赤肉色白作連珠狀大如指頭重實者方堪入藥一種白皮者名草甘遂乃是蚤休苗亦不同療體全別修治采取用斗草水浸三日瀝乾再以麵包煨熟用）

○甘遂行水氣。逐留飲。散大腹蠱脹之藥也。前人主大腹腫脹而目虛浮。痞熱疝瘕。宿痰留飲諸疾。皆從水濕所生。水去則濕除飲消。是拔其本也。繆古謂味苦氣寒。苦能泄。寒勝熱。此藥直達水氣所結之處。乃泄水之聖藥。然水結胸非此不除。故仲景方大陷胸湯用之。蓋去水極神。損真極速。有毒不可輕用。其性之惡可槩見已。味大苦而反名甘遂者。如左氏所謂誚受而甘心降志焉。以甘于遂其功用也。但性有陰毒。雖善下水除濕。實能耗損真氣。虧竭津液。元氣虛人。除傷寒水結胸不得不用外。其餘水腫膨脹。類多脾陰不足。土虛不能制水。以致水氣之泛濫。法應補脾實土兼利小便。不此之圖而反用甘遂下之。是重虛其虛也。水既暫去。復腫必死矣。必察病屬濕熱。有飲有水。而元氣尚壯之人。乃可一暫用耳。不然禍必旋踵矣。戒之慎之。

○集方。治水腫腹脹。用甘遂炒三錢。黑牽牛頭末三錢。分作五服。空心白湯調下。○治膜外水氣作脹。用甘遂炒三錢。大麥麵炒五錢。水和作餅。炙熟食之。取利。○治身面紅腫。用甘遂二錢。生研為末。以豶豬腎一枚。切為七

餡入末拌勻、濕紙包、灰火內煨令熟、食之。行一服、至三四服、當覺腹鳴、小便利、是其効也。○治水蠱喘脹、大小便不通、用甘遂、大戟、芫花、各一兩、微火炒、皆為末、每服五分、白湯半盞、空心調服、不過十服愈。○治妊娠腫滿氣急、小腹脹大、小便不利、用甘遂二兩、炒為細末、煉蜜和丸梧子大、每服五六十丸、白湯下、得微利為度、以上五方、俱忌食鹽百日。○治心下留飲、胸滿而喘、冷澀水者、用甘遂三錢、生半夏一兩、俱漿水浸一日、砂仁五錢、俱炒黃為末、每服一錢五分、白湯調下。○治水痢腫痛、用甘遂一兩炒、茴香二兩炒、共為末、空心酒服一錢。○治痃癖腫滿、兼胸背疼痛、發熱盜汗、用甘遂炒黃為末、

大人服三錢、小兒服一錢、俱用冷蜜湯調服、忌油膩鹽味。○治腳氣腫痛難伸、下部瘡癢、乃腎臟風氣攻注者、用甘遂五錢炒、木鱉子仁五箇、共為末、豬腰一箇、去皮膜切片、用沒藥三錢、糝在內、濕紙包煨熟、空心食之、米飲下、服二次、大便微行、兩足便伸立効。○治膈氣哽噎、用甘遂、麵裹煨、五錢、南木香一錢、共為末、壯者服一錢、弱者服五分、白湯調服。○治體氣、用甘遂末二錢、同豬肉煮食、于野地中掘一坑、令患人至彼處、向上風站立、以甘草末、唾調入臍內、須臾腹中作響、取利黑水、亟從上風奔回、可絕、不絕再作一服、仍前用之。○治小兒風熱喘促悶亂不安、名為馬脾風、用甘遂二錢、麵包火煨、辰砂一錢、輕粉五分、共為末、每服三分、白湯少許、滴茶油一小點、抄藥在上、調勻灌之、

李時珍先生曰、腎主五液、化為五濕、凝則為痰飲、溢則為腫脹、半夏南星、能泄痰之標、不泄痰之本、大戟芫花甘遂、能泄腎經五濕之氣、治痰之本者也、但中病即止、不可過服。甘遂反甘草、仲景治心下留飲、與甘草同用、取其相反而立功也、又劉河間治水腫服藥未全消者、以甘遂末、塗腹遶臍、令滿、內服甘草湯、其腫便愈、又王璆[illegible]腳氣上攻、結成腫核、用甘遂末、水調塗腫處、煎甘草汁服、其腫即散。二物相反、而感應若此。

蒟蒻　味辛甘、氣寒、有毒。

李氏曰、蒟蒻出蜀中、今施州亦有、江南關中亦有、呼為鬼頭、宜樹陰下掘坑積糞種之、春時生苗、至五月移之、長一二尺、與南星苗相似、但多斑點、宿根亦自生苗、經二年者、根大如碗及芋魁、其外理白、味亦麻舌、秋後采根、須淨擦洗去涎、或片段、以灰汁煮十餘沸、以水淘洗、換水五六遍、煮化即成凍膏、切片、以米醋油醬拌食、如農書言救荒之策、有粉葛蒟蒻橡栗之屬、則此物亦有益于民者也、又搗爛敷瘰癧風毒有効、古方治癆瘵、以此物切碎、洗去涎水、灰汁煮過、再換水洗淨、清水熬化成膏、日食則癆病自愈。

續隨子。味辛，氣溫，有毒。（又名千金子）

（黃氏曰：續隨子多生蜀郡，今處處有之，江南尤多。入藥以南產者為勝。人家園圃種此可觀，但秋種冬生，春秀夏實，故又名拒冬子也。苗如大戟，初生一莖，葉在莖端，葉復生莖，莖復生葉，轉展疊加，宛如十字，作花亦類大戟，但從葉中抽幹，以結實耳。修治：取子鋪竹匾內，用薄砑覆如手掌大，輕輕擂之，則殼自裂，擂去浮殼，取白仁，綿紙包裹，壓去油用。）

○續隨子，通月閉，化癥瘕，消蠱脹之藥也。味辛烈，而性有毒，實攻擊猛摯之品。長于攻利腹內一切惡滯毒物，故宿血能通，頑痰能下，蠱毒能消，癥瘕能化，追利二便，消釋蛇咬。蓋此藥能以毒攻毒也。雖然，此藥長于搏擊攻利腹內一切惡滯毒物，如果病至膏肓，實不得已也。或者諸病則各有成病之由，當求其本而治，不致妄用可也。若脾虛便滑之人，慎服，必殆。

李瀕湖先生曰：續隨與大戟、澤漆、甘遂，莖葉相似，主療亦不相遠，其功皆長于利水消脹，惟在用之得法，應病合宜可耳，亦皆要藥也。

○集方：治月閉不通，瘀血血結，用續隨子廿粒，去殼去油，空心酒調服，當下惡物。○治癥瘕痃癖延積，用續隨子三十粒，去殼去油淨，膩粉二錢，共研勻，粳米飯丸如芡實大，每服一丸，打破，以大棗一枚燒熟，去皮核，空心同嚼，冷茶送下，半日後取下積聚惡物為效。○治陽水腫脹，用續隨子二兩，炒去殼，研去油，大黃一兩，酒煮曬乾，共為末，水發丸，如綠豆大，每白湯下五十丸，去陳莝。○治蛇咬腫悶欲死，用續隨子二十一粒，草甘遂二錢，研細末，每服一錢二分，酒調服，再用少許以津唾和，塗咬處，立效。○治疥癩癬瘡，以續隨子研細，和黃丹數分，搽患上。○治小便不通，臍腹脹痛不可忍，諸藥不效者，用續隨子去殼一兩，黃丹五錢，同煉蜜少許，搗作團，用瓶盛，埋陰處，臘月至春末取出，研成丸，如梧子大，每服二三十丸，木通湯吞下。或化開服，病急者亦可隨合。○治黑子疣贅，用續隨子去殼，研爛，少許塗之，自落。

蓖麻子。味辛甘，氣溫，有毒。

（李瀕湖先生曰：蓖亦作螕。螕，牛蝨也。其子有麻點，故名蓖麻。今在處有之，北地尤多。夏月生苗，一莖直上，有赤有白，高丈餘，莖節如甘蔗，中空如赤箭。葉似葎草及瓠葉，葉甚肥厚而大。一葉五尖，夏秋之間，椏中抽穗，開細黃花，纍纍成穗，結子數十顆，枯時劈開，狀類巴豆，又類牛蜱，青黃斑褐，間雜可觀。殼中有仁，嬌白如續隨子仁，中之油可調印色。修治：以鹽湯煮半日，去殼取中仁，研細去油用。雷氏曰：凡使，勿用黑天赤利子，顆外皮無刺而頭尖，子無斑點。慎服，有大毒。○取蓖麻油法：用蓖麻去殼淨仁，石臼搗極細，以水一斗煮之，有沫撇起，沫盡乃止。遂用文火煮熬其沫，水去澄，滑上無氣升，油即成矣。傾入磁器中，冷定則凝結如脂，經久不變。蘇氏曰：凡服蓖麻者，一生不可食炒豆，犯之必脹死也。）

○蓖麻子：逐頑痰，利水脹之藥也（李仁甫稿）。其性善于收吸，能開通關竅，活利經絡，拔病氣出外。故逐痰利水，并追膿取毒，通鼻窒，解喉痹，下胞衣，出肉刺，行小便，能出諸有形之

滯物；又收子腸挺出，正口眼喎斜，定偏風頭痛，開痰閉失音口噤等疾，蓋從外治得功者居多。內服僅一二證而已也。但體質多油，而又有毒，如脾胃薄弱，大腸不固之人，慎勿輕用。

王紹隆先生曰：蓖麻力長收吸，入者能出，出者能入。如出肉刺，下胞衣，收子腸，提脫肛，拔病氣，奪有形質之滯物，多從外治，迅速敏捷，如桴應鼓。

○集方：治頑痰齁喘咳嗽（李氏方），用蓖麻子去殼炒熟食，日食十顆，須多服見效。○治水氣脹滿（外臺秘要），用蓖麻子仁十顆研爛，白湯調服，日中當下青黃水也。○治一切腫毒（傳信方），痛不可忍，用蓖麻子仁研爛敷上即止，如有膿即出也。○治鼻（聖惠方）塞不通，用蓖麻子仁二三粒，大棗一枚，去皮核，搗勻，綿裹塞之。一日一易，一月即聞香臭也。○治喉痹（海上方）急緊，脹不通，用蓖麻子仁研油，塗紙作條，燒烟熏吸即通。○治胞衣不下（[illegible]方），用蓖麻子仁七粒，研膏，塗腳心。若兒胎及胞衣下，即速洗去，不爾則子腸出，即以此膏塗頂，則腸自入也。○又催生下胎，不拘生胎死胎，用蓖麻二箇，巴豆一顆，俱去殼，麝香一分，研貼臍中，并足心。○治鍼刺（[illegible]生）入肉，用蓖麻子仁去殼一兩，先以帛襯傷處，敷之，頻看，若見刺出，即拔去，恐藥緊努出好肉。或加白梅同研，尤妙。○治食中（小品方）悞觸竹木骨哽，用蓖麻子仁一兩，凝水石二兩，研勻，每以一撚置舌根，噙嚥自然安。○治盤腸（救急方）生

產，子腸不收，用蓖麻子仁十四粒，研爛塗頂，即收。○治小便（[illegible]）不通，用蓖麻子仁三粒，研細，入紙撚內，插入莖內，即通。或取仁五粒，研爛，白湯調服亦可。○治口眼喎斜（王氏易簡方），用蓖麻子仁四十粒，搗爛，斜左貼右，斜右貼左，即正。有一方，用仁七七粒，研作餅，左喎安在右手心，右喎安在左手心，却以銅碗或瓷碗盛熱湯，坐蓖麻膏上，冷即換湯，五六次即正也。○治頭風偏痛（河間方），不可忍，用蓖麻子仁、乳香各等分，搗，隨痛左右，患止貼太陽穴，解髮出氣，極效。又方，用蓖麻子五錢，棗肉十五枚，搗塗紙上，捲筒插入鼻中，下清涕即止。○治八種頭風（袖珍方），用蓖麻子、巴豆各四十九粒，去殼，先用雀腦川芎一大塊，搗成極細末，

糊丸彈子大。風乾。遇是病先將川芎九。苦茶調成膏。了塗磁盞內。後將炭火燒蓖麻、巴豆肉。烟起。隨用藥盞蓋之。待烟盡。以白湯入盞內和調川芎藥服之。再以綿被裹頭臥。汗出避風。○治中風痰閉失音。用蓖麻子仁一兩。去油膽星一兩。為末。薑汁拌牙皂末三錢。共搗入蓖麻子內。或作丸。或作散。臨是病。白湯調服二錢。○治腳氣作痛。用蓖麻子十七粒。去殼。研爛。同蘇合丸貼足心。痛即止。○治癘風。鼻塌手指攣曲。骨節間痛不可忍。漸斷落。用蓖麻子仁二兩。川黃連八錢。剉碎。以小瓶子入水一升同浸。春夏二日。秋冬五日。後取蓖麻子一枚。劈破。仍以藥水吞之。漸加至四五枚。微利不妨。瓶中水盡更添。兩月後吃大蒜猪肉試之。如不發。是其効也。若發動。再服。直候不發乃止。○治瘰癧惡瘡及軟癤。用白膠香一兩。瓦器內溶化。去滓。以蓖麻仁六十箇。研膏。溶膠投之。攪勻。入油半匙。點水中試軟硬。添減膠油得所。以緋帛攤瘡癧貼。一膏可治四五瘡也。○治肺風面瘡。起白屑。或微有赤瘡。用蓖麻子仁五十粒。白果、膠棗各十粒。瓦松五錢。肥皂一箇。搗為丸。洗面用之良。○治惡犬咬。用蓖麻子仁五十粒。研膏。先以鹽水洗咬痛處。乃貼此膏。

(一)蓖麻葉。氣味有毒。治風腫腳氣不能動履。搗蒸熱裹之。日二三易即消。

有一種名博落迴。生江南山谷。莖葉竟似蓖麻。莖中空吹之有聲。折之有黃汁。誤入口立死。不可不知。

烟草　味苦辛。氣熱。有毒。通行手足陰陽一十二經。

（沈氏曰。烟草生江南浙閩諸處。今西北亦種植矣。初春下子。種時喜肥糞。其葉深青。大如手掌。夏初作花。形如斜頭。弱旋合抱。微有辛烈氣。稍合色姿。甚嬌嫩可愛。其本莖長五六尺。秋中采收。曬乾。切細如絲綫。成積裝入筒口。火然吸之。烟氣入口。鼻通達百骸。尚漳閩中石馬鎮產者最佳。）

(一)烟草通利九竅之藥也。門吉士曰。此藥氣甚辛烈。得火然取烟。氣吸入喉中。大能禦霜露風雨之寒。辟山蠱鬼邪之氣。小兒食此能殺疳積。婦人食此能消癥痞。北人日用為常。客至即然烟奉之。以申其敬。如氣滯、食滯、痰滯、飲滯，一切寒凝不通之病。吸此即通。如陰虛吐血、肺燥勞瘵之人。勿胡用也。偶有食之。其氣閉悶。昏憒如死。則非善物可知矣。所以陰虛不足之人不宜也。

常山。味苦辛。氣寒。有毒。

（別錄曰常山生益州川谷及漢中今宜都建平海州出西湖南淮浙亦有之蘇氏曰生山谷間莖圓有節高二四尺葉似茗兩兩相對二月開白花青萼五月結實青圓三子爲房根似荊根色黃而皺苗如蜀漆也采時須連根苗收用氣力始全性惡濕采即曝燥色青白堪用否則黑爛鬱壞矣宜都建平者根形細實堅如雞骨最用勝他地也海州者葉似楸葉八月開花色紅白子碧色似山楝子而小又天台土常山苗葉並甘而涼人用爲飲非此常山類也修治如用蜀漆臨時去根水洗淨漉乾搗用甘草水拌蒸晒乾取用如用常山臨時去苗水洗淨細剉酒浸一宿炒黃用不爾使人吐也）

○常山。逐痰涎。散溫瘧之藥也。蓋寒熱溫瘧。必有黃涎聚于胸中。爲寒爲熱。爲脹爲嘔。古人謂無痰不成瘧也。古方書又謂治傷寒寒熱。痰飲寒熱。蟲毒瘴氣寒熱。傷暑食魚麵瓜菓積滯寒熱。常山力能驅之。但此藥雖能驅

癖癘。逐積飲。其性暴悍。終損胃氣。故瘧疾非由于瘴氣及老痰積飲所致者。勿用。如風寒暑濕之邪。飲食之積。乘虛客于五藏六府十二經。瘧亦因之而發。務宜疎散四氣。次以養胃健脾消痰。乃治瘧之正法。稍久。則當分氣血。施補助。無不愈。又安所事常山者耶。

方龍潭先生曰。常山蜀漆。有劫痰截瘧之功。須在表邪發散之後。或瘧發七次之後。用之無害。若用之早。必致閉邪成膨脹者。恒有之。

○集方。治胸中痰飲。用常山酒浸炒。甘草炙。各五錢。水二升。煮取半升。去滓。入蜜十茶匙。溫服取吐。不吐更服。○截瘧神方。用常山酒浸晒乾。草果。研各二錢。知母。貝母。各一錢五分。水二碗。煎半碗。五更未發前熱服。○治寒多熱少。久瘧不止。用常山酒煮二錢。檳榔一錢五分。丁香五分。烏梅一個。酒一碗。浸一宿。五更飲之。一服即止。永不再發。○治數年不瘥久瘧。用常山酒煮一兩。晒乾爲末。神麯打糊丸梧桐子大。每服五十丸。五更一服。天明一服。發前一服。俱薑湯下。或吐或不吐。即止。

小胃丹。（治一切痰飲最能化痰化痞化積治中風痰痺極有神效）用常山五錢煨。大戟水煮半日晒乾炒。芫花醋拌濕炒。白芥子炒。大黃酒煮炒。白朮。半夏。枳實。南星。蒼朮。桃仁去皮。杏仁去皮。七味俱用牙皂白礬水泡過晒乾炒。各一兩。陳皮炒二兩。共爲末。薑汁和竹瀝打蒸餅作糊爲丸。如菉豆大。每服四五十丸。虛減半。白湯下。

續補集方。治一人飲食起居。向無疾病。安逸自如。恬澹亦無妄作內損諸事。因子貴。日事奉養。肥甘旨酒之樂。忽一日醉後臥醒。目中見物一若兩。或爲三四。如桌椅物件平正者。視之反歪斜。歪斜者視之反平正。或補藥瀉藥寒藥熱藥。諸投不效。一人教服滾痰丸。初次服一二劑。覺瀉數行。稍可。服至四五劑後。行多次。覺體憊難支。目光愈恍。視物即山頭樹木。皆林林移動。一西醫李光先曰。此胸胃有伏痰也。用常山五錢。人參蘆三錢。甘草一錢。生薑五片。水二碗。煎八分。食後頓飲。少頃吐痰數碗。目光安定。視物無前狀矣。

藜蘆味苦辛，氣寒，有毒。

（李氏曰：黑色曰黎，其蘆有黑皮裹之，故名。別錄曰：出太山山谷，高山者乃佳。蘇氏曰：今陝西遼州、均州、解州亦有之。四月生苗，高五六寸，莖似葱白，色青紫，多毛，外有黑皮裹莖，宛如棕櫚，故初生之葉亦若棕心，經久漸旋，與鬱金、秦艽、蘘荷葉相等也。六七月開花，肉紅色，立冬即枯。根似龍膽及馬腸根，長四五寸，一本二三十科，若百餘科者，乃水藜蘆也。水藜蘆生近水溪澗石旁，莖葉都相同，獨不入藥用。修治：去蘆頭，用米泔水煮一滚，曬乾候用。）

○藜蘆，吐風痰、出蠱毒之藥也。味苦善涌，能使邪氣痰積凡胸膈部分之病，悉皆吐出，有宣壅導滯之功。故古人治痰涎蠱毒及暗風五癎之證，一吐即平。日華子云：此藥但苦劣有毒。凡胸中有痰飲，或中蠱毒惡氣者，止可借其上涌宣吐之力，獲効一時。設病非關是證，切勿沾脣。徒令人悶亂，吐逆不止，虧損津液，耗減元氣也，慎之慎之。如外用敷搽，又能療白禿頭瘡及一切疥癬頑癬，殺蟲去蝨，世所常需。

沈藍田先生曰：古方去痰積，每用吐藥。然吐藥不一，如常山吐瘧痰，瓜蒂吐熱痰，烏附尖吐濕痰，萊菔子吐氣痰，若藜蘆則吐風痰者也。又按張氏方云：一婦病風癎，每年一作，五七年後，歲三四作，至四十歲，一月三四作，漸至三三日一作，甚至一日二三作，作則昏癡，遂忘人事。一醫教取藜蘆二大握，洗淨蒸熟，飽食，至五更忽覺心中不安，吐涎如膠，連日不止，約一斗餘，汗出如洗，甚昏困，三日後漸輕，飲食亦加，病去竟無恙。朝內和王妃劉氏年七十，病中風，不省人事，牙關緊閉，諸醫束手。一醫見藥不能入，自午至子不甦，濃煎藜蘆湯抉齒灌之，少頃噫氣一聲，遂吐涎痰而甦，漸調理，六君子加當歸、玉竹而安。

○集方：治諸風痰飲，用藜蘆一錢，鬱金二分，共爲末，每用三分，白湯一盞和服，探吐。○治中風不語，牙關緊急，喉中如曳鋸，口中涎沫，取藜蘆一分，天南星一箇，去皮，于臍上剜一窩，納入醋浸稼斗子肉二箇，四面火逼黃色，研爲末，麵糊丸梧子大，每服五丸，溫湯化下。○治蠱毒服悶臨急，用藜蘆末三分，黑豆炒爲末七分，白湯調服，取吐。○治心癎暗風及五種癎疾，用藜蘆微炒爲末，每

用五分，生明礬末五釐，白湯調灌，立甦。服三五次，漸漸不發。如元氣虛甚者，甦後服人參湯調理。○治諸風頭痛，用藜蘆五分研末，麝香三釐，吹鼻。又方：用藜蘆三錢，川黃連三分，麝香三釐，共研細末，綿裹塞鼻中亦好。○治瘴瘧不食，欲吐不吐，用藜蘆末五分，白湯調服，探吐。○治黃疸腫疾，用藜蘆爲末四分，白湯調服，取吐。○治白禿頭瘡，用藜蘆末，豬脂調搽。○治疥癬蟲瘡，用藜蘆末，香油調搽。○治鼻生瘜肉，用藜蘆三分，雄黃一分，共爲末，蜜和點之，每日三上，勿點兩畔。○治頭生蟣虱，用藜蘆末摻之。○治誤吞水蛭及諸蟲物，用藜蘆炒爲末，白湯調服一錢，必吐出。

附子。味辛鹹。氣熱。有大毒。味薄氣厚。陽中之陽。升少降多。浮中沉。無所不至。入手厥陰心胞。少陽三焦。兼入足少陰腎。太陰脾經。其性走而不守。

別錄曰。附子生犍為山谷及少室。近以蜀道綿州龍州者良。他處雖有。力薄不堪用也。李氏曰。初種為烏頭。象烏之頭也。附烏頭而生者為附子。如子附母也。烏頭如芋魁。附子如芋子。蓋一物也。然烏頭有兩種。出彰明者即附子之母。今人謂之川烏頭是也。烏頭春末生子。故春末采之。附子冬末生子已成。故冬末采之。其天雄烏喙側子。皆是生子多者。因象命名。若生子少及獨頭者。即無此數物也。宋人楊天惠著附子記甚悉。其說云。綿州乃故廣漢地。領縣八。惟彰明出附子。彰明領鄉凡二十。惟赤水廉水昌明會昌出附子。而赤水為多。每歲以上田熟耕。和以豬糞作壟。取種于龍安龍州齊歸木門青堆小坪諸處。十一月播種。春月生苗。高二三尺。莖類野艾而澤。葉類地麻而厚。花則瓣紫。蕊黃。苞長而圓。實類桑椹子。細而且黑。七月采。根謂之早水。拳縮而小。蓋未長成耳。九月采者佳。其品凡七。本同而末異也。初種之化者為烏頭。少有旁尖。身長而黑。附烏頭而旁生者。根須實不相連者。曰附子。左右附而偶生者。曰鬲子。獨生無附。長三四寸者。曰天雄。附而尖者。曰天錐。附而上出者。曰側子。附而散生者。曰漏籃子。皆脈絡連貫。如子附母。而附子以貴。故專附名也。凡種一而子六七以上。則皆小。種一而子二三。則稍大。種一而子特生。則特大。而附子之形。以蹲坐正節角少者為上。有節多鼠乳者次之。形不正而傷缺風皺者為下矣。又附子之色。花白者為上。鐵色者次之。青綠者為下。天雄烏頭天錐。皆以豐實盈握者為勝。漏籃側子。如園人乞役卑卑。不足數也。漏籃即雷氏所謂木鼈子。大氏所謂虎掌。鬲子即烏喙。天錐即天雄類。方書並無此名。功用當相同耳。然易植難成。功此質變。或種美而苗不茂。或苗秀而根不充。或已釀而腐。或已曝而攣。原屬氣化而生。又復化氣而消。若有神物陰為之者。故園人擁此。嘗禱于神。目為藥妖者以此。○徐氏曰。凡製烏頭附子天雄側子烏喙等法。先于六月內造大小麪麴。未采前半月。用大麥煮成粥。拌麴造醋。候熟去其糟。醋不必太酸。酸則以水解之。將烏頭附子等去根鬚。于甕內淹七日。日攪一遍。撈出。以疎篩攤之。令生白衣。再向慢風日中晒之三日。以透乾為度。若猛日則皮皺而不附肉矣。如此收穫方不壞爛。臨病應用。切作薄片。用道地和黑豆煮三日。去宿童便。并豆換新童便。入淨砂鍋內煮。以童便乾為度。日中晒燥。或烘燥用。○外有兩種。一種草烏頭。一種白附子。不與此類同種。列二物也。故俗呼附子為黑附子。烏頭為川烏頭以別之。

○附子。回陽氣。散陰寒。逐冷痰。通關節之猛藥也。此藥禀（程君安）地中火土熱烈之氣。（一庫所先生合參）其性走而不守。于上中下部。氣血表裏。無所不到。為諸經引用之藥。故前人主風寒濕三氣凝固不行。為跛躄拘攣。為膝痛脚疼。為手臂冷麻諸證。因此藥氣暴力峻。稟雄壯之質。擅能衝開道路。流行血氣。則前證自除矣。又傷寒。直中三陰寒證。嘔吐冷涎。湯藥不受。厥冷腹痛。自利不渴。（屬太陰）煩躁不寐。厥逆踡臥。自汗心驚。臍腹痛而顫慄。面赤舌青。（屬少陰）環口塵黑。唇青囊縮。四肢厥冷。嘔吐涎沫。噦出蛔蟲。（屬厥陰）六脈沉細欲脫。四肢厥逆不溫。或作呃聲。言語無倫等證。（總屬三陰之證）或霍亂吐瀉。厥逆脈脫。或中風中氣。痰涎壅閉。或胃虛久病。嘔噦番逆。或水腫膨脹。喘息不臥。或痰厥頭痛。痰塞胸膈。或三陰痎瘧。久發不休。或堅癥積聚。血脉冷凝。或金瘡受寒。血冷瘀滯。或脾泄久痢。臟氣虛冷。或久痢赤白。休息延綿。或脚氣腫滿。胃敗不食。或厥陰寒疝。攻痛欲死。或嘔血血崩。虛脫如注。或老人陽弱。目睛瞀蒙。或冷敗潰瘍。膿血大泄。或久暴泄瀉。四肢厥冷。人事昏迷。或痘瘡灰塌。寒顫自利。不食。或諸病眞陽不足。虛火上升。咽喉不利。飲食不入。服寒藥愈甚者。附子乃命門主藥。能入其窟穴而招之。引火歸原。則浮游之火自

熄矣。凡屬陽虛陰極之候，肺脊無熱證者，服之有起死之殊功。若病陰虛內熱，或陽極似陰之證，誤用之，禍不旋踵。

繆仲淳先生曰：附子既禀地二之火氣以生，無非火熱爲性，氣味皆然，毒可知已。論其性質之所能，乃是退陰寒，益陽火，除冷濕之要藥，引補氣血藥入命門，壯元陽之上劑。若非陰寒、寒濕、陽虛氣弱之病，而悞用于陰虛內熱，血液衰少，傷寒、溫病、熱病、陽厥等證，靡不立斃。謹列其害如左，醫師司命，宜詳覈而深鑒之，亦生人之大幸也。凡治傷寒，先辨陰陽二證。陰厥內外皆陰，若惡寒，若無熱，若吐涎，若不渴，若自汗，若厥冷，若舌胎白滑，或

黑潤，其屬陰寒確矣，必用附子無疑。陽厥外寒內熱，或係傷寒瘟疫，其先必發熱頭疼，其後表熱已除，雖不發熱不頭疼，然必胸滿腹痛，大便不行，小水必赤，心煩口渴，此當清解之，或下之之病也。至于嘔吐，有口渴思冷水者，此胃熱嘔吐，宜黃連竹茹湯。至于自利，日十數行，口乾舌燥而渴甚者，宜芩連四逆散。至于自汗，濈濈不止，口燥煩渴不寐，而屬陽明內熱者，宜參連白虎湯。至于吐蛔作呃，有三陽熱邪犯胃，熱極吐蛔，熱甚作呃而煩渴者，宜黃連烏梅湯、黃連柿蔕湯。至于中熱中暑，霍亂吐瀉，上吐飲食涎水，若澒下瀉熱糞黃水如注，或熱汗橫流，腹痛欲死，而口燥作渴者，宜藿香正氣散，加滑石、芩連。至于中風中氣，卒然僵仆，不語，痰多，神昏，宜大劑參芪术香、薑桂，俟元氣虛脫者續，斷逆者通，再量加附子，消息行之，不可驟用。又如腫滿膨脹，因濕熱者，堅癥痞積，因內熱者，金瘡暴傷，血流不止者，痢疾雖久，淤積未清，大便澁閉者，肝熱木實，脚氣腫疼者，血熱妄行，吐血上湧，陰虛內熱，崩血血淋者，時眼暴發，熱盛生風者，癰疽毒盛，腫赤未潰者，又若痘瘡乾焦黑陷，痘瘡火閉不出，痘瘡皮薄嫩紅，痘瘡因熱咬牙，痘瘡挾熱下利，痘瘡餘毒生癰，諸證咸忌熱烈之藥，附子大非宜用。外又有鼻衄齒衄，尿血便血，舌上出血，耳鳴耳聾，骨蒸盜汗失血，發痙，血虛頭痛，偏頭風痛，怔忡驚悸，惡熱喜冷，

好食米菓，畏火，日光，畏聽人聲，畏聞木聲，火炎欲嘔，證類反胃，虛陽易興，精滑夢遺，赤白淋濁，小便餘瀝，或老人精絕陽痿，少年縱慾傷精，婦人血枯無子，血枯經閉，濕熱黃疸，濕熱脚氣，濕熱泄瀉，血虛便結，血虛腹痛，心脾鬱熱，口苦舌乾，夜夢紛紜，小兒急驚，熱疳枯瘦，傷食作瀉，凡內外男婦小兒前後共七十餘證，均屬陰虛，及諸火熱，無關陽虛，亦非陰寒，法所均忌，臨證施治，宜謹審之。

花溪老人虞氏曰：附子稟雄壯之質，有斬關之能，引補氣藥（人參黃耆白术）行十二經，以追復散失之元陽；引補血藥（當歸熟地枸杞鹿膠）入營分，以培養不足之真陰；引發散藥（防風桂枝）

（麻黃羌活）開腠理以驅逐在表之風寒引溫煖藥（蒼朮白朮肉桂細辛鹿茸獨活）達下焦以攻除在裏之冷濕

陳廷采先生曰烏頭附子烏喙天雄側子射罔木鼈子七名實出一種但治各有不同今尊會編附其總論天雄長而尖者其氣親上故曰非天雄不能補上焦陽虛附子圓而矮者其氣親下故曰非附子不能補下焦陽虛烏頭原生苗腦形如烏鳥之頭得母之氣守而不移居乎中者也側子散生旁側體無定在其氣散揚宜其發四肢充皮毛爲治風痺之妙用也烏喙兩岐相合形如烏嘴其氣鋒銳宜其通經絡利關節尋蹊達徑而直抵病所也煎爲射罔禽獸中之即死非氣之鋒銳捷利者能如是哉又有所謂木鼈子者其形摧殘其氣消索譬如疲癃殘疾之人百無一能徒爲世累且又令人喪目宜其不入藥用也

李時珍先生曰烏附毒藥病非虛寒危殆不用而補藥中少加引導其功甚捷有病人纔服錢匕即發燥不堪受而昔人補劑用爲常藥豈古今運氣有不同耶按荊府都昌王體瘦多冷無他病日以附子煎湯兼嚼硫黃如此數歲不輟又蘄州衛張百戶平生服鹿茸附子藥至八十餘康健倍常宋張杲醫說載趙知府耽酒色每日煎乾薑熟附湯吞硫黃金液丹百粒乃能健啖否則倦弱不支壽至九十他人服一粒即爲害若此數人皆其藏府禀賦之偏服之有益無害不可以常理槩論也又瑣碎錄言滑臺風土極寒民啖附子如啖芋栗此則地氣使然爾

○集方治陰毒傷寒（内天雄附散方共五附）面青四肢厥逆腹痛身冷及一切冷氣用大附子一枚切片薑汁和酒煮以乾爲度每用三錢人參三錢水二大鍾煎一鍾和薑汁半盞溫和服○治少陰傷寒初得二三日脉微細但欲寐小便清白者用附子一枚切薑酒煮乾麻黃去節甘草炙各一兩先用水五升將麻黃煮去沫後納二味煮取三升分作三服取微汗○治少陰傷寒脉沉細反發熱頭不痛用附子一枚切片薑酒煮乾麻黃去節一兩北細辛二兩先

用水五升將麻黃煮一滾後納二味煮取三升溫和服○治少陰傷寒下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出者用大附子一枚製法同前甘草炙二兩乾薑三兩水五升煮取二服溫和服其脉即出者愈如面赤本方加葱白九莖腹痛加炒白芍藥嘔加生薑一兩咽痛加桔梗五錢利止脉不出加人參二兩○治陰毒傷寒少腹疼痛腰痛手足厥冷或作呃逆六脉沉細用附子一枚製法如前乾薑一兩水三升煎一升加食鹽三分候冷服○治痰厥氣閉（脈[illegible]九甘）昏不知人或口眼喎斜等證用川附子廣木香川烏頭各五錢天南星乾薑各

一兩水一大升煎三合溫和服○治胃冷有痰嘔吐用川附子一枚半夏二兩俱切片俱薑酒煮乾每日用附子一錢半夏二錢水二大鍾煎七分服○治手足麻痺或癱瘓疼痛腰膝痿痺或打撲傷損悶肭痛不可忍用生川烏五靈脂各四兩威靈仙五兩俱酒浸洗烘乾爲末酒糊丸梧子大每服十五丸淡鹽湯下此藥常服其効如神○治腰腳冷痺疼痛兼有風者用川烏頭三箇去皮臍研爲末米醋調塗帛上貼患處其痛立止○治腳氣腫疼久不瘥者用生附子一箇去皮臍研爲末生薑汁調如膏塗之藥乾再塗腫消爲度○治十指疼痛或麻木不仁用大附子切片童便和酒煮乾每用一錢配當歸二錢五分木香五分桂枝七分水二碗煎服○治手臂冷麻或疼痛用附子切片童便酒煮一兩於白朮山藥茯苓各三兩山茱萸肉三兩澤瀉肉桂牡丹皮各一兩五錢懷熟地四兩酒煮搗膏爲丸梧子大每早晚各服三錢白湯下○治風寒濕痺麻木不仁或手足不遂用川烏頭爲末每以薏米煮粥一碗入烏頭末四錢慢熬稀稠得所下薑汁二匙蜜三大匙空腹啜之左傳云風淫末疾末疾謂四肢也脾主四肢風淫客肝則侵脾而四肢病也此粥極驗○治霍亂陰寒吐瀉厥逆脉將脫者用附子人參各五錢白朮一兩甘草二錢水煮冷服○治中風中氣汗出鼻鼾遺尿眼合痰聲如拽

鋸此五絕證用大劑附子人參各二兩甘草五錢於白朮八錢用水八碗煎三碗溫和徐徐服屢有得生者○治中風偏廢用大附子一箇切片薑酒煮羌活烏藥各一兩當歸身二兩酒炒共爲末每服四錢薑湯調服○治半身不遂用附子一兩切片薑酒煮乾當歸二兩炒以無灰酒二壺浸七日隔日飲一合○治風病癱緩手足嚲曳口眼喎斜語言蹇澁步履不正用川烏頭五靈脂各二兩人參五錢當歸一兩共爲末白湯爲丸如彈子大每服一丸生薑湯化服服後飲酒一二杯一日二服服十日便覺手活動也○治口眼喎斜用生川烏頭青礬各等分爲末每用一字嗃入鼻內取涕吐涎立効

○治卒忤停尸口噤用附子末五分吹入喉中立瘥○治產後中風身如角弓反張口噤不語用川烏頭一兩切片黑豆半升烏雞糞一合三味同炒焦黑投入好酒三升攪百餘轉以絹濾取酒微溫服一小盞取汗若口不開抉齒灌之以瘥爲度○治諸風縱緩言語蹇澁徧身麻痛皮膚搔癢及婦人血風頭痛目眩腸風藏毒下血不止者或痛風攣搐頤頷不收者服六七次即瘥用川烏頭一兩去皮臍薑酒童便製生荆芥穗二兩共爲末醋麪糊爲丸梧子大溫酒或白湯每服二十丸○治久病嘔噦反胃虛而無熱者用製附子人參陳皮各二錢水煎服○治水腫喘滿不拘大小男女由中下二焦

氣不升降。爲寒痰痞膈。故水凝不行。發爲腫脹束手。服此藥則小便自通。喘滿自愈。用附子一箇。去皮臍。切片。薑酒童便浸煑。每服用三錢。水二碗煎八分。隨將此藥汁。磨沉香一錢。和入。冷飲。用附子。雖十餘枚。亦無害。以瘥爲度。小兒減半。宜忌油膩。酒麪鹽味。百日。○治痰厥頭痛如破。厥氣上沖。痰閉胸膈。用製附子。製半夏各二錢。甘草一錢。水煎服。○治三陰久瘧不愈。用大附子。製法如前。用三錢。於白朮。當歸身。半夏。薑製川牛膝。柴胡。牡丹皮各一錢五分。水二大碗煎八分。溫和服十劑愈。或加人參一錢亦可。腹脹者加厚朴一錢五分。○治久年堅癥積聚。用附子。製法如前。三錢。於白朮二錢。川黃連、各一錢。枳實一錢五分。水煎服。或作丸。食前服三錢亦可。○治金瘡受風。血冷脹痛。用製附子。當歸各二錢。紅花。桂枝各一錢。水煎服。○治脾虛久泄。或老人虛人中氣不足。藏寒洞泄。用製附子五錢。於白朮。炒肉豆蔻。麪裹煨熟。補骨脂。酒炒。各三錢。甘草。木香各八分。水煎服。或作丸服亦可。久痢赤白。休息不止。此方亦治。○治腳氣腫木。因脾虛胃弱者。用製附子。白朮。肉桂各三錢。木瓜五錢。木香一錢。水煎服。○治寒疝腹痛遶臍。手足厥。自汗出。脉弦緊。用製附子五錢。小茴香。肉桂三錢。木香一錢。乾薑二錢。甘草五分。水煎服。○治寒疝引脇肋心腹皆痛。用川烏頭二兩。切片。以白蜜四兩。和水

二碗。煑令透。搗爛爲丸梧子大。每早晚各食前服。三十丸。永除。○治寒疝。滑泄腹痛腸鳴。用製附子三錢。補骨脂。炒。五錢。木香一錢。蒼朮。白朮各二錢。水煎服。○治寒厥諸疝腹痛惡寒。小腸氣。膀胱氣。一切寒疝諸痛。攣急難忍。汗出厥逆。用大附子一箇。製。山梔一兩。炒黑焦。每各服三錢。○治嘔血吐血。或血崩脫血。盈盆盈桶。面色青慘。六脉欲脫。四肢厥冷。或自汗出。危極者。用製附子五錢。人參二兩。薑炭八錢。水二大碗煎八分。溫和服。○治陽虛吐血。用生地黃二觔。搗汁。入酒少許。以製附子一兩。入汁內。砂鍋內煑成膏。取附片烘乾。入淮山藥二兩研末。以膏和搗丸梧子大。每空心米飲下三四十丸。治婦人患此。屢發屢止。得此全愈。○治中年之人。陽氣衰微。睛光昏暗。視物不明。用大附子一箇。切片。童便薑酒煑透。大懷熟地五兩。枸杞子四兩。山茱萸肉。淮山藥。茯苓各三兩。牡丹皮。澤瀉各一兩五錢。肉桂二兩。共爲末。煉蜜丸梧子大。每早晚各食後服三錢。白湯下。○治癰疽發背。膿血大泄。元氣大虛。漸至陽微惡寒。嘔逆不食。用製附子。黃耆。白朮。人參各五錢。肉桂。砂仁各三錢。甘草一錢。水煎服。○治泄瀉不拘久暴。頻泄過多。陽氣旋脫。四肢厥冷。人事昏迷者。用製附子八錢。人參二兩。蒼朮。白朮炒。肉桂。木香。肉豆蔻麪裹煨各二錢。甘草炙一錢。水煎服。○治痘瘡冷陷。灰塌寒戰。咬牙泄瀉。不食

用製附子三錢。人參。白朮。黃耆。肉桂各二錢。木香。白芍藥酒炒各一錢。水煎。加桑蟲一條。擠出肉汁。和服。○治一切諸病服寒藥過多。漸至眞陽不足。虛火上升。咽喉不利。飲食不入。或再服寒藥愈甚者。用製附子一兩。懷熟地四兩。山茱萸。茯苓。山藥各三兩。牡丹皮。澤瀉各一兩。肉桂三兩。煉蜜丸。每早晚各服三錢。鹽湯下。或將丸料分作十劑。水煎服亦可。

續集維方。治年久頭痛。用川烏頭。天南星等分。共爲末。葱汁調塗太陽穴。○治頭風斧劈難忍。用川烏頭末。燒烟熏碗。溫茶泡服之。○治一切頭痛。用大附子一枚。剜一孔。入全蠍五枚在內。以孔內餘附末。用鍾乳石三錢。

火煨爲末。加白麵少許。和附末乳粉。水調作糊。包附煨熟。共研末。取葱涎和丸梧子大。每用花椒二十粒。食鹽三分。泡湯吞藥五十丸。○治鼻淵腦泄。用生附子末。葱涎和如糊。貼湧泉穴。○治無故耳鳴。晝夜不止。用川烏頭末。石菖蒲末各等分。綿裹塞之。一日一換。○治耳卒聾閉。用附子。醋浸。削尖插之。或更于附子上灸二七壯。○治耳聤膿血不乾。用生附子。爲末。摻入耳中。○治喉痹腫塞。用大附子切片。薑汁童便煮。晒乾。以蜜塗上灸之。令乾。病人口內含之。已成者即膿。未成者即消。○治久患口瘡。用生附子。爲末。醋麵調貼足心。男左女右。日再換之。○治寒厥心胃疼及小腸膀胱疝氣痛不[illegible]

用製附子五錢。鬱金。玄胡索。醋炒。廣木香。小茴香。黑牽牛頭末各四錢。共爲末。每用一錢。醋湯調服。○治疔瘡腫痛。用附子。爲末。醋和塗之。乾再換。○治癰疽腫毒初起。用生附子末一兩。水三碗。慢火熬稠。塗上留頂。立消。○治癰疽努肉突出。瘡口不斂。用生附子。爲末。水調敷上。外以艾火灸數壯。令熱氣逼內。即消。○治手足凍裂。用附子。爲末。白湯和麵少許塗之。

○烏頭附子。天雄尖。李氏曰。方書用此吐風痰。止癲癇。取其辛烈雄壯之力。直達病所。無他義也。

○集方。治風厥癲癇。或大人中風痰厥昏迷。或小兒驚風痰涎上壅。牙關緊急。上視搐搦。並宜用烏頭尖。蠍梢。各

七箇。銅綠三錢。俱研極細。和勻。薑汁麵糊丸。如黃米大。○大人服二十丸。小兒服七丸或五丸三丸。量兒大小加減。俱薄荷湯下。○治小兒臍風撮口。用生川烏尖三箇。全足蜈蚣半條。俱酒浸烘乾。麝香五釐。俱研末。以少許吹鼻得嚏。再以薄荷湯灌下三分。

○天雄。味辛氣熱。有毒。乃種附子而生。變出其形。不生附側。經年獨長而大者。故曰天雄。其長而尖者。謂之天錐。象形也。其主治與附子同。惟治風寒濕痹。較之附子更烈耳。

盧不遠先生曰。合名與形。當屬督脈中之陽。秖能助長。能化育命門之用藥也。

○側子。味辛。氣熱。有毒。李氏曰。側子生于附子之側。故側子。附子。皆是烏頭下旁出者。以小者爲側子。大者爲附子。陶氏言附子邊角。削取爲側子。甚謬。此物散生附子旁側。體無定在。其氣熱劣。而輕揚。專于發散四肢。充達皮毛。爲治風之藥。多入癰疽藥中。古方多不用。邇來醫家療脚氣有驗。故錄之。

○集方。治脚（魏氏方）氣久不消。用側子一兩。切片。童便浸五日。去宿便。再換新便。和黑豆一合同煮。俟豆熟。取側子片曬乾。每劑用側子一錢。木瓜五錢。當歸。川芎。各一錢五分。水煎服。

○漏藍子。味辛。氣熱。有毒。李氏曰。此又側子之瑣細未成○者。古方不入湯丸散服食藥中。僅宜敷貼。外科消毒藥內誤服。令人喪目。按大明會典。載四川成都府歲貢天雄六十對。附子。烏頭。各五十對。漏藍子。二十觔。不知作何用也。

◎集方。按類方云。一人兩足生瘡。臭潰難近。用漏藍子一枚。生研爲末。入膩粉少許。井水和津唾調之。敷上漸消

草烏頭。味辛。氣熱。有大毒。（吳氏曰。形如烏之頭。有兩岐相合。如烏之嘴。故又名烏喙。又有三岐者。古書名兩頭尖。猶諸云鴛鴦菊。即其[illegible]也。然附子天雄有偶生兩岐者。亦謂之烏頭。非此烏頭也。止係南北各路野生。故名草烏頭云。本草悞入川烏頭條中。大謬。按後魏書言。遼東塞外。秋收草烏頭爲毒藥。射食獸。又續漢五行志言。西國生獨白草。煎汁。獵人取此敷箭。射禽獸。十步即倒。中人亦死。故又有射罔之名。李時珍曰。草烏頭。南北東西。山陵平澤。處處有之。根苗花葉。與川烏頭大同小異。但此係野生。並無攤造灌養之法。其根外黑內白。皺而枯燥。形如尖芎。大者長寸。小者豆粒。底圓頂尖。然毒則甚于川烏頭。置燥地反濕。置濕地反燥。飛鳥觸其毒則墮。走獸過其毒則僵。止佐烈有毒。无妄之藥也。修治。切作薄片。童便和醋。煮百沸。人鍋內炒燥黃。方可入藥用。大風痺藥中。大料不過二三錢。小料不過數分。倘不修製悞用。令人心隔悶亂。言語不出。如病怪狀。謹之。誤有中此毒者。以甘草。藍汁。浮萍。薺苨。冷水。皆可一味解之。）

○草烏頭。去風寒濕氣。（本經）逐痰攻毒之藥也。（別錄）其性猛劣有毒。（寧原）

○其氣鋒銳且急。能遍經絡。利關節。尋蹊達徑。而直抵病所。宜其入風寒濕痺之證。或骨內冷痛。及積邪入骨。年久痛發。并一切陰疽毒瘍諸疾。遇冷毒即消。熱毒即潰。自非頑風急疾。不可輕投入也。觀其煎汁敷箭鏃。能殺禽獸。聞氣即隕仆。非性之鋒銳捷利。酷劣有毒。能如是乎。即有風濕痺疾。癰瘍急欲之人。平素禀賦衰薄。或向有陰虛內熱（[illegible]氏方）吐血之疾。并老人虛人新產人。切宜禁用。

○集方。治中風癱瘓。手足顫掉。言語蹇澁。身體麻木。痿痺不仁。或腰脚冷痛。或膝眼痠痛。并濕滯脚氣。足腫難行。用草烏頭三兩。炮。川烏頭二兩。炮。乳香。沒藥各一兩。共爲末。用黑豆一升。以斑蝥二十一箇。去頭翅。同煮豆熟。

去蚤取豆焙乾爲末配草川烏頭乳沒四味共和勻以醋打麪糊丸梧子大每服三十丸溫酒下○治年久麻痺不仁或歷節風痛不拘男婦皆可用用草烏頭八兩去皮切片以酒浸一夜晒乾炒黃色磨極細末布袋一箇盛嫩豆腐腦約豆料一升入烏末在內和勻壓乾再入甑上蒸半日取出搗成膏晒乾爲末每服八分葱酒送下○治一切風證不拘頭風痛風風痺攣掣疼痛用草烏頭八兩川烏頭二兩俱去皮酒浸一宿隔湯蒸半日搗爲末用生葱生薑各四兩俱搗如泥拌草川烏末在內和作餅子以楮葉鋪盤內安餅于楮葉上又以楮葉蓋之再蓋布帛等物七日待出汗蒸黃乃晒乾舂爲

末又以生薑汁打麪糊爲丸梧子大每服三十丸白湯下日三服服後汗出宜避風尋愈○治破傷風用草烏頭切片酒拌炒黃爲末每以一二分溫酒調服出汗○治偏正頭風用草烏頭眞川芎蒼朮各四兩俱切片生薑生葱各五兩搗成膏拌草烏川芎朮片入甕瓶內封固埋土中春五夏三秋七冬十日取出晒乾揀去葱薑渣將草烏川芎蒼朮晒乾爲末醋打麪糊爲丸梧子大每服二十丸臨睡時溫酒下立効○治婦人血風頭痛用草烏梔子各等分爲末用葱頭自然汁調塗隨左右痛處藥汁勿流入眼宜避風○治腦漏臭穢用草烏去皮尖拌炒五錢蒼朮炒川芎炒各一兩爲末麪糊丸梧子大每服十丸茶下○治耳癢如流水耳鳴如風雨聲不治成聾用生草烏削如棗核大塞之日易二次不三日愈○治喉痺口噤不開欲死者用草烏皂莢各等分爲極細末入麝香少許擦牙并搐鼻內噤自開也又方用草烏尖石膽礬各等分爲末每用一錢醋煮皂莢汁調稀掃入喉間腫處流涎數次其毒即破○治牙痛臭爛穿透口鼻用生草烏燒灰入麝香少許爲極細末糝之○治腹中癥瘕堅結妨害飲食形容羸瘦用草烏二兩切片醋拌炒眞川椒三百粒共爲末大麥麪打稀糊爲丸如梧子大每服五丸白湯下○治心胃攻痛疰心寒疝常發不愈者用草烏切片醋炒吳茱萸炒各

等分紅麴打稀糊爲丸麻子大每服十丸日二○治內痔不出用生草烏爲極細末津唾調點肛門內痔即反出再用枯痔藥點之即落○治疔瘡惡毒初起用草烏川烏頭杏仁各七箇共爲末飛白麪一兩井華水調搽留頭以紙蓋之乾則以苦茶潤之○治疔毒惡腫用草烏切片一兩醋半壺熬成膏攤貼次日根出○治蛇蝎螫人用草烏頭爲末敷之血出愈○治中沙虱毒用生草烏末敷之

白附子味辛甘氣熱有毒純陽之藥專引藥勢上行（蘇氏曰白附子本出高麗及東海新羅國今涼州及遼東亦有生砂磧下濕地獨莖似鼠尾草細葉周匝生于穗間形似天雄根似草烏頭小者長寸許乾者皺文有節因與附子相似故得此名實非附子類也修治須切片以黃豆汁拌炒入藥用）

○白附子祛風痰解風毒善散面上風行百病之藥也故日華子治一切冷熱風氣面皯瘢疵及疥癬風瘡等疾古方入面脂面粉中并去風熱血癘痛癢水濕瘡疾因其辛烈而散上升之力故能主面上百病而行藥勢也別錄又主中風口眼喎斜小兒驚風搐搦及婦人血痺心痛者總緣此藥辛熱風升故併及之但氣熱性燥有毒如血虛生風内熱生驚似風似驚之證須禁用之

○集方治面上皯䵴（衛生易簡方）用白附子爲末臥時以湯洗面用白蜜和塗紙上貼之久久自落○治赤白汗斑（簡便方）用白附子硫黃蜜陀僧各等分共爲末薑汁調稀茄蒂蘸擦日三次○治中風口眼喎斜（楊氏方）半身不遂用白附子白僵蠶全蝎各四錢枸杞四兩共爲末每服三錢熱酒調食後服○治小兒急慢驚風（全幼心鑑）用白附子甘草膽星全蝎白殭蠶鈎藤各一兩五錢天竺黃白檀香各三錢牛黃五分共爲末每用一錢薄荷湯調服○治小兒暑風（同前）暑毒入心痰塞心孔昏迷搐搦此乃危急之證用白附子天南星半夏各等分俱生研爲末豬膽汁和薑汁爲丸黍米大一歲一丸以薄荷湯化下令兒側臥嘔出痰水即甦○治婦人血痺心胃疼用白附子切片薑汁浸一日晒乾爲末每服二錢花椒生薑湯調下○治風痰眩暈頭痛體氣壯實者用白附子酒浸炒石膏火煆紅各四兩硃砂三錢甘草五錢共爲末用薑汁打米糊爲丸如梧子大每服五十丸食後苦茶送下

追風袪痰丸治諸風癇癲風世之患此病者甚多用此得効者甚廣用白附子麩裹煨防風天麻殭蠶牙皂俱炒燥各一兩全蝎木香各五錢枯白礬川黃連各三錢南星三兩白礬牙皂各五錢煎湯浸一宿半夏六兩用牙皂生薑各二兩共搗爛泡湯浸三日濾起晒乾人參白朮各一兩共研爲末薑汁半盞和飴糖爲丸如梧桐

子大每服七八十丸淡薑湯送下○治勞役辛苦人病癎用白附子二兩天南星一兩牙皂一兩生薑汁一碗同煮透入人參黃耆茯苓甘草白朮當歸川芎白芍藥肉桂木香各一兩俱用酒拌炒懷熟地四兩薑汁一碗酒一碗同煮乾飯鍋上蒸五次搗膏紫河車一具不拘頭生次生男胎女胎只要無病婦人者佳酒煮爛搗膏和入前藥內再搗勻丸梧桐子大每早晚各服五錢白湯下

天南星味苦辛。氣溫有毒。陰中之陽。可升可降。乃[illegible]
藥。欲其下行。以黃蘗引之。得防風則不麻。得牛膽[illegible]
燥。得火炮則不毒。得牛膽汁拌製則涼潤而活[illegible]
得生薑汁拌製則溫散而通行毛竅。乃急方之燥[illegible]

李氏曰。天南星。又名虎掌。因葉形五出如爪。故名[illegible]
頤曰。形如老人星狀。故又名天南星。藏器陳氏曰[illegible]
中山谷。及兗句安東。河北州郡。今近道亦有之。四[illegible]
苗高尺餘。獨莖。上有葉如鼠尾。中生一葉。如匙。裹[illegible]
尾旁開一口。上下尖。中有花。青褐色。結實如麻子[illegible]
白色。自落布地。一子只一窠。九月葉零。取根。但初[illegible]
根。僅如豆大。漸長者似半夏而扁。年久者始圓及[illegible]
如雞卵。周匝生芽三四枝。或五六枝。圍如指頂。宛[illegible]
掌。又冀州一種。二月生苗。高一二尺。莖似荷梗。葉[illegible]
蒻。兩枝相抱。五月開花黃色。似蛇頭。七月結實。作[illegible]
石榴子。二八月采根。似芋而扁。與蒟蒻相類。人多[illegible]
混不可辨。但蒟蒻莖斑花紫。根大肌膩。南星根小[illegible]
肌膩。炮之易裂。爲別。然南星即虎掌。同類而異種[illegible]
大者周匝亦有圓芽。但不若虎掌莖葉似爪。五出[illegible]

也。又江州一種草南星。葉大如掌。面青背紫。三四[illegible]
無本經。冬不凋。不結花實。根之四畔。亦有圓芽。名[illegible]
同性氣迥別。不可不辨。修治。南星取重一兩者。須[illegible]
倦用治風痰。須用溫湯洗淨。去涎。亦以白礬皂角[illegible]
浸三四日。每日一換。浸足曬乾用。設有急用。用濕紙[illegible]
裹埋糠灰火中。周匝。綻裂。便可用矣。又一法。以酒[illegible]
宿。用桑柴火蒸之。常令酒入甑內。令氣猛。一時取出[illegible]
剖開。味不麻舌爲度。又一法。以生薑汁。礬湯和南星[illegible]
泥封包。煨熟去泥用。若造麴。用生薑汁。及礬湯。和[illegible]
末作小餅子。安籃內。用稻草包蓋。候上有黃衣生[illegible]
曬乾收之。又造膽星法。將南星研細末。臘月取黃牯[illegible]
膽汁和勻。仍納膽囊內。懸掛有風處乾之。年久愈[illegible]

○天南星。開結閉。散風痰之藥也。治中風不語。口眼喎[illegible]
麻痺不仁。或跌撲損傷。血凝氣聚。或打傷頭腦。破傷[illegible]
腫。或癰疽痰核。紅腫堅結。此劑味辛而[illegible]
氣熱而燥。能勝濕逐涎。性緊而毒。能攻[illegible]
謂能墮胎。因其有散血之力故也。但其性味辛[illegible]

與半夏略同。而毒則過之。半夏之性。燥而稍緩。南星之性。燥而頗急。半夏之辛。劣而能守。南星之辛。劣而善行。如陰虛血少。血熱血燥之人。不可用也。前人以牛膽製之。名曰膽星。牛膽苦寒而潤。有益肝鎮驚之功。製星之燥而使不毒。若風痰濕痰。急閉涎痰。非南星不能散。如小兒驚風驚痰。四肢搐搦。大人氣虛內熱。熱鬱生痰。非膽星不能療也。二者施用。隨證投之。

○集方。治中風不語。（方氏正宗）用天南星爲末。以指頭蘸少許。揩上下兩齒間。再用溫薑湯數茶匙灌下。○治風中經脈。（[illegible]方）口眼喎斜。四肢麻痺。或半身不遂。用天南星切片。薑礬水炒。二兩。白朮、黃耆、當歸、川芎、川萆薢各二兩五錢。作十

劑服。或作丸亦可。○治打撲金刃傷。及破傷風傷濕。（李[illegible]林方[illegible]）其證強直如痫痓狀者。用天南星、防風等分爲末。水調敷瘡。出水爲妙。仍以溫酒調服一錢。已死。心尚熱。用童便調灌三錢。鬭毆內傷。并墜壓者。酒和童便速灌二三錢。即甦。亦可煎服。○治跌撲損傷。（同前）血脈凝滯不散。疼痛甚者。用天南星爲末。薑汁和酒調塗。如乾燥不時用酒以鵝羽蘸塗。如跌踹傷肉與骨。血出淋漓。以天南星爲末乾罨傷處。自然生肌收口。○治濕痰臂痛。（洪氏[illegible]）用天南星、蒼朮等分。生薑減半。水煎服。○治癰疽初起紅腫。（外科[illegible]）用天南星搗爛。和米醋調敷留頂。○治痰癧結核。生皮肌頭面。大者如拳。小者如栗。或軟或硬。不疼不癢。用天南星爲

末。米醋調塗。每日一換貼即消。○治大小氣閉昏塞痰涎上壅。用天南星一兩切片。薑汁浸晒乾炒。豬牙皂角去涎五錢。廣陳皮八錢。共爲末。每服二錢薑湯調下。○治小兒急慢驚風。痰迷昏塞。手足搐搦。用膽製南星。天竺黃各一錢。硃砂五分。共爲末。薑湯調服。一歲二分。○治小兒癇後瘖不能言。用膽南星爲末。薑湯調服。○治冷風入腦。鼻內結硬。遂流髓涕不止。用大天南星切片。薑湯泡一次焙乾。每用二錢。甘草五分。大棗七箇。同煎服。服三四劑。其硬物自出。腦氣流通。髓涕自止。再以大蒜和蓽撥末作餅。布貼顖間。再隔布以熨斗熨之。或以香附蓽撥末。用少許頻吹鼻中。○治酒積酒毒。用天南

星切片。薑湯泡浸一日。焙乾爲末。紅麴打糊爲丸。如梧子大。每早晚各百餘丸。白湯下。○治腸風瀉血。諸藥不效。用天南星一兩。生薑五錢。各切片。和石灰三錢共炒焦黑色。共爲末。酒糊丸梧子大。每早服三十丸。白湯下。○治小兒解顱。顖開不合。用天南星爲細末。酒調貼顖門。立效。○治解頤脫臼。不能收上。用天南星爲細末。薑汁調塗兩頰。一夜即上。○治小兒走馬疳。蝕透骨穿腮者。用生南星一箇。當心剜空。入雄黃末二錢。麵裹燒灰。去麵爲末。入麝香少許。摻瘡上。數日甚效。

玉簪花味甘辛。氣寒。有毒。

（李氏曰。玉簪處處園圃栽植。二月生苗成叢。高尺許。柔莖如白菘。其葉大如掌。團而有尖。葉上紋如車前葉。青白色。六七月抽莖。莖上有細葉。中出花十數朶。潔白如玉。長二三寸。本小末大。未開時睹如玉簪形。故名。又如蘑菇之狀。開時微綻四出。中吐黃蘂。頗香。不結子。其根連生。如鬼臼射干生薑輩。有鬚。冬月莖枯則下根結一臼。新根生。舊根腐。亦有紫花者。葉稍狹耳。皆鬼臼射干之類也。）

玉簪花根。解癰毒。化骨梗之藥也。其性挺利。推蕩甚速。非可常服屢服之劑。善用者。惟取其隨證權用而已。○集方。治乳癰初起。用玉簪花根擂爛取汁一盞。和熱酒服。以渣敷患上。○治悞食骨物。哽礙喉下。用玉簪花根搗爛取自然汁。以竹筒灌入喉中。其骨自下。不可着牙齒。○治牙痛欲落不落。用玉簪花根乾者一錢二分。硇

砂。威靈仙各五分。草烏頭五分。俱爲極細末。以少許點痛牙處。即自落也。○治婦人斷産。用玉簪花根。白鳳仙花子各二錢。紫葳二錢。辰砂一錢五分。俱爲極細末。蜜和丸梧子大。産後一月內。以熱酒半盞。五更時服之。分作三次服。○治斑蝥毒。用玉簪花根擣汁服之。即解。

玉簪花葉。味氣同根。李氏曰。治蛇虺螫傷。擣汁和酒服。以渣敷之。中心留孔出毒氣。

江篁陶先生曰。玉簪花根葉。挺利推蕩。力能化骨落牙。下胎斷産。此猛利之物。除此數事外。不可輕用。

半夏味辛苦，氣平。有小毒。氣味俱薄，沉而降，陰中陽也。入手陽明、太陰、少陰三經。（蘇氏曰：半夏在處有之，今青州、齊州、吳中、浙中亦有。以齊州者爲勝。生田野丘澤間，二月生苗，一莖，或三四莖，莖高七八寸，莖端三葉，淺綠色，頗似竹葉。五月生，連綴莖下，形似羊眼，圓而且白。八月采用。又江南一種，葉似芍藥，形大徑寸，南人特重之。又一種白傍幾子，絕似半夏，但咬着味不甚辛，而微酸者，僞充半夏，不可入藥用，宜辨之。修治：每半夏一觔，用白芥子四兩爲末，以釅醋先調芥子末，次將半夏投入浸洗之，以涎盡爲度，而以生薑四兩，泡湯，浸半夏冬五夏三日，曬乾，切片用，如法修治。不切片，或研末用，薑汁共酒和作餅子，布包，待發黴，出黃白衣，謂之半夏麯。）

半夏散（日）風寒（子），利痰涎，開結氣（權），燥脾濕，溫（朱丹溪）內寒之藥也。此（[illegible]）藥（[illegible]）生當夏半，本脾胃中州之劑，主治陰陽相半之邪。故治傷寒邪在少陽，半表半裏之間，若寒熱往來，若腹脹嘔逆，若欬若悸，若煩若眩，若脇下痞鞕，入柴胡湯爲開樞紐之劑。入雜病方，治心下痞堅，胸脹飲積，或泄瀉臚滿，腸鳴喘嗽，或霍亂嘔吐，瘧痢瘴氣，是皆脾胃寒濕之證。或中風中氣，痰閉昏迷，或痿痓癲癇，驚悸狂越，或心煩悶亂，眩運動搖，或痰厥頭痛，時吐冷涎，或痰包心絡，終夜不寐，是皆脾胃鬱痰之證。半夏並能治之。觀其辛溫善散，辛能理氣開鬱，溫能攻表和中，所以風寒暑濕四氣相搏，鬱滯不清，非半夏不能和。七情六鬱，九氣所爲，結塞于中，非半夏不能散。古方立二陳湯，以半夏爲君，意在此也。但辛溫性燥，有毒，雖能祛濕化痰，分水實脾，散寒氣，開鬱結，爲專功。所大忌者，惟在陰虛血少，津液不足諸病。故古人立三禁，謂血家、渴家、汗家也。凡一切吐血、衄血、咯血、咳血、溺血、淋血、便血、痔血，及齒衄、舌上出血，金瘡、產後失血過多者，腎水真陰不足，內熱發渴，中暑發渴者，陽虛自汗，陰虛盜汗者，并心熱煩躁諸證，皆所當禁者也。

繆仲淳先生曰：半夏辛溫而燥，應忌者尚多。凡少陽之邪，漸入于裏，轉煩轉渴，或見鼻衄者；嘔吐由于火衝胃熱，而不由于寒濕痰飲者；心下痞堅脹滿，由于脾陰不足，中焦營氣不能施化，而不由于寒冷飲食停滯者；氣喘由于氣虛，而不由于風寒所鬱者；咳嗽由于陰虛火炎，上炎爍肺，喉癢，內熱煎熬津液，凝結爲痰，而不由于寒濕風冷者；霍亂嘔吐，腹痛泄瀉，由于暑熱傷肺，而不由于寒濕停食者；瘧疾由于陰虛氣疲，久發不愈，而不由于風暑寒濕所感者；痢疾由于熱積大腸，膿血閉滯，後重窘迫，暴感時氣，而非久痢脾虛濕滯者；中風中氣偏枯拘攣，痰壅失音，由于中氣大虛，陰陽兩敗，而不由于痰厥氣閉者；痿躄由于脾氣衰弱，而不由于濕熱傷筋脉者；痓病由于汗多亡陽，失血損陰，熱極傷氣，而不由于邪結氣留而成者；癲癇由于心虛神亂，驚悸由于肝虛膽熱，狂越由于陽重熱極，三證俱不由于痰迷胞絡者；頭痛由于火盛血虛，而不由于痰厥攻腦者；不寐由于心胃無血，肝膽有熱，而不由于痰聚心胞者；小兒

吐痰。由于傷熱生涎。而不由于脾胃停積者。俱禁用之。其所最易悞而難明者。世醫類以其能去痰。凡見痰嗽莫不先投之。殊不知咳嗽吐痰。寒熱骨蒸。類皆陰虛肺熱。津液漸乾之候。悞服此藥。愈損津液。則肺家愈燥。陰津愈竭。濃痰轉多。必致聲啞。爲病必篤。蓋此物本脾胃藥。而非肺腎藥也。如寒濕痰飲作嗽。屬胃病者固宜。然亦百之一二。其陰虛火熾。煎熬眞陰。津液化爲結痰。以致聲啞發咳者。往往而是。故凡痰中帶血。口渴咽乾。陰虛咳嗽者。大忌之。司醫者。謹諸戒諸。

汪石山先生曰。脾胃濕熱。氣蒸爲涎。涎化爲痰。此非半夏曷可治乎。俗醫以貝母代之。反滋濕滯。是翹首待斃矣。

李時珍先生曰。脾無濕不生痰。故脾爲生痰之源。肺爲貯痰之器。半夏治痰爲。其味辛氣溫。體滑而性燥也。故行濕而通大便。利竅而泄小便。所謂辛走氣。辛化液。辛以潤之是巳。丹溪翁又謂半夏辛溫。能使大便潤而小便長。局方半硫丸。治老人虛寒秘。皆取其辛溫能散能行。能潤也。此說特爲寒痰濕痰壅閉二便而設也。若使血虛火結。二便閉澁不行。妄用溫燥之物。寧無悖劣之禍乎。故甄氏方謂非水濕痰癖之邪而用之。是眞竭其津液也。豈其所宜。

○集方治傷寒（仲景方）。病在少陽。寒熱往來。頭角痛。胸脇痛。口苦。或心胸痞滿。或煩而嘔。用半夏薑製一錢。柴胡。黃芩。人參各八分。甘草六分。生薑二片。水煎服。○治脾胃虛寒。兼有濕痰泄瀉腫脹者。用薑製半夏。蒼术。白术。俱炒。各三錢。砂仁。木香。人參。各一錢。炮薑一錢五分。水煎服。○治腸鳴。由裏虛有濕痰者。用薑製半夏。人參。黃耆。茯苓。各二錢。廣陳皮。木香各八分。加生薑。大棗各一錢。水煎服。○治痰火喘嗽。用薑製半夏。黃芩。花粉。杏仁。白芥子。各一錢五分。水煎。加竹瀝十餘茶匙。○治風寒喘嗽。用薑製半夏。一錢五分。桂枝。一錢。乾薑。一錢。甘草。五分。陳皮。杏仁。各八分。水煎服。○治氣滯喘嗽。用薑製半夏。陳皮。枳殼。桑皮。茯苓。桔梗。前胡。蘇子。杏仁。各一錢。甘草五

分。水煎服。○治氣虛喘嗽。用薑製半夏。廣陳皮。各一錢五分。茯苓。人參。白术。各一錢。甘草五分。水煎服。○治肺熱喘嗽。用薑製半夏。一錢。黃芩。黑山梔。桑皮。薄荷。玄參。知母。蔞仁。各一錢二分。甘草五分。水煎服。○治陰霍亂（方龍潭）吐瀉（本事方共五則）。用薑製半夏。於白术。乾薑。附子。人參。肉桂。各二錢。陳皮。甘草。各八分。水煎冷服。○治傷暑熱霍亂吐瀉。口渴喜冷水者。用薑製半夏。厚朴。陳皮。各一錢。川黃連。黃芩。滑石。木通。各一錢五分。傷食者。加枳實二錢。水煎服。○治瘧疾痺氣。用薑製半夏。陳皮。厚朴。蒼术。各一錢。黃芩。柴胡。乾葛。知母。各一錢五分。加薑棗煎服。○治久瘧氣虛。用薑製半夏。陳皮。白术。黃耆。各一錢五分。當歸。白

芍、肉桂、鼈甲、半、檳、各二錢。加薑棗煎服。○治痢方。不用半夏。惟嘔吐痰涎、腹脹、少食、胃寒、口不渴者。少加用之。○治中風中氣裏虛有痰者。宜參耆附桂藥中。倍加薑製半夏、膽星。○治風痰、食痰、氣閉生痰。用薑製半夏二錢、杏仁二錢、去皮研。水一大盞。煎八分。臨服時加沉香末五分。調入。○大壓痰積。或酒食傷。極驗。○治中風痰厥昏迷。用薑製半夏四兩、甘草五錢、防風一兩。俱炒研爲末。每服五錢。薑湯調下。○治留痰成痿。手足無力。時嘔痰涎者。用薑製半夏四兩、酒炒蒼朮二兩、真草薢、枸杞子、各三兩。俱炒研爲末。作丸。空心服。○治諸病因痰流入筋絡成痿者。用薑製半夏、膽星、天麻、各等分。炒研爲

末。每服三錢。當歸湯調下。○治癲癇痰結。用薑製半夏四兩、天竺黃、膽星、天麻、各三兩。牙皂五錢。硃砂八錢。俱研極細。每服三錢。燈心湯調下。○治驚悸不寧。聞聲即振亂者。用薑製半夏、膽星、天麻、天竺黃、人參、硃砂、各等分。爲末。每服一錢。燈心湯調下。○治痰聚心絡。癲狂跳越者。用薑製半夏、膽星、川黃連、各五錢。軟石膏一兩。火煅。俱爲細末。每服三錢。薑湯調下。○治心煩悶亂。若怔忡者。用薑製半夏三兩、茯苓、膽星、白朮、人參、各一兩。研末。每早晚各服三錢。龍眼湯調下。○治痰厥眩暈。用薑製半夏三兩、薑製南星二兩、天麻一兩、寒水石、雄黃、各八錢。共研細末。神麯打糊丸如黍米大。每服三錢。薑湯

送下。○治痰厥頭痛。或眩暈。時吐冷涎者。用薑製半夏、薑製南星、天麻、蔞仁霜、各二兩。川芎、川黃連、各五錢。研細末。水發丸如菉豆大。每早晚各服三錢。白湯送。○治痰包心絡。終年夜不寐者。用薑製半夏、薑製南星、蔞仁霜、各二兩。川黃連、遠志肉、石菖蒲、當歸身、茯苓、各一兩。俱炒研爲末。煉蜜丸如彈子大。每早晚各服二丸。燈心湯調下。○治盤腸生產。產後子腸不收者。以生半夏末、嗃鼻中。則上也。○治產後暈絕不甦。以生半夏末。冷水和丸如大豆大。納鼻中。即甦。○治小兒驚風。用生半夏末一錢。牙皂末五分。吹少許入鼻中。有嚏即甦。○治小兒重舌、木舌、脹大塞口。用生半夏煎醋。含泊之。○治魘

死、溺水死、自縊死。心頭有溫氣者。用生半夏末。吹入鼻中。半泊即甦。○治打撲瘀痕。用生半夏末。水調塗之。一夜即散也。○治蝎蠆螫人。用生半夏末。水調塗之。即止疼。○治諸瘻五六孔相通。用生半夏末。水調塗孔內。一日二次。漸平。

○積集痰證雜方。治風痰喘逆。兀兀欲吐。眩暈欲倒。用薑製半夏二兩、雄黃三錢。共爲末。薑汁爲丸如梧子大。每服七八十丸。米湯下。○治風痰喘急。用薑製半夏七箇、炙甘草一寸、牙皂一挺。俱微炒。水煎服。○治濕痰咳嗽。面黃身重。嗜臥心驚。食飲不消。用薑製半夏、薑製南星、白朮、各二兩。俱炒研爲末。紅麯打糊丸如梧子大。每服

百丸。白湯下。○治痰積支飲（金匱要略）。似喘非喘。似嘔非嘔。似渴非渴。似噦非噦。心下憒憒。用薑製半夏一兩。生薑二兩。水三升。煮一升服。○治停痰冷飲（千金方）。胸膈滿悶。氣短惡心。飲食不下。或吐痰水。用薑製半夏二兩。陳皮一兩。茯苓三兩。分作五劑。水煎服。○治結痰不出（活法機要）。語音不清。用薑製半夏一兩。肉桂二錢。草烏頭切片炒三分。共為末。薑汁打米糊為丸。如芡子大。每臥時服二丸。含嚥化下。○治嘔噦（金匱要略）眩悸。穀食不得下。因痰者。用薑製半夏一升。生薑八兩。茯苓三兩。分作五劑。水煎服。○治嘔吐（同前）反胃。用薑製半夏三升。人參二兩。水二升。煮取一升。渣用水。如法再煮升五合。總和。熬成稠膏。加煉白蜜一升。收之。每

早午晚各服數茶匙。○治胃寒噦逆（和劑局方）。用薑製半夏二兩。炒真藿香葉一兩。丁皮五錢。共為末。每服四錢。薑湯調服。○治妊娠（金匱要略）嘔吐。用薑製半夏二兩。人參、乾薑各一兩。為末。每服一錢。白湯調下。○治黃疸（濟生方）喘滿。小便自利者。用生半夏半觔。水煮五百沸。去水。加生薑片四兩。水七升。煮取一升六合。不住手。徐徐服。有人氣閉而死。心下暖。以此半升遂活。○治白濁（本事方）并夢遺。用生半夏二兩。浸洗去涎。再煮百沸。切片晒乾。豬苓二兩。同炒黃。去豬苓。入煅過牡蠣、茯苓各一兩。以山藥糊為丸。梧子大。每服百丸。白湯下。腎氣閉而一身精氣無所分泄。妄行而遺者宜用此方。蓋半夏有利性。豬苓能導水。使腎氣通也。

如下元虛憊者。不可用此。○治喉痺腫塞。用生半夏塞鼻內。涎出效。

○治痰瀉久不止。或多或少。或渴或不渴。用半夏、陳皮、茯苓各二錢。甘草七分。蒼朮、白朮、砂仁、厚朴、車前子各三錢。加生薑三片。烏梅二個。水煎服。○治胃寒呃忒不止。名丁香柿蒂湯。用半夏、丁香、柿蒂、良薑、肉桂、陳皮、木香、茴香、藿香、厚朴、砂仁各一錢。甘草五分。加烏梅二個。水煎。臨服加沉香磨汁十餘茶匙。如寒極手足冷。脉沉細。加童便製附子一錢五分。人參三錢。○治胃熱呃逆。發熱自汗口渴者。名柴胡柿蒂湯。用半夏、柴胡、黃芩、山梔、黃連、柿蒂、藿香、陳皮、竹茹各一錢。甘草五分。加燈心一

團。水三碗。煎八分。臨服加沉香磨汁三四茶匙。○治胃中痰火發呃逆者。名連茹柿蒂湯。用半夏、砂仁、黃連、竹茹、柿蒂、蘇子、陳皮、貝母各一錢。甘草五分。加生薑二片。烏梅一個。水煎服。臨服時。加沉香磨汁三四茶匙。○治水寒生冷停胃。發呃逆者。名藿薑柿蒂湯。用半夏、柿蒂、陳皮、藿香、蒼朮、白朮、乾薑、砂仁、木香、厚朴各一錢。甘草五分。加竈心土三錢。花椒二十粒。水煎服。臨服加沉香磨汁十茶匙。○治陰虛陰火上升發呃逆者。呃聲從臍下上升也。名滋陰柿蒂湯。用半夏、麥門冬、知母、柿蒂、山茱萸、茯苓、牡丹皮、山藥、澤瀉各一錢。懷熟地五錢。加生薑二片。黑棗五個。水煎服。臨服加沉香磨汁六七茶匙。

第 冊　續修四庫全書　集　14　版反內

羊躑躅味辛，氣溫，有大毒。（又名鬧羊花。）

（蘇氏曰：羊躑躅生河陽山谷，隨地皆有。初春即生，起苗一尺餘，葉如桃葉。二月終結蕊，三四月開花，深黃色，似瓜花。羊誤食此草，即躑躅而死，故名。開泛即采，日乾。用不可近眼。）

○羊躑躅，祛風痛，散頑痹之藥也。其性有毒，善能行散，故古方于風麻痹痛，賊風惡毒，諸痹之疾，因風寒濕邪爲患者，用此立去。然非元氣未虛，脾胃尚實之人，不可輕用。即用之，須配大補氣血及解毒和胃之藥，少用些須可也。

李時珍先生曰：此藥有大毒，有人以其根入酒浸飲，遂至于斃。局方治中風癱瘓，伏虎丹中亦用之，不多服耳。

○集方：治風濕痹痛，手足身體不遂，肢節疼痛，言語蹇澀。用羊躑躅花，酒拌蒸，一炊久，曬乾爲末。每以牛乳一碗，酒半碗，調服三分。○治風痰走注疼痛。用新鮮羊躑躅花，生天南星，並生時同搗作餅，甑上蒸四五遍，以麻布囊盛之。臨時取焙，配枸杞子二倍，共爲末，蒸餅丸梧子大。每服五丸，溫酒下。腰脚骨痛，空心服；手臂痛，食後服，大良。○治脚氣腫痛，或痛風，手足骨節痛。用羊躑躅一錢，煎湯，不時淋洗，半月全愈。○治風蟲牙痛。用羊躑躅一錢，草烏頭二錢，俱用酒拌蒸，曬乾爲末，化黃蠟爲丸，如黃豆大，綿包一丸，咬之，追涎。

鬼臼味辛，氣溫，有毒。

（別錄曰：鬼臼生九眞山谷及寃句，荊州、峽州、襄州、越州、蜀道等處。近以錢塘、餘杭徑山者爲上。錢塘者味辛微甘，上有叢毛；餘處味辛稍苦，無叢毛，力劣少異。蘇氏曰：並生深山巖石之陰處。二三月發生，一一莖，中空直上，莖當葉心。葉居莖上，如初生荷葉，逕出八角，面青背紫，叢生細毛。採之氣香。旦則東向，暮則西傾。花開葉下，紅紫色，連綴莖間，未嘗見日，故又名羞天花。風來不動，無風自搖。其葉或二三層疊，總一莖，當心直上，或旁生岐出，必另貫葉心，不與本莖相連絡也。李氏曰：鬼臼根如天南星相疊之狀，故市人謂小者爲天南星，大者爲鬼臼，殊爲謬誤。歲生一莖，一莖枯，下生一臼，矣以九年、十二年者更良。一說：一年一莖枯，一臼生，而舊臼隨腐，益陳新相易也。）

○鬼臼，攻濕積，散瘀血之藥也。此藥性沉而陰，味辛而烈，能攻散結痰、結氣、結血等疾，故前古主蠱毒鬼疰，精邪怪病，并傳尸殗殜，及煩惑失魂，妄見諸物之疾。然此諸病，何莫非陰邪尸鬼之所爲？凡物以類相從，故惟陰草乃能治乎陰鬼之賊害也。但味辛性燥，凡病屬陽，陽盛熱極，有似鬼魅爲祟，及狂惑失魂妄見者，不可用。

○集方：治氣血痰飲積脹成蠱。用鬼臼一觔，切片，生薑二兩，白礬五錢，泡湯浸二日，再用酒煮，搗爛成膏。巴豆肉三錢，去油，沉香五錢，蟾酥五錢，俱爲末，和入爲丸，如黍米大。每早晚各服二三十丸，白湯送下。○治鬼疰精邪怪病，并傳尸殗殜，及煩亂迷惑，失魂妄見諸物之疾，或神鬼依附等證。用鬼臼取新鮮者三兩，搗爛，和米醋少許，貼胸中背心，數日漸退，未全愈再貼。○治子死腹中，胞破不生，此方屢效，救人幾萬數。用鬼臼不拘多少，黃

色去毛，爲細末如粉。每服一錢，無灰酒一碗同煎，通口服，立生如神。○治黑黃急病，面黃身黃如土色，不思飲食，脉沉，若青脉入口者死。用鬼臼新鮮者，搗汁小盞，如無鮮者，用乾者爲末，白湯調服，或用渣搗爛炒熱，布包熨口角、耳會、玉泉、章門、心俞等處。○治射工中人（千金方），使人寒熱發瘡，用鬼臼葉一把，米醋浸搗取汁一二碗，徐徐服。

○瘍科書云：瘿氣瘤氣，乃氣血凝滯也。瘿多生於肩項，瘤則隨氣留結。如年月深遠，漸大漸長，堅硬不可移者，名曰石瘿；皮色不變者，名曰肉瘿；筋脉露纏者，名曰筋瘿；赤脉交結者，名曰血瘿；隨七情憂思消長者，名曰氣瘿。五瘿皆不可決破，破則膿血崩潰，多致夭枉，難治。瘤則有六種：骨瘤、脂瘤、肉瘤、膿瘤、血瘤、筋瘤，亦不可決破，破亦難醫，惟脂瘤破而去其脂漿則愈。如海上方用鬼臼切片，薑汁浸，海藻、昆布、海帶俱用熱水洗淨，海粉水飛過，海螵蛸各二兩，甘草一兩，海螺一個，火燒醋炙，如頸下搖者用長螺，頸不搖者用圓螺，共爲極細末，煉蜜丸如梧子大，每晚臨睡時口中噙化一丸。

射干。味苦辛，氣寒，有毒。陽中陰也。入手少陽、少陰、厥陰經。實爲肺經本藥。多服瀉人。

（別錄曰：射干多生江南閩浙湖廣平陸間，今在處皆有。園圃庭臺多種之。冬至後宿根生苗，至二三月始抽出，高二三尺。近根之莖有節若竹，離根三四寸，綠葉橫鋪扁生，如側手掌，宛如翅羽，故有烏翣、鳳翼諸名。四五月葉中抽莖，似萱而強硬，出淡紅萼，開紅色花，亦有蜜色者，瓣有細文，間黃紫黑斑點，次早互相交紐如結。秋作房，大如拇指，一房四隔，一隔十餘子，子大如胡椒，色紫黑，極硬，咬之不破。另有一種名鳶尾者，葉濶而短，根密而稠，花小者即蝴蝶草，花大色紫者即紫羅蘭，俱春末作花，與射干迥別也。又一說：射干多生山崖之間，其莖難細小，亦類木，故荀子云：西方有草名曰射干，莖長四寸，生於高山之上是也。）

○射干。散結熱，下結氣，解喉痺咽痛之藥也。此藥苦能下泄而降，辛能疏散而行。前古主欬逆上氣，及喉痺咽痛不得消息，并去胸中積熱，胃中癰瘡，水蠱腹大，風熱客

于上焦之氣，分爲瘰癧，爲結核，爲停痰積血，爲癰腫赤瘍，用之甚捷。但氣味苦寒，洩熱散結，消痰去腫，然無益陰之性。凡患腫痺癰結，屬陰寒而無實熱者，脾胃薄弱，藏寒氣血兩虛者，禁用之。

○集方：治欬逆上氣（時方），喉中作水雞聲，用射干、麻黃各二錢，生薑三片，煎服。○治喉痺咽痛（方脈正宗），氣不升降，用射干新鮮者，擂汁嚥之，大腸動即解。或和米醋噙汨，引涎出即消。○治瘰癧結核，因熱氣結聚者，用射干、連翹、夏枯草各等分，爲丸。每服二錢，食後白湯下。○治胃熱停痰，有血積上吐者，用射干、川貝母、懷生地、牡丹皮各等分，爲末。每服一錢五分，食後白湯調下。○治癰腫焮赤（永類方），用射干五

鳳錢。金銀花各五兩酒煎服。○治乳癰并便毒初起。用射干閘萱草根為末。蜜調敷之。立效。○治水蠱腹大。動搖水聲。皮膚黑。用射干搗汁。服一杯。水即下。○治二便不通。諸藥不效。用射干搗汁一盞服。立通。○治中射工毒。發熱生瘡。用射干、升麻各二兩。水三升。煎二升。溫服。

○治小兒風痰吐沫。氣喘咳嗽。肚腹膨脹。不思飲食。用射干一錢。大黃、檳榔、牽牛子各二錢。麻黃、甘草各八分。俱微炒。研為末。每服五分。蜜湯調服。其證肺脹喘滿。胸高氣急。兩脇搖動。陷下作坑。兩鼻竅脹。悶亂嗽渴。聲嗄不鳴。痰涎潮塞。俗云馬脾風。若不急治。死于旦夕也。

鳳仙花　味苦。氣寒。有毒。

（李氏曰。鳳仙花人家園圃多種之。二月下子。極易生。四月開花。待子五月下地。可再種。發苗即開花也。苗高二三尺。莖有紅白二色。其大如指。頭中虛而脆。葉長尖。似桃柳葉而有鋸齒。枒間開花。或深淺紅。或白或紫。或碧色。或一本四五色。其狀頭翅尾足具翹然如鳳形。故名。自夏初開花至秋盡。循續結實。纍然如小桃形。有毛。生青熟黃。手觸之。即自裂。皮卷如拳。實中子如蘿蔔子而小。褐色。凶年人采其莖。汋熟。醃柞可充萵筍。嫩華酒浸一宿亦可食。但此藥不生蟲蠹。蜂蝶亦不近。恐亦不能無毒也。）

○鳳仙花。活血氣。利筋脈之藥也。李氏方治腰脇引痛不可忍。因瘀血為患者。宜用之。

○集方。治跌撲傷損筋骨。并血脈不行。用鳳仙花三兩。當歸尾二兩。浸酒飲。

○鳳仙根。通經活血之藥也。李氏方治杖撲腫痛。血脈瘀凝。此寒滑。走散迅疾。其性快便捷利。又不宜多服。久服損脾胃。洩元氣也。又化雞魚骨哽并誤吞銅錢五金器物。

○集方。治杖打腫痛。用鳳仙花根搗如泥。塗腫破處。乾則又上。一夜即散。冬月取乾者。研末。蜜湯調塗。○治咽喉為骨物鯁礙。并誤吞銅錢。用鳳仙花根搗爛。噙嚥。骨物自下。雞骨尤速。即以溫水漱口吐去。免損齒也。○治馬患諸病。用鳳仙花連根葉搗汁熬膏。遇馬有疾。抹其眼四角上。即汗出愈。

○鳳仙子。落胞胎。化積塊。下骨哽。通閉竅之藥也。其性急速。善能透骨軟堅。庖人烹魚肉不爛。投數粒易軟爛。可

知其功用矣。緣其化骨。最能損齒。與玉簪根同。凡服者。不可着齒也。多用。亦戟人咽。

○集方。治難產（集簡方）催生。用鳳仙子。二錢。研末。白湯調服。勿沾牙。○治咽（直指方）中骨硬欲死者。用鳳仙子三錢。研末。白湯調以竹筒灌入咽中。其骨即軟。不可經牙。或爲末吹之。

蕘花。味苦。氣寒。有毒。

（別錄曰。蕘花出咸陽山谷。及河南中牟。所在亦有。近以雍州者更佳。蘇氏曰。生岡原上。苗似胡荽。高二尺。莖無刺。四月開花。細碎似芫花。開時色黃。乾則色白。或言蕘花即芫花。大畧不惟生成形肖不同。氣味功能亦少有分別也。○李氏曰。蕘花亦芫花之類。形肖少有不同。氣味主治。大畧相近。）

○蕘花。行水（日華子）逐留之藥也。其性（吳普）善行（元素）水。蕩滌腸胃中留痰積飲。癥瘕積聚。又主傷寒溫瘧。邪氣關乎水濕留滯。爲痰爲脹。爲寒熱邪氣者。需此可平。如元氣虛乏。正負而邪勝者。禁用之也。

寇氏曰。張仲景先生。以蕘花治利。如小青龍湯云。若微利。去麻黃。加蕘花。如雞子大。熬令赤色。取其行水也。水去則利止。其意如此。雖然。亦當斟酌。不可遽使。

芫花。味苦。氣溫。有毒。

（吳氏曰。芫花生邯鄲及絳州。或淮源山谷。今所在皆有。莖幹不全類木。又非草本。草中木。木中草也。木高二三尺。正二月舊枝抽苗作花。有紅紫碧白四種。紫赤者多。白色者間有。黃色者。絳州所産也。三月花落。葉乃生。葉似白前。及柳葉而青。漸厚則梢黑色。都似衣。三月采花。五月采葉。八九月采根。皆見小人。乍捫古日。葉桜縣皮膚。輙作赤腫。以涎人。又和鹽擦瘢。則衣若縮色也。修治。以陳年者佳。用米醋煮十數沸。去醋。水浸一宿。晒乾用則毒減矣。不可近眼。）

○芫花。行水消脹（甄權）之藥也。前古（蘇心吾誠）治欬逆上氣。喘呼膧脹。及邪瘧寒熱。飲澼脇痛。一惟水濕痰涎爲害者。服之頓解。如仲景治太陽證。表不解。心下有水氣。乾嘔喘欬。或利者。用小青龍湯。表已解。頭痛汗出惡寒。心下有水氣。乾嘔脇痛。或喘欬者。用十棗湯。蓋小青龍治未解之表。使

水氣從毛竅出。開鬼門也。十棗湯攻未解之裏。使水氣從二便出。潔淨府也。夫飲有五。皆因內啜水漿。外受濕氣。流于肺。則爲支飲（令人喘欬寒熱背冷吐沫）。流于肝。則爲懸飲（令人欬唾痛引缺盆兩脇）。流于心下。則爲伏飲（令人胸滿嘔吐寒熱眩悸）。流于腸胃。則爲痰飲（令人腹鳴吐水胸脇支滿或作泄瀉）。流于經絡。則爲溢飲（令人沉重注痛或作胕腫而脹）。芫花大戟甘遂。能直達水飲窠囊隱僻之處。但性毒至緊。取效極捷。病人稍涉虛者。宜禁用之。

陳廷采先生曰。芫花瀉水利濕爲要。夫水者。脾胃腎三經所主。有五臟六府十二經之部分。上而頭目。中而四肢。下而腰膝。外而皮毛。中而肌肉。内而筋骨。必審其元氣壯實。脾胃不虛者。方可投用。

集方。治咳嗽上氣脹喘，用芫花半升，大棗十四枚，水二升，煮汁三合，徐徐服。○治水蠱（普濟方）脹滿，用芫花、枳殼等分，俱以醋煮乾，焙研為末，紅麯末打糊為丸梧子大，每服五十丸，白湯下。○治久瘧（直指方）不愈，并結癖塊在腹脇堅痛者，用芫花醋煮過，炒，二兩，硃砂三錢，俱為末，煉蜜丸梧子大，每服三十丸，棗薑湯下。○治五種飲證，用芫花醋煮，大戟酒煮，甘遂童便煮，三處煮過，各等分，焙乾為末，每服三錢，大棗十枚煎湯調下。○治婦人（聖惠方）經候不調，兒胎癥癖，用芫花三兩，醋煮曬乾，炒黃為末，每服一錢，白湯調服，當利下惡物則止。○治催生落胎，用芫花根為末，加麝香少許，以綿裹納入陰戶中二三寸，即下。○治心胃痛有蟲，用芫花一兩，醋煮曬乾，雄黃一錢，共為末，每服五分，醋湯調下。○治一切瘡核并痔瘡，用芫花絞汁，于瓦器內熬膏，將絲線于膏內度過曬乾，繫痔，當微痛，候痔乾落，以紙撚蘸膏，納竅內，去根永除也。○治粉瘤枯法，用甘草煎膏，以筆蘸塗瘤四圍，一日上三次，乃用芫花、大戟、甘遂各等分為末，醋調塗中心，勿近甘草。次日縮小，再以甘草膏塗外，再以芫花、大戟、甘遂末塗中，其瘤自然焦縮。○治腫毒初起，用芫花末和廣膠塗之。○治酒疸發黃，足脛腫，用芫花、椒目各等分，燒末，白湯調服五分，日二服。

海芋　味辛，有大毒。　又名觀音蓮。

李氏曰：海芋生蜀中及江廣深谷澗邊，或植園圃中。今在處亦有。春生苗，高四五尺。其葉如芋葉，極大，可以蔽雨。葉背紫色。夏秋間抽莖開花，碧色，如大蓮花，花中有蕊，長作穗，如觀音像。其根葉皆有大毒。根似芋魁，大者如升斛，長六七寸。贊云：木幹芋葉，擁腫盤戾，農經弗載，可以治癘。

透山根（補）

李氏曰：按岣嶁神書云：透山根，生蜀中山谷，有大毒。草類蘼蕪。昔有人以刀刮之，忽黃軟成金。取汁點鐵，立成黃金。人誤食此草，肌肉藏府即化為血水。又庚辛玉冊云：金英草，亦生蜀中，狀如馬齒莧而色紅，摸鐵亦可成金。亦有大毒，入口殺人，須臾即化為血水。又一人在澤州割馬草，鐮皆成金，以草燃釜，釜亦成金。一人病腹脹，呻吟不安，一醫以水煎此草一盃與服，頃之不復聞聲，念已安矣，至旦啓幃視之，其人血肉俱化為水，獨存骸骨在牀。觀其煎藥之釜，則通體成金矣。觀書中所載，即是透山根及金英草之類。如此毒草，不可不知，故備載之耳。

鉤吻。味辛微甘。氣溫。性有大毒。（李氏曰。鉤吻即胡蔓草。又名斷腸草。入口即鉤人喉吻故名。俚人食不半日即死。蔓生葉圓而光。春夏嫩苗毒甚。秋冬枯老稍緩。五六月開花數十朵作穗。生嶺南者花黃。生滇南者花紅。又呼爲火把花。葉似黃精而莖紫。當心抽花黃色。初生酷類黃精。人誤采食即死。蘇氏曰。鉤吻與黃精酷似難辨。細看鉤吻莖是蔓生。葉有毛鉤。二箇黃精莖係直生。小葉似竹葉爲別也。又按葛氏方。據神農本草。鉤吻名野葛。如中此毒。惟飲人屎汁。或取生鵝血。或鴨血。或羊血灌之。或取雞卵抱未成雛者。研爛和麻油灌之。吐出毒物可生。稍遲即死矣。）

（朱）按鉤吻。入口即死。非若他毒藥有可製服。而後又能治療急疾者。何本草諸書。又列引神農本經及別錄方。稱治金瘡乳痓。中惡風。欬逆上氣。水腫。殺蠱毒。癥積。腳膝痹痛等證。莫非不入湯飲丸散服食料中。而爲煎膏熬汁。爲敷貼淋洗之用耶。因前人混說未明。（朱）不敢遂爲別錄集方。闕此以俟高明鑒定。

本草彙言卷之六

錢塘　倪朱謨純宇甫選集　男倪洙龍沖之氏藏稿
　　　沈　琯西瑛甫校正

草部　蔓草類

菟絲子。味辛甘苦。氣平。無毒。入足少陰腎經。（李氏曰。毛詩注菟絲即女蘿。陶氏言菟絲出朝鮮川澤而野間。今近道亦有。以宛句者爲勝。夏生苗如細絲。徧地不能自起。得他草木則纏繞而上。其根即漸絕于地。寄生空中。無葉有花。色白微紅。香亦襲人。結實如粟米粒。色微黃。久則轉黑。八九月采之。雷氏曰。一種天碧草之子形貌似。只是味酸澀并粘手爲別也。修治去殼用酒浸一日夜。取出。微火焙燥。入石臼中。燒熱杵杵成細粉用。）

○菟絲子。補腎養肝。溫脾助胃之藥也。主男子陽道衰微。陰莖痿弱。或遺精夢泄。小便滑（滑不禁）澁（澁不通）。治女人腰脊痠疼。小腹常痛。或子宮虛冷。帶下淋瀝。或飲食減少。大便不實。是皆男婦足三陰不足之證。惟此劑功甚溫補。其效如神。但補而不峻。溫而不燥。故入腎經。虛可以補。實可以利。寒可以溫。熱可以涼。濕可以燥。燥可以潤。非若黃柏知母。苦寒而不溫。有瀉腎經之氣。非若肉桂益智。辛熱而不涼。有動腎經之燥。非若蓯蓉瑣陽。甘鹹而滯氣。有生腎經之濕者比也。如漢人集神農本草。稱爲續絕傷。益氣力。明目精。皆由補腎養肝溫理脾胃之徵驗也。

繆仲淳先生曰。菟絲子。雷氏所謂稟中和。凝正陽之氣而結者也。其爲無毒明矣。五味之中。惟辛通四氣復經

四味。經曰腎苦燥。急食辛以潤之。菟絲之屬是也。與他辛香燥熱之辛。迴乎不同矣

盧子由先生曰。癸亥七月過烟霞嶺。望林樹間有若赤網籠羃者。有若青絲覆罩者。又有青赤相間者。以詢山叟曰。赤網卽菟絲。青絲卽女蘿。因憶古樂府所謂南山羃羃菟絲花。北陵青青女蘿樹者是矣。青赤相間者。卽蘿菟交互。唐樂府所謂菟絲故無情。隨風任顛倒。誰使女蘿枝。而來强縈抱者。是矣。但女蘿藤類。細長而無雜蔓。菟絲蔓類。初夏吐絲。不能自舉。隨風傾倒。縈艸者。則不經久。若傍松柘及他樹。則延蔓四布。宛如經緯。根或絕地。嘗寄生空中。質軟拗不損本樹之精英。夏末作花赤色而無葉。隨亦結實。實或着樹間。次年隨在吐絲。不下引也。雷氏謂稟中和以凝正陽之氣。得其性矣。如內經陰陽內外互交之機。惟菟絲有焉。

王靖遠先生曰。菟絲子專補肝藏風虛。活利腰膝間一切頑麻痿痺諸疾。

○集方治男子（氏建生緣）陽道衰微。陰莖痿弱。用菟絲子。八兩。補骨脂一兩。鹿茸。人參。於白朮。山藥。山茱萸肉。枸杞子。牛膝。肉桂。澤瀉。各一兩。黃耆。牡丹皮。各二兩。爲末。煉蜜丸。早服三錢。白湯送。○治遺精（方脈正宗）夢泄。小便不禁。或小便淋瀝。用菟絲子。四兩。蓮鬚。北五味子。車前子。茯苓。遠志。各二兩爲末。煉蜜丸。每早晚各服四錢。白湯送。○治婦人（婦用良）腰脊痠疼。小腹作痛。用菟絲子四兩。川續斷。當歸。酒炒。川芎。杜仲。牡丹皮。香附。醋炒。白芍藥。丹參。各二兩。如虛熱。加知母二兩。虛寒。加白朮二兩。肉桂。附子。各八錢。童便製。氣滯。加木香。○治婦人（附方）子宮虛冷。帶下淋瀝。用菟絲子。山茱萸肉。各四兩。枸杞子。三兩。赤石脂。於白朮。白薇。各二兩。爲末。煉蜜丸。每早服三錢。湯酒任下。○治男子。（方脈正宗）婦人。脾元不足。飲食減少。大便不實。用菟絲子。四兩。黃耆。於白朮。土炒。人參。木香。各一兩。補骨脂。小茴香。各八錢。餳糖作丸。早晚各服三錢。湯酒任下。○治脾腎兩（同前）虛精髓不固。子嗣難成。用菟絲子。三兩。北五味子。沙苑蒺藜。覆盆子。蓮鬚。山茱萸肉。巴戟天。枸杞子。各二兩。爲

丸。早晚各服三錢。○治老人（方氏本事）陰血虛。眼目昏花。用菟絲子三兩。甘菊花。蜜蒙花。沙苑蒺藜。枸杞子。穀精草。懷熟地。當歸身。爲丸。早服三錢。○治男子（同前）腰膝冷痛。頑麻無力。用菟絲子。四兩。牛膝。於白朮。枸杞子。肉桂。黃耆。各三兩。附子。童便製。七錢。爲丸。梧子大。每早服三錢。湯酒任下。

○菟絲苗。氣味同子。生研爛。塗面斑。煎湯飲。小兒善發瘖疹解肺部熱

九　炒　各　膝

五味子。味酸、辛、甘、苦、鹹。氣溫。無毒。陰中微陽。入足少陰、手太陰經。（皮甘。肉酸。核辛兼苦鹹。凡味具備。故名。但酸過于北。辛過于苦。苦過于鹹。）（陶隱居曰。五味子。生齊山山谷。青州。冀州。陝西。代郡。及河東。遼東。幷州。出高麗者。多肉而酸甜。最勝。他處春時蔓生木上。長六七尺。葉尖圓似杏。莖赤。三月作花。黃白色似蓮。七月成實。叢生莖端。如豌豆。生青熟紫。八九月收采。曝乾則紫黑。今吳越建南等處亦有。名南五味子。懸乾色仍紅。乾枯少液。不若遼北高麗。色黑肥大且滋潤也。如入滋補藥。必用北產者良。亦可取根種之。當年即旺。若二月種子。次年乃旺。不若根力之即茂也。修治微炒用。）

○五味子。斂氣生津之藥也。故唐本草主收斂肺虛久嗽耗散之氣。凡氣虛喘急。欬逆勞損。精神不足。脈勢空虛。或勞傷陽氣。肢體羸瘦。或虛氣上乘。自汗頻來。或精元耗竭。陰虛火炎。或亡陰亡陽。神散脈脫。以五味子治之。識用其酸斂生津。保固元氣而無遺泄也。然在上入肺。在下入腎。入肺有生津濟源之益。入腎有固精養髓之功。故孫真人用生脈散。以五味配人參、麥門冬。夏月調理元虛不足之人。意亦在其中矣。但酸澁多收。如肺中有火鬱者。肝家有動氣者。痧疹初發未透出者。濕痰停飲塞滯胸中者。俱禁用之。

先賢成無己曰。肺欲收。急食酸以收之。以酸補之。芍藥、五味之酸。以收逆氣而安肺。

繆仲淳先生曰。如百骸髓會而爲精。五味子力能充之。故羲皇謂補不足。強陰益男子精。

盧子由先生曰。本經言主欬逆上氣者。正肺用不足。不能自上而下。以順降入之令。勞傷羸瘦者。即內經云。煩勞則張。精絕。使人煎厥。肉爍也。此補勞傷致降下之不足。與補中益氣之治不能升出者。反能降。便是強陰。陰強便能降入。以入爲水藏事。故益男子精。精爲水藏物耳。設六淫外來。及肺氣焦滿。餌之反引邪入藏。永無出期。縱得生全。須仗夏火從中帶出。或爲斑疹。或作瘡瘍。得汗乃解。倘未深解病情。願言珍重。

○集方治久欬肺脹。用北五味子二兩。罌粟殼五錢。俱微炒爲末。煉蜜丸彈子大。每服一丸。白沸湯化下。○治氣虛喘急。脈勢空虛。精神不足者。用北五味子八分。人參、白朮、茯苓、半夏、陳皮各一錢。甘草五分。水煎服。○治陽虛氣上逆乘。自汗頻來。四肢厥冷者。用北五味子一錢五分。人參三錢。肉桂、附子、童便製炮薑各一錢五分。甘草六分。水煎服。○治精元耗竭。陰虛火動。骨蒸煩熱。口燥咽乾。用北五味子七分。知母、黃柏、沙參、白芍藥各一錢。麥門冬、懷熟地、山藥、牡丹皮、地骨皮、黃耆各二錢。水煎服。○治亡陰亡陽。神散脈絕。用北五味子一錢。龜膠二錢。懷熟地、人參、白朮、黃耆、附子童便製、人參各五錢。烏梅三箇。水煎服。○治腎虛遺精白濁。兩脇并背脊穿痛。用北五味子一兩。炒爲末。每早服二錢。醋湯調下。○治五更溏泄。經年不止者。名曰腎泄。用北五味子。吳茱

煎補骨脂（酒炒）各等分，為末，餳糖丸梧子大，每早服四錢，酒下。○治爛弦風眼（葉氏方）。用北五味子、蔓荊子，煎湯頻洗之。○治赤遊風丹，漸漸腫大（保幼大全）。用北五味子，焙研，熱酒調服一錢，自消退，神效。

外邪亦宜少用。酸能引痰，辛能引咳故也。

（參朮健脾丸）治脾腹冷痛，泄瀉年久不止。此藥溫補脾腎，除寒散濕，補理中宮，益腎水，溫下元，進飲食，調中下氣，大補諸虛寒證。用北五味子、川椒、小茴香、木香、白朮、茯苓、人參、山藥各二兩，補骨脂、枸杞子、菟絲子、蓮子肉、川楝子、川牛膝各四兩，俱用酒拌炒。蒼朮切片，米泔水浸一日，再換食鹽二錢、醋酒、童便各一盞，調和，再浸一日，取起曬乾，與前藥總和，微炒，磨為末，飾糖和為丸，梧子大，每早服五錢，晚服三錢，俱食前酒送。寧心定志湯：治病後虛煩不得臥，或心志虛怯，煩擾不寧，或觸事易驚，精神恍惚。用北五味一錢，酸棗仁（炒）、茯苓、半夏、熟地各二錢，遠志、甘草、當歸各一錢，竹茹、陳皮各八分，黑棗十個，生薑三片，水煎服。亦可作丸服。

蓬蘽　味甘酸，氣溫，無毒。

（別錄曰：蓬蘽生荊山平澤及冤句，今處處有之。蘇氏曰：秦吳尤多。李氏曰：此藥凡五種，予嘗親采，以爾雅所列者較之，始得其的。諸家所說，皆未可信。一種藤蔓繁衍，莖有棘刺，逐節生葉，葉大如掌，狀類小葵，葉面青，背白，厚而有毛，六七月開小白花，就蒂結實，三四十粒而成簇，生則青黃，熟則紫黯，微有黑毛，狀如桑椹而扁，冬月苗葉不凋者，俗名割田藨，即本草所謂蓬蘽是也。一種蔓小於蓬蘽，亦有鉤刺，一枝五葉，葉小而面背皆青，光澤無毛，開白花，五月結實成子，亦小于蓬蘽，不簇生而稀疏，生時青黃，熟則烏赤，冬月苗凋者，俗名插田藨，本草所謂覆盆子，爾雅所謂茥，缺盆者是也。二種俱可入藥。一種蔓小于蓬蘽，一枝三葉，葉面青，背淡白，微有毛，三月開小白花，四月實熟，紅如櫻桃，似覆盆而色大赤，酢甜可食，不入藥用，俗名薅田藨，爾雅所謂藨者是也。一種樹生者，樹高四五尺，葉似櫻桃葉而狹長，四月開小白花，結實如覆盆子，但色紅為異，俗亦名藨，爾雅所謂山莓，陳藏器所謂懸鉤子者是也。一種就地生苗，長數寸，開黃花，結實如覆盆，色鮮紅，不可食者，本草所謂蛇莓者是也。若以五類互為辨析，則蓬蘽、覆盆自定矣。諸家立論多淆，皆近是而非，更有以蓬蘽為根，覆盆為子，及宋

氏覆盆為子，蓬蘽為[illegible]，與樹生為覆盆，草生為蓬蘽，併以蓬蘽覆盆為二物者，悉出[illegible]，以為根也。盧氏曰：顆名思義，蓬蘽類繁多，因名蓬蘽，宜別子母兄弟以及雅，則覆盆亦類[illegible]矣，但氣有優劣，功用有異同，不可不細為辨析也。否則差之毫釐，失之千里。諸家議紛出，為陽立言遷古，特狀而出之。盧氏曰：凡使用，淨水淘去黃葉併皮蒂，取子，以酒拌蒸一宿，再淘一次，晒乾用。）

○蓬蘽養五藏，益精氣之藥也。本草主長陰令堅，強志倍力，益顏色，長鬚髮。此藥易生而多變，全得氣化榮華之表。雖養五藏，充足在肝，肝主發生，故主陰器可長可堅，神志可強，氣力可倍，顏色可益，鬚髮可長，為少陽甲木之用藥也。但肝主發生，又主疏泄，倘服食過多，性味有偏，發生急而疏泄多，未免有反激之患，而肝木自戕其體矣。慎之慎之。

○集方通治五藏陰精衰薄用蓬蘽四兩酒拌蒸晒乾酥人參白朮菟絲子枸杞子龜鹿膠懷熟地山藥山茱萸肉肉蓯蓉蓮鬚冬青子酒拌炒各三兩俱爲末煉蜜丸每早服四五錢白湯送多服自效如虛寒人加肉桂一兩虛熱加酒炒黃連五錢（普濟方）

治體肥人頭眩者（已下方俱出方脈正宗）屬氣虛有濕痰也用蓬蘽天麻白朮茯苓黃耆半夏當歸膽星各二兩川芎陳皮白芷白芥子各一兩人參甘草各八錢俱用酒拌炒分作十劑水煎服○治體瘦人頭眩者屬血虛有火也用蓬蘽天麻白朮茯苓黃芩黑山梔玄參知母當歸川芎懷熟地枸

杞子荊芥各一兩人參甘草各八錢俱用酒拌炒分作十劑水煎服○治無病人忽時眩暈卒倒者是中氣虛而風痰風火上沖也用蓬蘽人參黃耆茯苓當歸白芍各二錢川芎半夏膽星杏仁去皮防風陳皮生薑各一錢甘草六分水煎加竹瀝半盞煎服○治陰火動眩暈者是斲喪之人有之用蓬蘽人參白朮當歸黃耆各二錢懷熟地二兩水煎頻頻服○治虛極欲倒如坐舟車是眞陽不足上氣喘急氣短自汗而眩暈手足冷脈必沉細也用蓬蘽炒人參大附子童便製各三錢肉桂二錢甘草一錢煎服○治頭眩暈目中溜火大便閉結能食而健是火壅也用蓬蘽三錢大黃酒煮三錢水煎服

覆盆子味甘辛氣微熱無毒入肝腎二經（李氏曰子似覆盆之形故名寇氏曰覆盆子處處有之秦州永興華州尤多四五月紅熟山中人及時采其味酸甘外皮如荔枝大如櫻桃軟紅可愛過時則就枝生蛆食之多熱景氏曰按蓬蘽子以八九月熟故謂之割田藨覆盆子以四五月熟故謂之插田藨正與別錄五月采相合二藨熟時色皆赤烏故能補腎其四五月熟而色紅者乃耨田藨也不入藥用陳氏所謂以茅莓當覆盆者蓋指此也五月采烈日曝乾不爾易爛雷氏曰凡使用淨水淘去黃葉併皮蒂取子用好酒拌蒸半日研細淨水淘洗一二次晒乾用）

○覆盆子煖腎健陽之藥也甄氏方主男子腎精虛竭陽衰痿瘦服此能令堅長女人胞寒白帶血冷不調食之能令有子陳氏方搾汁塗髮可使黑潤寇氏方煎膏日服可止小便餘瀝不禁若馬氏方之療勞損風虛補肝明目與枸杞桑椹等皆煖腎健陽之意也如腎熱陰虛

血燥血少之證戒之

李瀕湖先生曰覆盆蓬蘽功用大抵相近雖是二物其實一類而二種也一早熟一晚熟兼用無妨其補益與枸杞桑椹同功若木莓蛇莓形類相似則不可混采者也

○集方治男子腎經虛竭陽衰陰痿（集驗方）用覆盆子四兩枸杞子菟絲子懷熟地各三兩俱酒浸炒大附子六錢童便煮肉桂一兩甘草九錢鹿角膠二兩酒溶化爲丸彈子大每早服三錢乾嚼化白湯過下○治女人胞寒白帶（孫氏方）血冷不受孕用覆盆子三兩枸杞子菟絲子懷熟地各二兩俱酒浸炒香附子八兩醋炒細辛木香各八錢[illegible]

膠二兩、切碎。乾麵拌炒成珠。白朮。白薇。牡丹皮各三兩。煉蜜丸梧子大。每早服三錢。白湯下。○治膀胱虛冷。小便頻數不禁。用覆盆子四兩。酒浸炒。木通一兩二錢。甘草五錢。共爲末。每早服三錢。白湯調送。○治血虛生風。肝腎俱虛。目昏不明。用覆盆子三兩。酒洗炒。桑椹子。枸杞子。俱晒乾炒。當歸。白芍藥。蒺藜。牡丹皮。懷生地。川芎各二兩。俱酒洗炒。共爲末。每早晚各食後服三錢。白湯調送。○治爛弦風眼。一二十年不愈者。用覆盆葉新鮮者。搗汁。用淨軟舊絹。蘸汁塗下弦。即時有蟲數十粒從弦下出。數日乾。復如法塗上弦。又得蟲數十而愈。後以此法治人。多驗。蓋治眼妙品也。

○延齡固本丹。治五勞七傷。諸虛百損。顏色衰朽。形體羸瘦。中年陽事不舉。精神短少。未至五旬。鬚髮先白。并左癱右瘓。步履艱辛。脚膝疼痛。小腸疝氣。婦人久無子息。下元虛冷。用覆盆子。車前子。當歸。地骨皮。俱用醋炒。各二兩。麥門冬。酒煮。懷熟地。酒煮。山藥。牛膝。杜仲。巴戟。山茱萸肉。枸杞子。白茯苓。北五味子。人參。俱用鹽水炒。栢子仁。研去油。木香。焙。各二兩。川椒。石菖蒲。棗仁。遠志。俱用拌炒。各一兩五錢。肉蓯蓉。兔絲子。赤石脂。煅。各三兩。先將麥門冬。懷熟地。搗膏。和入栢子仁內。餘藥俱依方製炒。共爲末。和入煉蜜爲丸。梧桐子大。每早晚各食遠服三錢。酒送下。

懸鉤子。味酸。氣平。無毒。

（李氏曰。懸鉤子。即木莓也。條莖生高四五尺。其莖白色。有倒刺。其葉有細齒。正面深青色。無毛。背面淡青色。頗似櫻桃葉而狹長。又似地棠花葉。四月開小白花。結實色紅。味酸美。人多食之。今人亦通呼爲藨子也。孟氏大氏並以此爲覆盆子。誤矣。楊士行云。南土覆盆子極多。是藤生。懸鉤子是樹生。形狀雖同。而色各異。覆盆色烏赤。懸鉤色紅赤。功用亦不同。今正之。）

○懸鉤子搗汁。解酒毒。并去射工沙虱毒。

○根皮。味苦。氣平。無毒。陳氏曰。煮汁飲。破血。逐赤白膿痢。并治子死腹中不下。

蛇莓子。味甘酸。氣大寒。有毒。

（陶隱居曰。蛇莓。南北所在皆有。多生野園下濕地。就地引蔓。節節生根。每枝三葉。葉有細齒。四五月開小紅花。結實鮮紅。狀如覆盆。而面與蒂則不同也。其根甚細。取汁當以莖根葉一并用也。）

○蛇莓子。取汁。解天行毒熱。傷寒大熱之藥也。故別錄方通婦人血熱閉阻不行。并口內生瘡腫痛。取蛇莓自然汁數合。徐徐嚥之。

倪朱謨曰。懸鉤。蛇莓二種。前人誤入覆盆條內。因其形狀相似也。故錄此二種生成出處形狀以別之。

使君子。味甘酸。氣寒。無毒。（李氏曰。使君子原出海南交阯之地。今閩之邵武。蜀之眉州皆有。亦易生之物。如山野及木岸間延蔓。如葛繞樹而上。葉青如五加葉。四五月開花。一簇一二十葩。淡紅色。輕盈如海棠。作實長寸。先黃。老則紫黑。殼類梔子。蒂有五稜。中仁色狀如榧。味如草果。七月收采。久則油黑不堪用矣。宋醫郭使君始用。故名。）

○使君子。療小兒五疳積聚之藥也。開寶方兼主小便白濁。殺蟲止痢。無非嬰科疳病諸證。專司之也。是不苦不辛。能滋運脾胃。故疳可療。濁可清。蟲可滅。痢可止耳。此所以爲兒科上藥也。但性寒。善消。如脾胃虛寒之子。又不宜多用。多食則發呃。益可知矣。如大人方藥中。世未嘗用也

李士材先生曰。殺蟲藥皆苦。惟使君子獨甘。空腹食數枚。次日蟲皆死而出矣。忌飲熱茶。犯之即瀉。有言其不宜食者。非也。按李氏綱目云。夫樹有蠹。屋有蟻。國有盜。人身有蟲。禍耶。福耶。觀養生者。先去三尸蟲。可知矣。設苟無蟲積。服之必致損人

○集方治小兒痞塊腹大。肌瘦面黃。漸成疳疾。用使君子肉三錢。木鱉子仁五錢。共爲末。每用一錢。用雞子一箇。破頂入藥在內。飯上蒸熟。空心和雞子食之。○治一切疳疾。用使君子肉、蘆薈、蕪荑、麥芽、厚朴、陳皮各等分。每用一錢。白湯調服。○治小兒蛔痛。口流涎沫。用使君子肉爲末。米飲調。五更時服一錢。○治小兒頭面虛腫。陰囊俱浮。用使君子肉一兩。蜜三錢。拌炒研細。每用一錢。食後米湯調服。○治[illegible]面瘡傷。用使君子肉五枚。香油浸一日。臨睡時細嚼。如法服。一月全愈。○治蟲牙疼痛。用使君子肉。煎湯頻漱。漸愈。

（肥兒丸。治小兒疳積一切病。此藥消疳化積。磨癖殺蟲。清熱痞脾。進食養神。用史君子肉去殼、蕪荑炒各五錢。胡黃連、牽牛子頭末各三錢。人參、白术、茯苓、甘草、麥芽、紅麯、山查肉各四錢。共爲末。黃米糊爲丸。如芡實大。每服一丸。米湯化下。或作末藥。每晚米湯調服六分。消疳丸。治小兒五疳。面黃肌瘦。髮豎尿白。肚大青筋。喜食泥炭茶米之物。或吐或瀉。腹內積塊。諸蟲作痛。用史君子肉、蕪荑仁、陳皮、厚朴、枳實、麥芽、蘆薈、白术、砂仁、三稜、莪术各五錢。胡黃連三錢。共爲細末。神麴糊爲丸。如彈子大。每服一丸。米湯化下。錢氏云。小兒疳疾。多由飲食無節。肥甘過度。或因久吐久瀉久痢久瘧久熱久汗久嗽久瘧之後。皆能亡失津液而成疳。疳疳治法。理脾爲主。消積次之。俗云。凡養小兒。宜戒散滋內補賊偏生病。生冷硬物涼水漿不與。自無疳癖病。誠哉是言。○又方治小兒無人顧看。缺乳與餓。伶仃者。不可作疳治。宜大補脾胃。用參苓白术散與服。）

繼以飲食調理。

治黃病。（萬病回春）愛吃生米、茶葉、桴炭、泥土、瓦屑之類。用使君子肉二兩。切碎微炒。檳榔二兩。南星三兩。俱用薑汁拌炒。共爲末。紅麴打糊爲丸。如梧桐子大。每服百餘丸。烏梅花椒湯送下。

木鱉子味苦微甘，有小毒。

馬氏曰：木鱉子出朗州及南中。蘇氏又言閩廣諸郡及全古、楊越亦有。蔓歲一枯，根則不死，春復旋生。亦可子種。種時須雌雄相混埋土中，及生則去其雄，方結有毛。作藤布葉，酷似蕃薯，但葉作五椏，色稍綠。四月開黃花，六月結實，似苦瓜、栝樓而極大，生時青碧，熟則紅黃。殼有軟刺，每一實有子數十枚，長三四分，圓而褊何。形狀如鱉卵，一頭尖者雄種也。八月采取中仁，青綠。修治法浙用。○嶺南人取嫩苗葉，鹽淹曬乾，而蒸熟可作茹食。

○木鱉子。利大腸，消疳積（李時），化腫毒（中梓）之藥也。開寶方（[illegible]）作湯飲，主療惡瘡腫毒，乳癰便癰。又醋調敷粉刺䵟黷，水調敷肛門腫痛，作散服，消疳積痞塊，乃疎結消壅之物。如胃虛大腸不實，元氣虧損者，不可槩投。如入敷貼外科諸疾，又勿論也。

盧子由先生曰：藥有雌雄，此指枝幹已成，別花實之有無，或形色之相肖，假喻而言也。若何首烏，色分赤白，兩藤時相交解，如天上夫妻，目視執手，以為婬事者也。惟頓遜國有木曰互婚，花似牡丹，根幹之間，實有其具，晝則分開，夜則聯合，如人間夫妻，實有婬業者也。獨木鱉子，胚胎未兆，先為匹配，而後生，生而後有子，此又雌雄之異類者矣。傳云：未有學養子而後嫁。此更學養子而後生。

姜月峯先生曰：古方載木鱉子有毒，不可食。昔薊門有二小兒，恐食成疳，一醫教以木鱉子煮猪肉食之，二晝夜，二子俱死。方書因著此為戒。又按李氏云：南人嘗取其苗及嫩實食之無恙，則其毒要未應至此，或者與猪肉不相得，或犯他食物而然，又不可盡咎木鱉子也。

○集方：治惡瘡（[illegible]）腫毒，乳癰便癰，用木鱉子仁三錢，金銀花、紫花地丁各四錢，乳香、沒藥各一錢，水酒各二碗，煎一碗。病在上，食後服；在下，食前服。乳癰加瓜蔞實一箇，打碎用；便癰魚口加大黃、皂角刺、穿山甲（火煅）各三錢。○治小兒疳積痞塊方，法見前使君子條內。○治肛門（[illegible]）腫痛并痔痛，用木鱉子仁十箇，研細，作七丸，每以一丸唾化，搽痔上，其痛立止，一夜一丸，自消也。○治經年（外科方）瘻，用木鱉子仁二箇，去油研細，入雞子內，蒸熟食之，一日一服，半月效。○治水瀉不止（[illegible]），用木鱉子仁五箇，母丁香三粒，麝香五釐，研末，米湯調作膏，貼臍內，外以膏藥護住。○治小兒疳疾（[illegible]），用木鱉子仁、去油使君子仁各等分，搗極細，米糊丸如芥菜子大，每服三四分，米湯送。○治疳病（[illegible]）目矇不見物，用木鱉子仁二錢，胡黃連一錢，研細末，米糊丸如芥菜子大，每服五分，白湯送下。○治酒疸（[illegible]）脾黃，用木鱉子仁，磨醋服一二錢，見利效。○治脚氣（永類方）腫痛，行履難者，用木鱉子仁切碎，拌麩炒，去油氣為度，厚肉桂減半，共為末，用熱酒服二錢，令醉得微汗愈。

[illegible]用木鱉子十個，去[illegible]桃枝、[illegible]瀉痢如神。柳枝各五十段，乳香、沒藥各五錢，用香油七兩，將木鱉子以下四味入油煎，浮撈起渣，後下好黃丹三兩，熬將成膏，用竹箸不住手攪，滴水內成珠，再入乳香、沒藥，以狗皮攤膏，貼臍上。

番木鼈味苦氣寒有毒

（李氏曰番木鼈生回回國今西土邛州諸處亦有之蔓生夏開黃花七八月結實如栝樓生青熟赤亦如木鼈其核小于木鼈而色白彼人言治一百二十種病每證各有湯引或云以豆腐制過用之良與狗食即死○盧氏曰蔓草曰木以用言也實核肖鼈以形舉也）

○番木鼈解咽喉結熱，肝痹脹痛，消腹中痞熱，癥塊攻疼。逆以此含之嚥汁，或磨湯盼嚥亦可。此藥有寒毒而劣。如元虛氣不足之證，禁用。

○集方治纏喉風腫，用番木鼈一箇，以水磨汁，和膽礬末三分，以雞毛醮汁掃患處。○治痘瘡入目，用番木鼈一箇，研細末，輕粉、銀硃各五分，冰片、麝香、枯礬各一分，和木鼈總為末，用少許，左目吹右耳，右目吹左耳，日二次。

○治有孕不欲留，用番木鼈一箇，研細末，用絹包，以綿繫納入陰戶內三寸，一日即下。

馬兜鈴味苦辛，氣寒，無毒。味薄氣厚，陰中微陽，入手太陰。

（蘇氏曰馬兜鈴生關中及河東河北江淮夔浙州郡在處山野及城旁與平澤叢林間皆有之春時蔓生附木而上葉似蘿藦葉而厚而濇又夏開花色青白間有黃紫者結實似李而長五瓣霜降葉脫垂纍如鈴故名其實四裂中仁似榆莢根色黃赤似漢防己稍小而扁其氣如蒿根及木香氣修治采實去葉及蔓布囊內懸屋角下風乾去革膜取淨子焙乾用其根即青木香八月采用）

○馬兜鈴清肺熱，定喘嗽之藥也。究其味苦兼辛，氣寒性速而且輕揚，苦善下洩，辛善橫散，寒善去熱，輕揚而速，頗能開達。故閔寶方主肺熱痰嗽不清，甚致喘脹而氣促者，屢獲奇功。此藥寒平和緩，不滑不燥，不烈不泄，厥狀類肺，故能入肺除熱氣，降熱除痰嗽喘促，自是乎矣。又言能消血痔瘻瘡，無非氣鬱血熱所致，況痔病屬大腸，大腸與肺通表裏，此藥能清藏熱，則府熱亦清矣，故亦主之。如肺虛寒，作咳嗽，或寒痰作喘促者，勿服。

李瀕湖先生曰：錢氏方補肺阿膠散用之，非補肺也，乃取其清熱降氣也。邪去則肺安矣。方中所用阿膠、糯米，乃補肺之藥，正以此二味調和馬兜鈴降洩之過。嘗觀崔氏方，用以吐蠱，其不能補肺，又可推矣。

盧子由先生曰：形似馬兜之鈴，高懸于樹而四裂，肺金之象也。氣味苦寒，對待肺熱葉焦，為欬為喘，為痰結，或移熱于府，為痔為瘻，或發于廣顙，為瘰癧，為喉瘡，或失于遊溢，為癃為淋，為水腫，或犢乘火位，為嗽為喘，為心

胃痛，莫不以熱爲本，以肺爲標，宜虛其實，毋虛其虛。

○集方治肺氣喘急，用馬兜鈴一兩，去殼及膜，甘草五錢，俱微炒，磨爲末，每服一錢，白湯調服。○治久嗽不愈，用馬兜鈴五錢，蔞仁霜一錢，北五味一錢，俱炒，共爲末，每服一錢，早晚食後白湯調送。○治血痔諸瘻瘡，用馬兜鈴一兩，甘草五錢，懷生地、於白术各二兩，作五劑，水煎服。○治痔（同前）瘻腫痛，以馬兜鈴燒烟，于瓶中熏病處，良。○治水蠱腹大或喘急者，用馬兜鈴三錢，煎湯日服之。○治瘰癧久不消，用馬兜鈴三錢，當歸、生地各二錢，牡丹皮一錢，日飲一劑，漸消。○治喉（同前）咽生瘡，非關綿花毒者，用馬兜鈴二錢，桔梗、甘草各一錢，水煎服。○治肺氣熱

閉下爲癃閉，或爲淋澀，用馬兜鈴二錢，懷生地三錢，生甘草一錢，茯苓、木通、燈心草各一錢五分，水煎服。○治一切心胃作痛，不拘男女大小，用馬兜鈴一箇，燈上燒存性，爲末，白湯調服，立效。○解蛇蠱毒，飲食中得之，喉中如有物，嚥不下，吐不出，心中熱悶，用馬兜鈴一兩，煎水服，即吐出。

○馬兜鈴根（名青木香，又名獨行根。）味苦，氣寒，有毒，不可多服，吐利不止。

治鬼疰積聚，諸蠱毒，水煮二兩，吐之。又搗末，水調，敷疔腫及蛇毒，日三四次，立效。

○集方治五種蠱毒，嶺南土人多于食中毒人，漸不能食，胸背漸脹，寒熱，酷似瘴瘧，用獨行根十兩，水一斗，酒三升，煮三升，分三服，毒從小便出。十日戒食一切毒物，不差更服。○治中草蠱毒，此術在西涼之西及嶺南人用此毒入咽欲死者，用馬兜鈴苗一兩，爲末，溫水調服一錢，蠱即消化，立效。○治惡蛇所傷，用青木香半兩，煎湯飲之。○治腸風漏血，用馬兜鈴、藤穀精草、荆三稜、川烏頭炒過，五味各等分，煎水，先熏後洗之。

預知子。味苦。氣寒。無毒。

（蘇氏曰：出淮南及漢黔諸州，作蔓生，依大木上。葉綠色，有三角，面深背淺。秋月結實作房，生青熟紅。每房有子五七枚，如皂莢子，斑褐色，光潤，狀如飛蛾。今蜀人極貴之，亦難得。九月采其根，冬月采之，陰乾，治蠱，其功勝于子也。山民稱爲聖無憂。李氏曰：諸書相傳，服子二枚綴衣領上，遇有蠱毒，則聞其有聲，當預知之，故名。）

○預知子。殺蟲。解蠱毒之藥也。此藥感陰清之氣以生。味苦。氣寒。凡蠱毒多辛熱蟲物所造。故宜陰清苦涼。以泄其熱毒。熱毒既解。則蠱不靈矣。凡蠱物。皆甘溫濕熱之味所生。得苦寒之味則伏。故殺蟲之藥。多苦多寒也。此草中之有靈性者。故有預知之名。犬氏方。治一切風毒化痃癖。消宿食。又治天行瘟疫。一切熱病。每早吞二七粒。卽差。總關積熱爲祟者。應手奏功。倘屬脾虛中氣寒冷者勿用。

○集方（時珍方）治癧風有蟲。眉落聲變。用預知子搗膏二兩。和雄黃末二兩。再搗勻。米糊丸梧子大。每空心服一錢。溫酒下。數服後。有蟲隨大便而出。

○預知子根。味苦。氣冷。無毒。搗細末。每用三錢。白湯服。解蠱毒立已。

牽牛子。味苦甘。微歛麻。氣熱。有小毒。

（李氏曰：牽牛子，處處有之。有黑白二種，俗名黑丑、白丑是也。黑者多野生，白者多種蒔。二月生苗，引蔓纏繞樹木，蔓落附籬，高二三丈。黑者蔓有白毛，斷之出白汁。葉有三稜，如楓樹葉。花不作瓣，色微紅，帶碧，如旋覆花狀。日出則開，日落則閉。實有蒂裹，生青枯白。核與棠梂子核酷肖，但色深黑耳。白者蔓無毛，有柔刺，微紅色，斷之出濃汁。葉圓無稜，有斜尖，如薯蕷、何首烏葉。花較黑者稍小，色淺碧帶紅。日出日落閉闔亦同。實蒂長寸許，生青枯白，核大，色白耳。其實嫩時，蜜煎爲果，呼爲天茄，因其蒂如茄也。多食損人，脾泄人元氣也。修治：曬乾，淘去枯浮者，再曬乾，微火焙燥，舂去皮，硏用。）

○牽牛子。逐積追蟲（時珍）。行水消脹（別錄）之藥也。其味（日華）辛歛（甄權）。久嚼猛烈。性惟行逐。李東垣治水氣在肺。喘滿腫脹。下焦鬱遏。腰背脹重。及大腸風秘氣秘。卓有殊功。又甄氏方。消痃癖。瀉蠱毒。破瘍癧。下宿膿。并一切氣滯痰飲諸疾。下咽卽效。若病在血分。及脾胃虛弱而致痞疾者。則不可取快一時。有損元氣也。

李東垣先生曰。牽牛。非神農藥也。辛熱有毒。性又迅速。其所主治。雖能逐積追蟲。行水消脹。若積也。蟲也。脹也。皆從水濕所成。夫水者。有形之邪也。如肺受水邪。則清氣不得施化。致大小便不通而成脹者。則宜暫用。蓋此藥感南方熱火之化所生。火能平金而泄肺中停水。水去則氣得周流。所謂五臟有邪。更相平也。今人不問有水無水。但見傷食損脾。或中虛內熱之證。俱用牽牛尅伐之藥。豈不誤哉。況牽牛止能泄氣中之濕熱。不能除血中之濕熱。如濕從下受之。下焦主血。血中之濕。宜澀

平之藥漸漸除之、反以辛烈猛厲如牽牛者泄之傷人元氣、其危殆必矣、況水濕脹滿之證、多由飲食失節勞役所傷、以致中氣不和、脾胃二藏失其納受運化之令。心火乘之、府藏之氣閉塞于內、經絡之氣壅滯于外、當此之際、藥宜溫平、不寒不燥、不熱不滯、宜資生運脾等藥、攻補兩備者、日漸服之、屏去鹹甜、油膩厚味、戒酒絕慾、緩心保攝、靜是見功、若急用牽牛。大辛熱、氣味俱陽之藥、以泄水、泄元氣、利其小便、竭其津液、是謂重虛、輕病轉重、重病必危、故張文懿公云、牽牛不可服、脫人元氣、凡有傷酒食病痞者、多服牽牛丸散、取快一時、藥過仍痞、隨服隨效、效後復痞、以致久服、脫絕元氣、猶不知

悔也、昔張仲景治七種濕熱、小便不利諸證。無一藥用牽牛者、仲景豈不知牽牛能泄水濕利小便乎。正謂濕病之根在下焦、是血分中氣病。不可用辛辣之藥泄上焦太陰之氣、是血病瀉氣、使氣血俱損也、經云、毋實實。毋虛虛。此之謂也。用者戒之

繆仲淳先生曰、脹滿一證、多是脾胃與肺家濕熱之病、理應屬虛、何資瀉藥、況脹滿諸證、應用藥物、尋檢本草、所載良藥不乏、何至舍其萬全、而就不可必、不可保之毒物哉、從東垣老人、諄復其辭、以戒後人之勿輕用也、茲并附錄以詔後世云、

李瀕湖先生曰、牽牛自宋以後、北人常用取快、及劉守眞張子和出、又倡爲通用下藥、東垣老人、目擊其非。故著此說、極力闢之。然東漢時。此藥未入本草。故仲景公不知。假使知之。必有用法。不應捐棄。況仲景未用之藥亦多矣、執此而論。蓋矯枉過中者也。牽牛。治水氣在肺、喘滿腫脹、下焦鬱遏、腰背脹重。及大腸風秘氣秘。卓有殊功。但病在血分。及脾胃虛弱而痞滿者、則不可取快一時、及常服暗傷元氣也、一宗室夫人。年幾六十。平生苦腸結病、旬日一行。甚于生產。服養血潤腸藥、則泥膈不快。服硝黃通利藥。如若罔知。如此二十餘年矣。予診其人體肥厚、日事膏粱、而多憂鬱。日吐酸痰盌許。乃寬。又多火病。此乃三焦之氣壅滯、有升無降、津液皆化爲

痰飲。不能下滋腸府。非血燥比也。潤劑留滯。硝黃徒入血分。不能通氣。俱爲痰阻。故無效也。乃用牽牛末、皂莢膏丸與服。即便通利。不覺積年腸結。一服就順。亦不妨食、且復精爽、蓋牽牛能走氣分。通三焦。氣順則痰逐飲消。上下通快矣。外甥柳喬。素多酒色。病下極脹痛。二便不通。不能坐臥。立哭呻吟者七晝夜、醫用通利藥不效。遣人叩予。予思此乃濕熱之邪在精道。壅脹隧路。病在二陰之間。故前阻小便。後阻大便。病不在大腸膀胱也。乃用楝實、茴香、穿山甲、韭菜子。各一錢、入牽牛加倍、水煎服。一服而減、三服而平。牽牛能達右腎命門、走精隧、人所不知。惟東垣老人知之。故東垣治下焦陽虛天眞、

丹用牽牛以鹽水炒黑入佐沉香杜仲破故紙官桂諸藥深得補瀉兼施之妙方見醫學發明又東垣治脾濕太過通身浮腫喘不得臥腹如鼓海金沙散亦以牽牛爲君則東垣未嘗棄牽牛不用但貴施之得宜耳

○集方治一（十洲方）切積氣諸般痞聚或食或痰或死血等積用牽牛子不拘黑白一斛炒香研爲細末取六兩配陳皮四兩白豆仁三兩俱炒爲末煉蜜丸梧子大每服六十丸白湯下如未動再服當下積聚之物如尋常行氣消脹每服二十丸甚效○治一（承[illegible]方）切蟲積用牽牛子二兩炒研爲末檳榔一兩使君子肉五十箇（儒門事親）微炒俱爲末每服二錢沙糖湯調下小兒減半○治諸水飲病面浮氣促

本草彙言　〈卷六　牽牛子〉　三四

咳嗽水便不利足重用牽牛子頭末一兩茴香炒研三錢和勻每服一錢五分生薑湯乘熱調服當轉下氣也中病即止○治水氣腹脹用牽牛頭末每空心服一錢壯實者二錢白湯乘熱調服○治（千金方）蠱毒脹滿用黑牽牛子末三錢韭菜子末二錢白湯乘熱調服即下蠱毒○治（宛氏方）大腸風秘氣秘不通結滿脹滿用牽牛子頭末一兩桃仁去皮五錢研爲末煉蜜丸梧子大每服百丸白湯送○治腸癰（張三丰方）有膿脹閉不出用牽牛子頭末三錢大黃二錢穿山甲火煅二錢乳香沒藥各一錢俱爲末每服三錢白湯調服○治一（[illegible]）切痰飲氣壅嗽唾痰涎精神不爽胸膈迷悶頭目昏眩用牽牛子頭末一兩豬牙皂莢末五錢和勻每早晚各食後半時服一錢白湯乘熱調服○治心（同前）胃作痛攻刺不可忍用牽牛子頭末三錢玄胡索醋炒廣木香焙檳榔炒各三錢共爲末和入牽牛末內和勻每遇此病白湯調服二錢立止○治濕（普濟方）氣中滿氣急咳嗽小便不利足脛微腫用牽牛子末八錢厚朴薑汁炒一兩共爲丸梧子大每服二錢早晚白湯送下○治風（[illegible]）毒腳氣腫痛者用牽牛子爲末五錢每日空心服五分生薑湯調下○治寒（[illegible]氏方）結疝氣睪丸作痛用牽牛子三錢小茴香百粒川椒五十粒俱微炒共爲末空心酒調服二錢取出惡物效○治濕（聖濟方）熱頭痛用牽牛子七粒砂仁一粒俱研細末用井華水調稀汁仰灌鼻中

本草彙言　〈卷六　牽牛子〉　三五

待涎出即愈○治氣滯（本事方）腰痛用牽牛子二兩以新瓦燒赤安牽牛子于瓦上不得撥動待冷研爲極細末配硫黃末二錢同研勻每日五更取末藥二錢白湯調下即已如未已再作極神驗○治小（[illegible]）兒腫滿腹脹大小便不利用牽牛子研末三錢每服五分蘿蔔湯下或青皮煎湯下亦可○治小（全幼心鑑）兒馬脾風病因急驚肺脹喘滿胸高氣急脅縮鼻張咳嗽悶亂煩渴聲啞或痰聲如潮俗名馬脾風不急治旦夕即死用牽牛子炒半生半熟大黃檳榔炒俱取末一錢每用五分蜜湯調下如痰盛加真輕粉三分

紫葳花味酸，氣微寒，無毒。不可近鼻聞之，傷腦。氣花上露入人目，令人昏矇。

（蘇氏曰：紫葳，即凌霄花也。多生山中，今人家園圃亦有之。李氏曰：初作蔓生，依大樹上，漸延至巔，高數丈，年久者藤蔓大如杯。初春發枝，一枝數葉，尖長有齒。自夏至秋，一枝開花十數朵，如牽牛花，有五瓣，赭黃色，有細點。秋深更赤。八月結莢，如豆莢，長三寸許，其子輕薄，如榆莢仁、馬兜鈴仁。其根長，秋後采之，陰乾。）

○紫葳花，行血閉，通血絡之藥也。（[illegible]）其色赤豔，故曰紫葳；其蔓附木而上，高引數丈，故曰凌霄。其氣味酸寒，能行血涼血。甄氏方治婦人肝熱血閉，經水不行，致成寒熱羸瘦若勞。又治產後血脉淋瀝，崩止不常，及男子血風酒皶面上風刺諸疾，但其性利而善攻，走而不守，破血行血，是其專職，虛人禁用。

李時珍先生曰：凌霄花及根，甘酸而寒，莖葉純苦，為厥陰肝經兼入少陽膽經藥也。走血分，留難諸證，故本經主癥瘕寒熱，血崩血閉，產乳餘病。觀其鼻聞傷腦，入目損睛，則非善物可知。

○集方：治婦人血崩，（丹溪纂要）由血阻留滯而成者，用凌霄花為末，每酒服二錢，數服後，血少止，隨住服，而服四物湯丸調理。○治血閉不行，（徐氏胎產方）用凌霄花為末，每服二錢，食前酒調送。○治婦人血閉不行，（楊氏產寶）或乾血勞漸羸瘦，少食寒熱，癥瘕，用凌霄花一兩，乾漆五錢，俱酒炒，當歸身、白朮、枸杞子、黃耆、川芎各二兩，俱為末，懷熟地四兩，酒煮搗膏，為丸梧子大，每早服五錢，酒送下。○治鼻上酒皶及風熱粉刺，（楊氏家藏）用凌霄花五錢，硫黃一兩，胡桃肉四箇，膩粉一錢，研膏，生絹包揩。○治男婦大小通身風癢，（[illegible]）用凌霄花為末，酒服一錢，二三次愈，小兒減半。○治走皮趨瘡，滿頰滿頭，浸淫濕爛，延及兩耳，癢而出水，發歇不定，（[illegible]）用凌霄花并莖葉亦可，煎湯日日洗之。○治嬰兒百日內，無故（普濟方）口青不食乳，用凌霄花、大藍葉、芒硝、酒製大黃各等分，為末，以羊骨髓為丸，如黍米大，每研一丸，以乳送下，便可。虛乳寒者勿服。○治大風癘疾，（[illegible]）用凌霄花一兩，地龍焙，殭蠶炒，全蠍炒，各二十一箇，共為末，每服五錢，溫酒調下。先以凌霄花煎湯洗過，服此藥出臭汗，數服漸效。○治婦人陰癬陰瘡，（[illegible]）用凌霄花為末，用鯉魚膽調搽。

營實墻蘼味酸濇，氣微寒，無毒。入足陽明經。（李氏曰：此草蔓延柔靡，依墻者而生，故名墻蘼。其莖多刺，牛喜食之。其子成簇，如營星然，故又名營實。陶隱居曰：野生林塹籬落間，或墻上。春抽嫩苗，既長則成叢，似蔓而莖硬，多刺。小葉尖薄，有細齒。四五月開花，四出，黃心，有粉紅色、白色二者。結子成簇，生青熟紅，有白毫，其核似金櫻子核。八月采之。根采無時，以白花者良。莖葉可烹茶，根可造酒，皆香美。園圃栽玩者，莖粗葉大，延長數丈，花亦厚大，有白、黃、紅、紫數色。花最大者名佛見笑，小者名木香，花皆香艷可人，不入藥用。南番有薔薇露，云是此花之露水，香馥異常。）

○營實：凉血解毒，利關節之藥也。蜀本草主血熱成癰，逆生疔腫惡毒，或風熱暑濕之氣，留滯筋脈，致關節不利，腫痛若痺。釀酒服，立時消解。葢此藥華于春，而實于夏，得木火之化。其氣芬芳，宜其有通暢血脈，發越毒氣之用也。其根，性味歛濇，別錄方主久痢赤白，腸風瀉血，及小便餘瀝，消渴生津，金瘡潰敗，生肉復肌，口瘡牙疾，破爛膿疰等證。用此無非取歛濇收平之意云。惜乎用之頗稀，爲世人鮮知故也。

○集方：治血熱癰腫及熱疹暑毒，流連不已。用營實子（炒燥，研碎）二兩，金銀花三兩，晒乾，浸酒飲，漸愈。○治關節四肢筋骨攣痛，舉動不便，或着風寒暑濕，四氣成痺，或患楊梅瘡毒，悞服輕粉，致結毒不散，遍身筋骨疼痛。野墻蘼根皮（酒洗淨）一兩，五加皮、木瓜、當歸、土茯苓各五錢。每日用水五碗，煎二碗，徐徐服。日用一劑。○治赤白痢，或腸風瀉血。用墻蘼根皮二兩，白芍藥（酒炒）五錢，甘草一錢，水煎服。○治小便失禁自遺。用墻蘼根皮一兩，茯苓二錢，北五味一錢，水煎服。○治三消引飲不厭，或小便日多。用墻蘼根皮二兩，甘草三錢，水煎代茶飲。○治金瘡腫痛，或潰爛不收。用墻蘼根皮二兩，水煎服，再取燒灰存性，研細末，摻瘡口。○治牙疳濕爛，膿水內疰。用墻蘼根燒灰存性，加枯礬少許，爲末，日日摻之。○治口瘡因心胃熱者。用墻蘼根燒灰，川黃柏炒，各三錢，甘草一錢，共爲末，摻口內。○治箭刺入肉不出。用墻蘼根燒灰，摻外。內服鼠粘子，生研五錢，酒調服，卽穿皮出也。○治少小睡中遺尿不自覺。用墻蘼根，酒煎飲之。

月月紅味甘，氣溫，無毒。又名月季花。（李氏曰：月月紅，南方處處人家多栽種之，亦薔薇類也。青莖長蔓，硬刺，亦有叢生者。葉小于薔薇，而花深紅色，千葉厚瓣，不結子，逐月開放，故名。今西北地亦有之。）

○月月紅：活血消毒之藥也。談氏家寶方治瘰癧未破。用花或枝頭五錢，芫花炒三錢，入大鯽魚腹中，封固，用線紥定，酒水各一碗，煮熟，去藥，食魚三箇，卽愈。魚須放糞水內游半日方效，或活或死皆可用。

栝樓實。味甘微苦。氣寒無毒。氣厚味薄。陰也。入手少陰太陰經。

（蘇氏曰。栝樓。出弘農陝州山谷者最勝。今江南江北處浙河南山野僻地間亦有。三月生苗。引藤蔓。葉如甜瓜葉。窄而有叉。背面具有白毛。六月開花。似葫蘆花而淺黃色。結實在花下。大如拳。生時青白。如瓜。九月黃熟。如柿。形有正圓者。長銳者。功用並同。內有扁子。如南瓜子。殼色褐。仁色綠。多脂。作青草氣。李氏曰。根直下生。年久者長數尺。秋後采者。結實有粉。他時便多筋脈矣。雷氏曰。修治去殼皮革膜及脂。取根用。大二三圍者。去皮搗爛。以水澄過。瀉白如雪。名天花粉。）

○栝樓仁。潤肺消痰。清火止渴之藥也。（李時珍）其體油潤多脂。專主心肺胸胃。一切燥熱鬱熱。逆于氣分。食痰積垢。滯于中脘。凡屬有形無形。在上者可降。在下者可行。其甘寒而潤。寒可以下氣降痰。潤可以通便利結。故仲景治胸

痺痛。引心背。或欬唾喘急。及傷寒煩熱。結胸滿痛。大便不通。皆用此藥。取寒潤不犯胃氣。能降上焦心肺之火。而使結熱下行也。但性潤寒滑。如脾胃虛冷作瀉者。勿服。

朱丹溪老人曰。栝樓實。古方專治胸痺。以其味甘性潤。甘能養肺潤。能降氣。胸中有痰者。乃肺受火逼。失其降下之令。今得甘緩潤下之助。則痰自降。宜其前賢為治嗽之要藥也。又能洗滌胸膈中垢膩鬱熱。如湯沃雪也。

盧子由先生曰。形如包括之囊。實列重樓之象。故曰括樓。氣味甘寒。遂治火熱。體質濡潤。遂治燥涸。或液燥涸致熱結聚。或熱結聚致液燥涸。遂成消渴煩滿者。悉宜用之。根實功力稍有異同。實主鬱遏。不能分解。根主散漫。失于容平。靡不以熱為因。以燥為證。顧天花瑞雪之名。則思過半矣。

顧虛齋先生曰。栝樓實連皮帶子。搗細酒煎服。立消癰疽乳毒。謂其寒潤能解火熱鬱結。能達經絡也。

○集方。（方氏家宗）治心肺有鬱火。或氣結。或食積。或痰結。壅閉中脘為脹為痛。用栝樓仁去油。六錢。川黃連。廣陳皮。白豆仁。製半夏各二錢。生薑十片。水煎服。○治諸咳嗽不止。（同前）不拘寒痰熱痰風痰濕痰氣痰食積痰。用栝樓仁一觔。去殼研細。絞去油。淨霜三兩。配陳膽星川貝母各一兩。和勻。每遇痰證除虛勞血燥不治外。每用一錢。寒痰用

生薑湯調下。熱痰燈心湯下。風痰用製熟附子三分煎湯下。濕痰白朮湯下。氣閉痰牙皂湯下。食積痰枳實湯下。如氣虛不運生痰濃煎人參湯下。○治傷寒食熱結胸。（仲景方）用栝樓仁五錢。枳實二錢。川黃連一錢。水煎服。○治傷寒熱盛發黃。（方外正宗）用栝樓霜五錢。白湯調服。○治胸中痺痛引背。（金匱方）喘息欬唾。短氣寸脈沉遲關脉緊數。用大栝樓一箇連皮搗爛。配生薑一兩。製半夏一兩。水七碗煎二碗。徐徐服。○治婦人夜熱痰嗽。（丹溪）月經不調。形瘦者。用栝樓仁研爛。香附童便浸。各二錢。甘草五分。每日煎服一劑。○治小兒痰喘咳嗽久不瘥。（劉同生方）兼膈熱者。用栝樓仁去油取霜。每日用五分。配抱龍丸一圓。生薑湯調服。○治

傷酒成痰咳嗽用此救肺。用栝樓仁去油取霜每早晚各服五分廣陳皮湯調下。○治痰火頭痛（聖惠方）用栝樓仁五錢川芎七分甘菊花一錢水煎服。○治黃疸身面睛皆（普濟方）黃者用栝樓仁三錢茵陳草五錢燈心五十枚水煎服○治小便不通（聖惠方）因傷火酒炙煿并藏垢敗精不行脹悶溺澀者用栝樓霜五錢川牛膝一兩微炒共爲極細末和勻每服三錢白湯調送。○治燥渴腸秘（寇氏衍義）冬月取栝樓熟瓤炒爲末食前沸湯調服二錢。○治吐血不止（聖濟錄）用大栝樓一箇鹽泥裹固煆存性研細糯米飲調服日再服○治腸風下血（普濟方）用栝樓一箇燒灰爲末每空心將酒服一錢。○治堅齒烏鬚方用大栝樓一箇開頂入青鹽二

兩杏仁三七粒將原頂合好紮定以細滋泥和鹽泥固濟炭火煆存性去泥取栝樓炭研末每日揩牙三次不惟齒牙堅固鬚亦轉黑也。○治面黑令白（聖濟錄）用栝樓一箇杏仁一兩去皮猪胰一具同研如膏每夜塗之令面光白冬月不燥。○治乳汁不下（[illegible]氏方）用栝樓仁炒研酒調服二錢合面臥一夜乳行。○治乳癰初起（子母秘錄）用熟栝樓一箇連皮帶子搗爛當歸尾三錢酒水各二碗煎一碗服渣再煎即消。○治便毒初起用栝樓一箇搗爛大黃三錢水煎速服效。

天花粉（即栝樓根）味甘微苦氣寒無毒挖深土者晒乾刮去麄皮淨切片用。

○天花粉降火清痰生津止渴解疽消癰之藥也。此藥稟天地清陰之氣以生甘寒和平退五臟鬱熱如心火盛而舌乾口燥肺火盛而咽腫喉痺脾火盛而口舌齒腫痰火盛而咳嗽不寧若肝火之脇脹走注腎火之骨蒸煩熱或癰疽已潰未潰而熱毒不散或五疸身目俱黃而小水若淋若澁是皆火熱鬱結所致惟此劑能開鬱結降痰火並能治之又曰天花粉其性甘寒善能治渴從補藥而治虛渴從涼藥而治火渴從氣藥而治鬱渴從血藥而治煩渴乃治渴之神藥也又曰乾葛其性辛

寒可治表渴花粉其性甘寒可治裏渴若汗下之後亡液而作渴者花粉不可妄投必用人參之甘溫以生津治渴可也陰虛火動津液不能上乘而作渴者花粉不可概施必用知母之甘潤以滋陰治渴可也又有五味子酸斂生津其渴自止麥門冬潤燥生津其渴不生茯苓有利水活津之妙烏梅有濟水奪津之功是皆生津止渴之藥也雖然花粉乃中和之劑其證當用人參之甘溫而反用花粉之甘寒必至損胃而伐陽矣當用乾葛之辛寒而反用花粉之沉寒必至引邪以入裏矣二者辨明而用斯無疑悞之弊矣但性寒而降如脾胃虛寒作泄者勿服。

○集方治心經火盛，舌乾口燥，用天花粉一兩，甘草三錢，水煎服。○治肺經火盛，咽腫喉脹，用天花粉一兩，桔梗、荊芥各三錢，甘草一錢，水煎服。○治脾經火盛，口齒牙齦腫痛，用天花粉五錢，白芍藥、薄荷各三錢，甘草一錢，水煎服。○治肝經火盛，脇肋脹悶，遍身走注疼痛，用天花粉五錢，牡丹皮、白芍藥、白芥子各二錢，水煎服。○治腎經火盛，骨蒸煩熱，口燥咽乾，小便淋濁，用天花粉五錢，懷生地、菟絲子、山茱萸、牡丹皮、黃栢、知母各二錢，澤瀉一錢，水煎服。○治內（正宗）熱痰多咳嗽，用天花粉一兩，杏仁、桑皮、貝母各三錢，桔梗、甘草各一錢，水煎服。○治傷寒熱極煩渴，用天花粉五錢，知母、麥門冬各三錢，內有

宿食者，加枳實三錢；虛甚者，加人參三錢，甘草一錢，水煎服。○治諸病煩渴（手集方），用天花粉二兩，淡竹葉、麥門冬、知母各三錢，甘草一錢，生薑三片，水煎服。○治男婦大小（正宗），不拘壯盛老弱，一切疸疾，用天花粉二兩，茵陳五錢，水煎代茶飲。○治一切癰腫初起（王氏方），用天花粉二兩，連翹、金銀花、紫花地丁各五錢，甘草一錢，水煎服。初起可定，熱痛膿後加白芷三錢，亦可托裏。○治偏疝痛極（本草彙箋），服此立止，如刲，用綿袋包暖陰囊，取天花粉一兩，以醇酒二碗浸之，自卯至午，微煎滚，空中露一夜，次早低櫈坐定，兩手按膝，飲下，即愈。未愈再一服。○治乳癰腫硬疼痛（永類），用天花粉一兩，酒水各一碗，煎服，漸消。亦可治乳汁不行。

○治折傷腫痛，用天花粉生鮮者，搗敷，重布裹之，熱除痛即止。○治箭鏃不出，用天花粉搗敷之，日三易，自出。○治痘後目瘴，用天花粉三錢，蛇蛻二錢，俱炒黃，爲極細末，用嫩羊肝一具，切開，入末藥在內，米泔水煮熟，切片食。

○倪朱謨曰：先君在粵，飲酒多，日忽患泄瀉。粵人丘杏山，名醫也，屢用健脾燥濕之劑，泄瀉愈甚；更用止澀之藥，其病照常不減。偶過友人薛東軒寓中，有天花粉散子彼，因吐血，一醫用天花粉一味，搗爛，用布袋盛，取漿澄乾，晒成白粉，用白湯調數錢，和白蜜少許，日服二次。先君過彼，口渴索茶，彼亦調一碗勸服，勉應彼意，即覺腹

中爽快，是日晚不泄瀉。次早懇彼一包，計十兩餘，如彼法服之，七日泄瀉竟止。余細思此係酒熱傷藏氣，故泄瀉也；服健脾香燥藥，故轉劇耳。宜乎甘寒天花粉之與蜂蜜也。

治驚悸不寧（萬氏家傳），是心虛痰火內閉也，將成怔忡健忘癇迷風癲之證。用加味溫膽湯：用天花粉、黑山梔仁、竹茹、人參、酸棗仁炒、茯苓、當歸、生地、川貝母、半夏、陳皮、膽星、麥門冬、黃耆、白芍藥各一兩五錢，俱酒拌炒，甘草八錢，分作十劑，每劑加生薑三片，黑棗五個，水煎服。○治小兒喘嗽發熱，氣喘吐痰，有血，用天花粉、沙參各五錢，爲末，每服五分，白湯調下。

王瓜。味苦。氣寒。無毒。（一云有小毒。能發吐下。其名實是土瓜。王。土字之誤也。）

（蘇氏曰。月令四月王瓜生。即此也。其根作土腥氣。其實似瓜也。李氏曰。土瓜生平澤田野。及籬塹墻垣處處俱有。四月生苗延蔓。葉如栝樓葉。但無叉缺。有毛刺。一說葉圓如馬蹄而有尖。面青背淡。澁而不光。六七月開單瓣五出小黃花。成簇結子。纍纍如彈丸。皮粗澁。生青熟黃赤。其殼徑一寸。長二寸。上微圓。下尖長。七八月熟。殼中子色赤。如螳螂頭。謂之赤雹子。其根如大指。又生淡黃細根。三五相連。北方出者。其子纍纍相連。大如棗形。狀稍有不同。若療黃疸。破瘀血。有者大勝也。）

○土瓜根。療黃疸。破瘀血。下蠱毒。利大小便之藥也。此藥稟清肅陰寒之氣。苦寒通利。除濕熱。熱毒入血分。諸病爲多。故大氏方。主治內疸熱結。瘀血內閉。蠱毒痰瘧。二便不通。及天行熱疾。酒毒石毒。鼠瘻疔癰等證。并取根及葉搗汁。少少與服。當吐下即愈。如胃虛內寒泄瀉少食之人戒用。

○土瓜子。潤肺化痰。清火止血之藥也。此藥寒潤流利。故大氏方。稱爲潤心肺。止吐血之暴熱。涼肝脾。退黃疸之久延。

○集方。治心肺伏熱。吐血衄血。用土瓜子。微炒。研細。空心服二錢。白湯送。○治黃疸胃熱。久不退。用土瓜子。微炒。煎湯飲。○治大便下血。用土瓜仁一兩。生地黃二兩。俱炒黑。黃連五錢。焙。共爲末。煉蜜丸梧子大。每服百丸。米飲下。○治痰熱頭風。用土瓜七箇。栝樓一箇。炒。牛蒡子四兩。焙。共爲末。每食後茶調下二錢。忌食動風發氣等物。○治瘀血作痛。不拘遍身腹脇等處。因血瘀者。用土瓜仁連瓜皮。陰陽燒存性。研末。無灰酒空心服二錢。○治經水不通。小腹滿。或經一月再見者。用土瓜根、白芍藥、桂枝、桃仁各二兩。共爲末。酒服方寸匕。日三次。○治中蠱毒。用土瓜根如指長三寸。切碎。以酒半升。浸二宿。服之。即吐下蠱物。

海上方。治結核。或生項側。在頸。在臂。在身。腫痛。多在皮裏膜外。是痰注不散。火氣鬱甚。則結堅硬。纍纍如果中核也。不須潰發。但熱散氣和。則自消矣。用土瓜子三錢。連翹、木通、黃柏、半夏、白附子、殭蠶、南星、金銀花、白芷、天門冬各二錢。蒼耳子、瓜蔞仁、當歸、生地黃各三錢。甘草一錢。水二大碗。煎半碗服。如延生不絕。加全蝎三個。流

至兩腋。加牡蠣粉火煅二錢。流至下部。加牛膝、萆薢各二錢。如發潰膿血者。本方去白附子、殭蠶、南星。加黃耆、白朮、茯苓各三錢。○治頸項耳後結核。三五成簇。不紅不腫。不痛不成膿者。用土瓜子、白蒺藜、懷熟地酒煮、山茱萸肉、山藥、茯苓、澤瀉、牡丹皮各四兩。除地黃酒煮搗膏外。餘藥俱微炒。磨爲細末。煉蜜丸梧子大。每早晚各三錢。白湯下。

葛根味辛甘氣平無毒氣味俱薄輕而上行浮而微降陽中陰也乃陽明經本藥（李氏曰葛根出江浙閩廣所在有之有野生有家種鹿食九草此其一也春生苗引藤延蔓長二三丈取用可作絺綌各以土地之宜以別精粗美惡耳葉有三尖如楓葉而長面青背淡七月開花成穗纍纍相綴紫粉色似豌豆花結實似小黃豆莢上有毛其子綠色而扁似梅核生嚼有腥氣八九月采之神農經所謂葛穀是也根外紫內白大如臂長八九尺以入土最深者良五月屯采根曝乾用陶隱居曰生南康廬陵閩最勝多肉少筋味甚甘美搗汁飲可解暑解瘟病大熱）

○葛根清風寒淨表邪解肌熱（劉[illegible]）止煩渴瀉胃火（[illegible]）之藥也嘗觀（[illegible]）發表散邪之藥其品亦多如麻黃拔太陽營分之寒桂枝解太陽衛分之風防風紫蘇散太陽在表之風寒藁本羌活散太陽在表之寒濕均稱發散藥也而葛根之發散亦入太陽亦散風寒又不同矣非若麻桂蘇防辛香溫燥發散而又有損中氣之候也非若藁本羌活發散而又有耗營血之虞也此藥枝莖蔓延繞走太陽一身經絡根長丈餘入土最深又得土陰之氣沉而且厚故神農經謂起陰氣除消渴身大熱明屬三陽表熱無寒之邪能散之清之之意也如傷風傷寒溫病熱病寒邪已去標陽已熾邪熱伏于肌腠之間非表非裏又非半表裏口燥煩渴仍頭痛發熱者必用葛根之甘寒清肌退熱可也否則舍葛根而用辛溫（如麻桂蘇防之類）不惟疎表過甚而元氣虛必致多汗亡陽矣然而葛根之性專在解肌解肌而熱自退解肌而渴自止解肌而汗自

收而本草諸書又言能發汗者非發三陽寒邪在表之汗也又非發風濕濕溫在經之汗也實乃發三陽寒鬱不解鬱極成熱之汗也又如太陽汗出不徹陽氣怫鬱其人面色緣緣正赤躁煩不知痛之所在短氣更發汗則愈宜葛根湯治之鬱解熱除汗出而邪自退此所以本草諸書言能發汗者此也但（[illegible]）體性陰潤對待熱涸如寒本濕本主氣及寒化標陰專令者所當避忌世人不但目為輕淺且以之從治嚴寒未有不致寇至者

江督陶先生曰按本草十劑云輕可去實麻黃葛根之屬蓋麻黃乃太陽經藥兼入肺經肺主皮毛葛根乃陽明經藥兼入脾經脾主肌肉二藥皆輕揚發散則一而所入所主迥然不同也

盧不遠先生曰外陽內陰有三陰漸長化炎熱為清涼之象

劉默齋先生曰甘寒清潔凡暴吐鮮血因胃熱致血者七劑立平果試屢驗也

李士材先生曰皆在陽明一經仲景治太陽陽明合病桂枝湯加麻黃葛根又有葛根芩連解肌湯用以斷太陽入陽明之路非即太陽藥也頭痛乃陽明中風宜葛根葱白湯若太陽初病未入陽明而頭痛者不可便服以發之是引邪入室也戒之

○集方（仲景方[illegible]）太陽病項背強几几無汗惡風者葛根湯主之用

葛根二兩桂枝白芍生薑各一兩。甘草五錢麻黃一兩。去節以水一斗。先煮葛根麻黃減二升。去白沫。內諸藥煮取三升。去滓溫服一升。覆取微汗。○太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之。○太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主之。即前方加半夏。○太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脉促者表未解也喘而汗出者葛根黃芩黃連湯主之用葛根四兩甘草一兩。黃芩黃連各一兩五錢以水四升。先煮葛根減一升。內諸藥煮取一升。去滓分溫再服。○治數種傷寒兼治天行時氣發熱頭痛煩渴脉洪者用葛根二兩江西豆豉三合生薑十片水一升煎半升服。○治陽明胃熱溫病

邪熱頭疼。發渴煩悶鼻乾不得眠。如渴甚嘔甚用葛根黃芩升麻知母石膏竹葉。○治斑疹初發壯熱點粒未透用葛根升麻桔梗前胡防風各一錢甘草五分水煎服。○治妊娠病時行熱疾發熱煩渴用葛根二兩煮湯頻飲。○治小兒熱疾煩渴或泄瀉者用葛根一兩煮湯頻頻服。○治心胃熱極吐血或衄血不止用葛根煮湯頻頻飲。○治過食熱物因下血者用葛根三兩甘草五錢菉豆二兩煮湯飲。○治酒醉不醒用生葛根數兩搗汁二升飲即愈。○治中諸藥毒發狂煩悶吐下欲死用葛根煮湯飲。○治解中鴆毒氣欲絕者用葛根研成粉取末升白湯調灌立甦。○治虎傷人瘡用生葛煮湯洗之仍搗末。白湯調服五錢。日夜四五次。立止痛。

葛穀味甘氣平。無毒。炒研末。白湯調服二錢。止熱毒下痢極驗。

葛花氣味同穀水煮飲。專解酒毒酒積。并腸風下血。

○倪朱謨曰葛性散而解熱鬱。能發汗。能止汗。有人病發熱頭痛身疼無汗而渴者。汪石樵用葛根四兩。甘草二錢防風五錢。水煎一大碗服。藥畢。大汗諸證解。有人病發熱頭痛身疼有汗而渴者。石樵用葛根四兩甘草三錢桂枝五錢黃耆一兩。水煎一大碗服藥畢。汗止身涼頭痛身疼亦止。又一人病白虎歷節風痛遍身痛且無定處或在肩背。或在腰脇或在臂腕或在手指掌前後

之間。或在足指脛膝上下。疼痛遊走不定其痛如虎咬不時昏暈晝夜大汗。石樵用葛根八兩白朮三兩。水煎十餘碗頻頻飲之。三日疾平。此三證余在南贛目睹其病姑記之。時癸亥季夏月也。

○倪朱謨曰西醫荀延生治時疫熱病煩躁不寐危證畢見用葛根數兩煎汁頻頻灌之。漸睡而病轉安。又治五色痢疾噤口不食身熱脉大勢甚危困。亦如法煎飲積痢日止胃口可食而安。

（萬病回春）治脚汗多出方用乾葛一二兩白礬五錢煎湯逐日洗脚連洗數日自然無汗

天門冬。味苦甘。性滯。氣寒平。無毒。氣薄味厚。陽中之陰。沉也。降也。入手太陰。足少陰經。氣分之藥也。

（陶隱居曰。天門冬。生奉高山谷。今處處有之。草之茂為虋。今俗作門。蔓茂而功用同麥門冬。故亦有門冬之稱。蘇氏曰。苗高潔地上。春生藤蔓。大如釵股。高丈餘。葉如絲杉纖細。青勁澁而無刺。一種。葉如茴香。尖細青疏滑而有刺。夏生細花白色。亦有黃紫二色者。結實在根枝之旁。其色黑。秋入伏後則無花。暗結實矣。根科生如百部。一科一二十枚。大如手指。圓實而長。根白色。亦有黃紫二色者。雜中者細。餘大葉殊不相類。蔓而者。無花有子。餘無他異。以根作湯。沐浴衣垢。越人呼為浣艸。七八月采根。日曬乾。去心用。丸散以酒煮。搗爛配用之。今江浙人以蜜糖蒸曝作菓。甚美。）

天門冬。潤燥滋陰。降火清肺之藥也。此藥稟大寒初之氣以生。得地之陰精獨厚。味苦微甘。沉降之質。統理肺腎火燥為病。如肺熱葉焦。發為痿癖。吐血咳嗽。煩渴傳

為腎消。骨蒸熱勞。諸證在所必需者也。如前人有謂殺三蟲。去伏尸者。因熱極血乾而生蟲。以成伏尸者也。有謂除偏痺。強骨髓者。因肺熱成痿。腎熱髓枯。筋槁不榮。而成偏痺者也。天門冬陰潤寒補。使燥者潤。熱者清。則三蟲可去。伏尸可除。骨髓堅強。偏痺可利矣。然必以元虛熱勝者宜之。倘胃寒脾弱。不食者。又不宜用也。

繆仲淳先生曰。若陰虛水涸。火起下焦。上炎于肺。發為痰喘咳逆者。天門冬誠為要藥。然大寒而苦。不利脾胃。陰虛之人。脾土衰弱。又以苦寒陰潤之物。損其胃氣。以致泄瀉惡食。則危殆矣。何者。後天元氣。生于胃氣。五藏之氣。皆因之以為盛衰者也。強則喜食而甘味。弱則惡食而不甘味。陰虛精絕之病。正賴脾胃之氣強。能納能消。以滋精氣。若脾胃先困。則是後天生氣之源絕矣。尤餌雖佳。總統于食。湯液雖妙。終屬于飲。若非胃氣無損。焉能納而消之。以各歸其根。奏平定之功哉。必不得已。當以薏苡仁。白茯苓。山藥。甘草。白芍藥同用。或用麥門冬以代之可也。誤用之必泄。

盧子由先生曰。門司出入。出即生也。冬司寒令。寒即水也。合天一生水。故名天門冬。天者。清肅為用。水者。澄湛為體。其能滌垢。亦謂得清肅澄湛之力耳。對待染汙不潔之氣。使形骸氣血。混濁不清。致偏痺不開。遂生三蟲伏尸。為欬。為血。為痰。為喘。為骨蒸。為勞瘵。咸相宜也。設

合寒邪。便當束置。蓋寒原屬水。法當逆治。非反佐順從之類。稟滯多脂。陰沉濡潤之物所宜。

李蘋湖先生曰。天門冬。清金降火。益水之上源。故能下通腎氣。故滋陰退熱。有效。同麥門冬。兼行手少陰。清心降火。使肺不犯邪。故止咳消痰。殊功。蓋腎主津液。燥則凝而為痰。得潤劑則化。所謂治痰之本也。

○集方　治陰虛咳嗽。吐血不止。骨蒸夜熱。或成肺痿肺癰。五勞七傷。諸般虛損。用天門冬。麥門冬。各一觔。懷熟地。懷生地。鱉甲。各八兩。茯苓。川貝母。山藥。沙參。人參。各二兩。紫菀。牡丹皮。各三兩。廣橘紅一兩。用水百念碗。大鍋內煎。取汁念碗。渣再煎二次。計共取汁四十碗。入砂鍋

内慢火緩緩煎、至一十碗。加煉蜜八兩、龜膠四兩、收入貯淨磁瓶内、不拘時、用白湯調數茶匙服。○治肺熱消渴。用天門冬、麥門冬、不去心、各八兩、北五味子、八錢、熬膏、加煉蜜少許收、每早晚白湯調服五六匙。○治婦人骨蒸。用天門冬、麥門冬、各八兩、青蒿一觔、鼈甲、北沙參、牛膝、白芍藥、地骨皮、生地、牡丹皮、各四兩、熬膏、煉蜜收。早晚白湯調服五六匙。○治老人大腸結燥不通。用天門冬、八兩、麥門冬、當歸、麻子仁、生地黄、各四兩、熬膏、煉蜜收、每早晚白湯調服十茶匙。○治諸般癰腫。用新鮮天門冬三四兩、洗淨搗爛、以好酒濾汁頓服、未効再服必愈。

化痰順氣、開鬱清火、定喘方、古名清氣化痰丸、今本稍增減一二味。用天門冬、湯泡去心、酒煮搗膏、杏仁、湯泡去皮、瓜蔞仁、去殼、蘇子、微炒、三味俱研細、各二兩、川貝母、白茯苓、桔梗、橘紅、山查肉、連翹、黄連、薑汁炒、香附米、童便炒、黄芩、酒炒、半夏、薑製、海石、各一兩五錢、真青黛五錢、皂角二兩、去皮弦子、熬汁、用右爲細末、用神麴、竹瀝打糊、和入皂角汁、爲丸梧子大、每服五十丸、食後白湯下。○治一切虛損、内熱、形容枯槁、四肢羸弱、飲食不進、腸胃乾澀、津液枯竭、久服補氣生血、煖胃和脾、用天門冬、去心、肉蓯蓉、各四兩、羊肉、去筋膜皮、淨三觔、好酒十壺、三味同煮、極爛搗膏、入人參、白术、當歸、黄芪、各三兩、俱研爲末、和入爲丸梧子大、每早晚服五錢、酒下。

百部　味苦、氣寒、無毒。入手太陰經。（蘇頌曰、百部生江湖淮陝齊魯州郡及處處山野皆有之。春生苗、作藤蔓、莖青肥、葉大而尖長、頗似竹葉、面青色而光、亦有細葉如茴香葉者。其根色白、長者近尺、新鮮者亦肥實、日乾則虛瘦無脂爾。其根多者叢數十枚、連屬如部落然、故名。三八月采根用。）

○百部、清痰利氣、治骨蒸勞嗽之聖藥也。故珠囊云、主肺熱上氣之咳嗽、治虛勞内灼之骨蒸。但其味苦、氣下泄。藥性論、主潤益肺金、其性長于殺蟲、傳尸、骨蒸勞熱、往往有蟲、故亦主之、亦天門冬之類、故皆治肺病。小兒疳熱有蟲、及蚘蟲、寸白蟲、蟯蟲、皆能去之。味專苦泄、脾虛胃弱人、宜兼養脾補胃藥同用、庶不傷胃氣。又燒烟熏樹木蛀蟲、觸烟即死、亦殺蠅蠓。日華子言之詳矣。又濃煎湯、洗牛馬猫狗蠅虱即去。又酒浸空心飲、去疥癬皮癩蟲瘡。

顧虛齋婦科方云、百部色白象肺、味苦入心、修長應肝、叢聚類腎、通治四藏、縕熱成勞者、一味熬膏、常服屢効。

○集方、治男婦三十年久嗽、用百部二十觔、搗取汁、煎如飴、加煉蜜一觔、收貯、每早午晚服方寸匕、白湯過。○治小兒咳嗽、用百部、炒、麻黄、去節、炒、各一兩、杏仁、去油淨、五錢、共爲末、煉蜜丸如龍眼核大、每服二丸、白湯下。○治遍身黄腫、用新鮮百部八兩、洗淨土、掛乾、搗爛、罨臍上、再以糯米半升、酒煑作飯、罨藥上、以帛包住、待二日後口内作酒氣、則水從小便中出、腫自消也。○治虱多

熏衣方、用百部爲末、燒烟爐內、以竹籠罩衣熏之、虱自落。亦煮湯洗衣。

滋陰降火湯。治陰火動發熱、咳嗽吐痰、喘急盜汗、口乾。此方與六味丸相兼服之。大補虛勞神効。用百部三錢、生地黃、熟地黃、天門冬、麥門冬、知母、川貝母、白朮、白芍藥、茯苓、黃耆、地骨皮各一錢五分。水煎服。骨蒸夜熱、加鼈甲三錢。盜汗不止、加炒酸棗仁二錢、倍黃耆。咳嗽痰多喘急。加沙參、人參各二錢。痰中帶血、加眞阿膠二錢。倍熟地黃。咽喉痒、或作痛、加桔梗、桑白皮、倍貝母。夢泄遺精。加山藥、芡實各五錢、牛膝二錢。小便淋濁、加車前子、萆薢各二錢。大便不結實、加炒山藥、炒扁豆各五錢。

○治久嗽不已、咳吐痰涎、重亡津液、漸成肺痿、下午發熱、鼻塞項強。胸脇脹滿、臥則偏左其嗽少止、偏右嗽必連發、甚則喘急、病必危殆。速宜百部湯主之。用百部、薏苡仁、百合、麥門冬、各三錢、桑白皮、白茯苓、沙參、黃耆、地骨皮各一錢五分。水煎服。

何首烏。味苦澀。氣溫。有微毒。入通于肝。外合于風。升也。陽也。入足厥陰。足少陰經。

蘇氏曰。此藥歷古本草。向未采入。于唐高宗養生集中始用。因順州南河縣。一何姓者。偶入山。見兩藤夜交。便即采食。其人素嘗衰弱多病。羸瘦不堪。髮黃面槁。食此。鬚髮轉黑。神彩精明。故有何首烏之稱。今在處有之。但海內外深山皆有。春生苗。延蔓附墻崖而生。莖紫色。如木蕖狀。葉似薯背。葉有光澤。單生不相對。其藤夜合晝踈。夏秋間開黃白色花。結子有稜。似蕎麥。雜小如栗粃。秋冬取根。小者似連拳。色分赤白。古云。赤雄白雌也。其草甚多。但取根之大者。又不多得耳。存地五十年者。如拳大。號山奴。服之一年。髮髭青黑。百年者。如盤大。號山哥。服之一年。面顏紅悅。百五十年者。如盆大。號山伯。服之一年。齒落更生。二百年者。如一斗栲栳大。號山翁。服之一年。面如童子。行及奔馬。三百年者。如三斗栲栳大。號山精。或似鳥獸山岳之狀。此純陽之體。服之一年。成地仙也。李氏曰。凡諸名山深谷產者。堅大而佳。采時洗去土。采用竹刀刮去皮。石臼內木杵搗碎。用黑豆減半。拌勻。酒潤三日。乘日曬乾。甑上蒸一次。曬一次。酒潤一次。計九次。此其服氣入藥用。倪朱謨曰。已上諸說。具見諸家本草。有人依法修製。信服有年。亦未見其確驗。但生子延壽之說。似屬荒唐。姑集此。惟聽高明用舍何如耳。

○何首烏。固精斂氣。截瘧止痢之藥也。此藥味極苦澀。生用氣寒。性斂有毒。製熟氣溫。無毒。前人稱爲補精益血。種嗣延年。又不可盡信其說。但觀開寶方所云治瘰癧。消癰腫。滅五痔。（氣。血。毒。蟲。濕。五痔）去頭面熱瘡。蘇腿足軟風。其作用非補益可知矣。惟其性善收澁。其精滑者可固。痢泄者可止。久瘧虛氣散漫者可截。此亦莫非意擬之辭耳。倘屬元陽不固而精遺。中氣衰陷而泄痢。脾元困疲而瘧發不已。此三證自當以甘溫培養之劑治之。又不必假此苦澁腥劣寒毒損胃之物所取効也。

陳月坡先生曰。按何首烏。藥中之草類也。野生窮崖幽谷。小者如茄。大者如拳。五十年氣足可采。取時洗淨土氣。或切片。或搗碎。用黑豆和酒。拌蒸九次。取其性氣收澁。凡精血漏泄之證。有養腎秘精之功。可保無遺泄之患。雖然。又不藉此一物之力。必配大劑參耆歸地枸杞。山茱萸。山藥。金櫻子輩。共濟成功。若沾沾以一拳如許何首烏之力。而服逕一年。烏鬚黑髮。返老還童。不亦過誤乎。再推而進之。百年如盌大。百五十年如栲栳大。二百年如斗大之說。服之卽成地仙。前人見其五十年。僅大如拳矣。或有大如盌。大如栲栳。大如斗者。卽以百年。百五十年。以至二百三百年計之。不過懸斷之辭耳。不知此藥得深山靈氣而生。所生甚廣。求其大如盌。又不易耳。雖然。大如盌者不易。此積百歲方成故也。大如盌者不易。而每見有大如栲栳。大如斗者。又何以得耶。抑又有說也。大如盌者。積百歲而成。大如栲栳。大如斗者。可五年而完也。何也。積百歲者。得山林地氣漸長而成。可服食者也。見五年而卽完。如栲栳。如斗大者。得蟒毒。蛇毒之氣。驟結而成。不可服食者也。又不踰年。必自腐爛。倘食之。必致中急疾而死。施藥與受藥者。當自愼重可也。或又一說。何首烏初十年如彈。如栗。五十年如拳。百年如盌。力足矣。百年外。不復發苗。根漸腐壞。如山間偶得如栲栳大。斗大者。苗葉藤蔓酷似何首烏。實非何

首烏也。數年漸長大如斗。不及十年。隨腐爛不可服食。名爲宕芋。何首烏之于宕芋。如黃精之于鉤吻。石龍芮之于天灸。青葙子之于雞冠子。等類。良毒異殊。苗葉形實。初難別也。

再按此藥僻植窮谷。日受山林陰腐之氣最深。歲愈久。則毒愈劇。前人雖有多服延齡種子之說。實未必然。緩有服此而後得急疾至死。而人不能識。不能醫者。皆服此藥之毒。而不覺也。觀其氣之腥惡。味之慘烈。原非甘溫和平之品。製非九次勿殺其毒。非黑豆勿殺其勢。一近鐵器其毒愈酷。凡食物血肉之類。忌鐵器者。惟烹蛇則有之。要之前文所云。積受蟒蛇毒厲之氣而成者。或非虛語。不知生之士。多爲方外小人所惑也。

○集方。治瘰癧延蔓。寒熱羸瘦。乃肝鬱火鬱。久不治。成勞也。用何首烏如拳大者一觔。去皮。如前法製。配夏枯草四兩。當歸。土貝母。香附。各三兩。川芎一兩。共爲末。煉蜜

丸。每早晚各服三錢。○治時行火癧（已下八方俱見陳地迎稔）。或癰疽流發。遍身十數者。用何首烏。生搗十兩。紫花地丁。金銀花。各三兩。甘草一兩。陳皮五錢。白芷八錢。分作十劑。水煎服。○治五痔攻痛。用何首烏照前九製過。四兩。氣痔加人參。白术。烏藥。血痔加當歸。生地。黃柏。蟲痔加使君子。濕痔加蒼术。厚朴。龍膽草。四種每味各加三錢。惟毒痔加土茯苓八兩。打碎。炒燥。俱浸酒。每早晚隨量飲。○治頭面風熱。生瘡疹癍。并黚黯諸疾。用何首烏照前九製過一味浸酒飲。○治瘧邪在陰分。久不愈。用何首烏一兩。臨用炙。牛膝。陳皮。青皮。各四錢。當歸。白术。各三錢。虛甚加人參三錢。水煎服。○治四肢骨軟風疾。用何首烏一觔。照

前九製過川烏二兩。童便浸炒。草烏三錢。酒洗炒。川萆薢、枸杞子各八兩。爲末煉蜜作丸。早晚服三錢。或浸酒蒸一日。每日早晚隨量飲亦可。○治大風癩疾。用何首烏一觔。照前九製法。用胡麻八兩。去皮。蘄蛇一條。俱爲末。每服五錢。白湯調服。○治疥癬滿身。用何首烏一觔。連皮生搗碎。每日用四兩。生艾葉一兩。共煎湯洗浴。漸退。○治中蠱毒。用生鮮何首烏。連皮搗爛。和白湯二碗。絞汁。一氣飲。即吐立解。

○七寶美髯丹。烏鬚髮。壯筋骨。固精氣。續嗣延年。用赤白何首烏各一觔。一箇用黑豆二升。淘淨。共入米泔水浸一日。將何首烏磁瓦刮去皮。切作薄片。同黑豆拌勻。以砂鍋乘湯。木甑鋪豆與何首烏片蒸之。俟豆熟取出。揀去豆。將何首烏晒乾。再用黑豆二升淘淨。同晒乾首烏片。同蒸。如此九次。豆揀出俱不用。將首烏片。石臼內搗爛聽用。白茯苓二觔。去皮爲末。用人乳五碗拌勻晒乾。牛膝、菟絲子、當歸身、枸杞子各八兩。俱酒拌炒。補骨脂四兩。以黑芝麻拌炒。並忌鐵器。俱入石臼內搗爲細末。煉蜜丸彈子大。每早午晚各食前乾嚼。化湯酒任送。○治小兒龜背。用何首烏生搗爲末。用酒調敷背高處。久久自平。

萆薢味苦。氣平。無毒。陽中之陰。降也。入足陽明少陰厥陰經。

（別錄曰。萆薢生眞定山谷及河陝汴東荆蜀諸郡。皆有之。蘇氏曰。作蔓生。苗葉俱青。葉有三叉。似山薯葉。又似菉豆葉。花有紅黃白數種。亦有無花結白子者。根色黃白。多節。三指許大。大如商陸。莖有刺者。根白實。莖無刺者根虛軟。軟者入藥最佳。李氏曰。今成德軍所產一種。葉似蕎麥。子有三稜。根似山薯而體硬。又與菝葜少異。凡收采混眞。菝葜根作塊赤黃。萆薢根細長淺白。今市肆皆以土茯苓切片僞充萆薢。又以萆薢僞充爲狗脊。修治不拘時月。采根切片曬乾用。）

○萆薢。驅風濕。活血氣。蘇痺壓之藥也。善治足三陰經風寒濕熱之氣。以致腰背痛強。四肢痿痺。骨節拘攣。遍身五緩五急諸證。及脚氣腫痛。重墜難行。或腸風藏毒。血色紅黯。或白帶白濁。精滑淋瀝。或遍身惡瘡。延蔓不已。凡一切風濕穢毒留滯之疾。此藥去濁分清。活利血氣。並能治之。顧萆薢之名。宜于身之下部。更宜于痺閉不通之疾也。若下部無濕疾。陰虛火熾。溺有餘瀝。莖中作痛。并腎虛腰痛。此眞陰不足之候也。並不宜服。

王紹隆先生曰。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲拆。萌櫱自內解。乎從外也。萆薢主經脉勁強于外。（指痿痺拘攣之疾。）致關機失利于內。（指濁帶淋瀝之疾。）分理陽明濕熱流入下焦。客于肝腎諸證。方能解而通之。

王自薇先生曰。小便頻數。莖中澁痛。其原有二。如房勞過多。精道虛竭而然者。以知柏地黃湯加麥冬、甘草治之。如强忍慾事。情鬱不發。敗精瘀腐。壅結精道而然者。

以萆薢一兩，煎飲立安。

○集方：治風寒濕熱之氣，病腰背痛強，足膝痹軟，或腰背痹軟，足膝痛強。用眞川萆薢一觔，杜仲、蒼朮、枸杞子、黄栢各四兩，俱酒洗炒，研爲末，每旦白湯調服三錢。○治通身筋脉五緩（緩弛懈無力，即今之痿疾也）五急（急拘攣不舒，即今之痹疾也）四肢不能舉動，用萆薢一觔，酒洗炒，黄栢鹽水炒，白朮土拌炒，薑黄童便拌炒，各四兩，俱研爲末，每旦服四錢，白湯調服。如胃強能食者，加葳靈仙，酒炒，四兩（爲末和入）。○治脚氣腫痛，不能動履，不論寒熱虛實，久病暴發，皆可用萆薢五錢，黄栢、蒼朮、牛膝、木瓜、猪苓、澤瀉、檳榔各二錢，水二大碗，煎一碗，每日食前服一劑。○治腸風臟毒，血色或紅或黯，用川萆薢、貫仲各一兩，柿餅一箇，蒼朮五錢，水煎，食前服。○治男子白濁，婦人白帶，久不愈，用萆薢三錢，金櫻子五錢，白朮、蒼朮各二錢，甘草一錢。如白帶，本方加當歸、川芎各二錢；如白濁，本方加淡竹葉、牛膝各二錢，水煎，食前服。○治遺精夢泄，用萆薢子、金櫻子、龍骨煅、牡蠣煅各五錢，共研末和勻，每早服三錢，白湯送。○治通身惡瘡，用萆薢四兩，紫花地丁三兩，半枝蓮、連翹、甘菊花、荆芥、生地黄各二兩，蒸酒飲。○治白濁頻數，漩出稠濁，澄下如膏，或龜頭浸漬濕爛，乃眞元不足，下焦虛寒，用萆薢五錢，石菖蒲、益智仁各三錢，烏藥一錢，食鹽五分，水煎服。

土茯苓，味甘淡，氣平，無毒。

李氏曰：土茯苓生楚蜀閩浙山箐及海畔山谷中。蔓生如蓴，莖有細點，葉類竹，闊大厚而且滑，又如瑞香花葉而長，有五六寸。其根狀如菝葜而圓，小者如雞卵子，大者如拳，連綴而生，即零者遠不及尺，皮似茯苓，色有赤白，肉似芋薯，味甘兼濇，亦可生啖，入藥以色白者爲佳。又按東山經云：鼓證山前有奇草焉，名曰榮草，饑可充穀。其葉如柳如竹，其根如卵如拳，食之已風。并療筋攣惡毒內注，用斯乃安，恐即此也。

○土茯苓，去風濕，利關節，治拘攣骨痛，解惡瘡結毒之藥也。陳氏救荒本草言能代穀不饑，健脾胃，壯筋力，止泄瀉者，因氣味甘平而無消伐之性也。李氏方又言能蠲結毒，解內注汞粉藥氣者，因味甘兼淡，淡能利竅，淡能發留結，淡能泄陳垢耳。故惡瘡有服水銀輕粉，外雖光潔，內注筋骨，久而破爛，復潰，致成廢疾，以此熬汁屢服數月，不惟積毒漸消，且得補益之力。

薛立齋先生曰：楊梅瘡古方不載，[illegible]正德間起于嶺表，傳及四方。蓋嶺表風土炎熱，嵐瘴薰蒸，男女淫猥，濕熱之邪積蓄既深，發爲毒瘡，互相傳染，然皆淫邪之人病之。其證多屬厥陰、陽明二經，而兼乎他經。邪之所在，則先發出。蓋相火屬于厥陰，肌肉屬于陽明，如兼少陰、太陰，則發咽喉；兼太陽、少陽，則發頭耳也。醫用輕粉銀硃劫劑，五七日即愈。蓋水銀性走而不守，加以鹽礬昇爲輕粉銀硃，其性燥烈，善逐痰涎，痰涎被劫，隨火上升，從喉頰齒縫而出，故瘡即乾痿而愈。然毒氣竄入經絡筋骨之間，莫之能出，涎乃脾之液，痰涎既去，血液耗

涸。筋失所養。營衛不從。變爲筋骨攣痛。發爲癰毒疳漏。久則生蟲。爲癰。爲癩。內經所謂濕氣害人皮肉筋骨者也。土茯苓甘淡而平。爲陽明本藥。能健脾胃。去風濕。風濕旣去。則營衛從而筋脉柔。肌肉實而拘攣癰漏愈矣。初病服之不效者。火盛而濕方鬱也。此藥長于去濕。不能去熱。病久則熱衰氣耗。而濕鬱爲多故也。李瀕湖綱目。有搜風解毒湯。治楊梅瘡。病深者月餘。淺者半月卽愈。服輕粉藥。筋骨攣痛。癱瘓不能動履者。服之亦効。其方用土茯苓一兩。薏苡仁。金銀花。防風。木瓜。木通。白鮮皮各五分。皂莢子四分。氣虛加人參七分。血虛加當歸七分。水二大盌。煎飲。日三服。惟忌飲茶及牛羊雞鵝魚

肉燒酒麵房勞。蓋秘方也。

○集方。治楊梅瘡。因服輕粉。致傷內藏氣血。筋骨疼痛。久而積爛成癰。筋攣潰漏。連年累月。至于終身成廢疾者。用土茯苓二兩。有熱。加川連。連翹。花粉。氣虛。加四君子。血虛。加四物湯。水煎代茶。月餘卽安。○治瘰癧潰爛。用土茯苓切片。水煎服。或入粥內食之。須久食爲妙。

治頭風神方。用土茯苓一觔。金銀花三兩。蔓荆子一兩二錢。玄參。防風。天麻。辛荑。川芎。芽茶各一兩。黑豆三百粒。分作五帖。每帖用河水二碗。煎八分。食後服。

白歛。味苦甘。氣平。微寒。無毒。（寇氏曰。白歛服食方少用。惟歛瘡方多作散藥敷擦。多用之。故名。蘇氏曰。生衡山山谷。今江淮及荆襄懷孟商齊諸州皆有之。二月生苗。多在林中作蔓。赤莖。葉小如桑。五月開花。七月結實。根如雞鴨卵而稍長。三五同窠。皮黑肉白。八月采根。洗淨切片。以竹條穿。日乾用。又一種赤歛。花實功用少別。但表裏俱赤也。）

○白歛。歛瘡口。拔疔毒之藥也。此藥甘苦寒平。故前古主癰腫疽瘡。散結止痛。未膿可消。已膿可拔。膿盡可歛。又治女子陰中腫痛。帶下赤白。總屬營氣不和。血分有熱者。咸宜用之。敷貼服食。因病製作可也。

○集方。治發背癰毒疔瘡初起。用白歛研細末。水調敷上。

○治面鼻酒皶。用白歛。白石脂。杏仁各五錢。爲末。雞子清調搽。旦洗去。○治凍耳成瘡。用白歛四分。杏仁霜一

分。黃蘗末二分。共爲末。蜜和敷耳。○治湯火灼爛。用白歛末敷上卽收。○治女子陰中腫痛。用白歛爲細末。敷內外。○治諸瘡不歛。亦以白歛末敷之卽收。

第九八七冊　續修四庫全書　第6　版正內

山豆根，味苦，氣寒，無毒。

（蘇氏曰：山豆根出劍南宜州、果州及廣西忠州、萬州，莖蔓如大豆，葉青翠，經冬不凋。今廣南一種如小槐，高尺許，石鼠啖其根，捕取者收其腸胃暴乾，用以解毒攻熱甚效，不識果然否。）

○山豆根，通咽喉下結熱，解蠱毒之藥也。此藥苦寒清肅，得降下之令，善除肺胃鬱熱，如咽喉腫痺不通，小兒丹毒熱腫，婦人血氣腹脹，及痢疾赤白，急黃疸證，又療熱厥心痛，天行熱疹，五疳五痔，凡一切暴感熱疾，涼而解毒，表裏上下，無不宜之。但苦寒多泄，凡脾胃虛冷者勿服。

○集方：治喉風急證，牙關緊閉，水穀不下，用山豆根、白藥子各等分，水煎噙之，嚥下，二三日即愈。○治中蠱毒，用

山豆根和白湯研服，少頃未淨再服，已禁聲音者亦愈。○治小兒丹毒赤腫，以山豆根水磨，擦患處。○治女人血氣熱鬱成腹脹者，用山豆根同木香，白湯磨服。○治水蠱腹大有聲，面皮色黑者，用山豆根同烏藥，白湯磨服。○治赤白痢疾，用山豆根五錢，川黃連三錢，共為末，蜜丸梧子大，每服一錢，白湯下。○治五般急黃，用山豆根為末，白湯調服三錢，兼蠱氣者，以酒調下。○治熱厥心痛，以山豆根，白湯磨服少許。○治小兒五種熱疳，以山豆根為末，每服三分，白湯調服。○治血熱痔痛，用山豆根冷水磨服。

黃藥子，味極苦，氣寒，無毒。稟天地清寒之氣而生。

（蘇氏曰：黃藥子原出嶺南，今夔、陝州郡及明、越、秦、隴山中亦有之，以忠州、萬州者緊重為勝，他處輕虛不甚佳。莖生高三四尺，柔而有節，似藤非藤，根及莖葉大如拳，長二三寸，其根長尺許，大者圍二三寸，外褐內黃，亦有黃赤色者。一說其根濕時色紅，暴乾色黃，有人擣其根入染藍缸中，云易變色也。七月開白色花，其肉味酸，其核仁即黃藥之實。一說黃藥冬枯春生，開碎白花，無實。）

○黃藥子，降火涼血，解毒消癭之藥也。凡惡毒腫瘡，喉痺結熱等疾，并惡蛇毒犬咬傷，研末湯調服之，并塗敷患處，最效。治馬病心肺熱疾，水煎服特靈。大方科服食湯液中，今鮮用此。此物苦寒疏散，凡病血熱吐衄等證，古人曾有用之。若脾胃素弱易於作泄者，禁用。

王起凡先生曰：黃藥子解毒涼血最驗，古人于外科血證兩方嘗用，今人不復用者，因久服有脫髮之虞，知其為涼血散血明矣。故能療牛馬心肺熱疾云。

○集方：治人忽生癭疾一二年者，以萬州黃藥子八兩，須緊重者為上，如輕虛即是他處出者，力慢，用須加倍。取無灰酒一斗，投藥入中，封固瓶口，以糠火煨一復時，取起，待酒冷乃開瓶，時時飲一二盃，不令絕酒氣，經三五日，把鏡照看，覺消小即停飲，不爾令人項細也。其驗如神。○治吐血不止，用黃藥子一兩，水煎服。○治天泡毒瘡，用黃藥子為末搽之。○治蠱毒，搗汁飲，即吐出。

白藥子。味苦辛，氣寒，無毒。

（蘇氏曰：白藥子出原州，三月生苗，四月抽赤莖，葉似苦苣，蔓似壺蘆。六月開白色花，八月結子如瓜蔞，九月葉落。今西川、夔、施、合州、江西、嶺南亦有。一種葉似烏桕，子如綠豆，至六月變赤色。修治：九月采根，洗淨，切片，日乾。根皮黃色者多。）

○白藥子，涼血散血，解熱毒，消喉痺之藥也。唐本草主金瘡，生肌肉。藥性論又主喉中熱塞，噎痺不通，咽中腫痛。日華子又主吐血、衂血不止。詳味諸書所主，皆解熱散結之功，則其爲清爽之用明矣。如脾虛作瀉，胃弱少食者，切勿沾唇。

○集方：治吐血衂血不止，用白藥子一兩，紅棗肉減半，俱火燒存性，爲末，糯米湯調服二錢。○治咽喉腫痛，熱塞不通，用白藥子一兩，朴硝五錢，共爲末，每用少許吹入喉內。○治一切疳眼赤爛生翳，用白藥子一兩，甘草五錢，共爲末，猪肝一具，剖開摻藥末五錢，煑熟食之。○治癰腫不散，用生鮮白藥根擣貼，乾即易之，無生鮮者，研末水和貼。○治一切天行熱病，疥痒瘧。取白藥研如麪，二錢，用滾湯一碗，空腹調服，便仰臥一食頃，候心頭悶亂，或惡心，腹內如車鳴刺痛，良久當有吐利數行，勿怪。欲服藥時，先煑稀粥待冷，若吐利過度，即喫冷粥一碗止之。不爾，即困人。○治諸骨哽咽，用白藥煎米醋細嚥，在上即吐出，在下即瀉出。

威靈仙。味苦辛鹹，氣濕，無毒。可升可降，陰中陽也。入太陽經。

（馬氏曰：威靈仙出上洛山及華山平澤。今陝西、河東、河北、汴東、江湖州郡皆有。生處不聞水聲者良。生先衆草，初起作蔓，莖如釵股，有四稜，葉如楊柳，有層叠，每層有六七葉，環列如車輪。七月開花六出，淺紫色或碧白色，作穗似蒲臺子，亦有似菊花頭者。實青色。根稠密多鬚，似穀歲必敗朽，冬年旁引生苗，年久轉茂，一根叢鬚數百條，長二尺許。九月采根，濕時色黃黑，乾時色深黑，俗呼鐵脚威靈仙是也。別有一種，根鬚都酷肖，根色黃或白者，並不堪用。）

○威靈仙，主風濕痰飲之疾，通行十二經之藥也。治中風不語，手足頑痺，口眼喎斜，及筋骨痛風，腰膝冷疼，脐脹痠痛，癱風酷毒，皮膚風痒，腎臟風壅，頭風眩暈，腦漏流涕，傷寒痞氣，憎寒壯熱，黃疸黑疸，冷熱氣脹，胃痛膈氣，膀胱宿膿宿垢，惡水氣利，脚氣痔疾，瘰癧疥癬，婦人月閉，氣血衝心，產後惡露不行，及大人暗風、癇風、癲狂心風，小兒胎風、臍風等證，並皆治之。大抵此劑宜行五臟，通利經絡，其性好走，亦可橫行直往，追逐風濕邪氣，蕩除痰涎冷積，神功特奏。若多服疎人眞氣，凡病血虛生風，或氣虛生痰，脾虛不運，氣留生濕，生痰生飲者，咸宜禁之。倘不得已必需用者，倍加參、耆、歸、朮，庶幾乎。

李瀕湖先生曰：威，言其性猛也；靈仙，言其功神也。去風逐痰，行氣利水，朝用而夕行者也。故主久病宿冷之痼疾，禀壯氣强者，藉此便成大丹。倘元神稍虧，作此必有終凶之咎。

○集方。治中風（[illegible]）不語。手足頑痺。口眼喎斜。用威靈仙酒浸。九浸九蒸九晒。八兩。於白术。人參。黃耆。枸杞子。天麻。膽星各三兩。俱焙燥。研爲末。煉蜜丸。梧子大。每服五錢。白湯送。○治筋骨（同前）痛風。或腰冷痛。肘腂痠疼。用威靈仙。（製法如前）五兩。枸杞子。牛膝。杜仲。萆薢。木瓜。虎骨。當歸。各四兩。薑黃。二錢。川附子。五錢。童便製。羌獨活。酒炒。一兩。共研末。煉蜜丸。梧子大。每早服五錢。酒下。○治癘風（同前）酷毒。皮膚風瘡。及腎臟風癬等疾。用威靈八兩。（製法如前）胡麻子。浮萍。晒乾。皂角刺尖。白蒺藜。各六兩。烏稍蛇。一條。前藥俱製炒爲末。將蛇去腸肚。淨露天煑熟。拌藥末爲丸。如黍粒大。每早服五錢。白湯下。○治頭（同前）風眩暈。并腦漏流涕。用威靈仙四兩。（製法如前）白芷。辛夷。各一兩。白术。枸杞子。甘菊花。各二兩。共爲末。每早晚各食後服三錢。白湯調下。○治傷（林氏方）寒癠氣。憎寒壯熱。用威靈仙。酒炒過。紫蘇葉。各五錢。葱頭五莖。水煎服。○治黑疸（同前）黃疸。冷熱氣脹。用威靈仙。（製法如前）爲末。水發爲丸。如菉豆大。每服二錢。平明白湯送。微利惡物積滯。漸效。○治胃（陳氏方）痛膈氣。有停飲者。用威靈仙。（製法如前）醋一鍾。蜜一鍾。水一鍾。煎七分服之。吐出宿飲痰涎愈。○治膀胱（[illegible]）有宿膿宿垢。惡水氣利。用威靈仙一兩。（製法如前）水煎服。○治脚（千金方）氣入腹。脹悶喘急。用威靈仙。（製法如前）爲末。每服二錢。酒下。痛減一分。則藥亦減一分。○治痔（[illegible]）瘡腫痛。用威靈仙三兩。水七升。煎湯。先薰後洗。

冷再溫之。○治瘰癧結核。用威靈仙四兩。（製法如前）蜜陀僧一兩。火煅過。斑毛三十箇。去頭翅。共爲末。水發爲丸。如黍米大。每早晚食後服百丸。白湯下。○治男（[illegible]）婦大小人疥癬經年不愈。以威靈仙三兩。（製法如前）白术二兩。浸酒五壺。蒸一夜。每日隨時隨量飲。○治婦（同前）人經閉不行。并產後惡露停阻。用威靈仙四錢。（製法如前）官桂。木香。細辛。桃仁。去皮。牡丹皮。玄胡索。醋炒。五靈脂。濾去沙石。各三錢。共爲極細末。每服三錢。早晚用砂糖酒調送。○治痰（同前）迷心絡。人事昏憒。語言糢糊。視聽俱廢。飲食不進。大小不知。自遺不覺。病名痼風。用威靈仙五錢。白术三錢。當歸。半夏各二錢。豬牙皂角。石菖蒲各一錢。共爲末。每服三錢。五更生薑湯調服。如卒時昏倒。口吐涎沫。踰時即甦。病名癇風。如踰垣上屋。罵詈不避親疎。毀廢物件。甚至裸體披髮。晝夜狂妄。病名狂風。一併皆治。如小兒胎風臍風。每用二分。或三分。用燈心湯調送。○治患（[illegible]）楊梅瘡。服輕粉毒藥。年久不愈者。用威靈仙三觔。（製法如前）好酒十壺。封煑三炷香。取起。逐日飲之。以愈爲度。○治破（[illegible]）傷風。用威靈仙一兩。爲末。獨頭蒜一箇。香油三錢。同搗爛。熱酒沖服。汗出即愈。

茜草根。味苦。氣寒。無毒。禀土水之氣。而兼得天令少陽之氣以生者也。

（別錄曰。茜草根。出喬山山谷。即今染絳草也。東地諸處雖有而少。不如西出者多。詩云。茹藘在阪。即此是也。今圃人亦作畦種蒔。獲利殊厚。季冬生苗。蔓延數丈。方莖中空。外有細刺。數寸作節。每節五葉。似棗葉頭尖下闊。七月開花。結實如小椒。中有細子。以八月采根。銅刀切。日乾用。忌鐵器。外一種赤柳草根。形狀相似。只是味酸濇爲別。誤服令人患內瘡。速服甘草湯。其毒即解。）

○茜草根。散血行瘀。兼去痺痛之藥也。蜀本草治吐血衄血。產後血暈。及跌撲瘀血。能散血而行血也。別錄治痿躄脚氣。及骨節風痛。能疏痺而通經脈也。其色赤。入營分。味苦入心經。氣寒能凉血。散血而因血由熱結也。故時人稱爲行血甚捷。前人又言治黃疸。疸者濕與熱摶滯于血分。惟其散血行血。則濕熱亦行。而疸病自退矣。李氏又言治痛風。解瘡癤。亦是此意。但其氣性寒燥。風濕成痺。得寒燥而開。濕熱成疸。得寒燥而散。瘀血吐衄。得寒燥而止。故每用取效。若三證有屬精虛血少者。脾虛胃弱者。陰虛火勝者。俱禁用之。

沈則施先生曰。紅花。丹參。牡丹皮。赤芍藥。皆屬血藥。咸以色命名也。茜草色赤甚于四種。不曰赤草紅草。而曰茜草者。正見古人命名。深有取義。所云茜者。從草從西。取西方金氣。入通于肺。止吐衄暴血。由于肺病。獨擅其能。他如痺疸跌撲諸疾。咸治者。實取行散瘀血之功。推廣其意云。

○集方。治吐血暴出不止。用茜草根二兩。搗末。每早晚各服二錢。水煎服。○治衄血暴出不止。用茜草根。生艾葉各一兩。爲細末。烏梅肉三錢。搗勻煉蜜丸梧子大。每服三錢。白湯下。水煎服亦可。○治婦人五旬後復行經。用茜草根。生地黃各一兩。側柏葉。黃芩各五錢。分作五帖。每帖水二碗。煎八分服。○治跌撲瘀血。用茜草根二兩。紅花。桃仁各五錢。分作三劑服。○治脚氣并骨節風痛。因血熱者。用茜草根一兩。木瓜。牛膝。羌活各五錢。水煎服。○治黃疸。用茜草根。水煎代茶飲。漸退。○治女子經閉不通。用茜草根一兩。酒煎服之。一月即通。○治中蠱毒。吐下血如猪肝。用茜草根三兩。水二升。煮汁飲。立解。

○倪朱謨曰。茜草治血。能行能止。余嘗用酒製則行。醋炒則止。活血氣。疏經絡。治血鬱血痺諸證。最妙。無損血氣也。配歸芍用。大能有益婦人。

防已味苦辛，氣寒，無毒。陰也，降也，泄也，急方通劑也。（蘇氏曰：防已生黔中宜都建平，以漢中者爲勝，故方書多稱漢防已也。李氏曰：其莖如葛蔓延，其莖梗香而且嫩，苗葉酷類牽牛，折其莖一頭吹之，氣從中貫出。其根外白內黃，中心有黃黑紋暈，如車輻解者良。若他處木根強不柔，有黑點者不堪用。外有一種根作腥氣而皮皺，上有丁足子者，名木防已，性猶峻烈，不任用。而張仲景方治傷寒，有增減木防已湯；孫眞人治遺尿小便澁，亦有三物木防已湯。思此雖不及漢中，然隨病制宜，又非可棄也。又陳氏曰：漢、木二防已，卽是根苗爲名，不知是否。）

○防已祛風利濕，分決十二經水氣之藥也。故時方療水腫，除脚氣，推爲首劑。如前人之治溫瘧寒熱，肺閉喘嗽，皮節痛風，膀胱水蓄，二便不通，及癰疥蟲癬等疾，凡屬風濕、水濕、濕熱、濕痰爲病在下者，靡不奏効。然其性燥而不淳，多降下，善泄善走，長于除濕，治下焦腰下至足之

疾。如飲食勞倦，脾胃衰薄，元氣穀氣已虧，陰虛內熱，眞元不足，自汗盜汗，口苦舌乾，腎虛小水不利，脾虛作脹，肺虛喘嗽，及胎前產後，雖有下焦濕熱之證，愼毋輕用。

○東垣老人曰：按本草十劑云：通可去滯，通草、防已之屬。夫防已大苦寒，能瀉血中濕熱，通其滯塞，亦能行大腸，通小腸，泄陰瀉陽之藥。比之于人，則險而健者也。幸災樂禍，能首爲亂階。然善用之，亦可敵兇突險，此瞑眩之藥也。故聖人存而不廢。大抵聞其臭則可惡，下咽則令人身心煩亂，飲食減少。至于十二經有濕壅塞不通，及下注脚氣，除膀胱積熱，非此藥不可，眞行經之仙藥，無可代之者。若夫飲食勞倦，陰虛生內熱，元氣穀食已虧

[illegible]防已泄大[illegible]血此不可用[illegible]也。如人大渴引飲，是熱在上焦[illegible]氣分，宜滲泄而淸之，可已。防已乃下焦血分[illegible]也。外傷風寒，邪傳肺經，氣分不致小便[illegible]至不通，此上焦氣病，禁用血藥，此[illegible]用也。[illegible]下焦濕熱[illegible]不可用。惟下焦濕熱流[illegible]而用之。

[illegible]

[illegible]漢防已[illegible]錢水煎服。○治濕瘧[illegible]防已六[illegible]寒熱出[illegible]血分者用漢防已二錢，蒼朮、柴胡、半夏、檳榔、厚朴、黃芩、[illegible]各一錢，水煎服。○治肺氣鬱閉，喘嗽逆滿者，用漢防已一錢五分，桔梗五分，枳殼、紫蘇、杏仁、前胡各一錢，水煎服。○治四肢風痛，攣急不安，用漢防已、萆薢、牛膝、木瓜各三錢，白朮、防風、威靈仙（酒炒）、當歸、柴胡各一錢，水煎服。○治膀胱水蓄，脹滿幾成水腫，用漢防已二錢，車前、韭菜子、澤瀉各三錢，水煎服。○治因傷酒食肥甘濕麵厚味，濕熱脾傷，以致二便不通

用漢防已。木通。乾葛。陳皮。川黄連。澤瀉。紅麯。枳實各二錢。水煎服。○治遍身蟲癬瘑疥。用漢防已三兩。當歸。黄耆。各二兩。金銀花。一兩。煑酒飲之。○治膈間支飲。其人胸滿。心下痞堅。面黧黑。其脉沉緊。得之十數日。醫以吐下不愈。用漢防已二兩。人參。桂枝各二錢。石膏一兩。分作五劑。水煎服。如大便不通。加芒硝二錢。

○續補集方。治頭風暴痛。（澹寮方）用漢防已三錢。酒炒。水煎服。○治風濕相搏。（仲景方）關節沉痛微腫。用漢防已酒炒。五錢。黄耆。白朮。各六錢。甘草。炙。八分。生薑五片。大棗五枚。水煎服。

○治水臌脹。（楊氏方）用漢防已二兩。生薑五錢。同炒。隨入水煎服。半饑時飲之。

木通。味苦辛。氣微寒。無毒。味薄降也。陽中陰也。入手少陰。足太陽經。

（藺氏曰。木通。生石城山谷。及山陽。今澤潞漢中江淮湖南州郡皆有之。蔓樹蔓藤。大者其莖幹徑三五寸。每節二三枝。枝頭五葉。夏末開花紫色。亦有白色者。結實如小木瓜。長三四寸。瓤白核黑。食之甘美。枝即通草。莖有細孔。兩頭皆通。取一頭吹之。其氣直貫。色黄白者良。黑褐色者爲雨暘所侵。以致形色腐黑。用之力少。不及李氏曰。木通有紫白二色。紫者皮厚味辛苦。白者皮薄味淡苦。二者味雖少殊。通利氣分力同也。）

○木通。開心通竅。泄金鬱。利氣竅。行小便之藥也。本草主利九竅。除鬱熱。導小腸。治淋濁。定驚癇狂越。爲心與小腸要劑。所以治驚之劑。多用木通。驚由心氣鬱故也。心鬱既通。則小便自利。而驚癇狂越之病亦安矣。按十劑云。通可去滯。木通防已之屬。夫防已大苦寒。能瀉血中濕熱之滯。而通大便。木通大苦辛。能助西方秋氣下降。瀉氣中濕熱之滯。而利小便也。若肺受熱邪。津液氣化之源絕。則寒水斷流。膀胱受熱。癃閉約束。其證胸中煩熱。口燥咽乾。大渴引飲。小便淋瀝。或閉塞不通。脛痠脚熱。並宜木通主之。又遍身隱熱。疼痛拘急。足冷。皆是火熱傷血。血屬心。宜木通以通心竅。則經絡流行矣。故上能通心清肺。利九竅。下能泄濕熱。利小便。而通身拘痛古方導赤散用之。寔瀉南補北。扶西救東之意。但性燥而利。凡病陽虛氣弱。陰虛精血不足之證。內無濕熱鬱火者。并妊娠腰[illegible]無力。俱禁用之。

江瘤陶先生曰。木通[illegible]通輕虛。清陽之劑。古人用以通

九竅利水蓄。因形似也。陳氏方，治小腹虛滿，小便數急而疼，水腫喘急，皮膚瘡痍，幷婦人血閉，月候不勻，乳結不下，皆通竅之所致也。如茯苓、澤瀉、豬苓、燈心、琥珀、瞿麥、車前子之類，皆可以去濕熱，泄滯氣，利小便，功用相似。析而論之，君火爲邪，宜用木通；相火爲邪，宜用澤瀉；茯苓利水，有活津之能；豬苓利水，有分理陰陽之妙；燈心清火，揚而瀟之；瞿麥清火，行而蕩之；若琥珀、車前。車前爲開水道之前驅，琥珀止澁，而又有下注之力也。利水雖同，用各有別。

李士材先生曰：木通功用雖多，不出宣通氣血四字。

○集方：治鬱熱（方脉正宗）不清，或發熱口乾，或遍身走痛，小便淋澁不通等證，用木通、車前、黑山梔各二錢，連翹、防風、黃芩各一錢，甘草五分，滑石、知母各一錢五分，水煎服。○治五淋（日用）幷赤白濁，用木通、生地黃、海金沙各二錢，甘草、茯苓、黃連、黃芩各一錢，竹葉五十片，燈心五十根，水煎服。臨服時，加白菓汁十茶匙。○治心熱（錢氏方）多煩，幷顛狂喻逗，上屋不定，用木通二錢，半夏、膽星、白芥子、川連、廣皮、防風、石膏、石菖蒲、茯神各一錢五分，水煎服。○治婦人血（孟氏方）氣阻閉不通，用木通濃煎三五盞，飲之即通。

○木通子，味甘，氣寒，無毒。孟氏方：去三焦客熱，胃口熱閉，飲食不思，調和腸胃，以蜜水煮食之。治噤口熱痢有効。南人多食之，北人不知其功。

通脫木，味甘淡，氣寒，無毒。降也，陽中陰也。入手太陰、足陽明經。

（陳氏曰：通脫木生江南山側，郡琪言高丈餘。夏生，莖大者圍數寸，葉似蓖麻，莖中空，有白瓤，輕白可愛。女工取作薄片，加紙染各彩色，作像生花，以爲首飾，酷似。或作蜜餞充果，食之甘美。今四川亦種蒔矣。）

○通脫木利陰竅，治五淋，通癃閉，除水腫之藥也。此藥色白而氣寒，味淡而體輕。凡陰竅澁而不利，水腫閉而不行，用此立通。故有惣草之名。與木通、燈心草同功。然淡利而泄，陰陽兩虛者禁用。凡用，不入湯丸，惟堪作散子，白湯調服。

白兎藿，味苦，氣平，無毒。

（蘇氏曰：白兎藿生交州山谷，今荆襄亦有。蔓生，山南苗似蘿摩，葉圓厚，莖有白毛，與衆草異。五六月采苗，日乾用。此藥解毒，莫之與敵，而人不復用，幷無識者。今交廣又[illegible]有白花藤，亦善解毒，但用根不用苗也。）

○白兎藿，治蛇虺、蜂蠆、猘狗、野菜、魚肉諸蠱，幷諸大毒不可入口者，皆消除之。如毒入腹，煮汁飲，即解。爲末，着傷處，立清。眞救世之良藥也。

蘿藦。味甘。微辛。氣溫。無毒。葉子同。

陳氏曰。蘿藦。東人呼為白環。又名芄蘭。又名雀瓢。蔓生籬垣間。其莖折之有白汁如乳。其形酷似女青。實非女青。二物相似。不能分別。李氏曰。蘿藦三月生苗。蔓延籬垣。易繁衍。其莖白軟。其葉長而前尖後大。莖與根斷之皆有白乳。六七月開小長花。如鈴狀。色紫白。結實長二三寸。大如馬兜鈴。頭尖。殼青軟。中有白絨胎。白霜後枯裂。其輕颺能飛。商人取其絨胎。作坐褥代綿。甚輕軟。詩云。芄蘭之支。童子佩觿。芄蘭之葉。童子佩韘者是也。外一種莖葉及花皆似蘿藦。但氣臭根紫。結實圓大如豆。生青熟赤為異。此所以女青似蘿藦。陳氏所謂二物相似。難以分別者也。

○蘿藦。補虛勞。益精氣之藥也。（唐本草）此藥（[illegible]玫琳稿）溫平。培補統治一切勞損力役之人。筋骨血脈久為用力疲痺者。服此立安。陳氏方。療金瘡血出不止。用子搗敷即乾。癰毒疔腫。用葉搗敷即退。若蜘蛛咬傷。并一切蛇蟲諸毒。取葉與子搗汁飲。并將渣敷傷處。隨見和平。然補血生血。功過歸地。壯精培元。力堪枸杞。化毒解疔。與金銀花、半枝蓮、紫花地丁。其功驗亦相等也。奈時人不知其用。惜哉。（方脈正宗）

○集方。治房勞過度。精血有虧。或奔走遠勞。筋骨疲憊。用蘿藦子四兩。枸杞子并根皮。酸棗仁。黃耆。白朮。各一兩。俱用酒洗炒。北五味子一兩。炒麥門冬去心。懷熟地黃各三兩。酒浸蒸搗膏。共為丸梧子大。每早晚各服三錢。白湯下。○治損傷血出不止。痛不可忍。（袖珍方）用蘿藦花葉子不拘。皆可搗爛。和白湯絞汁飲。渣敷患處。瘡口立效。

絡石。味甘酸。微苦。氣溫。無毒。入足陽明。手足少陰。足少陽。厥陰五經。

蘇氏曰。絡石所在有之。帖石包絡而生。故名。生太山川谷。或石山之陰。或高山巖石之間。其莖蔓延。遶石上。葉似橘葉。細厚圓而木強。面青背淡。濇而有光。冬夏常青。莖節着處。即生根鬚。包絡墻壁木石。人家亦種此為飾。五月開白花。實黑而圓。有尖葉、圓葉二種。功用相同。蓋一物也。六七月采莖葉。日乾。楷去毛用。沈氏云。絡石者良。絡木者無用。

○絡石。暖血壯筋。健腰膝之藥也。此藥（[illegible]）性質耐久。氣味和平。前古列為上品。李氏方稱為藥中之君。主筋骨關節風熱腫強。不能動履。凡筋骨痺痛。不能屈伸。或癰疽腫毒。焮赤疼痛。流結上下。身體樞絡之間。起居動止。痿廢勿用。速宜浸酒蒸飲。又喉痺腫塞。煎汁。立通。刀斧傷瘡。敷之隨效。凡服此。能使血脈流通。經絡調達。筋骨強利。奈舉世醫家莫知用者。豈以因其賤而忽之歟。抑功用未盡善歟。如陰臟畏寒易泄者勿服。（[illegible]）

○集方。治小便白濁。緣心腎不濟。或由酒色。遂至已甚。謂之火淫。蓋有虛熱而腎水不足者。醫者往往峻補肝腎。其疾反甚。惟服博金散。則水火既濟。源潔而流清矣。用絡石、茯苓各二兩。人參五錢。龍骨煅一兩。共為極細末。每服二錢。食前燈心湯下。日二服即愈。○治筋骨攣拳。（同前）遍身疼痛。腰膝無力。行動艱難。不利風寒濕毒。或精亡勁喪。筋骨衰敗者。服此即痊。用絡石八兩。日乾。再炒燥。枸杞子、當歸各四兩。浸酒日逐飲。○治喉痺腫（外臺秘要）[illegible]

不通須臾欲絕、用絡石草一兩、水一升、煎一大盞。徐徐呷之、少頃即通。○治癰疽腫毒（外科精義）。焮赤疼痛、用絡石莖葉一兩、水洗、晒乾、勿見火。皂角刺八錢、新瓦焙。甘草節五錢。大瓜蔞一箇、取仁炒。乳香。沒藥各三錢。分作十劑。每日服一劑、水煎和酒半盞服

○治一身風毒作痛。或諸瘡餘毒作痛。或濕痰流飲作痛。或濕痰流飲作核作塊、時聚時散、脹痛非常、取一二兩、並宜酒煎飲之。○治婦人頻年小產不育、用絡石八兩、當歸身、白朮各四兩、俱醋拌炒、共爲末、煉蜜丸梧子大、每早晚各服三錢、白湯下、可全育。

木蓮蓬、味酸。氣平。無毒、（陳氏曰、木蓮蓬、薜荔也。附木而生、得木氣。故名木蓮。俗呼鬼饅頭、蔓緣樹木牆壁、三五十年漸大、枝葉繁茂。葉長二三寸、厚若石葦。生子似蓮房、打破有白汁、停久如漆。六七月實。內空而紅、則滿腹細子、大如稗子、一子一鬚。其味微澀。其殼虛輕、一年一熟、子亦入藥、但薜荔絡石極細、類莖葉扭大如藤狀。木蓮更大于絡石、四時不凋）

○木蓮蓬巢、解毒消癰、散瘀血之藥也（函谷集）。故陳氏方。主血風不和。腰腳無力。蘇氏方。主背癰腫痛、去腐生肌。李氏方。（李仁甫稿）又主血淋澁痛、內熱心煩、其藤汁又治風癬疥瘡。并癧瘍惡風血毒等證。其實中子、晒搗絞汁、作腐、和糖醋調和、夏月食之、涼滑可口。辟暑解熱。此蓋稟天地陰寒之氣而生、涼之甚也。如胃虛脾弱、并陰藏無陽之人、不宜食之、

○集方（陳自明方）治一切癰疽初起。不問發于何處。用木蓮蓬、四十箇揩去毛、搗爛、用生酒和絞汁服、功與忍冬藤同。○治（集簡方）乳汁不通。用木蓮蓬七箇、豬前蹄、一隻同煮食之。并飲汁盡、一日即通。無子婦人、食之亦有乳也。○治（方脉正宗）瘀血內滯、兼有風氣。腰膝腳踝無力、用木蓮蓬十箇、搗爛晒乾、川萆薢、枸杞子、各四兩。浸酒飲。○治男婦血淋澁痛。用（同前）木蓮蓬、十二箇、車前子、生地黃各等分、俱搗爛取汁、和生酒少許飲之、○治（同前）一切風癬疥瘡久不愈、用木蓮蓬藤、搗汁飲、并將　擦患處。○治（同前）癧瘍惡風血毒、用木蓮蓬藤、零採。零搗汁逐日飲。○治（奇效方）久年瀉痢、腸風下血或。

因飲食熱物積毒大腸或肛出不收紅紫黑血。用木蓮蓬取汁。待凝成膏。和米醋食之。

本草彙言卷之七

錢塘　倪朱謨純宇甫選集　男倪洙龍沖之氏藏稿
沈　琯西與甫校正

草部　水草類

澤瀉味甘淡氣寒無毒陰中微陽降也入足太陽少陰經（酈氏曰澤瀉生汝南池澤蘇氏又言今汝南不復采惟以涇州華州者爲善今山東河陝江淮閩浙亦有之總不若漢中南鄭青州代州者形大而長尾間必有兩岐者爲勝春生苗叢生淺水中葉似牛舌獨莖直長秋開白花作叢似穀精草秋末采根曝乾但易朽蠹須密藏爲佳。）

○澤瀉宣行水道之藥也。此藥寒淡下行。以疏滲利竅爲事。故前古統治一切水病。專通利下焦去胞中之垢濁蓄積之水。凡濕熱黃疸。四肢水腫。寒濕脚氣。陰汗濕痒。小便癃閉。淋瀝白濁。或心忡悸動。奔豚疝瘕。如上中下三焦停水之證。並皆治之。如患人無水濕病。而陰虛腎氣衰微。陽虛血氣不足。以致眩暈目昏。耳鳴耳聾。怔忡驚悸。煩渴腫滿諸疾。法咸禁用。

方龍潭先生曰。澤瀉其味甘淡微鹹。有固腎治水之功。然與豬苓所治則一。而所用又有不同者。蓋豬苓利水。能分洩表間之邪。澤瀉利水。能宣通內藏之濕。但此劑入腎經。能瀉膀胱邪氣。故八味丸腎氣丸用此。不惟接引諸藥入腎經。亦可運地黃茯苓山藥之滯。古人用補藥必兼瀉邪。邪去則補藥得力。一闔一開。此乃玄機妙理。此劑性善分洩。長于宣行水道。故張仲景治雜病。心

下有支飲苦冒、有澤瀉湯。治傷寒有大小澤瀉湯。五苓散輩皆用澤瀉。行利停水為最要藥。無水濕痰者。慎服。病人眼盆目為水。而司膀胱腎藏者也。過于分利。則膀胱之水涸而火生矣。故曰病眼若腎水不足者。用補益之劑。以此少佐可也。又按經云久服明目。扁鵲又云多服昏目。何也。若脬中有留垢伏水。濕痰濕氣者。服澤瀉以淨膀胱濕邪。故利小便而明目也。若腎氣衰之。上無留水下無留濕。悮服澤瀉以瀉腎氣。故多服昏目也。又陶氏言澤瀉根葉及實。強陰氣。久服令人有子。日華子言善催生。通女人血海。令人無子。既云強陰。何以令人無子。既云催生。何以令人有子。蓋澤瀉同補藥能逐下焦濕熱邪氣。濕熱既去。陰強海淨。謂之有子可也。若久服則腎氣大泄。血海反寒。謂之無子可也。諸藥皆然。學者當類而推之可矣。

陳和士先生曰。農皇經言澤瀉治風寒濕痹。養五藏。益氣力。肥健。久服耳目聰明等語。總在風寒濕痹四字直貫。此藥行水去濕。痹痛自安。痹痛安。則四體和。氣力益而身肥健也。身有風寒濕邪。則清陽不升。必有頭重目昏耳鳴耳聾之證見焉。此藥水行濕去。則土氣得令。清陽上行。天氣明爽。耳自聰。目自明矣。若非風寒濕邪。悮用為病反甚。

○集方　治一切停飲停水。用澤瀉五錢。人參。白术。半夏。茯

苓。陳皮。紫蘇。豬苓。各三錢。為治飲無不効。○治水腫晝劇夜平者。陽水也。用澤瀉。豬苓。白茯苓。人參。白术。白芍藥。赤小豆。桑白皮。陳皮。多服必愈。治水腫夜劇晝平者。陰水也。用澤瀉。車前子。赤茯苓。生地黃。白芍藥。赤小豆。桑白皮。木瓜。石斛。萆薢。薏苡仁。多服必愈。（水煎服。分兩各等。）○治陰胞不淨。為淋為濁。為帶。諸垢穢宿疾。用澤瀉一兩。瞿麥。豬苓。各五錢。滑石三錢。甘草一錢。燈心五十枚。水煎。和生白菓肉汁半盞服。如無白菓汁。生白蘿蔔汁亦可。○治膀胱不清。水苦不利。用澤瀉一兩。豬苓五錢。滑石一錢。肉桂。木香。各五分。水煎服。○治濕熱黃疸。面目身黃。用澤瀉。茵陳。各一兩。滑石三錢。水煎服。○治四肢水腫。方見前陽水陰水。○治寒濕脚氣。有寒熱者。用澤瀉。木瓜。柴胡。蒼术。豬苓。木通。萆薢。各五錢。水煎服。○治陰汗濕痒。腎囊風疾。用澤瀉二兩。小茴香。蒼术。各五錢。水煎服。○治小便癃閉。或淋瀝。或白濁。用澤瀉。豬苓。車前子。瞿麥。甘草。白茯苓。川黃柏。各三錢。水煎。臨服時加海金沙一錢調服。○治水濕凌心。心忡悸動。用澤瀉。豬苓。各五錢。半夏三錢。白术二錢。水煎服。○治水濕不行。陰道無陽氣轉運。致成奔豚寒疝。用澤瀉五錢。小茴香。橘核。吳茱萸。桂枝。各三錢。青皮二錢。水煎冷服。○治心下支飲。用澤瀉五兩。蒼白术。俱米泔浸一日。炒。各一兩。水二升。煎半升。溫服。○治水搐渴煩。小便不利。或吐或

瀉，以澤瀉一兩，豬苓五錢，白朮、茯苓各三錢，肉桂二錢五分，水煎服。○治陰虛有濕熱者，用澤瀉爲君，鹽水炒，配入六味地黃丸中。

○倪朱謨曰：澤瀉利水之主藥，利水，人皆知之矣。丹溪又謂能利膀胱包絡之火，膀胱包絡有火病，癃閉結脹者，火瀉則水行，利水則火降矣。水火二義，並行不悖。

羊蹄根，味苦，氣寒，無毒。

（別錄曰：羊蹄生陳留川澤，所在亦有，今江南江北近水濕地極多。韓氏曰：春生苗，高三四尺，莖節紫赤，葉長尺許，狀如牛舌及萵苣葉而青碧。入夏起薹，開花青白，成穗，結實有三稜，夏至而枯，秋深即生，根長尺許，赤黃色，似大黃及牛蒡、胡蘿蔔輩。○詩小雅云：言采其蓫，[illegible]即此也。）

○羊蹄根，殺蟲，去癬，凉血，解毒之藥也。按本經主女子陰蝕，除禿瘡、頭癬、乾疥諸疾，用米醋磨塗即消。又寇氏方搗汁吐蠱毒，并治產後風秘，或熬膏，或作丸服，散熱鬱吐血，止赤白雜痢，第稱爲奇方也。但苦寒而腥，如脾胃虛寒，泄瀉，不食者，切勿入口。

集方：治女人陰蝕疼痛，用羊蹄根煎湯揩洗。○治白禿瘡，用羊蹄根搗爛，蘸米醋擦之。○治經年頑癬，久不愈

洞。○治蠱毒，用羊蹄根搗汁飲，即吐出。○治產後風秘不通，用羊蹄根搗汁飲，即通。○治熱鬱吐血，用羊蹄根，和麥門冬煎湯飲，或熬膏，煉蜜收，白湯調服數匙。○治赤白雜色痢疾，用羊蹄根煎湯飲，或作丸服亦可。○治面生紫塊如錢，或滿面皆有，用羊蹄根生搗，各四兩，取汁，穿山甲十片，燒存性，川椒五錢炒，俱爲末，用生絹包擦，如乾，入醋少許，潤濕擦數次累效。

石菖蒲味辛。氣溫。無毒。

李氏曰。菖蒲乃蒲類之昌盛者。故名。生上洛石磵間。今池州、戎州、蠻谷中者更佳。今所在亦有。呂氏春秋曰。冬至後五旬七日。菖始生。爲百草之先生者。于是始耕。喜生逆水。根莖絡石。略無少土。頗能活。四時常青。新舊相代。新者從莖端抽發。舊者從莖末退去。一葉一節。節稀莖長。節密莖短。莖直者。莖端生葉。莖曲者。節旁分枝。莖翠。翠有嫩節。根潔白。多向下生。因莖枝延蔓。布石故也。夏作花。黃色。紫色者更佳。以堅瘦節密。拆之中心微赤。嚼之辛香少滓者。入藥最良。以砂石栽之。旦暮易水則易茂。春夏愈摘則愈細。葉僅寸許。甚有短一二分者。別有香苗、挺秀、金錢、臺蒲諸種。而香苗之最細者。曰虎鬚。尤可娛。日東坡云。凡草生石上者。必須微土以附其根。惟石菖蒲濯去泥土。漬以清水。置盆中。可數十年不枯不死。節葉根鬚。愈轉連絡。恐冬淡清蒼然。几案眞仙草也。修養書云。石菖蒲置几案間。夜坐誦黃。烟收其上。不致損目。修治入藥。以銅刀刮去黃黑皮及硬節。曬乾用。勿犯鐵器。令人吐逆。如形似竹鞭。及色黑。氣味腥穢者。勿入藥用。又一種生于溪澗砂石之間。葉高尺許。瘦根密節。亦石菖蒲也。亦可入藥。又一種生溪澗之旁濕土之間。葉高二三尺。根如竹鞭者。名土菖蒲。僅堪殺蟲。搗汁入酒中。驅蛇蟲。今以端陽節供食用者。不入藥用。○蒙筌曰。按生石澗而葉細嫩者。名菖蒲。根小節密。味甚辛烈。堪收藥用。能通竅開心志者也。種池塘而葉粗長者。名昌陽。根大節疏。味兼苦淡。僅取作餞浸酒點茶者也。故古方中但用此味。特加石字于上。示其所優。使人之不誤取也。

○石菖蒲能通心氣。開腎氣。溫肺氣。達肝氣。快脾氣。通透五臟六府。十二經。十五絡。之藥也。故本草主欬逆上氣（本[illegible]）（肺）。人事昏迷（[illegible]）（心）。兩腰沉滯（[illegible]）（腎）。恚怒氣逆（時珍）（肝）。肚腹飽脹。水土不和（[illegible]）（脾）等證。又治一切風疾。如手足頑痺。癱瘓不遂（別[illegible]）。服之即健。一切時行瘟疫。如瘴瘧蠱痢。噤口不食（[illegible]珍）。服之即安。一切氣閉。如音聲不清。耳竅不利（本[illegible]）。并喉脹乳蛾（[illegible]珍）。服之即通。大抵此劑。辛則上升。而苦則下降。香則通竅。而溫則流行。可以散風。可以溫寒。可以去濕。可以行水。可以和血也。如農皇言補五藏。通九竅。延年益智者。單指巖棲修煉之士。辟穀服餌之用。以其助發陽氣。辟除陰嵐。兼可參合養性諸藥。如人參、黃精、玉竹、地黃、天麥二冬之屬。資其宣導。臻乎太和。故亦爲仙經要藥。至于世俗之人。五慾熾然。六淫迭至。詎可窮年卒歲。久服偏燥之物乎。故陰虛火炎。吐血咳嗽之人。切勿與也。

繆仲醇先生曰。陽精芳草。辛溫四達。逐百邪。散邪結。壅遏既徹。九竅應之而通。仙家服食藥之上品上生者也。

王紹隆先生曰。菖蒲得道種程。不似人心。臨境即變。清心寡欲。人餌之莫不仙去。可比琴瑟妙音指發。

○集方治欬逆上氣（[illegible]方）。因氣道阻塞者。用石菖蒲二錢。木香一錢。共爲末。白湯調服。○治中風（[illegible]方）。中痰。中氣。中暑。中食。人事昏迷。語言不出者。用石菖蒲、膽南星各三錢。爲末。中風。防風、秦艽湯下。中痰。白芥子、製半夏湯下。中氣。白朮、木香湯下。中暑。川連、薄荷湯下。中食。枳實、厚朴湯下。○治兩腰沉滯（[illegible]方）。重強不能俛仰。用石菖蒲、石斛、萆薢各等分。水煎服。○治積怒傷肝（[illegible]）。憤恚成疾。用石菖蒲一兩。紅花五錢。共爲末。每服三錢。白湯調下。○治脾氣不和（[illegible]良方）。肚腹飽脹。用石菖蒲一兩。白朮、厚朴各五錢。甘草四錢。俱炒燥。爲末。水發丸。每服三錢。燈心湯下。○治手足頑痺（[illegible]方）。癱瘓不仁。用石菖蒲四兩。枸杞子八兩。白朮五兩。共爲末。煉蜜丸。每服五錢。白湯送下。○治時疫瘴癘。導[illegible]

用石菖蒲。一兩。茵陳。二兩。川連。三錢。薑皮。五錢。共爲末。每服二錢。白湯調下。○治噤口惡痢（[illegible]方）粒米不入者。用石菖蒲。一兩。川黃連。甘草。五穀蟲。各三錢。爲末。蜜湯調送少許。

續補集方。治三十六種風（夏禹臣方）不治者。用石菖蒲。三觔。薄切。日乾。好酒一斛。以絹袋盛浸酒中。密封百日。視之如菜色。再以熟黍米五升納中。封十四日。取出日飲。無不效驗。并治癲癇風疾。○治尸厥（肘後方）魘死。但痛嚙其踵跟。及足拇趾甲際。即甦。或再用石菖蒲。搗汁灌之。或用乾者研末。白湯調灌亦可。○治卒中客忤（同前）。用石菖蒲搗汁灌之。○治喉痹腫痛。用石菖蒲搗汁含之。○治胎動（千金方）不安。或腰痛。胎轉搶心。或日月未足而欲產。並以石菖蒲根。搗汁溫飲。○治耳卒聾閉（肘後方）。用石菖蒲一寸。萞麻仁。一粒。去殼。同搗作七丸。綿裹一丸。塞耳。日一換。

○倪朱謨曰。石菖蒲利氣通竅。如因痰火二邪爲眚。致氣不順竅不通者。服之宜然。若中氣不充。精神內餒。氣竅無陽氣爲之運動。而不通者。屢見用十全大補湯。奏功極多。石菖蒲不必問也。

香蒲。味甘。氣平。無毒。

李氏曰。香蒲生南海池澤。今處處有之。又以泰州者爲良。春初叢生水際。嫩葉出水時紅白色。茸茸然。似莞而褊。有脊而柔。取其中心白翦大如匕柄者生啖之。甘脆。美。只又湯瀹作羹食。或蒸食。或醋浸食。或曝乾磨粉作餅食。皆可。詩云。其蔌伊何。惟筍及蒲。是矣。又周禮謂之葅蒲。今人罕有食之者。至夏抽梗于叢葉中。花抱梗端。如武上棒杵。故俚俗謂之蒲槌。即蒲萼也。其花中蕊屑即蒲黃也。四五月欲開時。便取之。

○香蒲。潤燥凉血。去脾胃伏火之藥也。東垣主五藏邪熱。故汪氏方。生啖。止消渴。吐衄。鮮血。甯氏方。搗汁飲。治勞熱煩躁。又利小便。今方藥中不復用。人無采者。南海人亦不識。因蒲黃出于此中。今備此以廣取用云。

治關格（嘉宗皇帝賜王司馬有治李太醫隱方）上下不通。膈中覺有所礙。欲升不升。欲降不降。升降不行。飲食不下。大便不出。書云。關者甚熱之氣。垢物無由而出。熱在下焦。壅塞不便也。格者甚寒之氣。水穀無由而入。寒在胸中。遏絕不進也。用真香蒲末一兩。半夏麴六錢。川貝母五錢。蘇子四錢。茯苓三錢。白朮二錢。枳實、沉香各一錢。俱爲極細末。如關病大便閉塞不便。本方加酒煮九蒸九曬大黃一兩。砂仁五錢。共爲末。煉蜜丸。如黍米大。每空心服二錢。豆腐漿送下。如格病飲食不入。本方加肉桂一兩。附子童便製五錢。白豆仁四錢。共爲末。煉蜜丸彈子大。噙口內。隨津嚥徐徐嚥下。

蒲黃味甘，氣平。無毒。

（雷氏曰：蒲黃即香蒲花上黃粉是也。一名蒲厘。開時便取，蜜搜作果食之，甘潤而美。其葉七八月摘取，柔滑而溫，可以爲席、爲扇。書禮二經言男執蒲璧，即取此像，言有莫安君人之道之意。外有松黃及黃蒿二物，全似蒲黃，只是味粗澀及吐人，務要辨明，取眞者，須微炒令黃色用。）

○蒲黃，血分行止之藥也。主諸家失血，凡吐血、衄血、溺血、便血、崩漏下血、腸風瀉血，總能治之。此藥性涼而利，能潔膀胱之原，清小腸之氣，故小便不通，前人所必用也。至于治血之方，血之上者可清，血之下者可利，血之滯者可行，血之行者可止。凡生用則性涼，行血而兼消；炒用則味澀，調血而且止也。

○集方：治吐血、衄血，不拘男婦老幼，用蒲黃末，微炒，每服三錢，白湯調送。○治小便溺血、血淋，大便腸風漏血，用生蒲黃，微炒，每空心服三錢，生地黃煎汁調服。○治婦人血崩經漏，用蒲黃炒焦、當歸、川芎、熟地、牡丹皮各二錢，煎湯調服。○治小便不通，用生蒲黃、海金砂各等分，白湯調服，早晚各二錢。○治心腹痛，用蒲黃、五靈脂各等分，白湯調送二錢。○治小便轉胞，以布包蒲黃裹兩腰間，令頭致地，數次即通。○治痔瘡出血不止，用蒲黃末三錢，白湯調，日三服。○治難產催生，用蒲黃、地龍洗淨焙、陳皮各等分，俱炒爲末，每服三錢，白湯調下，立產。○治產後下血幾死，用蒲黃炒黑二兩，水二升，煎八合服。○治產後兒枕、幷血瘕，用蒲黃三錢，米飲調服。○治產後煩悶，用蒲黃三錢，白湯調服，極良。○治耳中出血，用蒲黃炒黑，研末摻入。

蒲蕚，即蒲黃中篩出赤滓，治瀉血、血痢，炒黑用，澀腸甚妙。

菰筍（又名茭白）味甘淡，氣冷，性滑。無毒。

（韓氏曰：茭白生湖田陂澤中。二月生白芽，葉如蘆，中抽心，叢白如小兒臂。久則根盤而厚，生熟皆可啖，甘滑而利。歲有二刈，惟秋中結臂，內有黑灰色，人食之，終不如春月白嫩汁美也。）

○茭筍，潤大腸，疏結熱之藥也。甘滑冷利。孟氏方主五臟熱結，止消渴，除疸黃，解酒毒，化丹石毒發，誠爲專劑。如脾胃虛冷作瀉之人，勿食。

蓴味甘，氣寒。無毒。

（李氏曰：蓴葉似鳧葵，生南方湖澤中，惟吳越人善食之。葉如荇菜而差圓，形似馬蹄，其莖紫色，大如筯，柔滑可羹。夏月開黃色花，結實青紫色，大如棠梨，中有細子。莖之短長隨水淺深。春夏嫩莖未葉者，名稚蓴；葉稍長者，名絲蓴，其莖如絲也；至秋老則名猪蓴，僅可飼猪也。）

○蓴菜，涼胃，療疸，散熱痺，解丹石藥毒之藥也。此草性冷而滑，和薑醋作羹食，大清胃火，消酒積，止暑熱成痢。但不宜多食久食，恐發冷氣，困脾胃，亦能損人。

水萍。味酸苦。氣寒。無毒。（陳氏曰：水萍有三種，大者曰蘋，葉圓闊寸許；中者曰荇，葉似圓有缺；小者即溝渠池塘中所生，本草所用即此也。○李氏曰：季春始生，一葉經宿即生數葉，葉下微鬚，即其根也。面青背紫者入藥最良，而紫背綠者不堪入藥。七月收取，置竹篩內，下以水映之，日曬方乾。）

○水萍，發汗驅風，下水氣，化丹毒之藥也。此專得寒水清陰之氣以生，夏天清陽之氣以長，體輕性燥，善去皮膚濕熱風疹。又作湯沐浴，生長毛髮。他如風濕痿痺，癱瘓不起者，癘風惡毒，筋骨頹敗者，用此屢建奇功。又如水腫因熱鬱，小便閉結爲患者，用此亦無不愈也。但性燥而氣寒，善于發汗，力勝麻黃，下水功同通草。如表氣虛而自汗出者，勿用。

前賢朱丹溪曰：浮萍發汗，勝于麻黃。俗醫用治時行熱疾，無汗者，大有功効。其方用四月中初出浮萍，曬乾一兩，麻黃去根節五錢，甘草二錢，共研細末。每用二錢，葱頭湯乘熱調服，汗出乃瘥。

李瀕湖先生曰：浮萍其性輕浮，入肺經，達皮膚，所以能發揚邪汗也。世傳以紫背浮萍，曬乾爲細末，煉蜜和丸，彈子大，每服一二丸，以豆淋酒化下，治左癱右瘓，三十六種風，及偏正頭風，口眼喎斜，大麻癩風，一切無名風毒，及脚氣，并水腫，便秘，或打撲傷損，與胎孕有傷諸證。服過百丸，即爲全人。

蘇氏治癘風惡疾，遍身者，用紫背浮萍，濃煎汁，浸浴效。

海藻。味苦鹹。氣寒。有小毒。氣味俱厚，純陰之品，沉也。（別錄曰：海藻生東海池澤。蘇氏曰：今登、萊諸州及近海諸地皆有之。葉類萍藻，莖如亂髮而黑，根着水底石上。有大小二種：大者名大葉藻，生深水中，葉大如水藻；小者名馬尾藻，生淺水中，狀如馬尾。海人以繩繫腰，投水取之。五月後不可取，恐有大魚出水傷人也。修治以淡水浸去鹹味，晒乾用。○陳氏曰：海藻生海中，若蕪濯然。其名狀有四：一曰藻，海中之水藻也；一曰羅，水草之有文也；一曰綸，生淺水而葉細；一曰組，生深水而葉大。爾雅云：綸似綸，組似組，東海有之，正謂此二藻也。）

○海藻，散癭氣，消癰腫，化癥瘕，下水腫之藥也。此藥治癭核、馬刀諸瘡，堅而不潰，潰而不斂者，鹹能軟堅，寒能泄熱。如營氣不調，外爲癰腫，隨各引經藥配之，腫無不消。又李氏方，兼治水腫、脚氣、留飲結痰之濕熱，使邪氣從小便中出。取鹹入腎，達膀胱，有潤下分消之意。如脾虛胃弱，血氣兩虧者，勿用之。

東垣老人曰：此藥反甘草。古方治瘰癧，用海藻、甘草，兩用之，蓋以堅結之病，非平和之藥所能取捷，必令反奪以成其功也。

○集方　治癭氣（范汪方）：用海藻八兩，絹袋盛之，以清酒二升浸之，春二、夏三、秋四、冬五日，每服二合，日三服。酒盡再作，其渣晒乾爲末，每服二錢，白湯調，日三服，不過兩劑愈。○治瘰癧左右交接者（危氏方）：以海藻菜用蕎麥麵拌炒，亦白殭蠶炒，各等分，爲末，米糊爲丸，如梧子大，每食後服百丸，白湯下。

昆布。味鹹。氣寒。性滑。無毒。（李氏曰。昆布。又名綸布。生東南海中。葉如手大。紫色。采勒可食。其細葉者。即海藻也。又一說。昆布生登萊者。葉細搓如繩索之狀。出閩浙者。葉大似菜。蓋海中諸菜性味相近。主療一致。海藻昆布。雖稍有不同。亦無大異也。修治。以水煮半日。待鹹味去。可曬焙用。）

○昆布。去頑痰。利結氣。消癭瘰之藥也。（丹溪）別錄方。又治十二種水腫。斧陰癩疝瘕諸疾。總不過爲消痰下氣故也。古方噎隔證。恒用之。亦取此意。但此性雄于海藻。不可多服。令人瘦削。

東垣老人曰。鹹能軟堅。故癭腫堅如石者。非此不除。與海藻同功。二物。下氣消痰殊捷。久服又能損人。無此疾者。不可服食。

○集方。（廣濟方）治膀胱結氣。脹壅不行。類多疝證。用高麗昆布一觔。以米泔水浸去鹹味。再洗淨。以水一斛。煮熟。再切細。更水煮極爛。乃下醬油。薑椒。葱白等味。調和過飯食。極能下氣。海藻亦可。依此法製食之。○治項下五種癭氣（外臺秘要）結核瘰癧。腫硬。以昆布。海藻各二兩。浸洗去鹹味。曬乾爲末。醋和爲丸。彈子大。時時含之嚥汁。味盡再易。其患漸消。

海帶。味鹹。氣寒。無毒。（劉氏曰。海帶生東海水中石上。似海藻而粗。柔韌而長。今登萊人。曬乾以束器。用可代繩索。）

○海帶去癭行水。下氣化痰。功同海藻昆布。及婦人方中用此。催生有驗。稍有異耳。

草部　藤草類

忍冬藤。味甘。氣溫。無毒。（李氏曰。忍冬藤生。凌冬不凋。故名。在處有之。藤蔓左纏。纏緣草木上。或籬落間。莖色微紫。葉對節生。似薜荔而青。有濇毛。三四月開花。長寸許。並蒂一蒂二花。兩瓣大小不齊。若半邊狀。初開蕊瓣俱白。經二三日。漸變黃色。新舊交參。黃白相映。氣甚芬芳。燥濕不變。花名金銀花。藤名鷺鷥藤。四月采花。陰乾。惟采藤葉。不拘時日。）

○忍冬藤。葉花根。功用相同。驅風除濕。散熱療痺。消癰止痢之藥也。此藥。清虛振肅。不寒不燥。補而不滯。利而不滑。凡病風濕火邪。筋脉受患者。服之効驗更速。故史氏方。稱治痺痛。疥手氣。腳氣甚捷。而後世外科癰瘍諸證。未成可散。能施拔毒之功。已成可潰。大有回生之力。始終必用要劑。附後方。又治飛尸。遁尸。風尸。沉尸。尸注。及鬼擊客忤諸疾者。取其甘溫忍冬。乃得震陽振肅之意。不特解毒祛風。更有鎮安神臟者也。

○集方。治風毒。濕毒。熱毒。或痒或痛。或腫或木。或堅硬或破爛。不拘遍身胸腹背脅手足等處。用忍冬藤葉花根。一觔。土茯苓二觔。俱切碎。煎湯。逐日飲之。其毒漸滅。○治痺痛手足不隨。用前方日服有驗。○治癰疽發背。（外科精要）不問發在何處。發眉發顋。或頭或項。或背或腰。或脇或乳。或手足上下。兩腕之間。皆有奇功。如鄉落僻陋之處。或貧乏失業之人。藥食艱得者。但虔心服之。其效甚妙。用忍冬藤生取一握。搗爛。用生酒少許。調稀稠得所。塗于毒四圍。中留一孔。令洩氣。再用藤五兩。搗爛。用大甘草

一兩同入砂罐內、以水二大盌、文武火慢煎至一盌。入無灰酒一盌、再煎十數沸。去渣。分爲三服、一日一夜喫盡、病勢重者、一日二劑、服至大小便通利、則藥力到矣。○治熱毒血痢（聖惠方）、用忍冬藤濃煎飲。○治久年脚氣作痛（衛生易簡方）、筋骨引疼、用忍冬藤葉日乾爲末。每服二錢。熱酒下。○治五種尸注（肘後方）。飛尸者、遊走皮膚、通連藏府、每發刺痛。變動不常也。遁尸者、附骨入肉、攻鑿血脈。每發不時見死尸、聞哀哭便作也。風尸者、淫躍四末、不知痛之所在、每發恍惚、得風雨便作也。沉尸者、纏結藏府、中引心脇、每發絞切、遇寒冷便作也。尸注者、舉身沉重、精神錯雜、常覺昏廢、每節氣至便大作也。以上諸證、並是身中尸鬼

引接外邪。宜用忍冬莖葉剉碎。水煎濃汁。每用溫酒化下半盞。一日二服。○治諸般腫毒（乾坤秘韞）金刃傷瘡。一切惡瘡。用金銀藤八兩、吸鐵石三錢、香油一觔、熬枯去渣、入黃丹八兩。待熬至滴水成珠。用軟油紙攤貼。○治無名奇怪惡瘡（選奇方）、久不愈、用金銀藤一把、搗爛、入雄黃一錢、水二升、瓦礶煎之。以紙封七重、穿一孔、待氣出、取藥礶以瘡對孔薰之。藥汁冷、再熨熱薰、半日久久出黃水、後用生肌末藥即效。

稀痘方用忍冬藤、曬乾爲末。每晚服一錢、砂糖湯調服。日日服之、服三年。小兒永無痘瘍之夭

鉤藤味苦。微甘、氣平、無毒、入手足厥陰經藥也。

（陶氏曰、鉤藤又名弔藤、僅療小兒、不入餘方。寇氏曰、出建平。秦中湖南湖北江南江西山中皆有之。李氏曰、狀似葡萄藤、長八九尺或一二丈、大如拇指、其中空、致酒甕中、以氣吸之。涓涓不斷、莖間有刺、宛如釣鉤。色紫黑。古方多用皮、今方多用鉤、取其力鋭耳）

○鉤藤、祛風化痰、定驚癇（劉默）、安客忤、攻痘瘄（李書之）之藥也。此藥入（仰垣）手（[illegible]）足厥陰二經。手厥陰主火、足厥陰主風、小兒諸病、皆肝風相火爲患、故本草獨治小兒寒熱驚癇。手足瘈瘲、口眼牽動、凡胎風客忤、天吊急疾、幼科十二種驚風之證、用此通心胞肝膽三經、使風靜火息、則諸證自除矣。錢仲陽先生曰、鉤藤、溫平無毒、嬰科珍之、其體鋒鋭、其性捷利、祛風痰、開氣閉、安驚癇于倉忙頃刻之際。同麻

桂發內伏之寒、同芩連解酷烈之暑。同前葛祛在表之邪。同查朴消久滯之食。同鼠粘桔梗羌防紫草茸、發痘瘄之隱約不現也。祛風邪而不燥、至中至和之品。但久煎便無力。俟他藥煎熟十餘沸。投入即起、頗得力也。去梗純用嫩鉤、功力十倍。

白花藤味苦。微甘、氣寒、無毒。

（蘇氏曰、白花藤生嶺南交州廣州平澤、處處生苗、似野葛。葉似女貞葉、但無毛、開白色花。其根似葛而骨柔、皮厚肉白。一說葉有細毛、根似牡丹、凡使根苗皆可用。又一種菜花藤、頗相似、但味酸澀可辨耳）

○白花藤、解諸藥飲食中毒。煮濃汁立解（本草）

甘藤汁味甘。氣平。無毒。

（陳氏曰。甘藤生江南山谷。其藤大長丈餘。葉三四寸。如木防己。斫斷吹之。氣出一頭。其汁甘美如蜜。）

○甘藤汁。解諸熱。止煩渴之藥也。陳氏方主調中益氣利五藏者。特熱勝陰虛水枯血燥為病相宜也。若胃虛有寒者不可用。

黃藤味甘微苦。氣寒。無毒。

（李氏曰。黃藤生嶺南。狀若防己。土人常服此藤。縱飲食中有毒。飲此汁亦自然暗解。亦利小便不通。）

合水藤中水。味甘。氣寒。無毒。又名大瓠藤

（李氏曰。合水藤生嶺南及北海邊山谷中。又安南朱崖儋耳。無水處皆種此藤。藤狀大如瓠。葉若葛葉。實似枸杞。斷藤取汁飲之。甚清美。其藤去地一丈。斷之更生。其水不絕。山行口渴。斷取飲之。實天賚之藥也。）

○合水藤中水。去煩渴。定心躁。清瘴癘。解丹石火藥之毒也。外夷方土往往治天行熱疫。狂亂癲癇。并療暑瘴瘧痢。通小便癃閉。便濁諸證。

天仙藤味苦。氣溫。無毒。

（蘇氏曰。天仙藤生江淮及浙東山中。春生苗。蔓作藤。葉似葛葉。圓而小。有白毛。四時不凋。根有鬚。夏月采取。其根苗。南人多用之。）

○天仙藤。流氣活血。治一切諸痛之藥也。人身之氣。順則和平。逆則痛悶作矣。如楊氏直指方。天仙藤治痰注臂痛。氣留疝痛。瘕聚奔豚。腹痛。產後血氣腹痛。他如妊娠水腫。面浮氣促。男子風勞。久嗽不愈。（久嗽數年不愈。起居自如。身無恙者。名曰風勞。出巢氏方。）悉以此藥治之。無不寢安。蓋謂其善于流行血氣故也。如諸病屬虛損者勿用。

○集方。治痰注臂痛。用天仙藤、白朮、羌活各三錢。薑黃五錢。防風二錢。水煎服。○治諸般疝氣。用天仙藤一兩。好酒一碗。水二碗。煮六分。溫和服。○治癥瘕積聚及奔豚疝氣諸疾。用天仙藤一兩。炒。乳香。沒藥。玄胡索。醋炒。吳萸。乾薑。各二錢。小茴香五錢。共為末。每服三錢。好酒調服。○治產後兒枕腹痛。用天仙藤一兩。炒焦。玄胡索。山查肉。俱醋炒。各五錢。共為末。每服四錢。沙糖酒調服。○治妊娠水腫。始自兩足。漸至喘悶。足趾出水。不可作水治。用天仙藤炒。香附。陳皮。烏藥。各一錢。甘草五分。木瓜。紫蘇葉。各一錢五分。水煎服。小便利。氣脈通。腫漸消。不須多服。○治風勞久嗽。用天仙子四兩。北細辛三錢。黃耆。防風。桑皮。各二錢。分作十劑。水煎服。

清風藤味氣缺又名青藤

（蘇氏曰。清風藤生台州天台山中。其苗蔓延木上。四時常青。土人采莖用。）

○清風藤。散風寒濕痺之藥也。圖經方治風濕流注。胝赤延生。及歷節、鶴膝、痛風、攣縮、麻痺、癱瘓諸疾。使酒浸飲。能舒筋活血。正骨利髓。故風病軟弱無力。并勁強偏廢之證。久服常服。大建奇功。須與當歸、枸杞合用方善也。

○集方。治風濕痺痛。用清風藤根三兩。漢防己一兩。切碎。入酒五壺。蒸飲。○治一切諸風。用清風藤。出太平荻港上者。三四月采之。不拘多少。入釜內。微火熬七日夜。成膏。收入磁器內。用時先備木梳三五把。量人虛實。以酒服三茶匙。將患人身上拍一掌。其後遍身發癢不可當。以梳梳之。要癢止。即飲涼水一口。便解。風病皆愈也。須避風數日良。

百稜藤味氣缺又名百靈藤

（蘇氏曰。百稜藤生台州屬縣山中。春生苗。蔓延樹木上。無花葉。冬采皮用。土人常用之。）

○百稜藤治一切風痺。風痛。風癬。風癩之藥也。煎膏。釀酒。作丸散。均可修用。

○集方。治一切風痺疼痛。不拘久近。用百稜藤五觔。水四斗。煎一斗。濾汁。再煎至三升。入牛膝、童便製附子、天麻、鹿角膠各二兩。俱作末。同煎。再入煉熟白蜜半升。熬如餳狀。磁瓶收之。每早晚各食前服三錢。白湯溫酒下。忌一切毒物。○治頭風腦痛。用百稜藤十觔。水一石。煎汁三斗。入糯米三斗。作飯。候冷。拌麴末九兩。同入缸中。如常釀酒法。經三五日。待熟澄清。每溫飲一小盞。服後渾身汗出為効。○治大風癩瘡癘疾。用百稜藤一觔。水二斗。熬數百沸。去渣。入粳米三合。煮米熟。取出米粒。密室中乘熱浴之。少臥取汗。汗後皮膚起如麩片。其藥渣隔日再作。連作十餘次。漸愈。

千里及味苦氣寒有小毒（又名千里光）（蘇氏曰千里及藤生天台山中及杭越山谷道旁附樹木籬落間今宜湖間亦有之春生苗葉細而厚秋作花淺黃色土人采花葉入藥用蘇氏曰又筠州有千里光生山谷路旁葉似菊而長背有毛枝幹圓而青春生苗秋作花黃色不結實采莖葉入藥用名黃花演蓋一物也）

〇千里及解疫熱清疸瘧之藥也主南北疫氣黃疸瘴瘧赤白痢疾并解蠱毒煮汁取吐下諸證即平又搗爛敷百蟲及毒蛇惡犬咬傷此藥寒平清利雖無補益治一切熱毒諸疾咸需用之但獨行單用不入衆藥共劑也

〇集方治天行疫熱瘴癘黃疸熱瘧熱痢時疾用千里及一握水煎飲立效〇治百蟲咬傷并毒蛇惡犬咬傷用千里及新鮮者搗敷其毒即解〇治爛弦風眼用新鮮千里及以筍殼葉包火煨熟滴入目中

藤黃味酸濇有毒（一名海藤）（郭氏云藤黃出岳鄂等州諸山崖係海藤花蘂散落山石上彼人收之謂之沙黃就樹采者輕妙謂之臘黃李氏曰今畫家漆匠所用藤黃皆經煎煉成者舐之麻舌又按真臘云國有藤黃乃藤之脂番人以刀斫藤枝滴下地數月後收之似與郭氏說微不同不知即一物否也）

藤黃治蚛牙蛀齒水調點之即落也（李珣）

再附錄諸藤（拾遺自李）陳氏方

地龍藤味苦氣平無毒（生天目山繞樹蟠屈如龍故名采即曬乾用吳中亦有而小異）主風證血瘀痹腰膝脚中諸冷飲食不調不作肌膚浸酒蒸服之（已下皆藤下種俱出陳氏藏器本草）

龍手藤味甘氣溫無毒（出安荔浦石上向陽者葉如龍手采無時曬乾用）主偏風口喎手足癱瘓風痺諸證兼能補虛益陽去冷氣以醇酒浸蒸空心隨量飲

牛領藤味甘氣溫無毒（生嶺南高山形濶亦如牛領取之曬乾用）主腹中諸冷證腰膝痛軟無力小便稠白如膏淋男婦腸道衰弱并起米煮飲或浸酒蒸服

牛奶藤味甘氣溫無毒（生深山大谷中大如樹牛好食之故名）其藤有粉采得研細可救荒令人不饑其根食之令人髮落

鬼膊藤味苦氣溫無毒（生江南林澗邊葉如梨葉子如梔子）主去風活血宜浸酒蒸服其葉搗爛敷癰腫尤良

斑珠藤味　氣溫無毒（生深山中冬月不凋子如珠而斑）主風血羸瘦婦人諸疾

息王藤味苦，氣溫，無毒。（生嶺南山谷。其葉冬月不凋。）

主產後腹痛，惡露不盡，取尺餘，煎汁服。

百丈青味苦，氣平，無毒。（生江南林澤間。藤蔓緊硬，葉如薯蕷，對生。）

主天行瘴疫，溫熱疫毒，並煎汁服。生搗汁亦可。其根性冷，服之令人下利。

溫藤味甘，氣溫，無毒。（生江南山谷，着樹不凋。）

主積風積冷，有傷血分，宜浸酒蒸飲。

藍藤味辛，氣溫，無毒。（生新羅國。根如細辛。）

主冷氣欬嗽，濃煎汁飲。

瓜藤味甘，氣寒，無毒。（生施州。四時有葉無花。采皮無時，焙乾用。）

主諸熱毒惡瘡，搗細末，用甘草湯調搽。（蘇頌）

含春藤味[illegible]，氣[illegible]，無毒。（生台州。其苗延木而上，冬夏常青。采葉用。）

治諸風風痰，極效。（蘇頌）

石斛味甘淡，微鹹，氣平，無毒。氣薄味厚，陰中之陽，降也。入足太陰、少陰二經。

（別錄曰：石斛生六安山谷，水傍石上。蘇氏曰：今荊襄漢中、江左、廬州、台州、溫州諸處亦有。近以溫台者為貴，謂其形似金釵之股，端美可觀，然氣味腐濁，不若蜀產者氣味清疎，形頗精潔更佳也。蜀人呼為金釵花，今充貢者取川地者進之。又按李氏曰：叢生水旁石上，其根糾結甚繁，乾則白軟。莖葉生皆青，色乾則黃韌。五月生苗，似竹節，節間出碎小葉。七月開淡紅色花，初冬結實。節傍自生根鬚，折之懸掛屋下，時灌以水，經年不死。此即蜀中所產，入藥最良。甫按蘇氏曰：一種麥斛，形似大麥，累累相連，頭生一葉，而性多寒。一種雀髀斛，莖大如雀髀，葉在莖頭。一種草斛，若禾草，長三四寸，柔且韌，折之如肉而實。一種木斛，中虛如木，長尺餘，色深黃而光澤。俱用補人元氣。修治去根頭，酒潤蒸之，曬乾用。惟入湯膏，不入丸散，以質性綿韌，不能作末故也。○倪朱謨曰：石斛短而中實，木斛長而中虛，甚易分別。）

○石斛，壯筋骨、健腳膝之藥也。不藉水土，緣石而生，色黃味濇，叢生盤結，亦若筋膜之聚絡骨節也。故前古稱其功用能壯筋骨，健腳膝，厚腸胃，主傷中疲弱，五藏虛損，內絕不足，肌肉羸瘦諸證，咸宜用之。皆取此清虛純潔之質，不與糞土卑污穢腐滋生之物比也。又馬氏方有久服却病延年，定志安神，開胃進食，以其有益脾胃心腎之功力也。凡物之受而量滿成能，滿而溢，故虛勞可補，羸瘦可充，筋骨腳膝可健。附生於石，故命名以此。

○集方：治五痿五痺，足膝軟弱，腰脊痠疼，或遺精夢泄，淋瀝成濁，或三消五膈，骨敗髓枯，或脾元內損，無故羸瘦，或血冷精寒，子嗣勿育，或半產漏下，血氣妄行，或脾胃

不和飲食減少或多食作脹少食即饑○治五痿五痹腰膝痠軟用川石斛萆薢枸杞牛膝天麻白术當歸身各五錢黃栢七錢作散服空心服五錢白湯調送○治遺精夢泄滴濁成淋用石斛遠志茯苓車前木通滑石甘草黃栢澤瀉各二錢牡蠣煅三錢海金沙五錢作散子空心服三錢白湯調送○治三消病好飲湯水終日不轍爲上消好食米麵肥甘菓食等類愈食愈瘦爲中消煩渴引飲索水湯不厭所下小便混濁如膏爲下消以川石斛川黃連知母各等分配入六味地黃丸料作丸早晚食前後皆可服五錢白湯送○治五膈五噎證用川石斛一味熬膏加鹿角膠少許收之白滚湯化服廿餘匙此證多死間有生者不過百中一二而已○治脾元內損無故羸瘦用川石斛十兩白术茯苓半夏當歸砂仁廣皮人參黃耆各一兩甘草五錢熬膏煉蜜四兩和鹿角膠二兩溶化收之每早午晚各服十餘匙白湯調送○治男婦血冷精寒子嗣勿育或半產漏下血氣妄行用川石斛兔絲子各十兩黃耆白术川萆薢枸杞子當歸身川芎補骨脂山藥肉桂木香人參各四兩熬膏以龜板膠鹿角膠各四兩藥汁內溶化收之量加煉蜜數兩亦可每早晚白湯調服十餘匙婦人服此加香附四兩○治脾胃不和飲食減進或多食作脹少食即饑用川石斛四兩人參黃耆白术茯苓半夏陳皮各一兩甘草川黃連薑炒白蒺藜各五錢砂仁麥芽各二兩爲末作散子每服三錢白湯下

地錦味辛氣平無毒（又名血見愁又名草血竭又名醬瓣草又名血風草）（李氏曰地錦生近道田野及荒寺階砌間皆有之就地而生赤莖綠葉六月開黃花秋結黑實而細狀如沙蒺藜斷莖有汁）

○地錦涼血散血解毒止痢之藥也（李時珍）善通流血脈專消解毒瘡別錄方治婦人血結陰疝及血痢血崩崩淋方消癰腫惡瘡血痢熱痢諸疾凡血痢而因熱所使者用之合宜設非血熱爲病而胃氣薄弱者又當斟酌行之

○集方治婦人血結腹痛陰疝熱瘕諸疾用地錦草搗汁半碗和熱酒飲之○治血熱成痢腹痛用地錦草搗汁一碗和熱酒飲之○治臟毒赤白用地錦草曬乾爲末每服二錢米飲下立止○治血熱崩中用地錦草搗汁二碗當歸川芎各五錢薑炭三錢將地錦汁二碗煎減半服○治癰腫惡毒及背瘍用地錦草一兩酸棗草五錢當歸三錢乳香沒藥各一錢酒水各一碗煎半服如有生鮮者搗汁熱飲以渣敷之効○治好酒食炙煿之人遍身乾疥搔之血出燥癢不休以地錦草一大把搗汁和熱酒飲之○治跌撲損傷內血瘀留作痛或金瘡血出不止俱用地錦草搗爛炒熱敷上以布縛緊一時許痛定血止

骨碎補，味苦，氣溫，無毒。足少陰經之藥也。

（陳氏曰：骨碎補原名猴薑，因其主折傷，補骨碎有効，故命此名。生嶺南虔吉州。蘇氏曰：今淮浙陝西夔路州郡皆有，寄生石上，或木上，多在背陰處，引根成條，上有黄白赤毛及短葉附之。又抽大葉成枝，葉長有缺，頗似貫衆，面色青綠，有青黄點，背色青白，有紫赤點。每一大葉兩旁各有小葉丫，兩兩相對，至春作葉，冬則乾黄，無花實。根扁而長，略似薑形，又江右人呼爲胡孫薑，日華子呼爲石毛薑，皆形相似也。修治用刀刮去黄赤毛，細切片，晒乾用。）

○骨碎補，破血止血，療折傷，補骨碎之藥也。按此藥好生陰處，每得陰氣爲多，宜其入足少陰腎經而主骨間病也。蘇氏方治婦人血分阻滯，因虛而不堪行藥者，用此行散瘀積，補續折傷。一切筋骨血病。又甄氏方主骨中邪氣，風血疼痺，以致手足不收，或大病後四肢痿軟無力。雷氏方治耳鳴耳聾，虛氣攻牙，牙痛動搖，諸證咸需治之，皆入腎入骨之驗也。但性燥氣溫，如血虛風燥，血虛有火，血虛攣痺者，俱禁用之。如必不得已，在所當用者，宜配大滋養同劑，方可。

盧不遠先生曰：味苦走骨，氣溫燠腎，有火疾者，恐生燥熯。

○集方：治打撲傷損，骨節筋脈或腫或痛，或傷折或閃肭。用骨碎補三兩，當歸、川芎、川續斷、紅花，俱酒洗炒，桃仁泥，各一兩五錢，分作十劑，水煎服。或作丸梧桐子大，每早晚吞服三錢，白湯送亦可。○治婦人血氣阻滯，攻痛心腹，或流散四肢，成腫成脹，腹猶疼悶，血不行者，用骨

碎補三錢，當歸、川芎、木香、玄胡、香附，各二錢，俱酒炒，水煎服。○治骨中邪氣，或風或火，或濕或血，或痰飲諸病，留滯作疼作脹，難以言狀者，用骨碎補三錢，羌活、防風、黄柏、蒼朮、當歸、川芎、懷生地、半夏、天麻各二錢，俱酒洗炒燥，爲末。每用三錢，白湯調服。○治久痢久瀉不止，形容憔悴，腿足痿軟無力者，用骨碎補二兩，川萆薢一兩，於白朮、茯苓、枸杞子各八錢，俱用酒洗，晒乾炒燥爲末。或作散，或作丸。每食前服三錢，白湯送。○治腎虛耳鳴耳聾，并齒牙浮動，疼痛難忍，用骨碎補四兩，懷熟地、山茱萸、山藥、茯苓各二兩，牡丹皮一兩五錢，俱酒洗炒，澤瀉八錢，鹽水炒，共爲末，煉蜜丸。每服五錢，食前白湯送下。○治一切牙痛，用骨碎補四兩，炒黑爲末，每早擦牙。不惟堅齒，亦且補腎益精，并除一切骨病，如牙動將落者，數擦立住，再不復動，極驗。○治病後髮落不住，用骨碎補、野薔薇嫩枝各少許，煎汁刷之。○治腸風失血不止，用骨碎補四兩，炒黑如炭，爲細末。每早服三錢，米湯調服。○昔魏刺史患久泄，諸醫不效，覺至危殆，一醫用骨碎補爲末，入豬腎中，煨熟食之，頓止。蓋腎主大小二便，久泄屬腎虛，不可專從脾胃也。特附此以廣仁義云。

石韋　味苦，氣溫，無毒。足太陽膀胱經藥也。（別錄曰，石韋生華陰山谷。蘇氏曰，今晉絳滁海福州江寧處，凡陰崖險罅處有之，叢生石旁，不聞人聲處更良。李氏曰，淩冬不凋，葉長近尺，濶寸許，背有黃毛，柔韌斑點如文。一種葉背有金星者，名金星石韋。葉如杏葉者，名杏葉石韋。同生石上，功用亦相同也。修治去黃毛極淨，否則戟人肺，令欬逆難療也。外有古瓦屋上生者，名瓦韋，療淋亦效。）

○石韋利水道，通癃閉之藥也。（本經）（陶效野稿）日華子主小便癃閉不通，或淋瀝遺溺，凡膀胱一切火鬱氣閉之證，用此立清。故前古又謂清肺氣，主勞熱下欬逆，即與治膀胱火鬱氣閉之證同意。但其氣性溫平，無毒，不補不瀉，為方科要藥。倘不善製，去毛未淨，增人欬嗽。司業者，當留心毋忽也。

○集方：治小便淋痛。（集簡方）用石韋去毛淨、滑石各等分，為末，每服二三錢，白湯送，最驗。○治小便轉脬。（集簡方）用石韋去毛淨、車前子各二錢，甘草五分，水煎服。○治男婦血淋。（[illegible]孫）用石韋去毛，為末，茄子枝煎湯下二錢。○治血崩漏。（同上）用石韋去毛，為末，每服三錢，溫酒服，極效。

金星草（又名金星石韋）味苦，氣寒，無毒。（劉氏曰，金星石韋生成州處，與石韋同，喜生背陰石上，及竹箐中，或大木下，及古瓦屋上，少日色，背陰處常有之。新出深綠色，葉長尺餘，至深冬，背生黃星點子，兩兩相對，無花實，淩冬不凋。其根盤屈如竹根而細，折之有絲。五六月和根采之，曝乾用。）

○金星石韋其主治功用與石韋同，然性至冷，解鬱熱，背發癰瘍，及金石煿火丹藥諸毒發病，特異。悉以末，白湯調服立下。不惟丹石火藥之毒悉去，即終身有患諸火病，一併盡除也。如年老人不可輙服。若患人不因金石烟火丹藥之毒，而因憂鬱氣血凝滯而發毒者，亦非所宜也。○其根搗爛，浸麻油，塗頭，大生毛髮。○治熱毒下血。（本事方）用金星草、陳乾薑各三兩，俱微炒，共為末，每服一錢，白湯調下。○治腳膝爛瘡。（集簡方）用金星草背上星刮下，搗爛敷之，即乾。

石莧　味辛苦，氣平，有微毒。（蘇氏曰，石莧多生筠州，附河岸沙石上生之。春生苗，葉莖青，高一尺，葉如水柳而短。八九月采之。）

○石莧善吐風涎之藥也。（宋圖經）蘇氏方同甘草等分，煎服，治齁齁屢效。

虎耳草　味苦辛，氣寒，有小毒。（李氏曰，虎耳草生陰濕處，人亦栽于石山上。莖高五六寸，有細毛，一莖一葉，如荷蓋狀，人亦呼為石荷葉。葉大如錢，狀又似初生小葵葉，及虎之耳形。夏開小花，淡紅色。）

○虎耳草解瘟疫，吐蠱毒之藥也。宜生取搗汁，溫飲之，能作吐利。如煎湯冷飲之，又能止吐止利。故治暑月熱沙霍亂者，煎湯冷飲之，立止。又治痔瘡腫痛，陰乾燒烟，桶中熏之，立收。然寒涼能散能利之物，有損胃氣，除此數證之外，無他用。

平。無毒。

（別錄曰：景天草，又名火丹草。出太山山谷，極易種植，折步置土中，澆灌旬日便生也。今南北處處皆有，多生石上。今人家種于中庭，或種盆中，置屋簷上，云可辟火。春生苗，高一二尺，莖黃赤色，質極柔弱，折之有汁出。葉似長匙，淡綠色，光澤柔厚，起層而上。夏開碎花，紅白色。結實如連翹，有小中有細黑子，如粟粒。秋後蔗根，明春宿根再發。）

○火丹草：解小兒赤遊丹毒，消風疹熱瘡之藥也。別錄方解蠱毒，一切血熱諸病。鮑氏方定傷寒熱狂，時行赤眼頭痛，小兒血熱驚風等證。但苦寒純陰，苟非實熱火邪，勿得輕用，以動脾氣，惟外塗無礙耳。

○集方：治熱毒丹瘡，并烟火丹毒，金粉諸藥毒，從兩股兩脇起，赤如火。用火丹草搗汁，和生酒減半飲之，或用渣塗患上。○治蠱毒內攻，不能吐出。用火丹草搗汁飲之。○治天行時熱，眼赤頭痛。用火丹草搗汁，日點三五次。○治小兒驚風煩熱，并遍身風疹瘙癢諸瘡，或風疹隱現皮膚不出。用火丹草煎湯浴之。

石胡荽：味辛，氣溫，無毒。其性雄烈，升也，陽也。

（李氏曰：石胡荽，南北諸處皆生。生石縫間及陰濕地，小草也。高一二寸，冬月生苗，細莖小葉，其狀宛如嫩胡荽。其氣辛薰，人不堪食，鵝亦不食之。夏開細花，黃色，結細子。極易繁衍，僻地生此，常鋪滿池面也。又一種小葉，狀類石胡荽，又名天胡荽，生近水渠中濕處，又名雞腸草，亦即此草也。）

○石胡荽：利九竅，通鼻氣之藥也。其味辛烈，其氣辛薰，其性升散，能通肺經，上達頭腦，故孟氏方主齁鮯痰喘，氣閉不通，鼻塞鼻痔，脹悶不利。又去目中翳障，并頭中寒邪，頭風腦痛諸疾，皆取辛升溫散之功也。如開鍋蓋法，常欲邪毒不閉，令有出路，然氣雄而烈，力小而銳，宜嗃氣以聚其力，故目病暴赤，時眼翳膜障礙，取此塞鼻，嗃其氣即愈，亦仙方也。

○集方：治寒痰齁喘。用野園石胡荽，研汁，和白酒服，即住。○治鼻中生瘜肉。用石胡荽揉爛，塞鼻中，一日即消。○治目生翳障，目赤腫脹，羞明昏暗，隱澀疼痛，眵淚作癢，鼻塞頭痛，腦酸，外翳扳睛諸病。用石胡荽草曬乾二錢，川芎一錢，爲細末，噙水一口，每以如米粒少許嗃入鼻內，淚出爲度。○治中寒冷之邪，頭風頭痛。用石胡荽陰乾，揉爛，綿裹塞鼻，隨左右嗃之，含水一口。此方亦可止牙痛。○治一切腫毒。用石胡荽一把，搗爛，絞汁半碗，和酒半碗，加穿山甲一錢，燒存性，當歸尾三錢，炒，俱爲末，調入藥汁內服之，以渣敷患處。○治濕毒臁瘡。用石胡荽一把，曬乾爲末，每以五錢，用眞鉛粉三錢，桐油調作

隔紙膏量瘡大小攤貼，先以溫茶洗淨瘡，縛上膏藥，即有黃水出，五六日漸愈。○治脾寒瘧疾（同上方），用石胡荽一把，杵汁半盞，入熱酒半盞，和服甚効。

離鬲草，味辛，氣寒，小毒。

（陳氏曰：離鬲草，生人家堦庭濕處，高二三寸，苗葉似幕歷，江東有之，北土無也。）

○離鬲草，吐痰飲，截瘧疾之藥也。（[illegible]）故陳氏藏器方治小兒無辜寒熱，大腹痞滿，又散膈上痰飲。生搗汁飲一合，當吐出宿物，立愈。又搗爛敷瘰癧、結核、瘤塊諸疾。此瞑眩之藥。

酸漿草，味酸，氣寒，無毒。

（蘇氏曰：酸漿草，生南中道旁陰濕地，及人家園圃中多有之，北地亦有。苗高一二寸，叢生布地，極易繁衍。葉如浮萍，一枝三葉，一葉兩片，至曉自合帖，服如一。四月開小黃花，結小莢，長一二分，內有細子，冬亦不凋。初生嫩時，小兒喜食。用揩鍮石銅器，白亮如銀。）

○酸漿草，解毒涼血之藥也。（[illegible]）唐本草治男婦大小諸熱淋，澀瀝不通，及大便秘結，或痔瘡腫痛，或肛脫不收，或天行煩熱燥渴諸疾。凡屬血熱，咸宜用之。但酸寒清利，只宜熱閉不通，如屬胃虛，自當遜避。

○集方（王氏百一選方）治小便氣血砂膏勞五種淋證，用酸漿草一把，和四苓散煎服即愈。○治諸淋澀痛（[illegible]方），用酸漿草洗淨，搗自然汁一碗，和生白酒頓熱一碗，空心飲立通。○治二便（[illegible]）不通，用酸漿草、車前草各一大把，和砂糖一錢，調服立通，未通再服。○治痔瘡（[illegible]）出血疼痛，用酸漿草一大把，水二升，煎半升服，日三次，立效。○治大腸熱極（[illegible]方），肛脫不收，用酸漿草一大把，甘草五錢，水二升，煎半升，徐徐服。○治天行時熱（[illegible]方），煩燥作渴，真熱極者，用酸漿草一大把，水二升，煎減半，飲之。○治癬瘡作癢（[illegible]方），用酸漿草搗揉擦之，數次愈。○治牙齒腫痛（[illegible]），用酸漿草一兩，洗淨，川椒五十粒，去目，為末，同搗爛，取豆大，着痛處即止。

陟釐，味甘，氣寒平，無毒。

（蘇氏曰：王子年拾遺記云：晉武帝賜張華陟釐紙，乃水中粗苔爲之，青綠色，名苔紙，青滿也。又水中石上生者，綠色如毛，詩人命名石髮是也。別錄云：陟釐生江南池澤間水中石上。一種浮水中，不生石上者，名水苔，性極冷，與陟釐少異。陟釐今曬乾之，治爲苔脯，又以糖醋作食，尤美。水中青苔，洗淨曝乾，亦可作脯食。二者皆利人。汴京市中甚多。外又有生井中者，名井苔；生老屋上者，名屋遊；生石牆側者，名垣衣；生土牆頭者，名土馬騣；生船底者，名船苔；生山石上者，名苔衣；生水中石上者，即陟釐是也。）

○陟釐，止渴止痢之藥也。生水中石上，甘寒而潔，善治暑熱之邪傷氣血者，爲煩渴而燥，爲孅痢而澁，并積熱犯胃，痢疾脹悶不食者，每需用此，屢奏功效。倘屬胃家虛寒，切勿沾口。

○集方：治以上諸病，用陟釐取新鮮者，搗汁，和白湯飲。如無新鮮，取乾者煎汁飲，亦可。

海苔菜，味鹹，氣寒，有小毒。

（蘇氏曰：海苔菜生海岸崖畔，長尺餘，彼人乾之爲脯，但味鹹，與陟釐水苔味淡不同也。）

○海苔菜，化癭瘤結核，消酒積，解丹石藥毒之藥也。得水氣而成，凡風火、烟石、丹藥諸毒，用此立解。茶積、酒積、瘟結內藏，以致面黃腹脹，投此即平。但氣雖寒平，性稍有毒，緣水氣釀結故也。如多食，亦令發瘡疥，使人面色痿黃，少血色。又飲病作嗽之人，亦忌用。

○集方：治以上諸病，用海苔菜取新鮮者，搗汁，和白湯飲。如無新鮮，取乾者煎汁亦可。切細和粥食，亦可充蔬。

石蕊味甘濇，氣寒，無毒。

（陳氏曰，石蕊生太山石上，如花蕊，別錄方雖載，其言功用，不言形狀，此生高山石上，今人謂之蒙頂茶，多生兗州蒙山石上，乃山霧日彰熏蒸日久結成，早春青翠鋪開，如手掌，蓋苔衣類也，春中刮取曝乾，俚人謂之石雲茶，其狀白色，輕薄如花蕊，其氣香如蕈，其味甘濇如茗，不可煎飲，止宜細嚼及泡湯啜，清涼有味。）

○石蕊解熱化痰，生津潤喉之藥也。此得山霧陰濇之氣以生，輕浮高潔，能去心熱煩悶不安，肝熱眼障失明，脾熱唇口瘡，發肺熱咽燥痰結，腎熱小便淋閉。凡諸虛火鬱之證，咸宜用之。（見嘉森本草）

○集方：治心熱煩悶，用石蕊花五錢，以蓮子十五粒，煎湯泡服。○治肝熱眼目昏障，用石蕊花三錢，以木賊、薄荷各二錢，煎湯泡服。○治脾熱口瘡，用石蕊花三錢，以川黃連六分，煎湯泡服。○治肺熱咽燥有痰，用石蕊花三錢，以麥冬去心、黃芩各三錢，煎湯泡服。○治腎熱小便淋閉及濕熱五疸諸疾，用石蕊花五錢，以車前子、木通各三錢，煎湯泡服。

井中苔及萍藍味苦，微甘，氣寒，無毒。

（陶隱居曰，井中苔及萍藍係古廢井中苔，萍及井中磚石上縫間所生，雖異，俱類此。）

○井中苔、萍藍，雜草，解漆瘡、熱疹之藥也。清陰寒潔，善除一切火病，并解野葛、巴豆諸毒，搗爛調水飲之。

船底苔味甘，氣冷，無毒。

（李氏曰，船底苔係水之精氣，凌清船板木中，久則變為青瀝，漸長苔蘚，因太陽日氣下照，水中陰陽之氣蒸黃木中而成。）

○船底苔止鼻衄，通血淋，化金石藥毒之藥也。

○集方：治以上諸疾，俱取雞子大一團，水煮飲之。

地衣草、味苦、氣寒。微有毒。（大氏曰、地衣草係陰濕地、日曬起苔蘚、如草狀者是也。）

○地衣草、解火毒丹毒之藥也。主身面丹腫、中惡心痛。以男人身上汗垢為丸、服七粒、白湯送、立解。

垣衣、味酸、氣寒、無毒。（李氏曰、垣衣、乃磚牆城垣上背陰處青苔衣也。生石上者名昔邪。生屋上者名屋遊、形狀相似、治療畧同。古方不曾用此。）

○垣衣、療黃疸、止衄血之藥也。別錄方主熱極疸黃、暴風口噤、衄血吐血、俱宜搗汁、和酒飲之即愈。

屋遊、味甘、氣寒、無毒。（別錄曰、屋遊生古屋上陰處苔衣也。八九月刮取用之。其長數寸者、非屋遊、即為瓦松也。）

○屋遊、涼血止衄、利氣通小便之藥也。開寶方主小兒積熱成癇、痰閉煩悶、煎湯飲之。李氏方治胃中風火、牙齦宣露、和鹽少許、泡湯漱齒、及鼻衄暴出、小水卒秘、俱宜新汲水研服。此寒淡清肅之物、多服亦損胃氣、胃寒者少與之。

○集方治犬咬痛極、取古屋上青苔屑、按之立止。

昨葉何草、味酸、氣平。無毒。（即古屋上瓦松也）（蘇氏曰、昨葉何草、處處有之。生年久陰處瓦屋上、如蓬茹、高尺餘、遠望如松、故名瓦松。）

○昨葉何草、涼血行血之藥也。唐本草治胃熱酒積、烟火金石丹毒、成血痢腸風者、服之即止。此涼血而止血也。又女子內熱血乾、經絡不行、服之即通。此又涼血而行血也。然氣寒性利、通行之用居多。如血熱氣實、酒食味厚之人、間有用之、取效如老弱胃虛乏力之人、不可泛施。

○集方治經血不通、用古屋陰處瓦松、洗者五兩、搗汁、和酒一碗、入當歸梢、紅花各一兩、煎減半、空心飲。○治熱毒酒積、腸風血痢、用瓦松八兩、搗汁、和酒一斗、入白芍藥五錢、炮薑末五錢、煎減半、空心飲。○治小便沙澁成淋不通、用瓦松一觔、濃煎湯、乘熱熏洗小腹、約兩三次即通。

土馬騣、味甘酸、氣寒。無毒。（劉氏曰、土馬騣、所在背陰古土牆之上、歲多雨則茂盛。或以為垣衣、非也。垣衣生磚牆之側、此生土牆之上。比垣衣更長、故名馬騣。亦苔草之類也。采之日乾用。）

○土馬騣、涼血止衄、退熱延骨蒸之藥也。

○集方治暴衄、取土馬騣一二兩、生酒煮滾、濾和服。○治骨蒸夜熱、取土馬騣一兩、納嫩雞中煮食、漸退。

卷栢味辛。氣溫。無毒。（別錄曰：卷栢生常山山谷。蘇氏曰：今關陝及沂兖諸州亦有之。叢生石上，春分宿根再發，高三五寸，細葉似側栢，遇雨舒開如掌，經晴卷束如拳，根紫赤多鬚，無花子。六七月采取，洗去沙土，陰乾用。）

○卷栢，行血通經之藥也。前古主女人陰中寒熱，癥瘕血閉，絕子。此屬陰不與陽，功能使陰氣起，致陽氣前通。瘀滯行而新血生，癥瘕去而寒熱解，營衛融和，子可發育矣。然滲利之物，活血通經，卷栢之常性也。苟非血有瘀畜，或不因瘀畜而致疾者，不可輕用。

○集方：治婦人血閉成瘕，寒熱往來，子嗣不育者。用卷栢四兩，當歸二兩，俱酒浸炒，白朮、牡丹皮各二兩，白芍藥一兩，川芎五錢，分作十劑，水煎服。或煉蜜爲丸，每早服

本草彙言　卷七　卷栢　四

四錢，白湯送。○治大腸下血，不拘年月遠近，用卷栢、側栢、棕櫚各等分，俱火燒存性爲末，每早食前服三錢，白湯調下。

外有地栢，即卷栢之生于地上者。生蜀中山谷，根黃莖細，狀如絲，上有黃點子，無花葉。三月生，長四五寸許，四月采，曝乾用。此藥治臟毒下血，與嫩黃耆各等分，爲末，米飲調，每服二錢。蜀醫甚神此方，特附此以廣用云。

馬勃味辛。氣平。無毒。（寇氏曰：馬勃生濕地及腐木上。陶氏曰：俗呼馬屁勃是也。五六月卒然而發，紫褐虛浮，狀如狗肝，大者如斗，小者如拳如杓，以指彈之，即有塵出，韓退之所謂牛溲馬勃，俱收者是。修治：密室中置篩，榑紙以生布張開，緩緩摩擦下，以盤承取末用。）

○馬勃，散諸種惡瘡之藥也。別錄方除淩浮馬疥疼癰疽瘡毒，散頭面卒腫。凡闘亂斯蒙之毒，結聚壅閉成病者，假此輕浮勃然卒長之物，旋放旋卷，即旋開而去[illegible]矣。他如寇氏方，治喉痺重舌，久嗽失音，凍瘡破裂[illegible]，亦取此勃然旋放旋消之意。

李瀕湖先生曰：馬勃輕虛，上焦肺經藥也。故能[illegible]欬嗽喉痺失音，瘡疥諸疾，所以東垣公治大頭[illegible]

本草彙言　卷七　馬勃　三

不利，有普濟消毒飲，亦嘗用之。

○集方：治馬疥，用馬勃擦粉，菜油調敷。○治癰疽[illegible]擦粉，米醋調敷，即消，并入連翹各少許，煎服亦可。○[illegible]頭面卒腫，并大頭瘟毒，用馬勃五錢，前碎連翹、荊[illegible]旁子、薄荷、白芷、玄參、羌活、防風各三錢，杏仁、川芎各[illegible]錢，水煎服。○治急喉痺，用馬勃擦粉五錢，火硝一錢[illegible]爲極細末，每吹一字，吐涎血即愈。○治久嗽不止，用馬[illegible]勃擦粉，研細，煉蜜丸梧子大，每服三十丸，白湯下[illegible]治積熱吐血，用馬勃擦粉，蜜湯調服一二錢。○治[illegible]久不斂，用馬勃粉敷之，間日用葱湯洗一次。

石松，味苦辛，氣溫，無毒。又名玉柏

（陳氏曰：石松生天台山石上，似松，高一二尺。山人取根莖用，諸名山皆有之。）

○石松，驅風活血之藥也。拾遺方主腳膝冷疼，皮膚麻木，一切風痺不仁之證，宜一味浸酒飲之。

桑花，味苦，氣溫，無毒。

（大氏曰：桑花生桑樹上，白蘚花，樣如錢，用刀削取，炒用。不是桑椹花也。）

○桑花，澀腸健脾，止泄止血之藥也。日華子治吐血衄血，腸風臟血，及婦人血淋，白帶諸疾，為末，服二三錢，良驗。

本草彙言卷之八

錢塘　倪朱謨純宇甫選集　男倪洙龍沖之氏藏稿

沈公岐則施甫校正

木部　香木類

桂，味甘辛，氣熱，臭香，有毒。陽中之陽，浮也。入手太陽、太陰，足太陽、太陰、少陰經。

（李瀕湖曰：桂有四等，曰牡桂、菌桂、桂心、桂枝之分，同是一種。牡桂出合浦、交趾、廣州、象州、湘州、桂嶺諸處，生必高山之巔，旁無雜樹，自為林類，葉色四時皆青，凌冬不凋，如枇杷葉，邊有鋸齒，中心有縱文兩道，宛如圭形，四月放花，無實。木皮紫赤，堅厚，臭香，氣烈，味重者為最。枝皮為桂枝，榦皮之薄者為桂皮，厚者為肉桂，為桂心。○又菌桂出交趾、桂林山谷，生必臨崖，正圓如竹，小于牡桂，亦自為林，凌冬不凋，葉如柿葉，尖狹光澤，邊無鋸齒，中心有縱文三道，三月結蕊，黃色，四月放花，五月結子，如閩河之實，木皮青黃，骨軟而皺，易于環卷如筒，亦以皮之厚薄分桂心、桂枝之差等也。○桂海志云：凡諸木類，葉中心皆一道紋，獨桂葉有兩道、三道，如圭形，故字從圭。又埤雅云：桂猶圭也，宣導百藥，為之先聘通使，如執圭之使也。古名梫，言能侵害他木，故炮炙論云：以桂木削釘釘樹根，其樹即死是也。○蘇氏曰：本草載桂只有牡桂、菌桂二種，今嶺表所出，則有筒桂、肉桂、桂心、官桂、板桂之名，而醫家用之，罕有分別。筒桂正圓如竹，有二三重者，則今之菌桂是也。官桂，皮薄色黃，肉薄脂少，即今之牡桂是也。若平卷多脂，即今之板桂是也。若肉桂、桂心，皆從筒桂中分，其肉厚，其臭香，其味辛甘，其色紫者，即肉桂也。若肉桂又去外層，留其中心一層者，即桂心也。如此分別，則桂之名義，可得而知矣。又丹陽山有一種山桂，葉如麻，四月開細黃花，木色亦紫，氣微香，只是味苦辛，與肉桂之香甘辛迥不同也，市中偽充肉桂，不可不辨。）

○桂枝，散風寒，逐表邪，發邪汗，止咳嗽，去肢節間風痛之藥也。字韻云：枝，指也，從本幹而分支，致四末也。氣味雖不離乎辛熱，但體屬枝條，僅可發散皮毛肌腠之間，遊

行臂膝肢節之處。故能散風寒。逐表邪。自內出外。辛以散之。甘以和之。熱以行之。又能入血分。利肝肺氣。止煩止咳。兼除風痺。肢節攣痛。專取其氣薄輕揚。上浮達表出汗而通腠理也。仲景書。用以治冬月傷風寒。即病邪在表者。寇成兩氏論之詳矣。

○牡桂。治癰疽排潰。瘍化膿血。止疼痛。利筋骨血脈之藥也。說韻云牡。陽象也。有花無子。較枝稍強也。故能行皮膚血肉之內。治癰疽已潰未潰。護心托裏。或筋骨痠疼。肌肉頑痲。或惡露不行。上攻心嘔。或跌撲損傷。瘀血積滯。藉此辛甘溫熱之用。善行血脈。以通筋骨。去陳以致新也。

○肉桂。去陰寒。止腹痛。通經脈。化冷痰。散奔豚。定寒疝。固泄[illegible]虛汗。暖腰膝。安蛔逆。治沉寒痼冷之藥也。此獨得純陽[illegible]之力。以行辛散甘和熱火之勢。乃大溫中之劑。凡元虛不足而亡陽厥逆。或心腹腰痛而吐嘔泄瀉。或心腎久虛而痼冷怯寒。或奔豚寒疝而攻沖欲死。或胃寒蛔出而心膈滿脹。或血氣冷凝而經脈阻遏。假此味厚甘辛大熱。下行走裏之物。壯命門之陽。植心腎之氣。宣導百藥。無所畏避。使陽長則陰自消。而前諸證自退矣。如大氏方。又謂消瘀血。破痃癖者。亦取其辛烈陽健之氣。橫行直往。瘀血得熱則行。而痃癖僻居腸胃膜絡之間。自不容于不行矣。

繆仲淳先生曰。桂。其味辛甘。其氣熱烈。其性橫行直走。獨熱偏陽。表裏俱達。如和營衛。散表邪。出汗。實腠理。則桂枝爲長。故仲景專用。以治冬月傷風寒。即病邪在表者矣。更有桂心。與肉桂。實一物也。祗去皮耳。此則走裏行營。除寒。破血。平肝。入右腎命門。補相火不足。其功能也。然大忌于血崩。血淋。尿血。陰虛吐血。咯血。鼻衄。齒衄。汗血。小便因熱不利。大便因熱燥結。肺熱咳嗽。或產後去血過多。及產後血虛發熱。小產後血虛內熱。陰虛五心煩熱。陰虛小腹作疼。血熱經行先期。血虛內熱經閉。陰虛寒熱往來。血虛經行作痛。男婦陰虛。內熱外寒。口苦舌燥。或中暑昏暈。中熱腹痛。中暑瀉利暴注如湯。或

一切滯下純血。由于內藏伏熱。或腸風下血。臟毒便血。酒後失血。或陽厥似陰。夢遺精滑。虛陽數舉。脫陰目盲。或一切溫病熱病。頭疼口渴。陽證發狂。陽毒發斑。或小兒痧疹。腹疼作瀉。痘瘡血熱。乾枯黑陷。等。三十餘證。法並忌之。誤投則禍不旋踵。僅察病因用舍。在斷行其所明。無行所疑。其難其慎。毋嘗試也。

前賢寇氏曰。桂。辛甘大熱。素問云。辛甘發散爲陽。故仲景氏用桂枝湯治傷寒表虛。皆需此藥。正合辛甘發散之意。本草三種之桂。不用菌桂。牡桂者。此二種性止于溫。不可以治風寒之病也。然農皇氏止言桂。仲景氏又分桂枝者。特取枝上皮也。王氏曰。或問本草言桂。能止

頻出汗。而張仲景治傷寒。有當發汗。凡數處。皆用桂枝湯。又云。無汗不得用桂枝。汗家不得重發汗。若用桂枝。是重發其汗。汗多者。用桂枝甘草湯。此又用桂枝閉汗也。一藥二用。與本草之義相通否乎。曰。本草言桂辛甘大熱。能宣導百藥。通血脉。止煩出汗。是調其血而汗自出也。仲景云。太陽中風。陰弱者汗自出。衛實營虛。故發熱汗出。又云。太陽病。發熱汗出者。此爲營弱衛强。陰虛陽必湊之。故皆用桂枝發其汗。此乃調其營氣。則衛氣自和。風邪無所容。遂自汗出而解。非桂枝眞能開腠理。發出其汗也。汗多用桂枝者。以之調和營衛。則邪從汗出而汗自止。非桂枝能閉汗孔也。昧者不知出汗閉汗

之意。一遇傷寒無汗者。即用桂枝。誤之甚矣。言桂枝發汗。發字當認作出字。風散營衛和。則汗自然出。非若麻黄大開腠理。發泄其汗也。其治虛汗。亦當逆察其意可也。成氏曰。桂枝本爲解肌者。太陽中風。腠理緻密。營衛邪實。津液禁固。其脉浮緊。發熱汗不出者。不可與此。必也。皮膚疎泄。自汗出。脉浮緩。風邪干于衛氣者。乃可投之發散。以辛甘爲主。桂枝辛熱。故以爲君。而以白芍藥爲臣。甘草爲佐者。風淫所勝。平以辛苦。以甘緩之。以酸收之也。以薑棗爲使者。辛甘能發散。而又用其行脾胃之津液。而和營衛。不專于發散也。故麻黄湯不用薑棗。專于發汗。不待行其津液而[illegible]汗也

○集方。治傷寒太陽病。頭痛發熱。汗出惡風者。用桂枝。白芍藥。生薑各二兩。甘草一兩。大棗十二枚。水五升。微火煎至二升。徐徐服。○治傷風冷咳嗽。用桂枝五錢。防風。半夏各三錢。乾薑一錢。北五味子。北細辛。各五分。水煎服。○治四肢骨節間風痛。用桂枝。當歸。白朮。防風。羌活。各二錢。薑黄。秦艽。紅花。川芎。黄柏。甘草各一錢。水煎服。

○集方。治癰疽發背。膿水清稀。膿毒不化。疼痛不止。用牡桂五錢。白芷。黄耆。當歸。皂角刺。穿山甲。人參。各三錢。羌活。乳香。沒藥。金銀花。各二錢。水酒各半煎服。○治産後惡露不行。上攻心腹。用牡桂五錢。玄胡索。醋炒。五靈脂。當歸。紅花。陳皮。各二錢。水煎服。○治跌撲損傷。瘀血積

滯。脹悶疼痛。用牡桂三錢。當歸。川芎。紅花。蘇木。桃仁。乳香。沒藥。牛膝。各二錢。水煎服。

○集方。治三陰直中寒證。頭不疼。身不熱。口不渴。或有微熱微渴。自汗。腹痛泄瀉。吐冷涎。吐蛔蟲。四肢厥冷。躁煩不寐。或語言錯雜。時昏時省。用肉桂。附子。童便製。人參。各三錢。乾薑。白朮。炒。黄耆。吳茱萸各五錢。北細辛一錢五分。水煎服。○治三陰寒疝。攻冲欲死。亦有厥逆自汗者。用肉桂。附子。童便製。小茴香。青皮。橘核。厚朴。陳皮。吳茱萸各三錢。水煎服。○治奔豚疝瘕冲築。用肉桂。乾薑。小茴香各五錢。牡丹皮。木香。檳榔各二錢。甘草五分。水煎服。○治婦人經脉冷凝。阻遏不通。腹痛脹悶。用肉桂

木香、各三錢，陳皮、玄胡索、香附，俱醋炒，當歸、川芎，俱酒炒。牡丹皮、桃仁、烏藥各二錢。水煎服。○治積年痃癖不消，時發時止。用肉桂、木香、白朮各一兩五錢，當歸、枳實、川芎、香附、小茴香，俱酒炒，佛手柑、茯苓各三兩，澤瀉、山藥各二兩，俱炒過，研為末，煉蜜丸梧子大。每早服五錢，白湯下。○治胎死不下。用肉桂心研細末二錢，芒硝一錢，熱酒調服，立下。如難產及橫生者，本方去芒硝，加麝香二分，溫酒調下。○治大人小兒及老邁人食水菓乾菓等物，傷脾腹脹。用肉桂心研末，米糊丸菉豆大，每服五十丸，酒下。○治重舌蛾口。用肉桂末，薑汁調塗患處。

木犀花　味辛、甘、苦，氣溫，無毒。

（寇氏曰：木犀花生閩粵、江浙山谷中，亦是筒桂之類，而性大異。其葉不似柿葉，有鋸齒，如枇杷葉而粗澀者，有無鋸齒，如梔子葉而光潔者。叢生巖嶺間，謂之巖桂。土人又呼為木犀。有三種之分：其花白者，名銀桂；黃者，名金桂；紅者，名丹桂。有秋花者，春花者，四季花者，有逐月花者。其皮薄而不辣，白而不赤，陰淡而不香，不堪入藥。惟花香馥馨蘊，可收醃乾作香者，或浸酒，或鹽漬，可作香茶、香鹽之類。）

○木犀花，散冷氣，消瘀血，止腸風血痢之藥也。其味苦，能下氣；其氣溫，能散寒；其臭香，能破結。凡患陰寒冷氣，瘕疝奔豚，腹內一切諸冷病，蒸熱布裹熨之，諸疾皆愈。

松脂　味苦、甘，氣溫，無毒。

（別錄曰：松脂生太山山谷中，原雖有，不及邊塞與衡山者佳。以通明如薰陸香成顆粒者為上。柏陵子云：凡松脂以老松皮內自然流出，凝聚，及流結根底，不見日月者為第一。入地深久，化為琥珀。斲取者次之，煮成者亦不堪用。五六月采。雷氏曰：修治須鎔化，濾去松木及沙石，水內冷定，而用麻布袋盛，入沸湯煮一日，取出布袋浮水面者用，不出袋者不用。○李氏曰：松樹磥砢修聳多節，其皮粗厚有鱗，其葉二三月抽蕤，有二針、三針、五針之別。生花長三四寸，采其花蕊為松黃。結實狀如猪心，疊成鱗砌，秋老則子長，甲裂隨風飛散，著土便生。惟遼海及雲南者，子大如巴豆，可食，謂之海松子。詳見果部。）

○松脂，拔毒消癰，吸膿去腐肉之藥也。其氣溫燥，其質粘泥，予外科作散子敷塗，或和油煉成膏子貼，蓋一切潰爛敗穢腐肉，能排膿血，為必用之物。故前古主癰疽惡瘡、白禿、癧疥、齲牙、鼠瘻，不過外應敷貼，功盡之矣。有言

煉久色白如玉，服食能潤心肺，輕身延年，此荒唐不稽之說，不可信從。如入瘍科敷貼料中，可去膿拔毒。腐穢初作，或初潰者可用。如久潰瘍，膿血已盡，氣虛血與肉泛而不斂者，用此不惟不能生新肌，反增潰爛，延流皮肉，損人筋脈，不可勝言。用者當細審之。

○集方：治癰疽惡毒及背發一切腫毒，以成膿潰未破出頭者，用煉過松脂四兩，香油一兩，鎔化，用銅綠五錢，研細末和入，用薄油紙攤貼毒上，膿血盡出，俟膿將淨，然後以丹粉膏貼之。○治癰疽腫毒潰破，膿水淋漓，膿頭不出，用煉過松脂一兩，滴明乳香、真沒藥俱放瓦上焙出油，各五錢，樟腦一錢，共為細末，摻入毒內，拔膿去毒。

○治小兒白禿瘡。用煉過松脂、黃丹各五錢，輕粉三錢，共爲細末，菜油調搽。先用米泔湯洗淨，搽藥。一日一次。○治瘰癧瘡疥。用煉過松脂五錢，大黃、萆茇各一兩，樟腦、檳榔各五錢，共爲極細末，用豬脂油一兩和研爲丸，加水銀八錢，再研，以水銀散不見點爲度。每遇搽瘰疥瘡癬，以藥丸瘡上摩之，一二次愈。○治蟲蛀牙痛。用煉過松脂一兩，菜油三錢，火上熬化，將冷凝，加入真蟾酥末五分，用筯攪勻，取米粒大，內入牙痛隙處，即止。○治鼠瘻數眼，穿破，內潰不收。用煉過松脂一兩，菜油三錢，火熬化，加飛過黃丹五錢，用筯攪勻，取膏于撚成細條子，內入孔中，膿水拔出，漸乾收口。用人參、黃耆、白术、當歸各三錢，水煎服即止劑。

○續補方。○治風蟲牙痛。用松脂一塊，滾湯泡化，一漱即止。○治一切瘻瘡。用松脂爲末，填孔令滿，日三四度。○治小兒頭上軟癤，頻發不愈，俗名軟癤頭。用煉過松脂八兩，銅綠二兩，麻油三兩，豬膽汁三箇。先將松脂火上鎔化，乃下油并膽汁，熬勻，傾入水內，扯拔百遍，貯磁器內。遇此患，每用細布攤貼，不須再換。○治婦人白帶，久不愈。用煉過松脂五兩，酒二升，煮乾，入木臼內杵細，爲丸梧子大。每服百丸，溫酒下。○治一切腫毒。用煉過松香八兩，銅青八錢，蓖麻子仁六兩，同搗成膏，攤貼。未成即消，已成即潰，甚妙。○治一切膿爛瘰瘡。用煉過松香四兩，葱頭二兩，入臼內搗爛，加入生豬脂三兩，共搗成膏。用油單紙攤，夾紙貼，每日翻換，以米泔溫洗，半月愈。

松實　味甘，氣溫，性和，無毒。

（方氏曰：松實出松卵鱗甲中，見前松脂條內，又互見果部中。）

○松實補精髓、血氣之藥也。陳氏方主風痺寒氣，虛羸少氣，諸不足。經云：精不足者，補之以味。甘能益血，是已。形不足者，溫之以氣。溫能和氣，是已。服餌却疾延年。除五勞七傷，惟此足以當之，然亦久服，乃可責其效耳。

○集方。治風痺寒氣，虛羸少氣，及五藏勞傷，咳嗽吐痰，骨蒸盜汗，心神恍惚，飲食不甘，遺精滑泄等證。用松實仁八兩，麥門冬不去心一觔，金櫻子、枸杞子各八兩，熬膏，

少加煉蜜收。每早晚白湯調服十餘茶匙。

松節　味苦，氣溫，無毒。

（方氏曰：松節出大松樹中，劈取赤黑油膩者佳。）

○松節去骨節中風濕之藥也。別錄方主一切風虛風氣，骨痺痿麻，腳膝疼痛，宜釀酒飲之。此係松樹之骨也，質堅氣勁，久亦不朽，故去筋骨間風濕諸病。但氣溫性燥，如足膝筋骨有風有濕，作疼作痠，痿弱無力者，用此立痊。倘情慾斷喪之人，陰虛髓乏，血燥有火者，宜斟酌用之。

○集方治腳弱骨節風。以松節釀酒飲。○治遍身筋骨內痛。用松節打碎如豆大，炒焦，釀酒飲。○治歷節風痛，四

肢如解脫。以松節十觔，酒三斗，浸二七日。每服一合，日五六服。○治跌撲損傷（醫氏方集）用松節煎酒飲。

松葉味苦，氣溫，無毒。

（方氏曰：松葉又名松毛，叢針上指，宛如鬚髮。有二鬣、三鬣、五鬣之異。）

松毛，去風濕，療癬癩惡疾之藥也。（王赤上）大氏方云，松毛性燥質利，炒焦善去風濕頑癬濕爛，浸漬不乾。并敷冬月凍瘡。生取搗爛作丸，能治大風癩疾，或歷節風痛，或腳氣痿痺，或頭風頭痛等證。已上數病，凡關風濕致患者，相宜。倘因血虛風燥致病者，禁用之。

○集方：治風濕頑癬（外[illegible]方）用松毛炒黑一兩，和輕粉、樟腦各三錢，濕則乾摻，燥則用油調搽。如癢極者，以米醋調敷。并

治凍瘡如濕爛者乾摻，乾腫者作癢者，悉依頑癬同法。○治大風癩瘡（同前）用松毛取生新者，搗爛，焙燥，每用松毛二兩，枸杞子二兩，浸酒飲，時時服。不得大醉。久服效。并治歷節風痛、腳弱痿痺。○治頭風頭痛（方脈正宗）用生鮮松毛四兩，搗爛，焙燥，浸酒。時時飲之。其渣取出，貼頂門，用布裹頭，三日乃愈。

松花味甘，氣溫，無毒。

（方氏曰：松花即松黃，拂取之，似蒲黃，功用勝如脂、仁及葉也。）

○松花輕清涼滑，療久痢，解酒毒，清血熱之藥也。（食物本草）（王昕源）土人及時拂取，和白米炊實，白糖調勻，印為糕餅，作茶點食之，大能養胃清鬱熱。遞東風俗，以此款賓，歷載關所時尚也。

○集方：治痘瘡（幼兒百問）癢塌，破損血出，或皮裂膿流，用松花摻之，即乾。○治久痢不止（方脈正宗）延及數月，膿綢[illegible]，用松花，每服三錢，食前米湯調下。○治好飲之人（[illegible]集）酒毒發作，頭痛目眩，或咽喉閉悶，或下利清水，日數十行，形神委頓（庸工悞作陰寒自利，妄用溫燥熱藥者，多有之。）用松花一兩，焙，陳皮五錢，川黃連三錢，甘草二錢，俱微炒，磨為末，與松花和勻，每早晚各服二錢，白湯調服。二日即愈。

（治吐血胸中氣塞。吐出血紫黑色成塊者。是瘀血也。用松花、茜草根、桃仁、大黃、枳殼各一錢。○治吐血遇勞即作者，是勞傷動血也。用松花、人參、白朮、白芍藥、麥門冬、生地黃各一錢。○治衄血不止，出於肺也。用松花、茜草根、黑山梔、黃芩、桔梗、甘草、玄參、生地黃、桑皮各一錢，稱一兩。○治咳血不止，出於肺也。用松花、川貝母、生地黃、桑皮、款冬花、天麥二冬各一錢五分，甘草一錢。○治咯血不止，出于腎也。咯出血屑，用松花、熟地、天麥二冬、阿膠各二錢，紫菀、知母、黃栢各一錢。○治嘔血不止，出于胃也。鮮血隨嘔而出者，用松花、茜草根、茯苓、川貝母、天麥二冬、杜仲、生地黃、柿餅各二錢，甘草七分，炮薑灰八分。○治溺血不止，心移熱于小腸也。用松花、生地黃、黃芩、黃栢、黑山梔、知母、木通、甘草、天門冬、川黃連、萹蓄、茯苓、燈心各二錢。○治便血不止，大腸出血，熱府蘊積淫熱也。用松花、茜草根、側栢葉炒、槐角、地榆、阿膠、當歸、生地各二錢，黃栢、白芍藥、蒼朮、黑山梔、川芎各一錢。此方不問糞前糞後，并腸風下血症，皆治之。）

栢子仁，味甘，氣平，無毒。入足厥陰、少陰，又入手少陰經。（陶隱居曰：栢處處有之，當以太山、陝州、宜州、乾陵者爲最。四時長青，葉皆側生，枝皆西向。有四種：一曰叢栢，枝葉叢聚，今人呼爲千頭栢；一曰渾栢，獨葉茂密，木心紫赤；一曰刺栢，枝皆有刺，撫之戟手，皆不結實，惟堪作香，不入藥用；一曰扁栢，木心淡白，芳香清烈，作花細小，結實有角，角四裂，出子，霜後采取，中仁黃白色，最多脂液。生乾陵者，木理旋繞，有美氣，山水鳥獸狀。修治：蒸熟，去皮殼，擣作餅子，日乾收用。）

○栢子仁，潤燥補髓，養心神，定驚悸之藥也。（李東垣）此藥氣極芬芳，（[illegible]）則脾胃所喜；質極潤澤，則肝腎所宜。故前古謂安養五藏，主驚悸，定心神，悅顏色，聰耳目，爲延年却病之上劑也。但體質多油，腸滑作瀉者勿服；膈間多痰者勿服；陽道妄舉，腎家有熱者勿服。已油者能令哮肺，勿入藥用。

李瀕湖先生曰：按六書精蘊云，萬木皆向陽，而栢獨西指，蓋陰木而有貞德者，不畏霜雪，得木之正氣也。又埤雅云：栢之指西，猶鍼之指南也。

○集方：治心神虛怯，（[illegible]）腎髓衰乏，驚悸怔忡，志意恍惚，或睡臥不寧，或虛煩與懶等證。用栢子仁二兩，研；人參、茯苓、當歸、川芎、半夏、遠志、棗仁、白朮，俱炒，各一兩二錢；川黃連酒炒，五錢。共爲末，（[illegible]氏方）煉蜜丸梧桐子大。每早晚各服三錢，白湯下。○治小兒躽啼驚癇，腹滿，大便如青苔色。用栢子仁研末，白湯調服二錢。○治黃水濕瘡，（[illegible]方）用真栢油二兩，熬稠，搽之立愈。

側栢葉，味苦澀，氣微寒，無毒。（雷氏曰：栢葉有花栢葉、叢栢葉，及有子圓葉。其有子圓葉成片，如大片雲母，葉皆側形，葉上有微赤毛者，宜入藥用。如采葉，須隨四時建方：春採東，夏採南，秋採西，冬採北，取其得月令之氣也。）

○側栢葉，止流血，去風濕之藥也。凡（[illegible]）吐血、衄血、崩血、淋血，血熱流溢于外絡者，搗汁服之立止。凡歷節風痛，遍身走注，痛極不能轉動者，煮汁飲之即定。惟熱傷血分，與風濕傷筋脉者，兩病專司其用。但性味苦寒多燥，如血病係熱極妄行者可用，如陰虛肺燥，因咳動血者，勿用；如痺病係風濕閉滯者可用，如肝腎兩虧，血枯髓敗者，勿用也。司業者當熟審之。

盧子由先生曰：扁栢，芳香高潔，文彩陸離，即參天直上，誰能禁之，乃俛焉西向，以順受金制，可謂至德也已。巨擘喬木，作社稷棟梁，宜哉。殷人以栢，其通知後世之西向乎。

○集方：治吐血、衄血（[illegible]）不止，或血崩、血淋諸血熱證。用新鮮側栢葉五錢，白芍藥、懷生地、眞阿膠各三錢，甘草八分，水煎服。○治歷節（[illegible]）風痛，痛如虎咬，走注遍身，不能轉動，即痛極，晝夜不寧。用側栢葉五錢，木通、當歸、紅花、羌活、防風各二錢，水煎服。

○續集方：治小兒（[illegible]方）洞痢，用側栢葉炒黃，煎湯代茶。○治蠱（本）痢下血，黑色或茶脚色，或膿血如凝色，用側栢葉、川黃連，俱微炒，各等分，共爲末，每服一錢，空心白湯調下。治腸風亦効。○治酒（[illegible]方）毒下血，或下痢，用嫩側栢葉九蒸九

晒。二兩，陳槐花炒焦，一兩，爲末，煉蜜丸，梧子大。每空心白湯下百丸。○治中風不省人事，得病之日便進此藥，（[illegible]氏方）可使風退氣和，不成廢人。用側栢葉一握，去枝，葱白一握，連根研如泥，無灰酒一升，煎一二十沸，服。如不飲酒人，分作四五服，服完方進他藥。

胡桐淚味鹹苦，氣大寒，無毒。氣味俱厚，陰中之陰也。入足陽明經。

（蘇氏曰：胡桐淚出肅州以西平澤或山谷中，今涼州亦有之。其樹高大，皮葉似白楊桐桑輩，故名。木堪作器用。其脂液下地與土石相雜，狀如黃礬而堅實，得水即消，微若礬石消石之類，冬月呼之。）

○胡桐淚降火熱，清痰結之藥也。經曰：熱淫于內，治以鹹

寒。如急患火熱火毒，咽喉口齒腫脹不通，或心腹煩滿而脹者，用此鹹能潤下，苦能湧上，或下而愈，或吐而蘇，取効甚捷。滑氏方又治熱極急黃，黑汗、黃汗諸證，皆賴其鹹苦而寒，能除極熱之病耳。然性善湧泄，如胃家虛寒不食者勿用。

○集方治咽喉急脹，（[illegible]方）腫結不通。用胡桐淚三錢，硼砂二錢，生礬一錢，膽星一錢五分，共爲末。用一二茶匙，薑湯調嚥，漸消而通。○治人患急黃，（千金方）或黑汗、黃汗，用胡桐淚三錢，白湯調服。○治牛馬病急黃，（聖惠方）黑汗、黃汗，用胡桐淚一二兩，研細末，水調灌之，立愈。

杉木味辛苦，氣溫，無毒。可升可降，陽也。入足陽明經。

（蘇氏曰：杉木生江南深山中，木類松而徑直，葉硬偏如刺，附枝生，結實如楓實。江南人以驚蟄前後分枝插種，出蜀黔及諸峒所產者更良。其木有赤白二種，赤杉實而多油，白杉虛而潔，燥有斑紋如雉尾者，作棺尤貴，不生白蟻。郭氏云：眞杉木可以爲船，爲棺，及作屋柱，埋入土中不易朽。燒炭拌硝黃作火藥，甚速。）

○杉木去惡氣，消脹氣，下脚氣之藥也。（[illegible]）別錄方（[illegible]）煑湯外洗，治風濕毒瘡，腫滿脚氣。又大氏方煎汁內服，治奔豚上氣，心腹沖脹等疾。取辛溫直達，開發升賓之性，若毒瘡，若脚氣，若脹滿，若奔豚，四者皆屬五氣壅逆，不升不降之故。此藥氣味芬芳，能下逆氣，散毒邪，有開達內出之功。大能發揚火鬱，踈申肝令，獨擅其長者矣。奈世人舍近求遠，深可慨也。

前賢柳氏云：某得脚氣，夜半痞絕，脇有塊，大如石，困不知人，搐搦上視，三日，榮陽令醫用杉木節、橘樹葉各三兩，大腹子七枚，俱切碎，童子小便三大碗，水一碗，共煑至碗半，徐徐灌之。少頃大下三行，即氣通塊散，人事復甦。

○集方治平人無故（[illegible]氏方）腹脹，卒然成蠱，此時行惡毒之氣也。用眞杉木片四兩，和眞紫蘇葉三兩，煎湯飲之。○治脚（[illegible]）氣腫滿，用眞杉木片二兩，牛膝、木瓜、檳榔各一兩，煑湯淋洗，三四次愈。○治遍身風濕毒瘡，（[illegible]方）或癢或痛或乾或濕，用眞杉木片八兩，煎湯浸洗，自消。○治奔豚瘕疝沖（[illegible]方）築，脹悶疼痛，用眞杉木片二兩，吳茱萸、青皮、小茴香、橘

核各八錢，乾薑五錢，煎汁飲。○治轉筋霍亂，脚氣，用眞杉木片二兩，香薷、木瓜各一兩，煎湯溫飲。○治臁瘡黑爛。用多年老杉木節，燒灰，研末，麻油調，隔油單紙攤貼，紮定。數換卽愈。（常氏方）○治小兒陰腫赤痛，日夜啼哭，用眞杉木燒灰，三錢，入鉛粉一錢，淸油調搽，卽安。

樟木味辛，氣溫，無毒。

（李氏曰：樟木，西南處處山谷有之。其木理細而錯縱有文，故名樟。木高丈餘，葉小似楠而尖長，背有黃赤茸毛，四時不凋。夏開細花，結小子。木大者數抱，宜于雕刻器皿。○樟有大小二種，紫淡二色，外有釣樟，卽樟之小者。二樟一類二種，生植七年，乃可分別。）

○樟木辟邪氣，解中惡，定霍亂之藥也。（陳藏器）此物辛香竄烈，能發胃中停痰，食吞吐酸，水伏飲積滯等證。又煎湯浴脚氣，洗疥癬，能祛風逐濕，涵而善升，能達木鬱之病。如胃虛中氣弱者，禁用。

○集方（陳氏方）治霍亂及乾霍亂，煩吐者，以樟木屑三五合，煎濃汁飲之，卽吐，甚良。（李正作）又中惡鬼氣卒死者，以樟木屑燒烟薰之卽甦。○治手足痛風，痛如虎咬，用樟木屑數升，煎湯，乘熱用布醮湯熨洗，安手足于湯上薰之，或坐湯桶上，以草薦圍住蒸之，其效甚速。

○釣樟，又名烏樟，卽樟木之小者。氣味功用，與樟木主治同。惟治金瘡出血不止，刮末敷之甚驗。又特異于樟木也。

辛夷味辛，氣溫，無毒。氣味俱薄，浮而散，陽也。入手太陰、足陽明經。

（別錄曰：辛夷生漢中、魏興、梁州山谷，今江浙處處有之。人家園圃中多種植。樹高二三丈，枝條繁茂，極剛叉脆。二三月開花，花出枝頭，有紫白二色，花落方生葉，葉闊隨含花苞，經夏秋歷冬，其苞漸大，長半寸，而尖銳，苞外有苞重重，有青黃茸毛，順鋪苞形如小毛桃，開花時脫苞，花似蓮花，大如茶盞，如蘭花香。白者呼爲玉蘭，紫者呼爲紫蘭。更有千瓣者，以紫花之蕊爲貴，年淺者有花無子，經三十年方結實也。修治用粗布拭去蕊上毛，以瀞水浸半日，焙乾用。）

○辛夷溫肺氣，通鼻竅之藥也。（別錄）故善走三陽，（[illegible]國家林）除風寒風濕于頭面耳鼻齒牙諸分。若頭眩昏冒，兀兀欲嘔；若面腫面癢，隱隱如蟲行；若耳閉耳鳴，或癢或痛；若鼻淵鼻塞，或脹或瘡；若齒痛齒腫，或牙齦浮爛等證，咸宜用之。

此藥辛溫上達，能解肌散表，芳香淸潔，能上竄頭目，逐陽分之風邪，疏內竅之寒鬱，則諸證自愈矣。前古謂通九竅，利五藏，通關脉，退寒熱，意在斯乎。但辛香浮竄，氣虛之人，雖偶感風寒，致諸竅不通者，不宜用；頭腦痛屬血虛火熾者，不宜用；齒牙痛與耳病屬肝火胃火者，不宜用。

李士材先生曰：肺開竅于鼻，而胃脉環鼻上行。凡中氣不足，淸陽不升，則頭痛而九竅不利。辛夷稟春陽之氣，味薄而散，能助胃中淸氣上達高巔，故頭面九竅皆歸于治平也。

○集方（[illegible]魯方）治頭眩昏冒欲嘔，此屬寒痰也。用辛夷一兩，製半

夏、膽星、天麻、乾薑、川芎各八錢，爲末，水發爲丸。每晚服三錢，白湯下。○治頭面腫癢如蟲行，此屬風痰也。用辛夷一兩，白附子、半夏、天花粉、白芷、殭蠶、玄參、赤芍各五錢，薄荷八錢，分作十劑服。○治耳閉不通，或虛鳴如雨響，或耳內作癢作痛，（方脈正宗）用辛夷、黃芩、柴胡、川芎、半夏、甘草各五錢，爲末，每晚服三錢，白湯調下。如腎虛亦有耳閉耳鳴，作癢作痛者，用辛夷二兩，配入六味地黃丸料中，每服五錢，臨睡白湯送下。○治鼻淵鼻塞，（千氏方）用辛夷、甘草各一兩，蒼耳子八兩，甘菊花二兩，俱炒，江魚齒一兩五錢，膠泥裹，火內燒紅，去泥，俱爲細末，每晚服三錢，白湯調下。○治鼻內作脹，或生瘡，此係酒毒者多，用辛夷一兩，川黃連五錢，連翹三兩，俱微炒，研爲末，每飯後服三錢，白湯下。○治齒牙作痛，或腫，或牙齦浮爛，用辛夷一兩，蛇床子二兩，青鹽五錢，共爲末，摻之。

沉香。味辛，氣溫，臭香，無毒。氣厚味薄，可升可降，陽也。入足陽明、太陰、少陰，兼入手少陰、足厥陰經。（凡臭味香甜者性溫，辛辣者性熱。）

蘇氏曰：沉香生天竺諸國，及海南、海北、古城、眞蠟、黎明等處。寇氏曰：嶺南諸處悉有，傍海處尤多，奇幹連枝，岡嶺相接，木理虛柔，凌冬不凋，小者拱抱，大者數圍，體如白楊，葉如橘柚，花如梨，穗實如小檳，皮膜可作紙。未經斧斤者，雖百歲之木，亦不孕香；若半老之木，其斜枝曲幹，斫鑿成坎，雨露浸漬，斯膏脈凝聚，漸積成香。李氏曰：凡三等，其一即斫鑿之坎，氣聚色變，木端棕透，切而取之，入水輕浮者，爲黃熟；其二津沫營注，木理堅實，剝而取之，入水或沉或半浮者，爲棧香，棧香、速香也；其三精液所鍾，蘊結成塊，或自脫，或解取，入水沉底者，爲沉香。品亦凡四：曰熟結，曰生結，曰脫落，曰蟲漏。蟲漏者，因蠹隙而結也；脫落者，因水朽而結也；生結者，因斫鑿而結也；熟結者，因自腐而結也。復熟結一名死結，積則全體膏脈凝聚成香，此等之至上品之至貴者也。前四結總謂一木奇狀，其多凡四十有二，如角沉、韮沉、黃沉、烏沉、水盤、承露、青桂、黃蠟、雞栗、蕈菌、靈芝、金絲、葉子、麻葉、竹籬、機棧、附子、馬蹄、牛頭、燕口、蝟刺、龍鱗、烏刺、虎脛、雞骨、蓬萊、虎斑、弄水、鷓鴣斑、仙人杖，及爲杵、爲臼、爲肘、爲拳、爲山石、爲槎析、爲鳳、雀、龜、蛇、雲氣、人物，種種肖象，既所禀不侔，亦復優劣有異，各俟其形全氣足，而後采取，功力始備。今嶺南人不耐其成，爭多趨利，伐賊之害，惟璚管黎人非時不妄剪鑿，故異獲異香，雖纖薄如紙，入水亦沉，萬安黎母山東峒者，更冠絕天下，一片嘗值萬錢，以東峒日鍾朝陽之氣，其香更幽耀于他產耳。若舶上來者，臭多辛烈，尾烟必焦炙，雖海北者更甚，故南人不甚重之。此皆沉香等品奇狀也。盧氏曰：又奇南香，原屬沉香同類，附樹分牝牡，則陰陽兆質，臭味情性，各各差別。其成沉之本爲牝，爲陰，故味苦厚，性通利，臭含藏，燃之臭轉勝，陰體而陽用，藏精而起亟也。成奇南之本爲牝爲陽，故味辛辣，臭顯發，性禁止，藥之閒二奇傾陽之體而陰用也。至若黃棧品，成四結狀貴黃四十二等，亦有二則，因之以論高下，沉不惟棕透而黃實肖棧材，白臭亦得易散，奇本黃熟不惟棕透而黃實淺如熟色，遠勝生香，熟結僞南，襲難過也，棧即奇南猶液重者，曰金絲，其熟結、生結、蟲漏、脫落四品，雖就稱奇皆結，而四品之中，又各分別油結、糖結、蜜結、綠結、金絲結，爲熟、爲生、爲漏、爲落，並以成狀耳。大都沉香所重在

（質、故遍體作香。入水便沉。奇南雖結同四品、不惟味涵辛辣、着舌便木。頭四結之中、分必拖木。曰油。曰糖。曰蜜。曰綠。曰金絲。色相生成、亦逈別也。雷氏曰。凡使沉香、須要不枯、如觜角硬重、沉沒水下者為上。用紙裹懷中、候燥、乳研易于成粉。）

○沉香降氣溫中之藥也。（陳承氏）此劑得雨露清陽之氣最久。其味辛。其氣溫。其性堅結。木體而金質者也。善治一切衝逆不順之氣。上而至天。（肺）下而及泉。（腎）故上氣壅者。可降。下氣逆者。可和。與諸藥為配。最相宜也。滑氏本草。治上熱下寒。上盛下虛。或濁氣不降。清氣不升。為病逆氣喘急。或大腸虛閉。小便不通。或男子精寒。婦人血冷。大能調中。利五藏。壯元陽。補腎命。方書屢用有效。然氣味辛溫。香竄。治諸冷氣逆氣。氣鬱氣結。殊為專功。如中氣虛勞。氣不歸元者。心鬱不舒。由于火邪者。命門真火衰。由于精耗血竭者。俱忌用之。前古謂能殺鬼邪。解中惡。清人神。消風水毒腫。並宜酒煮服之。此不過因其辛陽香散。辟此陰疑不正之氣故也。如病陰虛氣逆上者。（切忌）

○集方。治壅（方脈正宗）氣衝逆不能下降。為脹滿。為喘促。為心胃不通。或痛或痞者。用沉香。磨汁數分。以杏仁、大腹皮、茯苓、廣陳皮、川貝母、各一錢五分。製半夏一錢。甘草五分。水煎。和沉香汁服。內熱者。加川黃連、梔黃芩、各一錢。內寒者。加乾薑、木香、砂仁、各一錢。（方氏切要）下氣虛而上逆者。加人參、白朮、各一錢五分。○治肺氣壅逆不下。用沉香。磨汁數分。以杏仁、桔梗、桑白皮、廣陳皮、白前、茯苓、各一錢。水煎。和沉香汁服。○治陰虛腎氣不歸原。用沉香磨汁數分。以麥門冬、懷熟地、各三錢。茯苓、山藥、山茱萸肉、各二錢。牡丹皮、澤瀉、廣陳皮、各一錢。水煎。和沉香汁服。○治上熱下寒。有二法。一法。用沉香磨汁一錢。以半夏薑製一錢五分。附子童便製三錢。白朮炒。肉桂各二錢。水煎。和沉香汁頓冷服。此引陽下降。則寒自去。一法。用沉香磨汁一錢。以半夏薑製一錢五分。川黃連、梔黃芩、天花粉、連翹、石膏各三錢。水煎。和沉香汁頓熱服。此瀉陽下泄。使陰氣上升。陰陽和而上不熱。下不寒矣。○治上盛下虛。亦有二法。一法。用沉香磨汁一錢。以蘇子、杏仁、廣陳皮、桑白皮、厚樸、枳殼、車前、木通、茯苓、各二錢。水煎。和沉香汁服。降其上盛之氣。則下虛自愈。一法。用沉香磨末一兩。以人參、鹿茸、補骨脂、懷熟地、枸杞子、山茱萸、虎脛骨、川萆薢、川石斛、牛膝、山藥、肉桂、當歸、小茴香、俱鹽酒洗炒、各二兩。研為末。煉蜜丸梧桐子大。每早服五錢。白湯下。峻補其下。則上盛自平。下虛自愈。○治濁氣不降。（方脈正宗）清氣不升。用沉香磨汁一錢。木香、茯苓、車前子、厚樸、防風、升麻、真蘇子、杏仁、廣陳皮、白前、白芥子、各一錢五分。水煎。和沉香汁服。○治大腸氣滯。虛閉不行。用沉香磨汁八分。以當歸、枳殼、杏仁泥、肉蓯蓉、各三錢。紫菀一兩。水煎。和沉香汁服。○治膀胱氣滯。虛澀。小水不通。用沉香磨汁一錢。以茯苓、車前子、牛膝、燈心、甘草、瞿麥、麥門

冬、地骨皮各二錢。木香八分。水煎和沉香汁服。○治男子精寒不嗣。并婦人血冷不育。（華本卷手集）川沉香磨末。一兩。鹿茸一對。黄耆、白朮、枸杞子、懷熟地、山茱萸、覆盆子、補骨脂、北五味子、九製何首烏、當歸、川芎。俱酒洗炒。各四兩。磨爲末。以黑豆濃汁。煮紫河車二具。搗爛成膏。爲丸如黍米大。每早服五錢。酒下。○治心神不足。火不降。水不升。（王璆百一選方）健忘驚悸。用沉香、人參各五錢。茯神二兩。共爲末。煉蜜丸如梧桐子大。每早晚各服百丸。白湯下。○治轉脬不通。（醫壘元戎）非小腸膀胱厥陰受病。乃强忍房事。或過忍小便所致。當治其氣則愈。非利藥可通也。用沉香、木香各二錢。（王仲陽家[illegible]）爲末。空心用白湯調服。○治腎家虛冷。目暗不明。宜暖

水臟。用沉香一兩。眞川椒去子炒出汗四兩。共爲末。酒（試效）糊丸梧子大。每服六十丸。空心淡鹽湯下。○治胃冷作（活人心統）呃。用沉香、眞紫蘇葉、白豆蔻仁各一錢。共爲末。每服七分。柿蒂湯調服。

奇南香。味辛辣。氣溫。無毒。其生成出處。主治功用。與沉香同。但性氣較沉香稍潤緩耳。氣惟含攝。能縮二便。今講官入値經筵。常佩此香。以免泄氣。

丁香。味辛甘苦。氣熱。無毒。純陽。氣厚味薄。入手太陰、足少陰、陽明經。

蘇氏曰。按廣志云。丁香出東海及崑崙國。今交廣南番亦有。其樹高丈餘。凌冬不凋。木類桂。又似栗。葉似櫟。花似梅花。色黄緋。實如山茱萸。色紫黑。形兩合可分。開如雞舌。故又名雞舌香。八月采。又云臘冬生花。至次年方采實。又一說是草類。蔓生。今乳香中揀出一種。如棗核。堅硬。剖之無子。燒亦不香。乃番棗核也。

○丁香。煖胃溫脾。（日華子）回陽逐冷之藥也。故方氏方。主除嘔吐。止泄瀉。理腹痛。去呃忒。散奔豚。逐疝氣。辟鬼疰。截瘧痢。煖腰膝。壯元陽。乃溫中建陽之品。凡諸陰寒水冷之邪爲患。咸需用之。又按開寶方。治齒疳䘌䘌。口臭。胡氣。及痘瘡寒陷。灰白不發諸證。亦取此辛溫純陽。健烈之力。而香竄又能走毒。燬除穢濁。發新陽故也。如以上諸證。

須眞虛寒者。方可投入。如兼內熱有火證者。槩勿施用。若陳氏方。治痘瘡濕爛不起發。或腹脹泄瀉。四肢冷逆。表裏俱虛寒之象。並用木香散、異攻散。倍加丁香、肉桂。亦有愈者。卽有此證。然必運氣在寒水司天之際。又值嚴冬極冷之時。用此大辛熱之藥。發之可也。若不識時辨證。一槩用此。不惟不能生全。反遭流謗。愼之愼之。

○集方。治胃寒嘔吐。（[illegible]）用母丁香三錢。白朮、製半夏、廣陳皮、白茯苓各二錢。俱炒黃。研末。每服二錢。白湯下。○治脾胃虛寒。作泄瀉。用母丁香五錢。廣陳皮、白茯苓、藿香梗、紫厚樸、訶子肉各三錢。俱炒過。研爲末。每早服二錢。米湯下。○治陰寒腹痛。兼四肢厥逆。自汗自利者。用母丁

香、三錢。人參、黃耆、白朮、肉桂、木香、各二錢。甘草。一錢。俱微炒。研爲末。作散服。白湯調下數錢。或水煎服亦可。○治陰寒呃忒。用母丁香、二錢。爲末。柿蒂十箇。煎湯調服。○治奔豚。或疝氣疼痛。用母丁香、一錢五分。吳茱萸、乾薑、炙甘草各一錢。青皮七分。花椒。一錢二分。水煎服。○治鬼疰。身似痛非痛。似癢非癢。似寒非寒。似熱非熱。似睡非睡。似醒非醒。形神默默。語言懶出。病名鬼疰。此心胃有伏痰所致。用母丁香、一錢。膽星製半夏、白茯苓各二錢。共爲末。每早晚各服一錢。燈心湯下。○治虛瘧久不止。寒多不渴者。用母丁香、一錢。爲末。於白朮。炒。當歸身、柴胡、牛膝、乾薑、各二錢。水煎服。○治久痢胃寒脾冷虛

滑不止。用母丁香、茯苓、於白朮、訶子肉、白扁豆、俱炒燥。爲末。每早服二錢。米湯調下。○治腰膝寒冷。并痿弱無力者。用母丁香五錢。金毛狗脊、於白朮、黃耆、當歸身、牛膝、枸杞子、川草薢、木瓜、大茴香、各二兩。俱酒洗。炒。研爲末。懷熟地四兩。酒浸蒸搗膏。共爲丸梧桐子大。每早晚各服三錢。白湯下。

○續集方治胃冷嘔逆氣厥不通。用母丁香、三枚。陳皮、二錢。水煎熱服。○治齒牙疳臭或黑蝕。用母丁香、煮汁含之。○治小兒冷疳面黃腹大食即吐者。用母丁香七枚爲末。乳汁和飯鍋上蒸三次。每用薑湯調服五分。○治食蟹傷脾腹痛或作瀉。用母丁香、一錢。爲末。薑湯調服。

○治食魚腥生冷瓜菓致傷。用母丁香、三錢。陳皮、二錢。共爲末。每服八分。薑湯調服。○治婦人陰冷。用母丁香三顆爲末。紗囊盛納入陰中。即煖。○治鼻生瘜肉。用母丁香綿裹納之。○治腋下胡臭。用母丁香末不時搽之。久用漸除。

丁香枝皮味氣與香同。攻一切冷氣爲病。如心腹脹滿。惡心嘔吐。泄瀉虛滑。水穀不消諸證。並宜水煮服之。

（治疝氣一切諸證。多因熱鬱于中。寒束于外而成。用山查五分。木香、砂仁、茴香、香附、玄胡索、萆薢、蒼朮、黑山梔、川烏各一錢。水煎冷服。如挾外邪。發熱惡寒頭痛者。本方加紫蘇、前胡。如大便久閉結不通者。加酒製大黃。脹悶者加枳實、厚朴。有瘀血者加桃仁、紅花。腎氣沖上、氣閉欲絕者。加沉香、枳實。四肢厥逆、自汗、脈沉者。加製附子、人參、當歸。○大凡疝氣一病、有六種。腸中走氣作聲或痛者。是盤腸氣也。加青皮、陰囊手按作響聲痛者。是膀胱氣也。加澤瀉。臍旁一梗升上釣痛者。是小腸氣也、加藁本。小腹下注上奔心腹急痛者。是腎氣逆也。加吳茱萸。陰子偏大者。是偏墜也。加荔枝核、火燒酒淬。陰子腫硬大而不痛者。是木腎氣也。服前方加灸。一切疝氣發于暑月者。多兼暑氣入膀胱也。加香薷、滑石。一切疝氣年久不愈者。前方再加耆朮歸地、治陰囊皮漏出水、外用丁香川楝子各等分爲極細末摻之。）

檀香味辛苦。氣溫。無毒。陽中微陰。入手太陰。足少陰。陽明經。

李氏曰。按大明一統志云。檀香出占城、真臘、爪哇、渤泥、暹羅、三佛齊、回回等國。今廣東、雲南及嶺南諸處亦有之。葉如荔枝。皮青色滑澤。又香譜云。皮實而色黃者爲黃檀。皮潔而色白者爲白檀。皮腐而色紫者爲紫檀。其木俱堅重清香。而白檀更良。藏者以紙封固。不洩氣。又格古論云。紫檀諸溪峒出。性堅。新者色紅。舊者色紫。有蟹爪紋。俱可作帶圍、扇骨等物。白檀多供然爇。非上品。沉水者不得入藥。

○白檀香（高士宗）。辟惡氣。散結氣。除冷氣。伏妖邪鬼氣之藥也。辛香開發。能升生胃氣。元素方。通噎膈。進飲食。除心腹冷痛。散陰寒霍亂諸證。入調氣藥中。引芳香之物。上至極高之分。胸膈之上。咽嗌之間。爲理氣之妙劑也。但辛香芳烈而竄。如陰虛火盛。有動血致嗽者。勿用之。

○集方。治噎膈飲食不入。用白檀香一錢五分。茯苓、橘紅各二錢。俱爲極細末。人參湯調下。○治心腹冷痛。用白檀香三錢。爲極細末。乾薑五錢。泡湯調下。○治陰寒霍亂。用白檀香、藿香梗、木香、肉桂各一錢五分。爲極細末。每用一錢。炒薑五錢。泡湯調下。○治男婦爲妖鬼所憑。如癡如醉。人事昏迷。以檀香末。臥牀前燒熏。則邪魅自退。

○紫檀味苦鹹。氣寒。無毒。

紫檀散風毒。消瘀血之藥也。劉氏方稱末傅金瘡。止血定痛。又醋磨汁。傅一切卒腫。因血滯所傷者。立驗。李瀕湖先生曰。白檀辛溫。氣分之藥也。故能理衛氣而調脾肺。利胸膈。除陰寒霍亂。紫檀鹹寒。血分之藥也。故能和營氣。而消腫毒。治金瘡。止血定痛。

降眞香味辛甘。氣溫。無毒。

李氏曰。降眞香出黔南山谷中。及大秦國。似蘇方木。燒之不甚香。得諸香和之。則特美。入藥以番降紫而潤者爲良。李瀕湖曰。今廣東、廣西、雲南、安南、漢中、施州、永順、保靖及占城、暹羅、渤泥、琉球諸番皆有之。又溪蠻志云。降眞香本出海南。今溪峒僻處所出者。似是而非。勁瘦如雞骨。不甚香。又眞臘志云。降眞香生深林。番人頗費斫伐之力。乃樹心也。其外有白皮。厚五六寸。焚之氣勁而遠。又草木狀云。降眞香長莖細葉。根極堅實。重重有皮。花白子黑。其莖截置煙焰中。經火成紫香。可降神。按此數說。前後似同而稍異。或中國者與番外來者有不同乎。

○降眞香。辟邪氣。活瘀血之藥也。李氏方療折傷。活血止痛。治金瘡。止血生肌。內服外敷。俱有驗也。又治天時疫癘瘟瘴災疾。并一切妖神怪異。宅舍中焚燒。盡皆屏跡。

○集方。治折跌并金瘡。血出不止。或潰爛不收。用眞降香

以鋒刀刮下細末。敷之縛定。內服數錢。乳香湯調服。甚效。○治上部有傷。瘀血停積。按之胸膈作痛。此吐血候也。急以降眞香。鋒刀刮末。白湯調服。立時消散。凡怒氣傷肝。致吐血不止。用此功過鬱金。

楠木味辛。氣溫。無毒。

李氏曰。楠木生南方。而黔、滇、蜀、廣諸山尤多。其樹直上。枝葉叠叠。若幢蓋之狀。茂似梓。而大如牛耳。經歲不凋。新陳相換。其花赤黃色。實似丁香。色青。榦甚端偉。高者十餘丈。巨者數十圍。氣甚芬芳。爲船、爲梁棟、爲器具。皆佳。色赤者堅。白者稍脆。居水久則中空。爲蟻所穴。其近根年深向陽者。結成花草山水之狀。俗呼爲骰柏楠。可作器。

○楠木。利水下氣之藥也。別錄方。治時行暑濕所傷。霍亂（吐下。煮汁服之。又轉筋腳氣。腫痛不寧。煎湯淋洗。凡取木及枝葉根四件。共治同功。）

烏藥　味辛苦，氣溫，無毒。可升可降。氣厚于味，陽也。入足陽明、少陰經。

（陳氏曰：烏藥生嶺南邕州、容州及江南。蘇氏曰：今台州、衡州、雷州亦有之，俗以天台者爲勝，又不及海南者堅實而力大。其木似樟而矮，根葉亦以樟氣，高八九尺。吳楚山中極多，土人以爲薪。一葉三椏，葉尖而微圓，面青背白，狀類鰟魮。四五月開花，細碎淡黃灰白色。六七月結子，似冬青子，生青熟紫，核殼浮薄，仁苦而微香。根不其大，形如芍藥，嫩者肉白，老者色黑褐，中心有車轂紋，形如連珠者佳。八月采根用。）

○烏藥，調氣和血之藥也。辛溫香竄，能散諸氣，故方氏方主風氣周身頑麻、搔癢，或風寒濕熱四氣所侵，或身重體疼，寒熱交作，或風濕流注，癰瘍破潰，或鬱結脹滿，表裏壅塞，或胎前產後，血氣不和，或血閉不行，癥瘕積聚，用此大溫之劑，自能行氣中之血，則諸證自除也。局方

治中風宗氣，用烏藥順氣散，以此則氣順而風散也。濟生方治七情鬱結，上氣喘急，用四磨湯，以此降中兼升，瀉中兼補也。補陰丸以此下通少陰腎經，上通脾胃元氣，故丹溪方中往往用之。又麥氏方謂此藥治一切氣，除一切寒，消一切食，調一切血。婦人溫經，非此不行；小兒諸蟲，非此不去；大人諸痛，（謂疝癖心腎之痛）非此不除。宜白湯磨汁服之，更勝于水煎服也。但辛香溫燥，散氣頗捷，凡屬氣虛內熱者，忌之。

繆仲醇先生曰：世人多以烏藥、香附同用，治女人一切氣病，不知氣有虛有實，有寒有熱。冷氣暴氣，用之固宜；如氣虛氣熱，用之能無貽悞耶？以故婦人月事先期，小便短赤，及咳嗽內熱，口乾舌苦，不得眠，一切陰虛內熱之病，皆不宜服。

○集方：治風痰風氣，不拘週身上下頭面四肢等處頑痺麻木。用烏藥二兩，木香五錢，防風、白朮、秦艽、天麻、當歸、川芎、枸杞、黃栢、黃耆、白芥子各一兩，俱用酒洗炒，研爲末，煉蜜丸梧子大。每早晚各服三錢，白湯下。○治中風中濕，遍身作疼，時發寒熱，用烏藥、防風、威靈仙、羌活各三錢，水煎服。○治風濕流注，遍身生毒，上下癰潰，用烏藥二兩，香附、白朮、川芎、木瓜、牛膝、當歸、黃耆各三錢，水煎服。如陽衰胃弱，血氣虛冷者，本方可加人參、附子，童便製各一錢。○治七情鬱結，胸膈脹滿，表裏壅塞，用烏藥、

川芎、香附，俱酒炒，各三錢，枳殼、厚朴、半夏、陳皮、茯苓各二錢，水煎服。○治胎前產後，血氣不和，腹脹腹痛，用烏藥、香附、當歸、川芎，俱酒炒，各三錢，水煎服。○治婦人女子無故血閉不行，肚腹脹悶，或成癥瘕血塊，用烏藥、香附、三稜、莪朮、玄胡索、炙甘草、廣陳皮各五錢，俱酒洗炒，研爲末，每早服三錢，白湯調下。○治中風中氣，用烏藥一兩，白朮八錢，白芷、陳皮、川芎、麻黃、乾薑、桔梗、枳殼、殭蠶、甘草各一錢，俱炒燥，研爲末，每服一錢，白湯調下。（名烏藥順氣散）○治七情鬱結，上氣喘急，用烏藥、沉香、檳榔、人參，各磨濃汁，共七分，徐徐嚥之。（名四磨湯）○治陰虛氣滯，脾胃不調，此藥上達胃脾，下通腎經，用烏藥、北五味子各二

兩。枸杞子、杜仲、牛膝、當歸、白芍藥、懷熟地、黃柏、知母、山茱萸肉各二兩。俱用鹽酒拌炒。研爲末。煉蜜丸梧桐子大。每早服五錢。白湯下。（名補陰丸）

續補集方。治一切氣痛。（衞生家寶）不拘男婦。冷氣。血氣。肥氣。痞氣。息賁氣。伏梁氣。奔豚氣。胃痛氣。及腳氣。疝氣。一切搶心刺痛。冷汗。喘急欲絕。用天台烏藥、小茴香、青皮、良薑各四兩。俱酒拌炒。研爲末。每遇此急。用白湯調服一錢。

烏藥子。治陰毒傷寒。（朴門方）腹痛欲死。取一合。炒至黑烟起。投水中。煎十餘沸。服一大盞。汗出。止。陽回即瘥。

治婦人經水將來作痛者。（[illegible]婦同方）或作或止。血滯氣滯也。用烏藥、當歸、川芎、白芍藥、川黃連、香附、桃仁（去皮）各一錢五分。紅花、玄胡索、牡丹皮、莪朮各一錢。俱用酒拌炒過。水二碗。煎一碗。食前服。十帖全愈。○治婦人經水不行（同前）久不止者。將成血崩也。用烏藥、當歸、川芎、白芍藥、生地黃、白朮、黃芩、黑山梔、地榆、黑荊芥、香附、人參、白茯苓各一錢五分。甘草五分。俱用醋拌炒過。水二碗。煎八分。食前服。十劑愈。○治婦人經水久不行。（同前）發腫者。血瘀滲入脾經。用烏藥、當歸、川芎、白芍藥、桃仁（去皮）紅花、牡丹皮、乾薑、肉桂、乾漆、枳殼、白朮、香附、牛膝、玄胡索各一錢五分。俱用酒拌炒過。水二碗。煎八分。食前服。五劑愈。

楓香脂（又名白膠香）味辛苦。氣平。無毒。氣薄味厚。陽中之陰也。入足厥陰經。（蘇氏曰。楓樹。西南方及閩陝甚多。樹高大。枝幹修聳。大者連抱數圍。其木甚堅。有赤有白。葉圓而作岐。有三角。二月開花。白色。乃連著實。大如鴨卵。有柔刺。八九月熟時曝乾。其取脂爲楓香脂。五月斫爲坎。烈日灼之。流聚而成。十一月采。又解字云。楓木。葉厚枝弱。善搖。漢宮殿中多植之。至霜後葉紅可愛。故稱楓宸。又臨川記云。嶺南楓樹。歲久生瘤。遇雷雨漸長至三五尺。謂之楓人。越刻鬼神。可極靈異。修治。凡用香脂。入漿水內煮百沸。取入冷水中。揉扯數十次。曝乾用。近世人不識此。誤以松脂明瑩者其謬。）

○楓香脂。（李時珍）摻一切癰毒。排膿止痛。活血生肌之藥也。其性疏通。故木易爲蚛穴。入外科方。爲癰疽要藥。又治吐血衄血不止。又治齒腫、齒痛、齒脹不消。究其味苦。能涼血熱。辛平。能完毒瘡。粘膩能去風燥。爲散、爲膏、爲丸。外敷

內服。隨證制宜可也。

○集方。治一切惡毒潰瘍。（[illegible]方）并破爛不收諸瘡。先以米泔溫水洗淨。用楓香脂、眞鉛粉各等分。爲細末。摻之。○治便癰膿血不乾。用楓香脂一兩。配輕粉二錢。麝香一分。共研細末。摻之。○治瘰癧軟癤。（[illegible]）用楓香脂一兩。溶化。以蓖麻子肉六十四粒。研入。待成膏。攤貼。○治諸瘡不合口。（直指方）用楓香脂、眞輕粉各二錢。用豬脂和塗。○治金瘡斷筋。（[illegible]民方）用楓香脂爲末。敷之。○治吐血衄血不止。（王璆百一選方）用楓香脂、蛤粉各等分。爲細末。共和勻。每服一錢。柿餅煎湯調下。○治齒痛。（[illegible]）腫痛。或膿。或蛀。年久不愈。用楓香脂六錢。香鹽內細灰四錢。共研細末。每早晚以指頭蘸藥揩擦。○治大風癩瘡。用楓香木皮燒存性。和輕粉各等分。爲細末。麻油調搽效。○治水瀉水痢。用楓香木皮煎飲。立止。

熏陸乳香、味辛苦、氣溫、無毒。氣厚味薄、陽也。入足太陰手少陰、兼入足厥陰經。

（陳氏曰、熏陸香西出天竺國、色黃白。南出波斯國、色紫赤。生沙磧中、樹類古松、葉似棠梨。盛夏脂溢皮外、拆皮甲剝取、爲熏陸。脂流之處、垂滴成乳頭者、爲乳香。所鑿脂溢成塊者、爲陳香。流溢自上而下、用篩接取者、爲篩香。淋漓根底、雜砂石者、爲砂香。色黑者、爲土塌。受水浮、色敗氣變者、爲水濕塌。所剩雜屑者、爲雜末。播揚如塵者、爲粉纏末。總是熏陸一種、分析也。得原采垂滴乳頭、圓明潤澤者、爲眞。如脂溢重疊纍纍然、不成乳頭者、亦即熏陸香也。修治、用酒浸、研如泥。如作末、用糯米數粒、或燈心草數莖、或人指甲二三片、共研之、即細如粉。）

○乳香、活血去風、舒筋止痛之藥也。陳氏發明云、香烈走竄、故入瘍科、方用極多。又跌撲鬬打、折傷筋骨、又產後血氣攻刺、心腹疼痛、恒用此、咸取其香辛走散、散血排膿、通氣化滯、爲專功也。故癰瘍可理、折傷可續、產後瘀血留滯可行、癥塊痞積伏血冷瘕可去矣。但性燥氣烈、去風活血、追毒定痛、除癰瘍產後及折傷筋骨之外、皆不須用。

○劉默齋集要方云、内托護心散、以乳香微寧孔中、能使毒氣外出、不内攻也。又凡病筋不伸者、敷藥宜加乳香、極能伸筋。又婦人難產、服湯丸散中、嘗用乳香、使胎滑易生。又治諸經卒痛、及心腹久疼、用乳香、酒煎服、立時安定。又與諸香同用、能驅邪辟惡。與歸芎同用、能調血催生。並羌獨秦防、散風濕于血滯、並芎朮芷草、排膿潰以生膿。凡屬血風寒濕痹痛諸疾、不可缺此。

○集方、治跌撲或鬬打、折傷筋骨、用眞乳香、眞沒藥、各一錢五分、當歸尾、紅花、桃仁、各三錢、水煎服。○治跌打潰爛疼痛、用乳香、三錢、麻油熬化、冷凝、早晩搽瘡上。○治難產催生、用乳香、沒藥、各三錢、俱瓦上焙出油、冬葵子三錢、共爲末、白湯調服、即產。○治產後瘀滯不清、攻刺心腹作痛、用乳香、沒藥、俱瓦上焙出油、各三錢、五靈脂、延胡索、牡丹皮、桂枝、各五錢、俱炒黃、黑豆一兩、炒成烟炭、共爲末、每服三錢、生薑泡湯調下。○治癰疽腫毒、未成可消、已成排膿定痛、用乳香、沒藥、白芷、連翹、赤芍藥、當歸尾、皂角刺、俱炒、穿山甲、火燒焦、各一錢二分、金銀花、二錢、酒水各一碗、煎八分服。○治一切癥塊痞積伏血冷瘕、用乳香、沒藥、俱瓦上焙出油、各五錢、草烏、一錢

酒洗炒黃、三稜、莪朮、各一兩、酒炒、於白朮、土炒、一兩五錢、炒、共爲末、阿魏五錢、酒頓化、和爲細丸、如黍米大、每早服二錢、酒下。○治心胃痛、用乳香、沒藥、各一兩、俱瓦上焙出油、拌水研爲細末、玄胡索、木香、白牽牛、各五錢、俱焙燥、共爲細末、與乳沒和勻、每服二錢、白湯調下。○治中風口眼喎斜、用乳香燒烟熏之、以順其血脈。○治小兒急慢驚風、用乳香、瓦上焙出油、甘遂、微炒、各五錢、共爲極細末、每用五分、薄荷湯調服。○治小兒内釣腹痛、用乳香、沒藥、俱瓦上焙出油、木香、各八分、爲細末、用五分、白湯調服。○（治風蟲牙痛、用乳香安孔中、燒銀簪頭烙化、即止。○治諸般漏瘡、膿血不止、用乳香、沒藥、各五錢、瓦上焙出油、牡蠣、燒炭、三錢、共爲末、黃蠟五錢、香油五錢、共熬勻、和丸如黍米大、每服一錢、白湯下。）

沒藥味苦辛。氣溫。無毒。氣薄味厚。陰也。降也。入足厥陰經。（馬氏曰：沒藥生波斯國。蘇氏曰：今海南諸國及廣州亦有之。其木之根株，皆似橄欖，葉青而密。歲久者則有脂液流滴下地，凝結成塊。色黑。微香。狀似安息香。大或小斷碎光瑩可愛。采無時。○或云：采時掘樹下爲坎，用斧伐其皮，脂流于坎，一月方取。如入藥，修治藥同乳香。）

○沒藥破血行瘀，化積聚，止腹痛之藥也。（李時珍）凡金刃木石，（汪機　陶華）或跌撲鬭打、墮壓等傷，瘀血內攻，筋骨疼痛，並宜研細，熱酒調服。數錢能推陳致新，活死血，和新血也。如產後惡血宿垢不行，變態諸患，咸宜服之。此藥大槩其功長于通滯血。血滯則氣亦壅，血滯氣壅，則經絡滿急，經絡滿急，故發腫作痛也。如金刃傷、木石傷、鬭打墮壓傷、產後血結傷、癰瘍腫痛傷，咸需之耳。然乳香行血活血，沒藥行血散血，皆能止痛消腫，故二藥每相兼用。

繆仲醇先生曰：沒藥善通壅滯之血，治一切傷損，腹中血結作痛，要藥，而不主諸虛也。凡骨節間與夫胸腹脇肋背胛腰脊之痛，非屬瘀血停留，而因于血虛者；胎前血虛血熱，腹中痛者；產後惡露去多，腹中虛痛者；癰疽潰久，膿水清稀者，皆不宜用。

○集方主治諸證與乳香同

騏驎竭味鹹甘。氣平。無毒。氣薄味厚。陰也。降也。入足厥陰、手少陰經。（蘇氏曰：騏驎竭生西胡大食諸國。今廣州亦有之。樹名渴留，高數丈。似沒藥樹，婆娑可愛。葉似櫻桃葉，有三角。色黃赤。樹中有脂液流出，如膠飴狀，久而堅凝成塊。色赤如血者，故名。以火燒之，赤汁湧出，成灰不變本色者爲真。一說：燒斷而有鏡面，光彩能映人影；或取磨指甲，弦間紅透甲者方妙。外有一種海母血，真相似，只是味鹹氣腥。騏驎竭味鹹微甘，與似梔子氣爲別也。雷氏曰：修治另研作粉，篩過入丸散中。若同衆藥搗，則化作塵飛散也。）

○騏驎竭活血（瘀）、散血（聚）、破血（結）、行血（死）之藥也。（李）凡跌撲鬭打，及墮壓損傷之輕者曰血瘀，曰血聚；傷之重者曰血結，曰血死。皆血脈留滯于腹中，及經絡骨節之處，與肌肉俱腐敗者。非活血行血之藥，不能治。然欲保其生全，舍乳、沒、騏驎竭之類，誰能起其危困乎。倘有斷骨損筋，或傷及藏府，血瘀血脹，垂死者，此三種之外，更加山羊血，或猴經二三錢，酒調灌之，下咽即有生理，真活命之良方也。又療癰疽惡毒，引膿生肌。

前賢劉河間曰：血竭除血痛，爲和血之聖藥。乳香、沒藥雖主血病，而兼入氣分；此藥專于血分者也。

○集方（治一切打撲損傷。用騏驎竭、乳香、沒藥二味，瓦上焙出油，自然銅火煅酒淬，狗頭骨火煅酒淬，麻皮灰，黃荊子，骨碎補，各等分，俱酒炒，共爲末。每服三錢，白湯下。○治產後血暈，不知人事，及狂言者。用騏驎竭一兩，研末，每服二錢，溫酒下。○治產後血衝心，胸滿，命在須臾。用騏驎竭、沒藥各一錢五分，研細末，童便和酒調服。○治一切金瘡及臁瘡潰爛，不生肌肉。用騏驎竭、滑髮灰、牙香、沒藥、輕粉、象牙末各等分，冰片些少，共爲末，摻之。○治金瘡出血不止。用騏驎竭爲末，敷之。○右五方出醫林集要）

安息香、味辛苦，氣平，無毒。氣厚味薄，陽也。入手少陰經。

（蘇氏曰：安息香生西戎，及南海波斯國，今安南、三佛齊諸番亦有之。樹如苦楝，長二三丈，大而且直，皮色黃黑，葉似羊桃而長，有四角，經寒不凋。三月開花，黃色，花心微碧，不結實。刻其木皮，其脂如飴，又如松脂，黃黑色。能發衆香，故人取以和香。絕焦然不宜于燒也。）

○安息香：通心竅，辟鬼邪，除中惡魘寐之藥也。大氏方祛一切神鬼魍魎、妖魅精邪，及人身寒濕冷氣，霍亂陰病。又治婦人產後血暈、血脹，口噤異疾，并老人氣閉痰厥失音等疾。蓋此藥入手少陰心經，心藏神，病由氣閉痰厥，則神昏矣。神昏則邪惡鬼氣易于侵犯。藉此芳香清烈之氣，通神明而開心竅，辟諸邪，則前證自除也。但辛香行散之品，亦能走散真氣，如中氣不足，陽神自虛，非

關惡氣鬼邪侵犯者，宜斟酌用。

○集方：治鬼疰、尸疰，寐魘暴亡，及大人小兒卒中惡氣，一切神鬼精邪侵犯者。用安息香一錢，鬼臼二錢，犀角八分，牛黃五分，丹砂、乳香、雄黃各一錢二分，俱研極細末，石菖蒲、生薑各一錢，泡湯調服五分。○治寒濕冷氣中霍亂陰證者。用安息香一錢，為末，人參、製附子各二錢，煎湯調服。○治婦人產後血暈、血脹，口噤垂死者。用安息香一錢，五靈脂水飛淨末五錢，共和勻。每服一錢，炒薑湯調下。○治老人氣閉，痰厥失音，垂死，用蘇合香丸，薑湯調服，立甦。此方推安息香為首用也。

蘇合香、味甘，氣溫，無毒。

（蘇氏曰：蘇合香出西域及崑崙，紫赤色，與紫檀相似，堅實體重如石，極芳香，燒之灰白者佳。又一說云：廣州亦有蘇合香，但類蘇木，無香氣，煎汁如稠油者極芳烈，而香色黑，狀如餅子矢也。又梁書云：中天竺國出蘇合香，是諸香汁煎成，非自然一物也。又一說云：蘇合香出安南、三佛齊諸番國，樹生膏脂，以濃而無滓者為佳。又一說云：蘇合有多葉子，如金色，按之即没，放之即起，良久不定，如蟲動，氣烈者佳。又一說此香出蘇合國，因以名之。然諸說聚訟不一，未不敢執是孰非，俱采集以俟後之博物君子鑒定云。）

○蘇合香：通五藏六府，一切氣竅，去風行痰，除癎定悸，鎮驚安神之藥也。香烈氣竄，能溫散留滯，故局方主辟惡鬼精邪，蠱毒瘴氣，中風中寒，及溫瘧寒熱，夢魘魂迷，尸蟲尸疰，并心腹卒痛，吐利時氣，一切暴疾，或牙關緊急，人事不清，服此使閉悶者疎通，昏亂者省覺，故命名曰

蘇合云。

○集方：治五藏六府氣竅不通，用蘇合香一錢，石菖蒲焙三錢，薑製半夏焙三錢，共為末，以蘇合香酒溶化為丸，如龍眼核大。每服一二丸，淡薑湯化下。○治五種癎證，用蘇合香一錢五分，薑製半夏焙、膽製南星焙、天竺黃各三錢，共為末，以蘇合香酒和化為丸，龍眼核大。每早晚各食前服二錢，淡薑湯下。○治驚悸，神志不寧，用蘇合香一錢二分，羚羊角、犀角俱銼末，各三錢，茯神、天竺黃、膽星俱微炒，各五錢，共為末，以蘇合香酒溶化為丸，龍眼核大。每早晚各服一丸，燈心湯化下。○治惡鬼精邪作祟，用蘇合香于臥牀前煨之，或用分許，薑湯調服。

○治溫瘧寒熱。從山林草野瘴癘之間。或從囹圄瘟瘧之氣而成者。用蘇合香一錢。紫蘇葉五錢。川芎三錢。廣陳皮二錢。共爲末。每服五分。淡薑湯調下。○治心膽之氣虛乏。多患夢魘魂迷之證。用蘇合香二分。人參五分。生薑一錢。每臨臥時。泡湯飲之。○治尸蟲傳染。并尸疰異疾。用蘇合香、安息香、乳香、沉香、各五分。泡湯一碗。空腹飲之。此藥可泡十餘次。以藥盡爲度。○治心腹卒痛吐利時氣。用蘇合香五分。藿香梗一錢。五靈脂二錢。共爲末。每服五分。生薑泡湯調下。

倪朱謨曰。局方諸風痰藥中往往用此。以祛風行痰。順氣活血。於卒中痰厥。風鬱閉不通者極靈。

龍腦香。味辛苦。氣寒。性熱。無毒。陽中之陽。升也。散也。

李氏曰。龍腦香。俗呼爲冰片。又名梅花腦。因其白瑩如氷及梅花片狀。故名。出婆律林羅短叱諸國。今南海深山窮谷亦有之。其液爲膏。其脂爲香。蘇氏曰。其樹高六七丈。大四五圍。形如老杉木狀。其臭亦如杉木氣。芳生勁枝。葉圓而青。背白。作花。結實如荳蔻。仁皮有甲錯。葉氏曰。其木肥者根下有清液。爲婆律膏。劈其樹。液流根下。截其上。液溢木端。其枝幹未經損動則有。否則氣洩無之矣。無花實者。其木瘦。瘦者生香。爲龍腦香。多歷年歲者。風清月朗時。噴香氣。明若霏雲。紛紛木上。先其時布帛羅樹底。驚之令隕。形如蜂蝶翅。此腦上品。頂則仍敗。香入木理。不易得也。又形氏曰。斷其樹。濕時無香。乾之衡理而折。狀類雲母。禁若冰雪。或解木作板。香溢縫間。劈而取之。大者成片如花瓣。小者成粒爲米腦。爲瑞腦。爲金腳腦。爲蓊龍腦。因其形色爲名。總不及如蜂蝶成片者氣全力精也。蒸者爲腦納。清者爲腦漿。異聞錄云。南唐保大中貢龍腦漿。貯之縑囊。懸琉璃瓶內。少頃滴瀝成水。香氣清烈。爲世所珍也。盧氏曰。近時多用火煏成片。更以樟腦昇打僞造。不可不辨。收貯燒杉木炭合養之。或糯米炭共貯之。則不耗。修治入藥。瓷鉢輕展徐研。務令塵細。急展則杵鉢生熱。便隨香竄耗。欲藉透肌走竅。用平底小鐺。以青布剪如底式。一面噴潤淨水。粘貼鐺底。置龍腦于布上。覆以盌盤。盤沿外餘布數分。水攪麥麵固濟盤布周沿。勿使氣洩。隔鐺底寸許燃燒文火。候麥麵色熟。具覺焦黃。即便住火。候冷開視。火法合宜。龍腦盡昇盤上。輕鬆潔白。香復百倍于昔。○李氏曰。又按宋史熙寧九年。英州雷震深山中。一梓樹木盡枯。中皆化爲龍腦香。此雖屬怪異。可見龍腦亦有變化而成者也。

○龍腦香。開竅（日）辟邪（行）之藥也。性（良水編）善走竄。啟發壅閉。開達諸竅。無往不通。然芳香之氣。能辟一切邪惡。辛烈之性。能散一切風熱。故唐本草主暴赤時眼。腫痛羞明。或喉痺壅脹。水漿不通。或腦風頭痛。鼻瘜鼻淵。或外痔腫痛。血水淋瀝。或交骨不分。胎產難下。或風毒入骨。麻痛拘攣。或痘毒內閉。煩悶不出。此藥辛香芳烈。善散善通。爲效極捷。一切卒暴氣閉。痰結神昏之病。非此不能治也。然

非常服之藥。如大人小兒風涎閉塞、及暴得驚熱者可用。如久病元虛、而成中風風痺之證、吐瀉後成慢驚者、不可用也。眼目係暴熱成翳障者可用、如肝腎精血不足成昏暗者不可用也。風痛在骨髓者可用、在血脉肌肉者不可用也。世但知其涼而通利、未達其熱而輕浮飛越、喜其香而貴重、動輒與麝香同爲桂附之助、然人身之陽易動、陰易虧、不可不慎也。

潘壽軒先生曰、一女子年十歲、病發熱腰痛、手足厥逆。語言譫妄、神氣昏迷、形證極惡。一醫云陽毒傷寒、一醫云陰證傷寒、予診其脉、沉緊而數、詢其家人云、尚未出痘。予疑是痘候、時暑月、急取屠家豬心血半盞、用冰片

二分、研細和服、得睡須臾、一身痘出而安。若非此方、則橫夭矣。又昔廖學中以熱酒服一握、九竅流血而死。此非冰片有毒、乃熱酒引其辛香、散溢經絡、氣血沸亂而然爾。

○集方、治暴赤時眼（[illegible]）。用冰片五分、硼砂一錢、薄荷二錢、共爲極細末、頻嗃兩鼻。○治喉痹（[illegible]）癰脹。用冰片二分、燈心三錢、黃柏二錢、二味燒存性、白礬七分煅、共爲極細末、每以一二分吹患處、絕妙。○治頭（[illegible]）風頭痛。用冰片五分、天南星五錢、共爲極細末、薑汁調敷痛處。○治鼻（[illegible]）生瘜肉、垂出脹塞不通。用冰片一味、點之自消。病頭風腦漏之人、多患此。○治外（[illegible]）痔脹疼。用冰片三分、嫩滑石三錢、

共爲極細末、不時摻之。○治産（[illegible]）難催生。用冰片三釐、溫湯調服、立産。○治風毒入骨、將成廢人。用冰片一錢、天南星、半夏各五錢、鳳仙花子三錢、共研極細末、葱汁調塗痛處、如乾落、再以葱汁調濕塗之。○治痘（[illegible]）毒內閉不出、狂躁心煩、氣喘妄語、或見鬼神、瘡色赤、未透者。用冰片一錢、細研、旋以豬心血丸芡實子大、每服一丸、紫草煎湯調下、少頃心神便定、得睡發瘡。○治中（[illegible]）風牙噤無門下藥。用冰片三分、天南星二錢、共爲極細末、每以三分、揩齒二三十遍、其口自開。○治下（[illegible]）疳臭爛。用冰片五分、嫩蘆甘石四錢、共研極細末、不時摻之。○求死不得。用冰片二錢、熱湯吞下、氣散立死。

○陝醫藥方抄（[illegible]）、宋太后患目疾、腫痛赤瘴、晝夜不寐、不肯服藥、不肯點藥。一醫奏取大冰片一兩、鋪盤內、請太后細細觀之、少頃腫痛漸消、赤瘴頓退、蓋取冰片之氣、逼眼竅、香涼而散之、故目之腫痛赤瘴自退矣。亦巧法也。

牛黃膏（萬病回春）治婦人熱入血室、發狂不認人者。用冰片二分、牛黃三分、甘草一錢、硃砂、鬱金、牡丹皮各三錢、共爲極細末、煉蜜丸、如皂角大、每服一丸、燈心湯化下。此方兼可治男婦癲狂風癇諸證。

紫鉚，味甘鹹，氣平，有小毒。（按酉陽雜俎云：紫鉚樹出眞臘國及波斯國，土人呼爲渇禀，又名勒佉。樹高一丈，枝葉繁盛，宛如橘柚，木與滋液俱赤色，經冬不凋。四月開花，白色，不結實。天有霧露及雨花濡潤，則枝條出鉚，狀如糖霜，纍纍紫赤，破則鮮紅。用造經拔，作宮女面花，與騏驎竭相類，實非一種也。）

○紫鉚，起痘行漿之藥也。唐本草治痘不作漿，或皮薄欲損，血溢于外者，用之，取其象形以從治也。

王紹隆先生曰：男女媾精，姪欲之毒，遂含胞胎，伏藏兩腎。有生之後，發爲痘瘡，始發也如春氣之升，行漿也如夏氣之出，回合也如秋氣之降，剝落也如冬氣之入。舉世但知始發之欲透，未知毒化之成漿，猶爲切要。何也？如去滓純水，必清必靜，全賴此耳。否則仍令毒種復歸

兩腎，生死存亡，變生不測矣。紫鉚固爲解毒之要品，但可施于化毒之際，不可施于始發之期。更有毒未化而漿不行，反棄鉚液之橫偏，頓投保元之降藏，雖不顧姪毒之不攖，獨不念六淫之未散乎？司業者當留心而熟思之可也。

○集方：治痘瘡皮破，漿水泛出，或手搔傷損。用紫鉚研極細末，敷之，即乾斂，不走洩元氣。○治痘瘡漿不豐滿，或乾枯，或水塌不透者。用紫鉚一二分，爲細末，糯米湯調灌，或人參湯調，或純酒漿調，亦可。

樟腦，味辛，氣熱，無毒。（李氏曰：樟腦出漳州、韶州，狀如龍腦，白色如粉潤，乃樟樹脂膏也。又胡氏煉樟腦方云：用樟木新鮮者，切片，以井水浸三日，入鍋煎之，柳木頻攪，待汁減半，柳木上有白霜起，即濾去滓，傾汁入瓦盆內，經宿自然結成塊也。他處雖有樟木，不能取腦。又陳氏方昇煉樟腦法：用銅盆一只，以陳壁土爲極細末，糝盆底，却糝樟腦一重，又糝一壁土一重，如此四五重，以薄荷葉放土面上，再用銅盆一只覆之，用細黃土鹽滷擣水和如膏，封固，勿令走氣，于文火上款款炙之，須以意度，不可太過，不可不及。候冷取出，則腦皆昇于上盆。如此昇兩三次，潔白如雪，可僞充片腦也。）

○樟腦，通竅殺蟲，除疥癬禿瘡之藥也。李氏方云：此藥辛熱香竄，禀龍火之氣，去濕殺蟲，此其所長。故燒烟熏衣，滅虱，逐蚤，熏房室，并牀帳枕簟，善辟臭蟲及一切蟻蜉蠅螫等類。又集要方治脚氣，止牙疼。總之，去濕殺蟲諸

在是矣。止堪敷塗，不堪服食，故外科方每需用耳。

○集方：治一切瘙癢蟲疥，及一切頑癬有蟲者。用樟腦一兩，大楓子肉二兩，搗膏，大黃、硫黃、胡椒各五錢，三味俱微炒，爲細末，和入大楓膏內，再入樟腦同搗勻，再入水銀五錢，再研勻，再搗三百下，爲丸彈子大。每臨臥時，被內以藥周身摸之，不過二三次愈。如治頑癬，本方再加斑貓末五分，信石末[illegible]分。如漿乾燥，請加香油些須，亦可。○治小兒禿瘡。用樟腦三錢，花椒末、瀝青末各二錢，生芝麻一兩。先以退猪湯洗淨患上，以香油少許調搽。（○治蟲牙疼。用樟腦、黃丹各一錢，胡椒五分，共研細，煉蜜丸如黍米大，塞患孔中。○治脚氣腫痛。用樟腦三錢，草烏頭二錢，爲極細末，醋糊丸彈子大。每置一丸于足心，踏之下，微火烘之，衣被圍覆，汗出如涎，即効。）

阿魏味辛氣平無毒（蘇氏曰阿魏生西番及崑崙國苗葉根莖酷似白芷搗根汁煎成爲上截根縣乾爲次稀氏又言阿魏生崑崙國是木津液如桃膠狀其色黃者爲上色黑者次之陳氏又言阿魏雲南長河中亦有今廣州亦有是木膏液鉼之汁出漸滴凝結與蘇氏所說不同又酉陽雜俎云阿魏出波斯國及北天竺其樹長八九尺其色青黃三月生葉似鼠耳無花實其枝汁出如水久乃堅凝又言取其汁和米豆屑合藏而成者說雜不可而氣體極臭而又能止臭亦爲奇物也戎人則皆炎謂能止臭猶陰質嗜撒興中州貴蚓取巴人重負器也又元祀云阿魏元人用充食料根名總屎又名薰渠用滿牛羊肉轉更香美盛若亦不色變○李時珍曰阿魏有草木二種草者出西域可煎可晒蘇氏所說是也木者出南番取其脂汁凝結循氏陳氏所說是也又按一統志所載有此二種云出火州及沙鹿海牙諸國草高尺許根株獨立枝葉如蓋臭氣逼人生取其汁熬膏名阿魏又言出三佛齊及暹羅國樹不甚高土人納竹筒于樹內脂滿其中冬月破筒取之又云其樹最高其脂最毒其氣逼人最臭不敢近每采時以羊繫于樹下自遠射之脂液着羊羊斃即爲阿魏觀此則其有二種明矣然繫羊射脂

之說俗語相傳但無實據修治以熱酒溶化和入藥用俗云阿魏無真言多偽也今市家搗蒜肉雜以他物偽充不可不辨雷氏曰驗阿魏真假有三法一法以半銖安熟銅器中一晝夜着處色白如銀永不變色二法以一銖置五斗草自然汁內次早盡變鮮紅色三法以一銖置柚樹上其樹立乾驗此三法真偽判然矣）

○阿魏化積墮胎殺蟲療蠱之藥也其氣辛烈而臭元人入食料中能辟一切禽獸魚鼈腥葷諸毒凡水菓蔬菜米麥穀豆之類停留成積者服此立消故汪氏方治癖癥瘕疫霍亂瘧痢尸蟲痞結等候咸取其氣息極辛極臭之物以除此不正之氣以致疾耳氣味雖有穢惡然不大損胃氣故方脈科每需用而不棄也

繆仲醇先生曰按人血氣聞香則順聞臭則逆雖有病積不可輕用當先養胃氣胃強則堅積漸消矣書曰大積大聚其可犯也衰其半而止蓋兢兢于根本者乎

○集方治一切痞塊癥瘕食飲血氣成積者用阿魏五錢白芥子四兩白朮三兩三稜莪朮各二兩四味俱炒燥研爲細末以阿魏熱酒溶化和入爲丸黍米大每早晚各服二錢白湯下婦人病此本方加當歸川芎乾漆俱酒炒各一兩○又貼痞膏用阿魏乳香沒藥芒硝各二兩俱研細聽用外用大黃二兩白芥子三兩木鼈子二十一個去殼穿山甲肉桂川獨活各一兩五錢亂髮二兩用香油四十兩煎黑去楂待油冷入鍋內乘油冷時加水飛淨細炒燥黃丹二十兩將油煎滾用鐵筯不住手攪以黃丹黑熟軟硬得所提起將凝加入阿魏乳

沒硝四味細末在內攪勻即成膏矣凡貼膏藥時先用芒硝研細隨患處鋪半指厚以紙蓋定用熱熨斗熨良久如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥○治尸疰中惡近死尸惡氣入腹終年嘗發者用阿魏二分侵晨熱酒吞下并治瘟疫瘴癘霍亂痎瘧諸病○治小兒盤腸內弔腹痛不止用真阿魏一錢爲末大蒜一瓣煨熟研爛和丸如麻子大每服五丸艾湯化下○治腳積結塊用阿魏五分雞子五箇去殼湯內同阿魏煮以湯乾雞子黃白俱老入石臼內同搗勻細黃蠟一兩溶化入阿魏雞子膏同熬數十沸入香油五六茶匙攪勻再入石臼內搗百下爲丸如黍米大每服一錢白湯下

盧會味苦。氣寒。無　沉也。降也。入心、肝、脾、三經。

（李氏曰、盧會出波斯國。及瓜哇、三佛齊諸國。今廣州亦有之。生深山中。乃樹脂滴凝而成。狀如黑錫。又一說云狀似鱉尾。乃草屬也。采取無時。蘇氏曰。盧會原在草部。今移入木部。二說不同。何哉。豈是木質而草形。抑木形而草質者乎。）

○盧會、涼肝殺蟲之藥也。宋開寶方主除心肺熱煩。去胸膈鬱火。大人痔瘻濕癬。小兒疳積蟲病。癲癇驚痰諸疾。又去三蟲。消五臟。凡屬肝臟為病。有熱者。用之必無疑也。但味極苦。氣極寒。諸苦寒藥無出其右者。其功力主消。不主補。以上數證。因內熱氣強者。可用。如內虛泄瀉食少者。禁之。

李瀕湖先生曰。盧會乃厥陰經藥。其功專于殺蟲清熱。

故治熱疳成積有效。

盧不遠先生曰。盧會傳說有草木二種。或因其形別亦有之。味極苦。氣極寒。對治以熱為因。為疳為癖。為熱聚所生之蟲病。莫不稍長。

○集方。治痔瘻腫痛。血水淋漓。用盧會數分。白酒磨化。和冰片二三釐。調搽。○治濕癬浸淫。延蔓成瘡。或在頭項。或在手足。或在腰腹。用盧會五錢。甘草二錢。共研末。先以溫米泔水洗癬。拭搽敷之。立乾便瘥。○治小兒疳積。蟲積。用盧會三錢。使君子肉一兩。共研末。每服三分。白湯調下。○治大人小兒五種癲癇。用盧會三錢。生半夏一兩。切碎。薑汁拌炒。白朮一兩。酒炒。甘草五錢。炒。共為細末。水發為丸。如黍米大。每服一錢五分。薑湯送下。○治小兒急驚風。用盧會、麝香、天竺黃、雄黃各一錢。共為末。甘草湯和丸。如彈子大。每遇此證。用燈心湯化服一丸。○治蛔結心痛。用盧會一錢。剪碎如米粒大。川烏條、花椒湯吞服。○治五種膨脹。用盧會、蟾酥各三錢。酒一盞浸一日。蒸化如膏。以生半夏為末二兩。巴霜三分。和丸如黍米大。每服十丸。淡薑湯早晚吞下。忌鹽醋百日。

孩兒茶味苦澀。氣平。無毒。

（李氏曰、孩兒茶出南番瓜哇、暹羅諸國。今雲南老撾暮雲場地方造之。云是細茶末入竹筒中。堅塞兩頭。埋汙泥溝中。日久取出。搗汁熬製而成。其塊小而潤澤者為上。塊大而焦枯者次之。）

○孩兒茶、解山嵐瘴熱。斂瘡生肌之藥也。張相如曰。服食方鮮有用者。惟入外科收斂瘡口。摻藥中用此。能定痛止血。收濕生肌。又兒科牙疳方中。配川黃連共為細末。摻牙根處。亦能斂潰收濕。定痛生肌。（出李氏綱目）今吳門市中售香茶。以孩兒茶為主。食之果香甜涼爽。移將藥味已過。轉增燥渴。久服更覺口乾苦澀。較前倍常。則前人所云解渴生津。未可深信。

本草彙言卷之九

錢塘　倪朱謨純宇甫選集　男倪洙龍冲之氏校正

沈公岐則施甫校正

木部（喬木類）

黄蘗　味苦，氣寒，無毒。氣味俱厚，沉而降，陰也。入足太陰，為足太陽引經藥。

（別錄曰：黄蘗出漢中山谷及永昌、邵陵、山東諸處。蘇氏曰：今取蜀中皮緊厚，色深黄者為上。郊永昌、邵陵、山東者，薄而色淺黄者，次。樹高數丈，葉似吳茱萸，又似紫椿，經冬不凋。外皮淺黄，其裏深黄，其根名檀桓，結塊如松下茯苓。雷氏曰：凡使，削去粗皮，用生蜜水浸半日，取出曬乾用。）（新曰）

○黄蘗，濟坎降離之藥也。稟至陰之氣而得清寒之性，益陰清熱，仗此專功。凡陰火攻沖，骨蒸鬱熱，小腹急疾，用此能抑陰中之火。濕熱不清，膝脛疼痛，步履艱難，用此能清濕中之熱。若夫上焦之火，攻發口舌，以致舌腫口破，或齒牙浮動，咽喉腫疼，是皆虛火之上浮也。下焦之火，蓄積大腸，以致下痢赤白，後重迫痛，或小便黄赤，淋瀝渾濁，或癃閉不通，脹滿阻塞，或腳氣攻沖，嘔逆惡心，或五疸黧黎，遍身發黄，是皆濕熱之下侵也。俱用黄蘗可以治之。設或陰分之疼，酒炒方効；骨節之痛，鹽製乃神；至于濕熱不清，酒炒可也；內火燔灼，生用可也；血弱陰虛，童便拌炒可也。此隨證製度，又不可不詳慎也。然此藥因能除熱益陰，然陰陽兩虛之人，病兼脾胃薄弱，或食減少，或宿食不消，傷食泄瀉，或腎虛天明溏泄[illegible]，時痛，或陽虛發熱，津竭口乾，或子宮虛冷，血寒不孕，或陽道衰微，精寒不嗣，或血虛發熱，肌膚枯燥，或産後瘀血停滯，或金瘡將潰發熱，或癰疽潰後發熱，或血虛不眠，陰虛煩躁等證，法咸忌用。

○集方（陳月坡方）：治陰火攻沖，骨蒸鬱熱，用黄柏、知母、懷熟地、地骨皮、麥門冬、北沙參、白芍藥各二兩，茯苓、北五味、白术各一兩，分作十劑，清水煎服。○治濕熱下流，膝脛疼痛，步履艱難（吳[illegible]方），用黄柏、蒼术、石斛、茯苓、木瓜、牛膝、烏藥、當歸各一兩，俱用鹽水拌炒，防風、白术各八錢，分作十劑，清水煎服。○治火攻上焦（方龍潭方），舌腫口破，或齒牙浮動，咽喉腫疼，並治，用黄柏、薄荷、荊芥、連翹、半夏、陳皮、防風、桔梗、玄參、山豆根各一兩，甘草四錢，分作十劑，清水煎服。○治口（小品）瘡臭爛，用黄柏五錢，銅綠三錢，共為末，摻之，去涎愈。○治下痢赤白（丹溪心法），後重急痛，晝夜無度，用黄柏、黄連、枳殼、厚朴各一錢五分，木通、茯苓、白芍各一錢，甘草、大黄各八分，清水煎服。○治小便淋澀不通（[illegible]方），或成白濁，用黄柏、車前子、白芍藥各二錢，甘草、澤瀉各一錢，瞿麥、木通各三錢，水二大碗，煎七分，加白果肉三十箇，取汁沖入，和服。○治腳氣攻沖（崔氏[illegible]），嘔逆寒熱，用黄柏、蒼术、厚朴、川獨活、青皮、牛膝、木瓜、柴胡、茯苓各一錢，清水煎服。○治五疸遍體發黄（明[illegible]方），用黄柏、秦艽各二錢，茵陳五錢，生薑五片，水煎服。

厚樸　味苦辛，氣溫，性燥，氣味俱厚，陽中之陰，降也。入足太陰、手足陽明經。

（陶隱居曰：厚樸出交趾、寃句，及陝西、洛陽、江淮、湖南、蜀川山谷中。今滑氏也以建平、宜都及梓州、龍州者爲最。木高三四丈，徑一二尺，木皮鱗皺，葉如槲葉，四季不凋。李氏曰：五六月開細花，紅色，結實如冬青子，生青熟赤，有細核，嚼之味甘美。寇氏曰：采樸以肉厚色紫多潤者入藥最良。今伊陽縣及商州亦有，肉薄而梗色淡白，不紫者，不堪用。雷氏曰：修治刮去粗皮，每一觔用生薑四兩，搗汁拌炒透，方可入藥，如不製，則戟人喉舌。）

○厚樸，寬中化滯，平胃氣之藥也。凡氣滯于中，鬱而不散，食積于胃，羈而不行，或濕鬱積而不去，濕痰聚而不清，用厚樸之溫可以燥濕，辛可以清痰，苦可以下氣也。故前古主中風傷寒，頭痛寒熱，嘔逆瀉利，蟲積痞積，或肺氣脹滿，痰涎喘嗽，或胃氣壅滯，水穀不行，用此消食化痰，去濕散脹，平土金二臟，以致于中和也。時人有云：厚樸益氣厚腸胃者，蓋亦指邪氣去，正氣自益之謂；積滯消，腸胃自厚之意耳。非消導之外，復有補益之功也。用者詳之。

繆仲醇先生曰：厚樸氣味辛溫，性復大燥，其功長于泄結散滿，去濕逐飲，溫暖脾胃。凡一切飲食停積，氣壅暴脹，與夫冷氣逆氣，腸鳴虛吼，痰飲吐沫，胃冷嘔逆，腹痛泄瀉，及元氣壯實之人，偶感風寒，寒熱飽脹，氣實之人悞服參耆，致成喘滿，以上諸證，誠爲要藥。然而性專消導，散而不收，略無補益之功，實有消導之勢。故凡嘔吐不因寒痰冷積，而由于胃虛火氣炎上者；腹痛因于血虛脾陰不足，而非停滯所致者；泄瀉因于火熱暴注，而非積寒傷冷者；腹滿因于中氣不足，氣不歸元，而非氣實壅滯者；中風由于陰虛火炎，猝致僵仆，而非西北真中寒邪者；傷寒發熱頭疼，而無痞塞脹滿之候者；小兒吐瀉乳食，發熱神昏，將成慢驚者；大人氣虛血槁，見發膈證者；老人脾虛不能運化，偶有停積者；產後血虛腹痛，產後氣虛作喘，產後吐逆泄瀉者，以上諸證，法所咸忌。世人不究其原，一槩濫用，雖或一時未見其害，而清純之氣默爲之傷耗矣，可不慎哉。

沈孔庭先生曰：厚樸辛苦溫燥，入脾胃二經，散滯調中，推爲首劑。然配他藥，用則泄實滿，故大柴胡湯用之；與陳皮、蒼朮同用，則除濕滿，故平胃散用之；與人參、白朮、麥蘗同用，則治虛滿，故調中湯用之。又同半夏、膽星能燥濕清痰；同甘草、白朮能和中健胃；同枳殼、萊菔子能下氣寬腸；同紫蘇、前胡能發散風寒；同山查、枳實能疏氣消食；同吳茱萸、肉桂能行濕燥陰。實有理氣行氣之功，但氣之盛者，用無不驗；氣之弱者，宜少與之。

○集方：治氣滯中焦，鬱而不散，或成脹滿痞痛。用厚樸一錢五分，木香一錢，陳皮、白朮各二錢，製半夏、茯苓各一錢二分，甘草七分，水煎服。○治食積胃脘，羈而不行，致成脹悶痞結，用厚樸一錢五分，草菓仁、砂仁各三錢，雞

麴枳實白朮各二錢山查肉茯苓各一錢二分甘草五分加生薑三片大棗四枚水煎服○治濕鬱成脹川厚樸一錢五分蒼朮陳皮各二錢甘草五分防風澤瀉各一錢加生薑五片水煎服○治濕痰成飽或嘔吐用厚樸一錢五分蒼朮製半夏各二錢陳皮茯苓白芥子各一錢加生薑三片黑棗二箇水煎服○治中風心膈飽脹飲食不入用厚樸一錢五分製半夏蒼朮防風膽星白朮茯苓各一錢二分水煎服○治傷寒頭痛寒熱不清用厚樸柴胡黃芩製半夏各一錢甘草五分加生薑三片水煎服有食加枳實山查各二錢嘔逆瀉利加藿香木香黃連薑水炒各八分○治蟲積用厚樸檳榔各

二錢烏梅二箇水煎服或蟲積甚加使君子肉二十箇去殼研成末配前藥共爲細末餳糖丸彈子大每早晚各服一丸燈心湯下○治痞積年久不愈（全幼心鑑）用厚樸薑水炒曬乾於白朮土拌炒枳實麩拌炒三稜莪朮紅麴俱酒拌炒各一兩作丸每食前服三錢米湯下○治風濕（小品）寒邪肺氣脹滿痰涎喘嗽用厚樸一錢五分陳皮製半夏杏仁桔梗枳殼桑皮各一錢二分蘇子白芥子茯苓各一錢甘草七分生薑三片水煎服○治胃氣壅滯水穀不行用厚樸一錢五分紅麴豬苓麥芽穀芽俱酒炒各三錢甘草七分生薑三片水煎服

杜仲味辛甘氣平無毒氣味俱薄沉而降陽中陰也入足少陰兼入足厥陰經乃肝經氣分之藥（別錄曰杜仲生上虞山谷及上黨漢中上虞在豫州虞號之虞非會稽之上虞也今出建平宜都而韓氏蘇氏又言出商州成州峽州諸山大谷中樹高數丈葉似辛夷又類柘葉嫩葉初生可食謂之檰芽花木皮狀似厚樸折之白絲相連江南亦呼曰檰花實皆苦澀亦堪入藥木又可作履以益腳也雷氏曰修治削去粗皮每一觔用蜜四兩和塗火炙黃以透爲度）

○杜仲達下焦補肝腎壯腰膝之藥也益肝主筋腎主骨肝充則筋强腎充則骨健屈伸利用故前古主堅筋骨除痿痺定腰膝痛并肝藏風濕成虛脊背强直俛仰不利屈伸不便及小便餘瀝陰汗濕癢者宜加用之故方氏直指云凡下焦之虛非杜仲不補下焦之濕非杜仲

不利腰膝之疼非杜仲不除足脛之痠非杜仲不去然色紫而燥質綿而韌氣溫而補補肝益腎誠爲要劑如肝腎陽虛而有風濕病者以鹽酒浸炙爲效甚捷如肝腎陰虛而無風濕病乃因精乏髓枯血燥液乾而成痿痺成傴僂以致俛仰屈伸不用者又忌用之

盧不遠先生曰杜仲從土從中其色褐爲土尅水象腎之用藥也腰本腎府濕土爲害必侵腎水而腰先受之據名據色可以擬也若象形如絡如綿能使筋骨相着又一義矣

○集方治肝腎兩虛筋骨不相榮養以致腰脊痠疼足膝無力將成痿躄者用川杜仲八兩切片鹽酒浸一日曬

乾炒焦。以牛膝、枸杞子、川續斷、山萸肉、兎絲子、玉竹、黃柏、當歸身俱酒洗炒，各四兩，懷熟地酒煮爛，搗膏爲丸梧桐子大。每早服五錢，白湯下。○治小便餘瀝（楊氏方），陰下濕癢。用川杜仲四兩，小茴香二兩，俱鹽酒浸炒，車前子一兩五錢，山茱萸肉三兩，俱炒，共爲末，煉蜜丸，梧桐子大，每早服五錢，白湯下。○治頻年墮胎（楊氏簡便方）。用川杜仲、川續斷各五兩，切片，鹽酒浸一宿，炒燥，爲末，煉蜜丸梧桐子大，每早服五錢，人參湯下。○治產後諸疾及胎藏不安（勝金方）。用川杜仲四兩，鹽酒、醋總和浸一日，炒，磨爲末，紅棗煮爛，去皮核，取肉爲丸，搗勻，丸如梧桐子大，每早服五錢，人參湯下。

黃櫨木，味苦，氣寒，無毒。

（陳氏曰：黃櫨生商洛山谷及蜀[illegible]地界亦有之。葉圓木黃，可作染黃色。[illegible]五月採）

○黃櫨木，解酒疸，除煩熱之藥也。苦寒涼血，故瀕湖方煮汁治大風癩疾，及湯火漆瘡。如入癆疸除熱方劑，又當作飲服之，更便也。

椿　樗（氣味詳後）

（李氏曰：椿、樗二木，南北皆有，形幹彼此大抵相類，該二種也。今據蘇、寇兩氏之說，細辨之，各有異焉。椿木體幹大而修長，皮赤，葉香，味甘，氣溫，質實，無花子，性澀，有毒，升發之用也。樗木體幹小而迂緩，皮白，葉臭，味苦，氣寒，質疎，有花子，性利，無毒，沉降之用也。以此觀之，二物其不同者如此。本草諸書分析尚未明確，今辨別二種之異，以俟博物君子再行查驗何如耳。）

○香椿殺蚘蟲，解蠱毒（陳藏器），止疳痢之藥也。陳氏（日華）方云：此藥甘香，澀澁而燥。甘香能醒發新邪（謂發瘡疥風疹及新氣時氣之類），澁燥能收斂陳氣（謂除蚘蟲蠱毒疳痢胃虛脾泄之類）。故孟氏方治婦人血崩，或產後血行不止，并平常月信來多，及赤白帶下。取椿根煎汁服，即止，則知性之止澁可知矣。

前賢孟氏曰：椿芽甘香而美，勝夫入諸蔬菜肉食中。大能省胃氣，然多食亦動風發熱，出瘡疥，昏神氣，發痼疾。

○樗木根葉主治相同，惟止痢疾，其功與罌粟殼、訶子肉相等。較其止澁治痢之功，更有倍于椿木根葉之力也。

前賢寇氏曰：洛陽一人，年四十餘，素縱酒無度，更嗜煿炙魚蟹雞鴨肥味，日久忽患瀉痢，日夜二三十次，稀糞挾膿血而下，大便連肛門，疼極不堪忍。一醫用止痢藥不效，一醫以腸風藥勢益甚，蓋腸風則有血無膿。如此半載，氣血漸虧，食減肌瘦，服熱藥則腹愈痛，膿血愈下，服寒藥則注瀉，飲食不進，如此期年，臥牀待盡。一人教服樗皮散，其方治大腸風虛，酒食過度，挾熱下痢膿血，痛甚多日不瘥。用樗根白皮一兩，川黃連五錢，俱炒，研共爲末，每服二錢，人參湯調下，半月愈。

乾漆味辛。氣溫。有微毒。氣味俱厚。降也。陽中陰也。入行腸胃。入厥陰肝經。

（李氏曰。乾漆出漢中。金州。梁州者。最善。益州廣州浙江亦有。其木高數丈。幹如柿。葉如椿。花如槐。實如牛柰子。木心色黃。夏至後刻取坎陷。以竹管承之。滴汁即成漆也。漢中金州者。色極黑。廣浙者色稍黃。入藥以色黑自然乾者。狀如蜂房。孔孔間隔。但性急易燥。熱則難乾。天寒陰雨亦易燥。濕者不堪入藥。修治取乾者。搗碎微炒熟。不爾損人腸胃。若沾人肉及衣。以油塗之。甫以肥皂擦之。蟹湯洗。即去跡。凡驗以稀者爲好。市家以桐油攪入亂眞。試訣云。微扇光如鏡。懸高急似絲。鉤成琥珀色。打着有浮漚。相感志云。漆得蟹而化成水。蓋物性相制然也。如惧中其毒。以鐵漿或黃蘆木湯或豆湯或蟹湯並可）

○乾漆化瘀血。消蟲積。斷尸勞之藥也。（日華子）別錄方主婦人經脉不通。癥瘕積結。心痛胃疼。或小腹奔豚。腸胃蟲積。或傳尸風勞。蟲勞。并大風癩疾。目爛鼻崩。下足拳攣。指節開裂。形容惡變。宜製熟服之。然性燥有毒。瘀血得之即化成水。其消鑠之力可知。凡經閉不通等證。由于血虛而非瘀血結塊阻塞者。切勿輕餌。

○李瀕湖先生曰。漆之爲物。性毒而殺蟲。氣烈而行血。質堅而攻癖積。所主諸病雖多。總不外此三者而已。

王太和先生曰。漆性燥爍而烈急。而有毒。治竹木皮革什用之物。能堅固不壞。續金石。補漏孔。絕無罅隙。因質沾凝而體堅也。着生物。血肉皮毛之處。受之無不腐爛。入腸胃筋骨之間。潰敗生蠹。不可救藥。因氣悍劣而性有毒也。何前古本草。主補中。續筋骨。填腦髓。久服輕身耐老成仙之說。此荒謬不稽之言。愚者信而服餌。死不旋踵。後世好古之徒。妄爲附會其說云。血者。有形之物也。形質受病。惟辛溫散結者。可入血分而消之。乾漆是也。瘀血消。則中藏自和。筋骨自續。而腦髓自充矣。瘀血消。則骨蒸自退。蟲勞自除。咳嗽自止矣。噫。斯言一出。明者相機而用。奏功于萬中之一。庸或有之。倘麤工鹵莽。信手投用。貽害生靈。天和之禍。寧有量哉。不仁之端。莫大于此。特采而錄之。以沼後世云。

○集方。治（婦科錄驗方）婦人血氣不和。不曾生長。將行經腹中耕痛。不可忍。及丈夫疝氣奔豚。或小腸弦急腹痛者。用濕漆一兩。熬一食頃。入乾漆末一兩。和丸梧桐子大。每服六七丸。溫酒下。○治婦人經閉不來。（簡便方）繞臍攪痛。寒熱往來。或諸癥瘕等病。此藥削年深堅急之積滯。破日久凝結之瘀血。用乾漆一兩。打碎。炒烟盡。川牛膝二兩。炒。共爲末。以生地黃熬稠膏。和爲丸。如梧桐子大。每服十丸。空心溫酒送下。藥完漸消。當以六君子湯加薑棗。日服一劑。○治心胃疼不止。（簡便方）用乾漆炒烟盡。玄胡索酒洗炒。各二錢。研爲末。每服五分。醋湯送下。○治腸胃諸蟲攻痛。（家抄方）有蟲下者。用乾漆炒烟盡爲末。每服三分。烏梅三箇。花椒二錢。泡湯調服。○治傳尸風勞。（大氏方）蟲勞。用乾漆一兩。醋洗。炒烟盡爲末。每空心服三分。麥門冬湯調服。○治大風癩疾。（千金方）毫毛脫盡。或甚至目爛鼻崩。手足拳攣。指節開裂。形容惡變。用乾漆爲末。一兩。和清[illegible]二兩。同[illegible]

皂角刺四兩、胡麻子、去殼六兩、俱炒燥爲末、總和勻、紅麪打糊爲丸、如黍米大、每服三錢、白湯侵晨送下、

○續補方、（聖濟總錄）治喉痺欲絕不可針藥者、用乾漆燒烟、以筆管吸之○（杜氏方）治小兒蟲病危惡與癎相似者、用乾漆搗炒烟盡、白蕪荑各等分爲末、米湯調服一字○（陳氏家秘）治紫白癜風、用乾漆一兩、炒烟盡、生地黃、半枝蓮、胡麻、荊芥各五錢、何首烏、天門冬、苦參各六錢、分作十劑、清水煎服○（仲景）治五勞虛極、羸瘦腹滿、不能飲食、內有乾血、肌膚甲錯者、用乾漆一兩、炒烟盡、䗪蟲十個、去足焙燥、共爲細末、大黃一兩、酒煮半日、搗膏爲丸、如黍米大、每服十丸、白湯送下、

海桐皮、味苦辛、氣平、無毒、氣薄味厚、陰中陽也、入足太陰陽明經、

（蘇氏曰、海桐皮生南海及雷州、凡近海州郡多有之、葉大如手掌、有三尖、皮若梓皮、白而堅韌、可作繩、入水不爛、又一種刺桐、生山谷中、文理細緊而性喜折裂、體有巨刺、如欓樹、其實如楓、又一種頳桐、皮青、葉圓大而長、高三四丈、開花紅色、成朶而繁、爲夏秋奇觀、）

○海桐皮、行經絡、去血分風濕之藥也、（別錄）開寶方（朱安山稿）主赤白痢疾、延綿日久、或風眼腫赤、暴發流行、又主血脉頑痺、臂膊痠疼、腰脚攻痛、動履不遂、凡風癧瘙痒之疾、特需用之、如痢疾赤眼、痺癧諸證、非關風濕者、不宜用、

○集方、（內府紫方）治久痢赤白、止作不休、用海桐皮一兩、切碎、酒洗微炒、水煎服○（韓氏秘方）治時行赤毒眼疾、合家傳染者、用海桐

皮二兩、切碎、鹽水洗、微炒、用滾湯泡、待溫洗眼、去赤止痛消腫○（王氏秘兒手鑑）治風毒攻走筋脉、臂膊痠疼、腿足麻痺、將成癱瘓者、用海桐皮二兩、切碎、川芎、羌活、五加皮、枸杞子、各二兩、牛膝、木瓜各三兩、懷生地六兩、俱入鍋內炒、去水氣、以麻布袋盛、入無灰酒三斗、磁瓶內浸之、春二、夏一、秋三、冬四日、將藥酒瓶入鍋內、隔湯煮二時許、取出渣、每早午晚、隨量飲、常令醺醺、忌燒酒、雞、鵝、羊、狗、肉、介海味、糟物、

楝實味苦，氣寒，有小毒。氣薄味厚，陰也，降也。入足陽明、手足太陰經。

（別錄曰：楝實生荊山山谷。及蜀，今所在亦有之，惟蜀者勝，故時人稱爲川楝子。李氏曰：木高數丈，生長甚速，三五年即可作椽。葉密如槐而稍長，三四月開花，紅紫色，芬芳滿庭。實如彈丸，生青熟黃。葉性滑利，可浣衣練白。蛟龍畏之，故時俗以糯米用楝葉裹粽投江中祭屈原，蛟龍不敢食也。蘇氏曰：楝樹有雌雄兩種，雄者不結子，根赤有毒，服之令吐不止，時有一亟竟欲死者。雌者結子，根白微有毒，入藥用。根用實，當用雌者。雷氏曰：凡采得，晒乾，用時以酒拌蒸，熟待皮軟，刮去皮，取肉弃核，搥碎用。）

○楝實散熱結，導小腸膀胱之氣之藥也。（李相宏精）故前古主傷寒溫疫，大熱煩狂，疝瘕攻心腹痛，及小腸水道不通，小腹急疾諸證。經曰：冬傷于寒，春必病溫。其主傷寒大熱，溫疫煩狂者，總因寒邪鬱久，至春變爲溫病，邪在陽明也。

苦寒能散陽明之邪熱，則溫疫煩狂自除矣。又膀胱爲州都之官，小腸爲受盛之官，二經順氣化之令，而使之出。令疝瘕攻築，則氣閉而小便不利，苦寒能散其邪熱，熱散氣通，則水道利矣。此劑但苦寒行散之物，以上諸證，非內熱氣結者，勿用。如脾胃虛寒之人，亦勿用。

○集方：治（河間內要）熱厥心痛，乍痛乍止，身熱足寒。用川楝實去皮，玄胡索各一兩，俱醋炒爲末，每服三錢，白湯下。（瘖集方）○治一切偏墜疝氣，痛不可忍，或鈎腎等疝。用川楝子肉五兩，分作五分：一分用補骨脂五錢同炒，一分用小茴香三錢、食鹽二錢同炒，一分用斑蝥七枚去頭足同炒，一分用吳茱萸二錢同炒，一分用牽牛子三錢同炒。炒畢，揀去食鹽、吳茱萸、斑蝥，只留補骨脂、茴香，同研爲末，以紅麴打糊爲丸，如梧桐子大，每服百丸，空心白湯下。○治（全幼心鑑）嬰兒冷疝氣痛，膚囊浮腫。用川楝子去皮核五錢，吳茱萸二錢五分，俱微炒，共爲末，每服五分，白湯調下。

○楝根皮（味苦，氣寒，微毒。色赤者有大毒，勿用；色白者無毒，可用。）去蟲殺疳之藥也。（陶隱居）（土方手抄）洪氏方：治小兒消渴有蟲，用楝根白皮一握，切碎，水二碗，煎一碗，空心飲之。雖困頓不妨，下蟲如蚯而紅色，其渴自止。小兒消渴病，係有蟲，人所不識也。

○集方：治小兒腹中有蟲，用楝根白皮一兩，切碎，白蕪荑五錢，俱微炒，共爲末，每以一二錢，量兒大小增減，白湯調服，次日蟲下。○治小兒乾疥濕癬，及禿瘡、蠼螋瘡、浸

淫瘡，并一切諸瘡。用楝根白皮，搗爛，和猪脂少許，搽之即愈。治大人疥癬亦可用。

治（竊用壱）婦人諸病因氣滯血不調者，用川楝實一兩，香附便煮、烏藥、砂仁、當歸、川芎、白芍藥各二兩，熟地黃四兩，酒煮，共搗細爲丸，每早服三錢，晚服二錢，白湯下。氣痛加吳茱萸五錢；身盛有熱，加半夏、茯苓、陳皮各一兩；脾胃不和，時作泄瀉，加白朮、補骨脂各二兩。○治（廣筆記）乳癰潰爛，經年將穿腹者，用土楝實一兩，經霜者佳，雄鼠糞七錢，露蜂房五錢，俱炒微焦，研細末，每用三錢，食後酒調服，間日一服，服藥完，痛即止，不數日膿血收斂，外貼長肉膏而愈。

槐實味苦，氣寒，無毒，沉也，降也。入手足陽明，兼入足厥陰經。

（別錄曰：槐生河南平澤。蘇氏曰：今南北處處有之。陳氏曰：小枝擺擺垂而如落，其木不甚高，其葉青綠而細。有葉大而黑者，名櫰槐；葉晝合夜開者，名守宮槐。李氏曰：槐之初生，季春五日而兔目，浹旬而鼠耳，更旬而始規，再旬而葉成。四五月開黃花，六七月結實，黑褐，作莢如連珠，奇數者為勝。花未開時，狀如米粒，采取煎汁染黃色，甚鮮明而美。初生嫩葉，摘之曬乾，可代茶，如煠熟水淘過，拌油醬，可充蔬食，謂之槐葵。西人好食之。折之插園圃亦可生活。禮書以世胄之家門庭多植之。雷氏曰：入藥用實，或莢中奇數者，以銅鎚搥碎，微炒用。）

○槐實涼大腸，潤肝燥之藥也。故陳氏方主五痔下血，腸風瀉血，赤痢毒血，小便尿血，崩淋下血，及吐血、咯血、嘔血、唾血，或鼻衄、齒衄、耳衄、舌衄，又肝熱風燥，赤眼腫痛，凡諸燥火動血為患，悉宜用之。此劑但苦寒純陰，如脾胃虛寒之人，將有泄瀉之證，或陰虛血熱而見以上諸證，而非實熱者，或外象似同，內因實異者，切宜忌服。

吳梅坡先生曰：槐感天地陰寒之氣，而兼木水之化，況晝合夜開，是得氣于陰。槐字從鬼，鬼為陰之精。冬取其火，冬亦時之陰，故前古主五內邪熱，氣入血分，入隱僻之地，為涼血要品。血不熱，則陰自足，目疾與痔證交相愈矣。

○集方（外科秘要）治內外痔瘡。用槐角子一斗，搗汁，晒稠，或慢火熬稠，以苦參數兩，切碎微炒，研為末，和為丸梧子大。每服五十丸，白湯下，兼作挺子納下部。○（和劑局方）治五種腸風瀉血：糞前有血名外痔，糞後有血名內痔，大腸不收名脫肛，穀道四面弩肉如碎妳，名鼠妳痔，大者名牛妳痔，頭上有孔名瘻瘡，內有蟲名蟲痔，並皆治之。用槐角子（去梗）四兩，炒，地榆、當歸（酒洗，炒）、枳殼（麩拌炒）、防風、黃芩（炒）各一兩，為末，酒糊丸梧子大。每服百五十丸，米湯下。○（宣秘）治赤痢毒血。用槐角子四兩，酒洗炒，白芍藥二兩，醋炒，木香五錢，焙，共為末。每早服三錢，白湯調下。○（錢氏簡易方）治小便尿血。用槐角子、三錢，車前、茯苓、木通各二錢，甘草七分，水煎服。○（濟陰全寶）治婦人崩淋下血。用槐角子八兩，酒洗炒，丹參四兩，醋拌炒，香附二兩，童便浸炒，共為末，飴糖為丸梧子大。每早服五錢，米湯下。○（劉氏集）治吐血、咯血、嘔血、唾血，或鼻衄、齒衄、舌衄、耳衄。用槐角子八兩，麥門冬（去心）五兩，用淨水五十大碗，煎汁十五碗，慢火熬膏。每早午晚各服三大匙，白湯過下。○（普濟方）治赤眼腫痛昏暗。用槐角子、二兩，川黃連五錢，白芍藥一兩，俱酒洗炒，研為末，蜜丸梧子大。每晚服百丸，白湯下。○（外科精要）治惡瘡腫毒，一切癰疽，不問已成未成，但焮痛者，用槐花微炒，胡桃肉湯泡去皮，各一兩，無灰酒二碗，煎十餘沸，隨意熱服。未成者一二服，已成者二三服，即效。○（劉氏傳信方）治痔瘡如桃，或行役過勞，或乘驢馬，有傷其痔，大作腫脹突出，寒熱，偃臥不能行動。以槐枝濃煎湯洗淨，痔上以艾壯如痔頭大，灸二七或三七壯，漸消。

槐花味苦，氣寒，無毒。入手陽明、足厥陰經。

（寇氏曰：未開時采收，陳久者良。入藥宜微炒。用染家以水煮一沸出之，其稠滓為餅，染色更鮮也。）

○槐花涼大腸血熱之藥也。張元素治腸風瀉血，濕熱便紅，氣痔、酒痔、蟲痔、脈痔，總因濕熱下干大腸血分，必須用之。如蘋湖方，術治赤白痢疾，往往用此取效，亦其意耳。然苦寒下降，如脾弱胃寒之人，宜斟酌行之。

○集方：治腸風瀉血，用槐花炒，研細末，每服三錢，早晚食前白湯調服。或用槐白皮煎湯亦可。○治酒毒下血，用槐花炒微焦一兩，黑山梔五錢，共為末，每早食前服二錢，白湯調服。○治諸痔出血，用槐花二兩，地榆、蒼朮各一兩五錢，甘草一兩，俱微炒，研為細末，每早晚各食前服二錢。氣痔（因勞損中氣而出血者），人參湯調服。酒痔（因酒積毒過多而出

血者），陳皮乾葛湯調服。蟲痔（因痔而內有蟲動出血者），烏梅湯調服。脈痔（因勞動有傷，痔竅出血遠射如線者），阿膠湯調服。○治赤白痢疾，用槐花微炒三錢，白芍藥炒二錢，枳殼麩炒一錢，甘草五分，水煎服。

○槐葉味苦，氣平，無毒。煎湯浴小兒疥癬，漱大人齒牙風痛。又濃煎汁飲，治痃癖氣隔不下。

○槐枝味苦，氣平，無毒。療大風痿痹，釀酒飲之，治陰囊濕痒痔瘡膿血，煎湯洗之。治崩漏帶下血，炒熱，腹上熨之。治疥癬定痒止痛，燒瀝塗之。治齒牙去風殺蟲，止痛，煅灰揩之。

○槐木皮、根白皮，俱味苦，氣平，無毒。煎湯洗一切爛瘡陰囊濕痒，陰疝核腫，諸般痔瘻，及婦人產門痛癢。又煎汁飲，治中風身強不能屈伸，四肢痿痹，腰膝疼痛諸疾。

王太和先生曰：槐之一物，分類有六，而治病凡二十，總不外清火散結，去風收濕，活血五事而已。其花色黃五瓣，意在斯乎。

樺木皮，味苦，氣寒，無毒。氣味俱薄，降多升少，陰也。入足陽明經。

（陳氏曰：樺木皮形似山桃皮，生遼東及臨洮、河州、西北諸地。其木色黃，有小紅斑點，其皮厚而輕浮柔軟。皮匠家用襯鞾裏及刀靶，或裹弓靶、鞍韂等物。胡人尤重之，以皮卷油燃，可作燭點。）

○樺木皮散風熱，解癰毒，消五疸，清時行痘疽瘡之藥也。

寇氏云：苦寒善降，能散鬱熱風毒，輕浮柔軟，能消乳毒癰瘍，但寒淡清脆之物，如脾胃冷弱，易于作泄者，勿多服久服。

○集方：治五疸發黃（林氏家抄），用樺木皮、鈴兒茵陳各等分，煎湯作茶飲。○治肺風毒瘡，遍身瘡疥，如癘及隱疹瘙癢，面上風刺，及婦人粉刺，用樺木皮、枳殼各四兩，俱炒焦黑，荊芥穗二兩，甘草八錢，共為末，以杏仁二兩，水煮過，去皮研如泥，拌入末藥內，每服二錢，食後白湯調下。○治乳癰初發，腫痛結硬欲破，一服即瘥，以北來真樺木皮燒存性，研末，每服三錢，無灰酒調下，一臥即瘥也。○治乳癰腐爛不收口，用舊樺木皮燒灰，酒服一錢，日一服。

秦皮味苦。氣寒。性濇。無毒。沉也。降也。乃足厥陰少陽經藥。（蘇氏曰。秦皮出陝西州郡。今河陽亦有之。其木似檀枝幹皆青綠。葉細如匙頭大。不光。不作花實。皮上有白點。取皮漬水。色便青碧。作字色亦青碧者方真。）

○秦皮斂精。收淚。息崩止痢之藥也。此藥味苦。性濇而堅。能收斂走散之精氣。故仲景用白頭翁湯以此治下焦虛熱而利者。取苦以濇之之意也。別錄方止男子精虛。婦人崩帶。甄氏方又治小兒驚癇身熱。及肝熱目暗。翳膜赤腫。風淚不止等疾。皆緣肝膽火鬱氣散以致疾。以此澄寒清碧下降之物。使濁氣分清。散氣收斂。故治眼科退翳膜。收淚出。治婦人科定血崩。止白帶。治大方科止虛痢。斂遺精。治小兒科安驚癇。退變蒸發熱。奈時人

僅知治目一節。幾于廢棄。良爲可惋。乘前賢曾存有之說。特表而錄之。以俟後之君子。聽其取用云。倘脾虛胃寒人。又宜少之。

○集方（仲景）治傷寒熱利下重。用秦皮、白頭翁、川黃連、黃蘗各五錢。水煎服。○（徐氏家抄）治男子精虛自遺。用秦皮、山茱萸各一兩。水煎服。○治婦人赤白帶下。及血崩不止。用秦皮三兩。丹參二兩。當歸身一兩。俱酒洗炒。研爲末。煉蜜丸梧桐子大。每早服五錢。白湯下。○（兒科摘要）治小兒驚癇發熱。及變蒸發熱。用秦皮、茯苓各一錢。甘草五分。燈心廿根。水煎服。○（外臺秘要）治肝熱目赤腫痛。翳膜隱或風淚不止。用秦皮一兩。川黃連三錢。水一升。煮七合。澄清。日日溫洗。○治血痢連年不愈。用秦皮、薔薇根各等分。水煎服。○治（寇氏本草）身無故生癩瘡。用秦皮一兩。煮汁飲之。服七日漸消。○治（[illegible]本草）風寒濕痹。寒熱洗洗。用秦皮一味。水煎飲。

無食子。味苦。氣溫。無毒。（蘇氏曰。無食子。即沒石子。生西戎沙磧間。樹似檉。西陽雜俎云。出波斯國。土人呼爲摩澤樹。高六七丈。圍八九尺。葉似桃而長。二月開花。白色。花心微紅。子如金彈。蟲食成孔者。入藥最佳。其樹一年生無食子。次年生拔屢子。大如指。長三寸。中仁如栗。又方輿志云。大食國者。一年生蒲盧子。圓扁。亦如栗。大寸許。中仁亦可食。次年生沒食子。彼國呼爲麻茶澤。間歲互生。一根異產如此。又一統志云。無食子生大食諸番中。樹如樟。結實如中國芳[illegible]雷氏曰。凡使勿犯鐵器。并火驚。用顆小無枕米者妙。以漿水砂盆研。令盡。焙乾再研。如烏犀色爲度。）

○無食子。澁腸固泄。溫中止痢之藥也。唐本草云。其味苦

澁。其氣溫和。其性斂濇。故止久痢（氣陷下也）暴泄（氣欲脫也）腸滑不禁。用爲要餌。推此收濇溫斂之能。故又能烏鬚髮。益精血。收陰汗也。如痢疾由濕熱鬱于腸胃。兼積滯未清者。不宜驟用。

○集方（普濟方）治血痢不止。用沒石子一兩。爲末。米糊丸小豆大。每食前米湯下百丸。○（聖惠方）治大人小兒無故暴泄。用沒石子二兩。爲末。每服二錢。人參湯調下。小兒減半。○治大人小兒口瘡。用沒石子三箇。甘草五分。共研末。摻之。如小兒月內生者。以少許塗乳頭上。令吮之。入口即活。不過三次愈。

合歡味甘，氣平，無毒。入手少陰、足太陰經。

（農皇經註曰：合歡生豫州山谷。別錄曰：生益州汴繼上谷。今所在山谷亦有，俗呼合昏樹。蘇氏曰：樹似梧桐，光直而披枝，甚柔弱，葉似皂莢，細而繁密，互相交結，每一風來，輒自相解綴，不相牽。五月開花，色紅白，上有絲茸。秋月作莢，子極纖薄步。采皮葉用之，不拘時月。雷氏又言：合歡花上半淺白，下半深紅，為花之異。其葉至夜即合。今東西兩京人家植之庭除間，適之別。雷氏曰：修治取皮，刮去粗皮用。其葉嫩時煠熟，水淘，和油醬，可充蔬食之。）

○合歡皮　蠲忿忘憂，安五臟，和心志之藥也（本經）。如前古云（王氏家抄）：久服輕身明目，令人歡樂無憂，得所欲（即孔子從心所欲之意。）乃甘溫平補，有開達五神，消除五志之妙應也。又觀其花，晝則開，夜則合，得天地陰陽啟閉之常，不特安五臟，亦可安衛氣，晝出于陽，夜入于陰，更可安營氣之周行經隧，調和血氣者也。如陰陽營衛，血氣咸得安常，則五神之心神、肺魄、肝魂、脾意、腎智，亦咸得其和矣。五神既和，安有肝之怒、脾之悲、肺之憂、腎之恐也耶。如是推之，始于天地陰陽開合之得其常，則營衛出入自和，營衛出入既和，則血氣經隧自調，血氣經隧既調，則五神自安，五神既安，則五情亦無復妄動，五情不復妄動，故令人歡樂無憂，得其所欲，而翩翩自適，若神仙人矣，故云久服輕身。輕身，非飛昇之謂歟。

前賢張潔古老人曰：土為萬物之母，心為君主之官。脾土虛，則五臟不安；心氣躁急，則神明內亂，而遇事拂鬱而多憂。此藥味甘氣平，主益脾土，脾實則五臟自安。味

甘氣平，主和緩心氣。心氣和緩，則神明自暢，而歡樂無憂；神明暢達，則覺照圓通，所欲咸遂矣。如俗語云：萱草忘憂，合歡蠲忿，正二藥之謂歟。又大氏方主消癰疽、續筋骨者，皆取其能補心脾，生血脈之功耳。

前賢朱丹溪老人曰：合歡屬土與火，補陰之功甚捷。古云：散癰疽，長肌肉，續筋骨之功，槩可見矣。又與白蠟同入膏藥中，用極神效，而外科良工未曾錄用，何也。

○集方　治（濱湖氏五方）心虛有熱，天王補心丸。○治肺虛有熱，四君子湯。○治脾虛有熱，歸脾丸。○治肝虛有熱，鱉甲丸。○治腎虛有熱，六味地黃丸。五方俱倍用合歡木皮，酒洗炒，加入。○治（韋氏方）外科癰瘍，潰未潰，可消；已潰，可斂。隨證隨方俱可加合歡木皮，作煎、作散、作丸、作藥酒，咸宜用之。○治（韋宙獨行方）肺癰唾濁，心胸甲錯。取合歡皮一掌大，水二升，煎取一升，分作二服。○治（百一選方）撲損骨折。用合歡樹皮，去粗皮，炒黃色，四兩，芥菜子炒一兩，共研為末。每服二錢，溫酒臥時煎服，以滓敷患處，接骨神效。

○合歡枝　治中風攣縮。和桑枝各等分，浸酒飲。

○合歡子　治疝氣。和橘核、茴香各等分，水煎服。

皂莢，味辛鹹，氣溫，有小毒。氣味俱厚，浮而散，陽也。入足厥陰、手太陰、陽明經。（別錄曰：皂莢生雍州山谷。蘇氏曰：今所在皆有，懷孟者爲勝。樹極高大。李氏曰：葉似槐，瘦長而尖，枝間多刺。夏開細花黃色，結實有三種：一種短小，形似豬者；一種細長瘦薄，枯燥而不粘者；一種長大肥厚，多脂而粘者。如入藥，取豬牙者佳。其樹多刺，難于采取，用竹篾箍樹本，其莢過夜盡落，亦一異也。有不結實者，將樹本鑿一大孔，入生鐵三五觔，外用泥封孔，只次年卽結莢，且數倍。有人以鐵砧搥皂莢，砧卽自損；或以鐵碾碾之，碾卽成孔；或以鐵鍋爨之，鍋卽爆片自落。豈皂莢與鐵有感召之情耶？雷氏曰：修治取赤色肥厚如豬牙不蛀者，新汲水浸一宿，銅刀刮去粗皮，並去子弦，酥炙乾用。用者惟其作末或熬膏，切勿煎汁爲飲劑。）

皂莢，利氣透竅，驅風行痰，消穀食之藥也。性惟猛急，（士條）故氣透竅。一吸而通。巢氏論治中風口噤，人事不明，或鬼魘卒死，癲癇痰結，或升降隔絕，氣塞喘急，或頭風頭痛，淚出目脹，以上諸證，皆由氣竅不通不利，爲痰爲結，爲風爲癇之故。此藥宣壅導滯，有斬關奪路之功。如九竅不通，腸胃壅閉，痰涎垢膩，氣結暴病，用之立時奏效。如中氣虛弱，不能運痰，以致痰涎不利，或陰虛火炎，煎熬津液，以致結而爲痰，或虛極生風，風虛內攻，以致猝然仆厥。世人多以稀涎散吐之，損其中氣，竭其津液，津液愈耗，則經絡無以榮養，極則爲拘攣偏廢之疾，重則厥而復厥，終致不起者多矣。用者當斟酌可否，以行之貴乎得其宜耳。（[illegible]）

○集方：治氣道不利，升降不周，爲脹爲滿。用豬牙皂莢二錢，去皮弦子，炒，於白朮、茯苓各一兩，炒，木香五錢，不見火，共爲末，煉蜜丸，每服二錢，米湯下。○治諸竅不通，（陳化甫方）因氣因痰因風因火，暴病閉塞者，用豬牙皂莢（製法如前）爲細末，吹入鼻內，卽通。○治風癬疥癩，（[illegible]）或皮膚麻木，死肌風痹頑皮等證，用大皂莢二十條，去皮子弦，切碎，水十五碗，熬成稠膏，每日用少許，搽患處，再以十茶匙，枸杞子湯調服，內服外搽，藥完卽愈。○治胸中一切痰結不行，（[illegible]）用皂莢三十挺（製法如前），清水五升，浸一夜，煎汁半升，如稠，濾出楂，用半夏八兩，醋煮熟，曬乾，生明礬三錢，共爲細末，和入皂莢膏內，搗勻爲丸，如梧桐子大，每服三錢，柿餅湯下。○治大人小兒多食穀麥糖豆諸物不消，（[illegible]）用皂莢末三錢，枳實一兩，白朮五錢，俱炒，研爲末，生薑湯調

服三錢，小兒減半。○治中風口噤不開，（衛生易簡方）涎潮壅上，用皂莢爲極細末，每服一錢，白湯調下，氣壯者二錢，以吐出風涎爲度。或用數分吹入鼻內取嚏亦可。○治中風口（外臺秘要）噤，用皂莢五兩，爲極細末，用米醋和之，左噤塗右，右噤塗左，如乾取落，再用米醋調濕，更上之。○治鬼魘不省，（千金方）用皂莢爲細末，吹入鼻內，卽甦。○治自縊將絕，（[illegible]）以皂莢末，吹鼻中，取嚏卽甦。○治癲癇風痰，取痰如神，（[illegible]）用大皂莢八兩，去皮弦子，以蜜四兩塗之，慢火炙透，搥碎，以熱水浸一時，慢火熬成膏，入麝香少許，攪勻，攤在夾綿紙上，曬乾，剪作銅錢樣片子，每用三四片，入白湯一盞，淋洗，以筆管取膏湯，吸入鼻內，待痰涎流盡卽愈。○治升

降（余居士選奇方）隔絕，氣逆喘急，有痰唾濁，不得臥。用長皂莢三條，去皮弦子。一莢用巴豆肉五顆，麻油浸一夜。一莢用生半夏十顆，生薑汁浸一夜。一莢用杏仁十顆，礬水浸一夜。俱各包藏皂莢內，用線紮住。一總再以蜜湯浸一夜，次日放大碗內，浮湯上，蒸三炷香，取起，出巴豆、半夏、杏仁，俱研極細，再將皂莢肉晒乾，微炒，亦研極細，總和一處。每用末藥一分五釐，臨臥，以生薑湯調下。立效。此方氣實痰結不通者可用，元虛者，當斟酌行之。亦可治水腫臌脹。○治頭風頭痛，暴發欲死。用長皂莢一挺，去皮弦子，切碎，蜜水拌，微炒，研為極細末。每用一二釐，吹入鼻內，取嚏。再用一分，以當歸、川芎各一錢，煎湯調下。○治

楊梅結毒，蛀爛。用皂莢為末，配鍾乳石、白殭蠶、真珠、象牙各五錢，加牛黃、冰片各八分，共研極細末。每服二分，人參湯調下。○治癰疽便毒。用長皂角一條，醋熬膏，敷之，屢效。○治二便關格不通。用皂莢燒，研為末，米湯調下三錢。○（千金方）治風蟲牙痛。用猪牙皂莢角，燒黑，各等分，為末，日揩之。○（袖珍方）治便毒腫痛。用皂莢，炒焦，真鉛粉，炒，共為末，以熱醋調攤紙上，貼患處，頻頻以溫湯潤之。○（袖珍方）治婦人吹乳。用猪牙皂莢去皮，為末，和蛤粉少許，拌勻，用熱酒調服一錢五分。○（孫作參方）治小兒頭瘡，粘肥臭穢，及白禿瘡。用皂莢燒黑為末，洗去痂瘢，敷之，不過三次，即愈。○治中（孫用和方）風昏昏如醉，形體不收，或倒或不倒，或口角流涎，斯須

不治，便成危篤。此證風涎潮于上，胸痺不通，急宜吐之。用大皂莢肥實不蛀者四挺，去黑皮，白礬明者一兩，共為末。每用五分，重者八分，溫湯調灌下。不大嘔吐，只是微微出稀冷涎，或出一升二升，當待醒醒，乃用他藥調治。然不可大吐，恐過劑傷人。此方屢效。

皂莢子：味辛，甘，氣溫，無毒。

（寇氏曰：皂莢子，器存炒去赤皮，以湯浸軟，煮熟，可拌糖食。）

○皂莢子，疏導五臟壅氣，祛風潤燥，和（寇氏）腸之藥也。

○集方：治（錢氏方）年久瘰癧。用皂莢子一百枚，米醋一升，煮乾，再

炒鬆酥，看瘰子多少，有一個服一枚，十個服十枚，細嚼，米湯下。酒浸煮服亦可。○治腰腳痛風，不能履地。取皂莢子一千二百個，洗淨，微炒燥，為末，蜜丸梧子大。每空心服百丸，白湯下。此方兼治風癩痛人、大便秘、腳氣病人大便秘，咸宜服之。○治（醫方摘要）下痢積滯不止，諸藥不效者。用皂莢子，炒燥，為末，米糊丸梧子大。每服百丸，茶下。用三服，宿垢去盡，即變黃色，屢效。○治（聖惠方）腸風下血。用皂莢子、槐實各一兩，用糯米糠拌炒，候焦，揀去糠，取皂莢子、槐實二件，為末。每空心服二錢，白湯調下。○治（[illegible]方）瘰癧，可預免。每年六月六日，照年歲，一歲一粒，吞皂莢子，白湯吞下。如年大者，以二十一粒為率，不拘大小人皆可用

皂莢刺，味辛，氣溫，無毒。（沈氏曰：皂莢刺宜用頭刺，極尖銳者佳。刺下節如枝梗者，功薄不及也。）

○皂莢刺，拔毒祛風，攻走血脈之藥也。故丹溪翁（[illegible]）言能引諸藥直達病所，至癰疽根處甚捷。凡癰疽未成者，能引之以消散；將破者，能引之以出頭；已潰者，能引之以行膿。于瘍毒藥中爲第一要劑。又泄血中風熱，風毒，故癘風藥中亦推此藥爲開導前鋒也。

姚繼元先生曰：皂莢刺性銳力利，治癘風癩疾，遍身瘡疥，甚則鼻塌眉落，指節折裂，筋攣骨痿，肉爛血凝，皮膚生蟲之證。併一切風癬風瘡，搔癢風屑，與苦參同用，其力更倍。

○集方　治（附癰疽初起已潰）癰疽惡毒，外發內發，欲破未破，在四肢肩背肚腹之外者，則痛極大腫；在胸脇腰腸肚腹腸胃之內者，則痛極大脹。用皂莢刺飛尖一兩，乳香、沒藥、當歸、川芎、甘草各二錢，白芷、花粉、金銀花各五錢，水酒各二碗，煎一碗半。毒在上，食後服；毒在中，半飽服；毒在下，空心服。未成可消，已成即潰。在外者，膿血從皮肉出；在內者，膿血從大便出。三劑見效。○治（存爲孔氏方）大風癘瘡，體癱肢損，形殘貌變者。用皂莢刺飛尖一觔，微炒，研爲極細末；赤鰱蛇一條，切碎，酒煮去骨，取肉，焙，切；麻仁三兩，生半夏二兩，眞鉛粉一兩，俱炒燥，研爲末，和皂莢刺末，一總水發爲丸，如綠豆大，晒乾，入淨磁瓶內。每早晚各服三錢，白湯下。○治小兒重舌，用皂莢刺灰入朴硝錢半，冰片少許，若茶漱口，摻藥舌下，涎出自消。○治（袖珍方）產後乳汁不行，乳房腫脹，或腹下腫脹，欲成癰毒者。用皂莢刺、蔓荊子各等分，炒焦，爲細末。每服三錢，白酒調服，三服立消。

椶櫚皮，味苦澀，氣平，無毒。其子主治同。

（○蘋湖李氏曰：椶櫚樹出嶺南、川廣山谷中，今江南兩浙八閩亦有之。最難長，初生葉如白及，葉高二三尺，大如扇，其尖上聳，四散岐裂，其莖三稜，四時不凋。其幹正直無枝，近葉處有皮裹之，每長一層，即爲一節。幹身赤黑，其木皆筋絡，柔靭而勒，宜爲鐘杵，亦可作器碗器物。其皮有絲毛，錯縱如織，剝取縷解，可織衣帽褥椅坐之屬，大爲時用。每歲必兩三剝之，否則閉悶而死，或不長也。三月間，于樹頂葉中出數黃苞，苞中有細子，乃花之孕也。狀如魚子，謂之椶筍，漸長出苞，則成花穗，黃白色。結實纍纍，大如豆，生黃熟黑，甚堅實。其葉連莖剝

取晒乾，黃水中浸一夜，絲絲血絲如縷。其漿削去稜，捶之如嚗，則可愛蠟紋。）

○椶櫚皮，澁腸收痢，止血定崩之藥也。朱震亨稿（丹溪）大治崩中帶下，腸風血痢，血泄，或吐血鼻紅，一時暴發不止，用此燒灰存性，爲細末，白湯調服數錢。取其血得熱則行，得黑灰則止之意。繆氏曰：凡失血過多，內無瘀滯者，以此止澁，切當其用，所謂澁可去脫是也。與髮灰同入更良。如血痢瘀滯方動，或崩中惡露未盡，或濕熱下痢初起，腸風帶下方熾，恐不宜遽用，即用之亦無效也。

肥皂莢，味辛，氣溫，無毒。

（李氏曰：肥皂莢生大山中。其樹高大，葉如檀及皂莢葉。五六月開白花，結莢長三四寸，狀如雲實之莢，而肥厚多肉。內有核數顆，大如指頭，不正圓，其色黑如漆而甚堅。中有白仁如栗，煨熟可食。其核亦可種。十月采莢，煮熟搗爛，和白麪及諸香作丸，澡身面，擦之去垢膩。相感志云：肥皂莢滴水能死金魚，又辟馬蝗，此物性然耳。）

○肥皂莢，宋人言能滑腸去垢，消積止痢之藥也。其形與皂莢同類，而肉皮肥厚，故曰肥皂莢也。觀其澡浣身面，擦去油膩穢垢不潔之物，則知其滑而去滯，能消積止痢之意明然矣。但質性滑利，而氣臭焦腐，聞之令人作嘔，雖炒製得宜，終不免于損胃，如胃弱少食不食之疾，宜忌用之。

陳六奇先生曰：治人不得已，慮稠粘生痰，飲鹽滷速斃，

治羊以熱血灌之，羊血下咽，滷盡收入血內。即以肥皂莢去核并弦皮，搗爛，以溫湯調灌，少頃即吐，滷味并隨羊血盡出，不損腸胃。

○集方：治（蔣坤性方）下痢噤口。用肥皂莢一枚，以鹽實其內，燒存性，去鹽為末，以少許入白米粥內，食之即效。○（衛生家寶方）治風虛牙腫，或因腎虛，或因涼藥擦牙，致齦并痛者。用獨核肥皂莢，以青鹽實之，鹽泥封固，火燒存性，共鹽研末，輕擦齒間。○（攝生方）治大人小兒頭耳諸瘡，并眉瘡、癬瘡，或癩瘡等瘡。用肥皂莢一箇，去核，生明礬一錢，內入，鹽泥固封，火煆存性，共礬研末，香油調搽。○（濟急方）治辣黎頭瘡，用獨核肥皂莢，去核，填入沙糖令滿，紮定，鹽泥封固，火燒存性，去泥，加輕粉、樟腦各二錢，研末。先以茶湯洗淨，拭乾，以香油調藥搽之，不過二三次愈。○治便毒初起，以服皂莢去核，搗成膏，敷之即消。○（濟生方）治玉莖濕癢，用肥皂莢，火燒存性，研細末，香油調搽。○（楊大本方）治綿花瘡毒不收，用肥皂莢連核，火燒存性為末，每服二錢，侵晨白湯調服。

無患子，味苦辛，氣平，有小毒。

（李氏曰：無患子，生深山中。樹極高大，枝葉皆如椿，特其葉對生。五六月開白花，結實大如彈丸，狀如川練子。生青熟黃，老則文皺。實中核黑，如肥皂莢之核，正圓如珠。殼中有仁，如榛子仁，亦辛苦，可炒食。十月采實，去核，煮熟搗和麥麪，作澡垢藥，澡洗身面，同于肥皂莢也。寇氏曰：今釋子取核貫[illegible]作念珠，初則紫黑，用久則光黑如漆也。）

○無患子莢（即核外肉也），搗爛，滾湯調稠糊，搽面䵟雀斑。搗汁和白湯服，治喉痹，開咽竅。

○無患子核，燒之辟邪惡氣，散瘟瘴，逐飛尸。（俱出蘊器陳氏方中）

欒華木，味苦，氣寒，無毒。（葉主治同）

（別錄曰：欒華生漢中川谷。此樹葉似木槿而薄，花細黃似槐而稍大，結子似酸漿，其殼中有仁，如熟豌豆，圓黑堅硬，堪為數珠。五六月作花，可收以染黃色，甚鮮明。蘇氏曰：今南方及汴浙閩廣咸有植之，其用為念珠，未見入藥。）

○欒華花，煎水（李[illegible]珍），可洗目熱赤爛，或腫痛淚出。

訶黎勒，味苦酸澁。氣溫，無毒。味厚陰也，降也。

（蘇氏曰，訶黎勒出波斯國，今嶺南廣州亦有之。樹似木槵，開白色花，作實如梔子，橄欖狀，色青黃，皮與肉相著，七八月熟。其六稜，肉厚者佳。雷氏曰，入藥勿用毗黎勒，箇箇兆頭者是也。若訶黎勒，實只有六稜，或多稜少者，俱是雜路勒，圓而文露，或十二三稜，號榔精勒，味澁不堪用。修治，用酒浸半日，酒濕草紙包煨，片刻，入石臼內搗細，肉核一總用。）

○訶黎勒，澁腸止痢之藥也。（蕭炳）味本苦澁，（何志念存）苦能泄滯，澁能斂脫，故唐本草主心腹冷氣，咳嗽脹滿，此取苦以泄滯也。蕭元亮止赤白下利，腸澼久泄，此取澁以斂脫也。如甄氏方，用以止水道不禁，蘇氏方，用以療腸風瀉血，帶下白淫，亦不外此收澁固脫之意耳。但其氣性溫而不涼，斂而不散。如泄瀉痢疾，因于濕熱，腸紅帶下，因于鬱火，

咳嗽，因于火逆衝上，小便不禁，因于腎熱頻數者，咸宜忌之。

○集方，治（臣氏[illegible]陽方）心腹冷氣，氣逆脹滿，用訶黎勒三箇，酒潤草紙裹煨熟，肉與核共搗細，砂仁五錢，白芥子四錢，白豆仁三錢，共研末，水發為丸，黍米大。每早晚各服二錢，燈心湯下。○治（趙府濟急方）咳嗽氣虛，散而不收者，用訶黎勒三箇（製法同前），北五味子、川貝母各三錢，杏仁霜一錢，真阿膠五錢，蛤粉拌炒成珠，共為細末。每早晚各服二錢，白湯調下。○治（余阿如家傳）赤白下痢，久不止，用訶黎勒三箇（製法同前），白芍藥五錢，醋炒，黃連，炒，共為末。每早服三錢，白湯調下。○治（林文夫方）腸澼久泄血水，用訶黎勒五箇（製法同前），白朮、蓮肉、白芍藥各五錢，甘草三錢，俱用米醋拌炒，共為末，每早食前服三錢，白湯下。○治小水頻行不禁，用訶黎勒三箇（製法同前），益智子、山茱萸肉、山藥、茯苓各五錢，分作十劑，水煎服。○治腸風瀉血，用訶黎勒十箇（製法同前），白芷、防風、秦艽各一兩，俱微炒，研為末，米糊丸，梧桐子大。每早晚各服三錢，白湯下。○治（胥休齋方）白帶白淫，因虛寒者，用訶黎勒十箇（製法同前），白朮、黃耆、當歸、杜仲、蛇床子、北五味子、山茱萸肉各二兩，俱炒，研為末，煉蜜丸，梧桐子大。每早服三錢，白湯下。

○治口瘡經久不愈，用訶黎勒五個（製法同前），配好冰片一分，共研勻細，不時摻入少許口含，徐徐嚥下。○治老人氣虛不能收攝，小水頻行，緩放即自遺下，或涕淚頻來，或口涎不收，用訶黎勒，不用煨製，取肉時時乾嚼化，徐徐含嚥，諸證即止。

治氣虛泄瀉，（參苓白朮散加減方）用訶黎勒肉、豆蔻俱用麫裹煨，人參、白朮、茯苓、山藥、砂仁、藿香、陳皮、乾薑、蓮肉、甘草各一錢，加生薑二片，黑棗二個，水煎服。○治大人小兒冷熱不調，下痢赤白，或如鵝血魚腦，裏急後重，臍腹疼痛，或脫肛下墜，酒毒便紅，並皆治之。用訶黎勒煨去核，甘草、白芍藥、枳殼、白朮、肉豆蔻麫裹煨，各一錢，肉桂八分，人參、當歸各一錢二分，木香八分，水煎服。○濕熱者，加黃連一錢；寒者，加便製附子一錢。

柳，味苦，氣寒，無毒。（李氏曰：柳與楊，一類二種也。楊葉圓闊而青，枝條短硬；柳葉狹長而綠，枝條長軟。楊枝硬而揚起，故謂之楊；柳枝弱而垂流，故謂之柳。說文云：楊從木易聲，柳從木卯聲。易者陽也，卯者酉也。觀此則楊與柳各一種也明矣。又一種蒲柳，乃水楊也。枝勁韌，可為箭笴，多生河北。杞柳生水旁，葉粗微白，木理微赤，可為車轂。今人取其細條，火逼令柔，屈作圓椅桶籮，即孟子所謂桮棬是也。魯地及河朔尤多。又曰：楊與柳俱縱橫顛倒扦插，皆生長大，高數丈。春初生柔荑，即開黃蕊花。至春晚葉長成後，花中結細黑子，蕊落而絮出，如白絨，因風飄飛，著衣帛絨獨之類，能生蛀蟲。入池沼即化為浮萍。陶朱公言：種柳荒圃中，可足柴炭。取其嫩芽，可作茶飲。其絮甚多，可捍造氈。昔爲茵蓐，臥之柔軟，蚤蝨皆趨遁攻。以柳齒磨進，謂太師擱上進也。）

○柳華，主散風水，清黃疸，利小便。

○柳絮，解惡瘡，排潰癰，逐膿血。

○柳葉，解金石，消瘡疥，化丹毒。

○柳枝，下熱痰，止淋濁，定齒痛。（四種治各少異，以清涼解散爲用，治諸證亦可互通。）

○集方：治風水面腫，用柳華煎湯飲之。○治熱鬱黃疸，用柳華煎湯飲之。○治熱鬱小水不通，用柳華煎湯飲之。○治一切熱毒惡瘡，用柳絮和鉛粉，以麻油調塗。○治灸瘡疼極，用柳絮貼之。凡一切瘡疼甚，亦可定。（千金方）○治一切惡毒膿血脹痛不潰，用柳絮敷上，膿泄毒減。○治金瘡血出不止，用柳絮封之即止。○治金石毒發，以柳葉和黑豆、綠豆煎湯飲之。○治惡疥痂瘡，并瘰馬疥癬，以柳葉煎湯頻洗，漸愈。○治丹毒，用柳葉煎湯乘熱搨洗，日五六次。（子母秘錄）○治小便白濁，以柳葉煎湯代茶飲之。○治瘡瘍生蛆，以嫩柳葉鋪席上臥之，蛆盡出葉上。○治風火熱氣閉鬱成痰，用柳枝煎湯飲之。○治小便淋濁不清，用柳枝一握，甘草三錢，煎湯飲之。○治齒牙浮痛，用柳枝一握，蛇床子五分，煎湯泪漱，頓止。

檉柳，味苦微鹹，氣溫，無毒。浮而升，陽也。入足陽明、手太陰、少陰經。（馬氏曰：檉柳又名西河柳。南北所在俱有，喜生沙地水旁。寇氏曰：汴京甚多，取枝春月雨中插之便生。李氏曰：樹高丈餘，條小枝弱，皮赤如絲，枝葉如松。至五月下垂如絲，一日三起三眠，長三五寸，一歲三次作花。花如蓼花，微紅，花氣如桐露靡鄉，可愛。）

○檉柳，涼血分，發痧癮，解痧毒之藥也。古云痧癮，即今之瘄疹也。其毒起于肺胃之間，發于皮毛之分。外因風寒

腸胃之邪，內因風火血熱之鬱，相感為病。宜苦涼輕散之劑，則出而解。此藥輕清升散，開發瘄毒。如瘄毒內閉不出，或出之甚多，難于解退，或解退後熱發不止，或喘嗽不消，肌肉羸瘦，致成瘄疳、瘄勞者，多有之。以此煎湯代茶，日飲，瘄疹諸疾漸自消減矣。與桔梗、甘草、牛旁子同用更善。如開寶方去驢馬血毒入人肉，以此煮汁飲之浸之者，蓋以驢馬性熱，馳後汗氣沾人，有毒，即能為病，亦以此解之，即取輕揚涼散，解熱毒，發瘄疹之意同義也。

○集方：（繆仲淳方）治瘄癮發不出，或雖發不透，用西河柳一握，石膏、知母、薄荷、荊芥、玄參、牛旁子、竹葉、連翹、黃連各一錢，甘

草五分。水煎服。如熱甚毒熾。舌生芒刺。大渴譫語。班色紫黑者。以西河柳、加入三黃石膏湯內。亦效。○治酒毒（衛生易簡方）致病。用西河柳、取嫩枝葉、晒乾。爲末。每服一錢。白湯調下。

水楊枝葉、味苦。氣平。無毒。

（蘇氏曰。爾雅稱楊爲蒲柳。其枝勁韌。可爲箭幹。左傳所謂董澤之蒲。今河北沙地多生之。楊柳二種。其類亦多。崔氏云。白楊葉圓。青楊葉長。柳葉長而細。楊葉短而粗。水楊葉似青楊。枝葉亦可作矢。赤楊霜後則葉赤。然今人鮮能分別。又曰。水楊葉圓潤而尖。枝條短硬。柳葉狹長。枝條長軟。楊與柳原各別也。）

○水楊枝葉、（金山聶時）止久痢赤白之積。（附本）起痘瘡不發漿之藥也。（時珍）此藥生于涯涘之旁。得水土之陰氣偏多。如赤白久痢腸胃有濕熱也。得苦涼之氣。則濕熱清散。痢自止矣。今人又用以治癰腫痘瘡。多效。按魏直心鑑云。痘瘡數日頂陷漿滯不行。或氣滯血澁。或風寒外阻。腠理閉密者。宜用水楊枝葉五觔。流水一大釜。煎湯溫浴之。如冷添湯。以軟帛拭乾兒身。良久照見纍起。有暈絲者。漿行也。如不滿。再浴之。力弱而不堪浴者。只洗頭面手足亦可。但此藥浴之。令暖氣透達。和暢鬱蒸。氣血通徹。每隨暖氣而發。行漿貫頂。功非淺也。若內服補氣血藥。藉此升之。其効更速。如風寒外阻者。自開。血氣內鬱者。自通。誠有燮理之妙也。如屢浴頂不起者。氣血敗。不必再浴。如始出即癢塌者。亦不必浴。浴之無益也。

○根皮。消乳癰。定金瘡苦痛之藥也。（[illegible]）按永類鈐方云。一人治乳癰。以水楊根皮。搗爛敷癰上。其熱如火。再敷遂平。（又肘後方。用柳根皮敷乳癰亦效。則楊與柳性氣不遠。可通用也。）又千金方治金瘡大痛不可忍。用水楊木白皮或根皮切碎。焙燥爲末。白湯調服方寸匕。日三次。兼敷之。

白楊、味苦。氣寒。無毒。（枝葉主治同）

（寇氏曰。白楊木肌似楊而微白。故曰白楊。處處有之。西北尤多。植墟墓間。其枝挿土即長。易于繁茂。木甚高大。葉圓如梨。而肥厚有尖。面色青而光。背色白而邊有鋸齒。風微至。葉如大雨聲。木肌細白。性堅直。用爲梁拱。終不斜曲。嫩葉味甘可救荒。老葉亦可作酒麴料。）

○白楊木皮。去風痺。消腳氣。活瘀血之藥也。（[illegible]）唐本草治風毒腳氣。四肢緩弱不隨。并風毒遊易。在皮膚中。左右上下。痛無定處。又陳氏方。治撲損瘀血。并折傷血瀝在骨肉間。痛不可忍。及手足皮膚風痛。遊走移易。每用六兩以好酒浸七日。早晚隨量飲之。又獨味水煎。止孕婦赤白痢疾。又醋煎漱牙痛。治口瘡。此涼降清虛之物。如胃寒者。宜少餌之。

續補方。治無病人。（姜用峯傳）遍身風麻搔癢。或結風塊。時癢時痛遊走不常。用白楊葉八兩。白朮、四兩。黑棗四兩。浸酒飲自退。

蕪荑味辛。氣平。無毒。（別錄曰蕪荑生晉山川谷。陶氏曰今出高麗及波斯諸夷。馬氏又言出河東河西及太原。今近地亦有。生太原者佳。其氣臭如狐狀。如榆莢而稍大。如小者是榆莢。非蕪荑也。王氏言可作醬甚香美。此指榆莢而言。蕪荑氣極狐臭。安可作醬食乎。）

○蕪荑殺三蟲。散五疳。治小兒百病之藥也。（李如）前古諸書主（王節齋）諸積冷氣。腸胃蟲癖。食癥血痞。及皮膚骨節中風毒。諸疾緣其氣臭辛烈。攤闢性專走逐。故諸滯成疾。食積蟲血。皆可蕩化。凡諸疳羸瘦。結氣發熱。疳勞疳脹。疳痢疳積。嗜食與不能食。咸宜服之。中病即止。如久服多服。不免有傷胃氣。司業者當自量之。

○集方（巢氏方）治諸積冷氣。用蕪荑一兩炒。大茴香、木香。各五錢。

共為末。紅麴打糊為丸。梧桐子大。每早服三錢。白湯下。

○治腸胃有蟲癖。食癥血痞。（仁齋直指方）因平時嗜食肥甘酒飲。以致敗血留瘀。結成蟲類。為鼈瘕。其發作時。或上行咽胃。下行臍腹。或附腸背。或隱胸次。大則如鼈。小則如錢。攻作耕痛。痛必垂死。惟用蕪荑一兩。酒炒。當歸、砂仁、人參各一錢。水煎服。乃可殺滅。若徒事雷丸、錫灰、史君子之類。無益也。○治結陰下血。（普濟方）用臭蕪荑二兩。搗爛。紙壓去油。甘草五錢。炒。共為末。以豬膽汁少許。調濕晒乾。大麥麪打糊丸梧桐子大。每早服三錢。白湯下。○治小兒蟲（杜氏方）積上攻。勢狀危惡。與癇相似。用臭蕪荑。炒。乾漆。燒存性。各等分為末。每服五分。米湯調下。

榆味甘。氣寒。性滑利。無毒。入手足太陽、手陽明經。（別錄曰榆樹生潁川山谷。李氏曰今處處有之。有十數種。不能盡別。惟知莢榆白榆刺榆榔榆數者而已。莢榆白榆。皆大榆也。有赤白二種。白者名枌。其木甚高大。未生葉時枝條間先生榆莢。形狀似錢而小。色白成串。俗呼榆錢。後方生葉。似山茱萸葉而長。尖峭潤澤。嫩葉煠浸淘過。和油鹽食。可作羹。故內則云。堇荁枌榆。免薨滫瀡以滑之。三月采榆錢。亦可作羹。或瀹過曬乾。可為醬。或生收曬乾。收貯至冬可釀酒。又山榆之莢。名蕪荑。與此相近。但味稍苦。諸榆性皆扇地。故其下五穀不植。榆。今人采其白皮為榆麪。荒歲煮糊可充饑。水調和香劑。粘固勝于膠漆。陶中人取榆皮濕搗如糊用粘要及瓦石器極牢有力。）

○榆皮利竅脉。通二便。（本經）止五淋。消癰腫之藥也。十劑云。滑可去着。冬葵子。榆白皮是也。如二便秘結不通。小便淋濁澁痛。或脹滿喘嗽。或妬乳腫癰。或丹石留毒。或胎滯難生諸證。以此通利流滑下降之性。一切腸胃中火滯、

氣滯。痰滯。諸有形之物。咸可奏功。別錄、陳氏兩書言之詳矣。若胃寒而虛弱者。非滲利滑降所宜。如前古謂久服輕身不饑。多食能益胃者。恐非確論也。

○集方（古今錄驗）治大小二便不通。用榆白皮煮濃汁飲之。○治五（普濟方）淋澁痛。白濁白淫。用榆白皮。陰乾焙研細末。每用以水五合。煮如稠糊。日二服。○治一切癰腫諸毒發背。（救急方）用榆白皮切細。搗極爛。以香油調敷。毒上留頂。一日一換。即消散。○治身體暴腫。（肘急方）用榆白皮搗末。同米作粥食之良。○治久嗽欲死。（古今錄驗）用厚榆白皮削如指大。長寸許。納喉中。吸其味。頻用。當吐膿血而愈。或煮膿汁飲亦可。○治丹（千金方）石毒發。用榆白皮和菉豆各半。煮水飲之。○治五色遊

風紅腫犯者多死。以榆白皮爲末，雞子白和塗之。○治胎（陳氏本草）孕月足不産，用榆白皮焙，爲細末，臨月白湯調服，日三次，臨盆易産。○治大（子母秘錄）人小兒身首生瘡有蟲者，用榆白皮爲末，和白糖、豬脂調塗帛上，覆瘡上，蟲出立愈。○治（濟急方）小兒禿瘡，用榆白皮末，和糖醋調塗，蟲出自愈。

櫸味苦，氣寒，無毒。

蘇氏曰：櫸，榆類，所在皆有，多生溪澗水旁。葉似櫸而狹長，似柳非柳，似槐非槐，皮極粗厚。木高有數仞，連抱二三人。湖南北甚多，然亦不材也，不堪爲器，其嫩皮取以緣褚花及煑雞鶩饌口。又鄭樵通志云：櫸似榆，其結實亦如榆錢，鄉人采其葉焙乾，作飲，爲甜茶。

○櫸木解熱毒，淨痢疾，散水氣，（蘇恭）安胎妊腹痛之藥也。（日華子）緣此（陳氏一五）

○櫸，生發易大，得春升清陽之氣，其性寒平。故別錄方治時行頭痛，熱結在腸胃。隱居方夏月煎飲，辟暑去熱。大氏方治風熱毒腫痛等證，悉屬熱病，宜此木煎飲之。如胃寒脾冷，不食者，勿用也。

蘇方木味甘鹹，氣平，無毒。可升可降，陽中陰也。入足厥陰，兼入手少陰、足陽明經。

蘇氏曰：蘇方木自南海崑崙來，今交州、愛州亦有之。樹似青梘，枝似赤隆，中心有橫紋似紫角者，名木中尊，力倍。嘗有動，夏月作花，黃色，結子生青熟黑，取木剉細搗爛，水煎汁，加白礬些須，用染紅色，名木紅。如見鐵器則色黯，不能見天雨水，則色淡白不紅。暹羅國人搗汁如新。

○蘇方木，活瘀血，逐死血之藥也。（日華子）大氏方，主婦人血氣阻滯，心腹攪痛，或惡露不行，上攻欲嘔，或月水不調，適來適斷，或血風內瘛，口噤不言。凡産後血閉不通，血脹血暈，悶絕欲死，水煮五兩服之，立安。故唐本草著之詳矣。又跌撲內損，瘀血痛脹，或癰毒釀膿，疼痛不止。凡屬形傷血敗之證，故海上方必資其爲首務焉。但入血分，行

瘀逐滯，每稱捷藥，實爲血脈損剝，善行而不能止者也。如産後惡露已盡，諸痛由血虛者，不宜加用。

○集方：治婦人血氣阻滯，心腹攪痛，惡露不行，上攻欲嘔，（劉氏産寶五則）用蘇方木五錢，搗細，當歸、川芎、白朮、乾薑、玄胡索、五靈脂、木香、香附、烏藥，俱酒炒，桃仁，研，乳香、沒藥各二錢，益母草三錢，水煎服。○治婦人月水不調，適來適斷，寒熱腹脹，惡心煩悶，用蘇方木五錢，搗細，柴胡、牡丹皮、續斷、半夏、當歸、川芎、厚樸、丹參、黃芩、白芷、三稜、陳皮、香附、澤蘭，俱酒炒，水煎服。○治血風口噤，不能言語，用蘇方木五錢，搗細，防風、玉竹各三錢，當歸、川芎、秦艽各一錢五入，水煎服。○治産後血暈血脹，用蘇方木三兩，搗細，水

五升，煎取二升，徐徐服。○治產後氣喘，面黑欲死，乃血入肺也。用蘇方木二兩，搗細，桃仁二，研，防風各一兩，人參五錢，水三碗，煎一碗，徐徐服。（普濟方）○治破傷風，牙關緊閉，身體反張，用蘇方木為極細末，每服三錢，酒調服。（集簡方）○治偏墜疝氣腫痛，用蘇方木二兩，搗細，好酒一壺，煮減小半，頻頻飲。（衛生方）○治金瘡指斷折，及刀斧傷，用蘇方木為極細末，敷之。外用羊絨條包縛完固，數日復舊。

烏桕木，味苦，氣溫，有毒，性沉而降，陽中陰也。入手足陽明經。

（蘇氏曰：烏桕木生南方平澤，今江西、閩、浙甚多。樹高丈許。葉似杏，但微薄而綠色少淡。五月開細花，色黃白，結子如芡實。九月熟，初青後黑。采子蒸煮，取油澆燭，然燈極明。子上皮脂，取油勝于仁也。陳氏曰：葉可煎汁染皂。其木朽老則根下黑爛成臼，故得此名。）

○烏桕木，行水氣積聚，通大小二便之藥也。李氏曰：取根皮，能利水，通腸，功勝大戟，故唐本草主水氣停蓄，氣促喘脹，遍身浮腫，二便不通，諸證勢甚危篤者，以根皮二三片，水二碗，煎半碗，服之，立通二便，水氣行而喘腫自消退矣。倘不因水蓄氣聚，而因脾虛不能制化水源，以致泛濫者，當補脾實土為急。（然必用蒼白朮、茯苓、陳朴、香砂、扁豆、澤瀉之類）此藥不可輕用。如果元氣壯實，亦須暫用一二劑，病已即止。

巴豆，味辛，氣熱，有大毒。味薄氣厚，降也，陽中陰也。入手足陽明經。

（別錄曰：巴豆生巴郡川谷。蘇氏曰：今嘉州、眉州、戎州皆有之。木高一二丈，葉如櫻桃而厚大，初生青色，後漸乾黃。季冬漸凋，仲春即發，仲夏舊葉落盡，新葉復生，即開花成穗，色微黃，五六月結實作房，七八月成熟，漸漸自落。外殼如白荳蔻，一房二瓣，一瓣一子，或三子，子如海松子，子亦有殼。惟戎州出者，殼上有縱紋隱起如線，或一道、二道、三道不等，土人呼為金線巴豆，最為上品。他處亦有。入藥用，去內外殼，取仁，酒煑一次，研膏用。有去殼取肉，生研如膏，以紙包壓去油者，謂之巴豆霜。中其毒者，以冷水、黃連、大豆汁解之。）

○巴豆，推蕩臟府，開通閉塞之藥也。方氏曰：此劑味甚辛辣，氣甚熱烈，性甚剛猛，攻關拔固，功過牽黃，摧滯逐實，力浮硝戟，追逐一切有形留着，久頑不遂之疾，如留飲痰癖，死血敗膿，蠱毒飛尸，鬼疰休息，結痢寒痰哮喘，及

一切生冷魚麵油膩，水果積聚，蟲積，或水腫大腹，寒疝死胎，痞結癥瘕，諸證下咽即行。苟非氣壯力強之人，不可輕用。張氏曰：如不審而妄用，耗却天真，使人津液枯竭，胸熱口燥，留毒不去，其他病轉生，則巴豆之為害，昭昭矣。然而更有未盡者。此藥稟火烈之氣，沾人肌肉，無不灼爛。試以少許，輕擦完好之膚，須臾即發一泡，必至腫爛成瘡。況腸胃柔脆之質，下咽則徐徐而走，且無論下後耗損天真，而府藏被其熏灼，能免無潰爛之患耶？凡一槩湯散丸劑，切勿輕投。即有萬不得已之急證，欲借其辛烈攻衝開通道路之力，必須煮熟，壓令油淨，入藥許即止，不得多用。如前古有云：巴豆煉熟，食之能益血

脉。悅顏色。通神仙。此無根怪談。不可信。從明理之士當自審之。

李瀕湖先生曰。巴豆峻用。則有戡亂劫病之功。微用。亦有撫綏調中之妙。譬之蕭曹絳灌乃勇猛武夫。而用之爲相。亦能輔治太平。王海藏言其可以通腸。可以止瀉。此發千古之祕也。一老婦年六十餘。病溏泄已五年。肉食油物生冷犯之即作痛。服調脾升提止澀諸藥。入腹則泄反甚。延余診之。脉沉而滑。此乃脾胃久傷。冷積凝滯所致。王太僕所謂大寒凝內。久利溏泄。愈而復發。綿歷歲年者。法當以熱下之。則寒去利止。遂用蠟匱巴豆丸藥。五十丸與服。二日大便不通。亦不利。其泄遂愈。自是每用治泄痢積滯諸病。皆不瀉而病瘉者。近百人。妙在配合得宜。藥病相對耳。苟用所不當用。則犯輕用損陰之戒矣。

○集方（昌學切問）治留飲痰癖并一切積滯。用巴豆肉十粒。紙裹打去油。蛤粉一兩。黃藥子炒二兩。共爲細末。水發丸。菉豆大。每用溫湯下五丸。○治（外科全書）腸癰內疽。死血敗膿。脹悶不出者。用巴豆肉三粒（製法如前）穿山甲五錢。燒焦。米糊丸。如菉豆大。每服三五丸。酒下。見下膿血即止。○治（外科精義）癰疽消後。腐肉不落。用巴豆肉。搗膏敷上即落。○治（陳一山奇家抄）一切蠱毒。用巴豆肉半粒。不去油。研爛。用麻油半盞。調服。再隨飲菉豆湯二碗。俟吐瀉數行。蠱即出。旋飲冷菉豆湯止之。

○治（[illegible]隣方）休息結痢。愈而頻發。用巴豆肉五錢（製法如前）研末。用熟豬肝爲丸。如菉豆大。空心白湯下三四五六丸。量人虛實多少爲數。不過三服淨止。○治（張果醫說）寒痰氣喘。用橘皮一大片。裹巴豆肉一粒。線紮緊。火內燒存性。研末。濃薑湯調服。○治（佳香堂醫集）一切生冷魚麵油膩水菓諸物傷脾成積。用巴豆肉十粒（製法如前）紅麴一兩。草菓仁五錢。共爲末。米湯和丸。如黍米大。每早服十丸。白湯下。小兒減半。○治（蓮池大師口傳）蟲積肚脹。好食生米壁土杵炭等物。用巴豆肉十粒（製法如前）三稜。莪朮。檳榔。白朮各五錢。俱炒過。共爲末。砂糖爲丸。如黍米大。每服五丸。白湯吞下。弱者三丸。○治（張文仲）水臌（濟急方）腹大動搖水聲。皮膚黑色。用巴豆肉十粒（製法如前）杏仁二十粒。去皮。紙裹打去油。和勻。紅麴一錢。打稀糊爲丸。如黃豆大。每早空心未食時服一丸。以利爲度。忌鹽味糖味百日。此方并治飛尸鬼疰。中惡心痛腹脹。大小不通。用藥二丸。敲碎。白湯泡化服。當下而愈。量大小老人強弱增減用之。○治（百一方）寒疝。用巴豆肉一分。研細。吳茱萸川練子各一錢。甘草五分。水煎溫和服。○治（海上方）死胎不下。胞在項刺。用巴豆肉半粒（製法如前）研細。滾水調服。○治（海上方）痞結癥瘕。用巴豆肉五粒（製法如前）紅麴三兩。炒。小麥麩皮一兩。炒。俱研爲細末。總和爲丸。如黍米大。每空心服十丸。白湯下。

續集方（危氏得効方）治夏月水瀉不止。用巴豆一粒。針頭燒存性。黃

蠟溶化爲丸。白湯吞下。○治（和劑方）乾霍亂。心腹脹痛。不吐瀉欲死。用巴豆肉一枚。研爛。溫湯調服。得吐利即愈。○治（張氏醫通）小兒痰喘。用巴豆肉一粒。紙包打去油。綿裹塞鼻。男左女右。痰即下。○治（多能方）荷錢癬瘡。用巴豆肉三粒。研爛以生絹包擦。日一二次如神。○治（千金方）急喉痺。用生礬爲末五錢。巴豆肉三粒。同熬焦。去巴豆肉。單用枯礬研細吹入喉中。流出熱涎。喉即寬。○治（千金方）喉痺垂死。止有餘氣者。用巴豆線穿內入喉中。即牽出即甦。○治（普濟方）一切臁瘡癩瘡。用巴豆肉五十粒。麻油煎黑。去豆以油調硫黃輕粉末。頻搽即效。

治中風痰厥。昏迷卒倒。不省人事欲絕者。用巴豆去殼紙包搥油。去豆不用。用紙撚作條。送入鼻內。或拌牙皂末尤良。或用前紙條燒烟。薰入鼻內亦可。

大楓子、味辛甘。氣熱。有毒。

（李氏曰。大楓子。出海南諸番國。按眞臘記云。大楓乃大樹之子。狀如椰子而圓。其中有子數十枚。大如雷丸子。中有仁白色。久則黃而油。不堪入藥。修治。取大楓子油法。用大楓子三斤。去殼。除黃色油透者不用。研極爛。磁器盛之。封口。入滾湯中。文火蒸至一日。色黑如膏。名大楓油。可塗風癩癬瘋瘡疾。）

○大楓子肉。搗膏擦風癩疥癬諸瘡之藥也。（王長[illegible]）此物質潤性燥。蘄湖方治瘡疥。僅供外塗。能潤皮膚。殺蟲止癢。不堪服食。粗工述肅人語。每治大風癩疾。與苦參同用作丸服。殊不察此性燥熱劣。有損液閉痰之虞。而傷血分。至有風癩未愈。而先失明者。用之外塗。其功不可沒也。

○集方。（嚴氏家抄共三則）治疥癩瘙癢有蟲。用大楓子去殼取肉四十枚。搗膏。大黃炒、蛇床子炒、樟腦、硫黃各五錢。共研極細末。和

入大楓子肉內。水銀五錢。研入。以不見星點爲度。如乾燥再加入豬油數錢。共研爲丸。先用熱湯洗淨瘡。後用此藥搽之。○（同前）治大風瘡裂。用大楓子燒存性。和麻油輕粉研勻敷之。此方亦治楊梅惡瘡。○（同前）治風刺鼻赤。用大楓子肉十箇。木鼈子肉五箇。輕粉、硫黃各一錢五分。共爲末。夜夜唾調塗之。

梓，味苦，氣寒，無毒。（葉主治同）

（蘇氏曰：按埤雅云，梓爲百木長，故呼梓爲木王。蓋木莫良于梓，故書以梓材名篇，禮以梓人名匠，朝廷以梓宮名棺也。李氏曰：梓有三種，當用朴素不腐者。今處處皆有之。宮寺人家園亭亦多植之。木似桐而葉小，花紫。雖有三種之分，實非一類也。木理白者爲梓，赤者爲楸。梓之美文者爲椅，楸之小者爲榎。）

○梓白皮，去熱毒，殺三蟲之藥也。大氏方治小兒一切瘡疥瘙癢，取此煎湯洗之。瀕湖方治溫熱時氣，頭痛壯熱，取此煮湯飲之。又別錄方搗梓樹葉，和豬食中，飼養肥大三倍，且無瘟死之虞。

楸，味苦，氣寒，無毒。（葉主治同）

（李氏曰：楸葉大而早落，故謂之楸。榎葉小而早秀，故謂之榎。唐時立秋日，京師人取楸葉剪花戴之，取秋意也。又曰：楸有行列，莖幹直聳可愛，至秋垂條如線。其木濕時脆，燥則堅，宜作棋盤，即梓之赤者也。）

○楸白皮，殺諸蟲，解諸毒，瘡瘍之藥也。陳氏方煎膏塗敷一切惡毒諸瘡，及癰腫疽瘻，痂癢痔瘡，能除膿血，生肌肉。

（李氏曰：楸乃外科要藥，而時人少知。按古醫葛常之云：有人患發背，潰壞腸胃可窺，百方不瘥。一醫用太醫朱升將楸樹葉數斗，熬膏敷其外，內以雲母膏作小丸服盡四兩，不累日而愈也。東晉范氏方亦稱楸葉治瘡腫，有拔毒排膿，止漏生肌之力。）

○集方：治一切毒腫，不問硬軟，取楸葉十重，敷腫上，用舊帛裹之，日三易。冬月取乾葉，鹽水浸軟貼之，或取根皮搗爛敷之，皆效。○治瘰癧瘻瘡，秋分前後摘楸葉十五斤，以水一石，淨釜中煎取三斗，又換鍋煎取七八升，換鍋煎取二升，乃納不津器中，用時塗瘡上，以軟帛裹之。日一拭，更上新藥，不過五六上，已破者即便生肌，未破者即內消。瘥。○治（聖惠方）灸瘡不瘥，癢痛不止，用楸葉頭及根皮爲末敷之。○治小兒禿瘡，用楸葉搗汁塗之。

青桐，味甘，微苦，氣寒，無毒。（葉主治同）

（李氏曰：桐有青、白二種，與罌子桐、梧桐各別。罌子桐能作油，有毒。青桐、白桐同一種，無毒。梧桐子可作果食，亦無毒。三桐各自一種，實非同類。又一說云：白桐即泡桐也。葉大徑尺，最易生長，皮色粗白，其木輕虛，不生蟲，可作器物、屋柱。二月開花，如牽牛花而白色，結實如巨棗，長寸餘，殼內有子，輕虛如榆莢、葵實之狀，老則殼裂，隨風飄揚。青桐即梧桐之無實者。又按陳翥桐譜，分別白桐、岡桐甚明。白花桐文理粗而體性慢，喜生朝陽之地，因子而出者，一年可起三二尺，由根而出者，可四五尺。其葉圓大而尖長，有角，光滑而毳。先花後葉，花白色，心微紅，其實大二三寸，內爲兩房，房內有肉，肉上有薄片，即其子也。又紫花桐文理細而體性堅，亦生朝陽之地，不如白桐易長。其葉三角而圓，大如白桐，色青多毛而不光，且硬，微赤。亦先花後葉，花色紫，其實亦如白桐而微尖，狀如訶子，房中肉黃色。二桐皮色皆一，但花葉小異，體性堅慢不同爾。亦有冬月復花者。○寇氏曰：桐類有數種，農皇經不定指是何桐，是難執用，但數目各有治驗，應病不同爾。）

○青桐木皮，化五痔，淨五淋，療奔豚，散腳氣，殺三蟲之藥也。治此數證，並宜煮汁飲之。（出別錄甄氏肘後三方書中）又醫林正宗云：治癰疽發背，大如盤，腐臭不可近者，用青桐葉，醋浸半日，蒸貼之，退熱出膿，定痛生肉，此極驗秘方也。究其青桐之性，清虛芳潔，散濁澄清，故淋痔奔豚腳氣癰蟲之疾，咸得奏其用焉。

梧桐，味苦，氣溫，無毒。

（李氏曰：梧桐處處有之。樹似桐而皮青不皺，其木無節，直生，理細而性緊。葉似桐而稍小，光滑有尖。四月開細黃小花，如棗花，枝頭出絲，綴結莢，長二三寸，五片合成，老則裂開如箕，謂之橐鄂。其子綴于橐鄂上，多者五六，少則二三，形如胡椒，其皮皺。又爾雅翼云：梧桐多陰，青皮白骨，似青桐而多子，其木易生，號春生葉，早秋即凋。古稱鳳凰非梧桐不棲，莊子亦食其實。詩云：梧桐生矣，于彼朝陽。又齊民要術云：梧桐生山石間，作爲樂器，更鳴響也。）

○梧桐子、搗汁、拔去白髮根、塗之。必生黑者。又煎湯泊口。治小兒口瘡。（李瀕湖方）

○梧桐葉、晒乾為末。蜜調敷發背諸毒、能煞其勢。（肘後方）

○梧桐木青皮、浸水梳婦人髮、髮黑潤不燥不蓬而光。（蘇氏方）

罌子桐、味甘。微辛。有毒。（即油桐也。因其實狀如罌、故名。）

（陳氏曰、罌子桐生江南北大山中、兩浙尤多。樹如梧桐、早春開淡紅色花、狀如鼓子花、成筒、子打造油、即桐油也。李氏曰、罌桐即白桐之紫花者。油桐枝幹花葉酷類桐。而樹長稍小、但其實大而圓、每一實中有二子或四子、如大風子、其肉白色、味甘、食之能發吐、吐不止、飲熱酒即解也。人多種蒔、收子打油、及造船諸器皿中刷、為時所須、人多僞之、試以竹篾作圈、蘸起如鼓面者爲真。）

○桐子油、吐風痰、解喉痺。去蟲瘡、摩（陳藏）疥癬。之藥也。（周本上）大氏方

○治風痰壅塞、喉脹不通、以油半和水、用鵝羽蘸掃喉中、探吐、或以水研末。吹入喉中、取吐亦可。但中病即止。不可多用、頻用、如多用、損耗中氣。痰涎轉多。為病變重者有之。

○集方、（集簡方）治腿足風瘡如癩、有蟲者。用桐子油、和人乳各等分、掃數次、即愈。○（摘玄方）治酒皶赤鼻。用桐子油、調黃丹、雄黃末敷之。○（楊氏方）治女人血風臁瘡。潰爛如掌大、用桐子油調真鉛粉、作隔紙膏貼之。○（華佗方）治悞食砒石。即刻用桐油半升灌之、得吐毒即解。

本草彙言卷之十

錢塘　倪朱謨純宇甫選集　男倪洙龍沖之氏藏稿
沈公岐則施甫校正

木部（灌木類）

桑根白皮、味甘。氣寒。無毒。升少降多。陽中陰也。入手太陰。

（王氏曰、桑類繁多。不可枚舉。所在南北皆有。花椹枝皮、功無差等。葉頻摘頻發、枝頻剪頻生。雖去枝純幹、餘尤生枝葉。充蠶食、材多適用、全體亦精、灌木易生之上品也。蘇氏曰、方書備桑之功用最神。爾雅云、又有梔桑、女桑、桋桑、檿桑、山桑。郭璞云、半有椹半無椹曰梔。幹小條長曰女。葉細而鋭、皮理粗厚曰檿桑。絲中琴瑟。山桑材中弓弩。皆材之美者也。他木鮮及之矣。李氏曰、桑有數種、壓條而分者椹少、葉終白、桑葉大而厚、山桑葉尖而長、雞桑葉花而薄、子桑先椹後葉、外有望海桑高數丈、葉蕃茂盛、亭亭如車蓋。桑生黃衣、其本必將枯死。種樹書云、桑樹以接則本大葉厚、桑根下埋龜甲則易茂盛而不蛀。典術曰、箕星之精、散而為桑。洪氏曰、箕水豹也。龍神在坎、故桑以蠶為食焉。東坡曰、琴絃舊而聲闇、桑葉揩之、發聲如新。本草云、桑根見地上者曰馬額、有毒、能殺人。旁行出土者曰伏蛇、亦有毒、但反能治心痛。修治、采嫩根、刮去青黃薄皮、只取裏白皮、切、焙。皮中有涎、勿去之。○桑上寄生、形狀見寓木類。）

○桑根白皮、平肺氣、消痰嗽之藥也。（氏少山稿）甄氏方、主泄肺氣、下喘逆。或肺火燔灼。痰嗽有紅。或肺傷風熱。暴嗽聲啞。或水飲停肺、脹滿氣急。是皆肺氣不清。為痰、為火、為停水之證。惟桑根白皮、可以治之。又錢氏瀉白散。與甘草、地骨皮、同用。能瀉肺火從小便中出。此瀉肺諸方之準繩也。如前古有云。治崩中絕脈者何也。緣桑之苗、葉、枝、幹、皮、根、紋理一縷、如人身之經脈聯絡。分析有條。若營血紋絡于心。故崩中絕脈、營血妄行之證。用桑根白皮可

以上之也。蓋桑之一物，如盡其材而論之，應用凡有八焉。桑蟲（味甘）攻痘毒甚效。（以酒漿調服之）桑葉（味甘微苦）明目疾尤奇。（煎湯早晚洗目）桑耳（味苦）破癥堅結聚。（爲末酒調服一錢）桑椹（味甘）染鬚髮轉黑。（曬乾浸酒飲之）桑枝（味苦辛）去風氣攣痛。（切細浸酒飲之）桑汁（味苦）治哦口舌瘡。（以鵝翎蘸塗口內）桑爲流通氣血之藥，所以桑上寄生（味苦）又能利筋脉，調血氣，治風寒濕痺（浸酒飲之）之聖劑也。再按桑根白皮，瀉肺降氣，清火下痰，是其專職。如肺虛無火，因風寒襲之而發咳嗽者，勿服。

○集方（宋瑞方二則）治肺氣盛滿，喘脹咳嗽，痰中有紅。用桑根白皮二錢，天麥二冬、款冬花、百部、沙參、川貝母各一錢五分，甘草七分，枇杷葉五片（刷去毛淨），水煎服。○治肺熱傷風

暴嗽聲啞。用桑根白皮二錢，前胡、防風、薄荷、葛根各一錢五分，桔梗一錢，甘草七分，水煎服。○（馬氏方二則）治水飲停肺，脹滿喘急。用桑根白皮二錢，麻黃、桂枝各一錢五分，杏仁十四粒（去皮），細辛、乾薑各一錢五分，水煎服。○治水腫。用桑根白皮、白芍藥、薏苡仁、木瓜、茯苓各一錢，陳皮一錢，赤小豆三錢，水煎服。○（肘後方）治產後下血不止，如非關產後，凡屬血露不淨，俱可服。用桑根白皮四兩，蜜水炒，每日用一兩，水煎飲之。○（廣利方）治金刃傷瘡。用桑根白皮，日用一兩，水煎服。外用馬糞和桑白皮各等分，燒灰敷瘡上，日一易。○（經驗方）治墜馬拘損筋骨。用桑根白皮五觔，爲末，煎膏敷之，日一換，藥完即愈，亦無宿血。○（蘇氏方）治刀刃傷腹腸出。用桑根白皮作線，縫腹皮，更以熱雞血塗之。○（聖惠方）治小兒口流涎不止，此係胸膈有熱痰故也。用新鮮桑根白皮，搗自然汁，日逐飲之。（朱氏方）并塗兩口角，甚效。（[illegible]）

○桑葉去風濕，利水氣，和血脉之藥也。蘇氏方煎汁服，能除脚氣，散水腫，通大小腸之逆氣。大氏方治一切風濕頑麻自汗，并撲損瘀血作痛，又宜浸酒飲之。普濟方治老幼久患眼目昏澁不明，以桑葉經霜者，煎湯早晚洗目，并治暴赤風眼，赤澁多淚，如一切目疾，惟久洗愈妙。通玄方治穿掌癰毒，以新鮮桑葉搗爛，罨敷即愈。又孟氏方取乾桑葉，水洗淨，曬乾，搓碎，微炒，泡湯作茶飲，止煩渴，通暢一身逆氣。蓋至賤之物，而應病甚奇，故併錄

○桑柴灰（味辛，小毒）消行水止血之藥也。

○集方（梅師方）治身面水腫，坐卧不得。取桑柴燒灰，淋汁，煮赤小豆，每饑時即食一二合，食時不得飲湯水。○（蘇氏方）治金瘡出血不止，以桑柴灰篩細敷之，止血生肌。○（聖惠方）治破傷風腫入腹即殺人，以桑柴灰淋汁，頓熱浸之，冷再易。

柘根白皮（味甘，氣溫，無毒）。

李氏曰：柘木處處山中有之，喜叢生，幹疎而直，葉厚圓而有尖，亦可飼蠶，取絲作琴瑟，清響勝常。爾雅所謂棘繭，即此蠶也。又弓人取材，以柘爲上。其實狀如桑子而稍圓，粒如椒。其木煎汁染黃，謂之柘黃，天子所服。一說柘木以米醋調礦灰塗之，一宿，即作間道花鳥文，物性相伏如此。

○柘根白皮，養胃固精，止血結崩中，去鬼交精泄之藥也。（陳藏器）

楮實味甘，氣寒，無毒。氣薄味厚，陰也，降也。入足太陰經。（別錄曰：楮生少室山中。湖廣衆陽獨多。今南北亦有。詩云：爰有樹檀，其下維穀，是陶陸氏曰：皮葉用之進博醫方，但貴楮實，餘亦稀用。李氏曰：楮與穀乃一種也，有雌雄之分。雄者皮有斑文，葉無叉椏，三月開花成穗，若柳絮狀，遂謝而不結實。雌者皮無斑文，葉有叉椏，四月開花成穗，若楊梅狀，五月色青綠，六七月漸深紅乃熟也。水撈去子，蜜煎充果食。其嫩葉莖花熟並堪作茹。皮膜爲冠，造紙練布，燃鹽成有用也。修治：水浸三日，旋攪旋投水，浮者即揀去之，沉出曬乾，焙燥用。）

〇楮實健脾養腎，補虛勞，明目疾之藥也。（別錄）陳氏本草主陽亢陰痿，水涸目矇，及脾濕水腫，腰膝痿弱，筋骨之力。諸證按古方，入滋陰藥中，用之甚廣。但性雖不補而氣稍清寒。如脾胃虛冷者，宜少用之。

陳廷采先生曰：按楮又名穀，桑荊楊交廣，咸謂之構。一說葉有瓣曰楮，葉無瓣曰構。又一說皮斑曰楮，皮白曰構。名雖有二，取用則同也。又相感志云：木中白汁如乳，名楮漿，可以丸丹砂。又楮膠可作金石之漆。又秋月剝取其皮，可織爲布，可搗爲紙，則楮之專精在皮與漿矣。所入醫方，惟用其實，赤者頻服，不老不饑，行同奔馬，載在本草，確有功效。奈時人于滋補藥中用之稀鮮，惜哉。

〇集方（武叅山方）治脾腎肝三臟陰虛，吐血欬血，骨蒸夜汗，口苦煩渴，夢中遺精，或大便虛燥，小便淋澀，或眼目昏花，風淚不止等證，不拘老幼，咸宜服之。用楮實赤者一斗，取黑豆一斗，煮汁，去豆，取汁浸楮實子一日，曬乾，再浸再曬，以豆汁滲盡爲度，再曬燥，配枸杞子三升，俱炒微焦，研

爲細末，每早用白湯調服五錢，功効不可盡述。〇治水氣蠱脹（潔法機要），用楮實子五升，水一斗，熬成膏，用茯苓三兩，白丁香一兩五錢，俱微炒，研爲細末，楮膏和丸梧子大，每空心用三錢，晚用二錢，俱白湯吞下。

〇楮葉（味甘，氣涼，無毒）涼血，祛風，利水之藥也。（李時珍）

〇集方（蘇氏方）治鼻衄暴流，數升不止。用楮葉搗汁二升，徐徐飲之。〇治虛肥水腫，氣上促者（外臺秘要），用楮葉煮白米粥食，勿絕白食，忌鹽味百日。〇治蝮蛇螫傷（千金方），用楮葉搗取汁漬之。〇治老幼瘡痢（楊氏方），日夜白餘度，用乾楮葉三兩，微炒，研爲細末，每服二錢，白湯調下。〇治一切眼翳（聖惠方），三月收嫩楮葉曬乾，爲細末，每以黍米大注眥內，其翳自落。

〇楮樹白皮（味甘，氣平，無毒）順氣利水，涼血止血之藥也。（李時珍）甄氏方治水腫氣滿，小水不通，因甘平能利水道也。李氏方治下血血崩，因甘濇能斂氣以和營也。但性多燥而少潤，如內熱血燥之證，宜少與之。

〇楮樹皮中白汁（味甘，氣平，無毒）利水消腫之藥也。外臺秘要治天行時疫病後脹滿，兩脇刺脹，臍下如水腫，以楮樹汁隨取隨意服之，水便清利，腫即消矣。其性最粘，古人用楮法帖經書扇譜，以此汁和飛麪白湯調作糊，裱褙永不脫解，過于膠漆，又和丹砂塊成團不散，故綱目稱爲五金膠漆。

枳實味苦酸。氣寒。無毒。氣味俱厚。沉也。陰也。入足陽明、太陰經。（別錄曰：枳生河內川谷及洛西江湖州郡。馬氏以商州產者爲佳。寇氏言：舊說橘踰淮而枳，故江北有枳無橘，江南雖有枳，不及江北者氣足力厚也。蘇氏言：樹如橘而大，葉如橙而有刺，春開白花，至夏結果，至秋成實。六七月采者名枳實，小則其性酷而速也；九十月采者名枳殼，大則其性詳而緩也。今醫家以皮厚而緊小者爲枳實，以皮鬆而寬大者爲枳殼。俱一切開，以翻肚如盆口者爲勝。又陳久者愈妙。近道所出一種臭橘，酷似枳，不堪用。修治，用小麥麩拌炒。至麥麩黑色，去麩用。）

○枳實破結實，下食積，消脹滿之藥也（張元素）。繆氏曰（張相如[illegible]）：別錄方主除胸脇痰癖，痞滿，腹胃停水，停食等疾。此疾原由脾胃二經氣滯，不能運化精微所致。此藥雖經成果，瓤核未分，混然結實，性堅而速，其氣味苦泄，有破散衝走之力。

故丹溪氏言有推牆破壁之功。所以仲景下傷寒腹脹實結不通者，有承氣湯；胸中痞痛者，有陷胸湯；潔古療心下痞滿者，有枳朮丸。使壅滯既去，則胃氣自安，而諸證自止矣。如前古謂主大風在皮膚中，如麻豆苦癢。又云益氣輕身，此屬幻語，非世俗時學所知，姑刪之，以俟後賢詳用可也。但性專消導，瀉痰下食，其爲犍悍之物，可知。凡中氣虛弱，勞倦傷脾，發爲痞滿者，脾胃氣虛，不能運化，以致傷食停積者，俱宜補中益氣湯，補其不足，少加枳實十分之一，則痞滿自除，停食自行矣。如傷寒脹滿，非實邪結于中下二焦，手不可按，七八日不更衣者，必不可用。如傷寒挾熱下痢，非燥糞結實者，亦不可用。如元氣壯實，有積滯者，不得已用一二劑，病已即去之。即潔古所製枳朮丸，亦爲脾胃有積滯者設也。積滯去，則脾胃自健，故謂之益脾胃之藥。非消導之外，復有補益之功也。用者當詳審之。

○集方：治食積結脹（劉[illegible]），用枳實、白朮、厚樸各等分，俱用小麥麩炒，川黃連減半，酒炒，共爲細末，紅麯作糊丸，菉豆大，每早晚各服三錢，白湯下。小兒減半。○治胸脇痰癖痞脹（錢氏方），用枳實四兩，南星、海石、白芥子、蘿蔔子、紫蘇子、白朮、茯苓各一兩，俱微炒，共爲末，紅麯作糊丸，菉豆大，每早晚各服三錢，白湯下。○治腹胃停水（[illegible]氏），用枳實、蒼朮、厚樸各一兩，豬苓、澤瀉、茯苓各五錢，肉桂、木香各三錢，共爲

末，每早晚各服三錢，白湯調服。○治腹胃停食不消（王氏手集），用枳實三兩，白朮二兩，俱用小麥麩炒，厚樸、白蒺藜各一兩，川黃連、紅麯炒，各三錢，共爲末，水發爲丸，如菉豆大，每早晚各服三錢，白湯下。○治堅積（痰飲血食）不消，用枳實、三稜、蓬朮、青皮、檳榔、白朮各一兩，俱酒洗微炒，研爲末，每晚食後服三錢，酒送下。然須能食，脾胃健者宜之。○治傷寒熱邪傳裏（仲景方），發熱汗出，不惡寒，腹滿而喘，大便不通，宜大小承氣湯。大承氣用枳實一兩，厚樸五錢，大黃、芒硝各八錢，水四大碗，煎一碗半服。小承氣用枳實八錢，厚樸四錢，大黃五錢，水三碗，煎一碗服。病急者用大小承氣，量病緩急臨證當消息用之。

枳殼味苦、酸、氣寒、無毒。氣厚味薄、沉也、陰也。入手太陰、足陽明、手陽明經。

（繆氏曰。氣味主治與枳實大略相同。但枳實形小。其氣全。其性烈。故善下達。如少年猛悍之將。勇往直前。而一無回顧者也。枳殼形大。其氣散。其性緩。故其行稍遲。是以能入胸膈肺胃之分。及入大腸也。）

○枳殼行滯氣、開胸結之藥也。凡病中膈不清。遂道痞塞。痰涎壅盛。氣食留中。至若癥瘕有形之物。痰飲有形之氣。用二陳以清之可也。然無枳殼。則不獲效。六鬱（氣血飲食痰濕）結而不散。五氣（風寒暑濕燥）脹而不行。用二陳以理之可也。然無枳殼。則不能通。大抵枳殼之性。專于平氣。氣平則痰喘止。氣平則痞脹消。氣平則刺痛安。氣平則後重除。所以戴氏方謂枳殼能定痰喘。消脹滿。止脇肋刺痛。除下痢後重急迫。正此意也。以上諸證。凡屬形盛有餘。氣火、風痰、食飲為病者宜之。如屬脾胃氣虛。中氣不運。而為痰為喘。為痞脹者。勿用也。如肝腎陰虧。血損營虛。脇肋隱痛者。勿用也。下痢日久。中氣虛陷。愈下愈墜。愈後重急迫者。勿用也。故前人有言。多服枳殼。有損胸中清純之氣。可不慎歟。

繆仲淳先生曰。一槩胎前產後。枳殼咸不宜服。今世多用以治婦人胎氣不安。或至八九月為易產之劑。動輒貪用。殊不知婦人懷孕。全賴氣血以養胎。氣血充足。則胎自易產。且妊婦至八九月。精神困倦。四肢軟弱。飲食減少。動息喘促。何莫非虛弱之證。而更用此耗散之藥耶。內經所謂損不足而虛其虛。豈不大謬哉。古方有瘦胎飲者。為湖陽公主而設。以彼奉養太過。其氣必實。故用此以耗其有餘之氣。使胎易產。今人不知古人立方之意。一槩濫施。誤甚誤甚。

○集方（王氏濟川）治氣滯食飲。痰火停結。用枳殼一兩。厚樸八錢。俱用小麥麩皮拌炒。去麩。每用枳殼二錢。厚樸一錢六分。水煎服。○治（龐元讓方共四則）痰喘氣火上逆不降者。用枳殼、蘇子、桔梗、杏仁、各一錢五分。茯苓一錢。木香五分。水煎服。○治中膈痞脹不寬。用枳殼、厚樸、白朮、各一兩。俱用小麥麩皮拌炒。砂仁、木香、白豆仁、茯苓、各五錢。共為末。水發丸如菉豆大。每早服三錢。白湯下。○治胸脇刺痛。用枳殼一兩。小麥麩皮拌炒。肉桂七錢。真蘆薈三錢。俱研極細末。水發丸菉豆大。每早服三錢。晚服二錢。淡鹽湯下。○治下痢後重迫急。用枳殼九錢。白芍藥六錢。川黃連三錢。乾葛、滑石、檳榔、各四錢。升麻、甘草、各一錢五分。分作四劑。水煎服。○治（王氏簡易方）老幼腹脹。氣血凝滯。以此寬腸順氣。用商州枳殼、去穰四兩。分作四分。一分用蘿蔔子一兩同炒。一分用乾漆一兩同炒。一分用蒼朮一兩同炒。一分用大茴香一兩同炒。仍去四味。只取枳殼為末。再以四味煎汁。打紅麴糊為丸。如梧桐子大。每食後服百餘丸。白湯下。○治（直指方）腳氣腫脹。用枳殼三錢。木瓜、牛膝、各二錢。水煎食前服。○治（繆氏方）氣虛人。大便解時不快。用枳殼二錢

人參、麥門冬、各一錢。水煎服。○治小兒軟癤，（[illegible]氏[illegible]方）用大枳殼一箇，去穰，磨口平，以麵糊抹邊，合癤上，膿血自出盡，更無痕也。

續補集方：（人參敗毒散加減方）治傷寒頭痛，壯熱惡風，及風痰咳嗽，鼻塞聲重，并四時瘟疫，熱毒頭面腫痛，痢疾發熱，諸般瘡毒。用枳殼、桔梗、羌活、川芎、前胡、柴胡、荊芥、薄荷各二錢，甘草八分，生薑三片，煎服。虛者可加人參一錢。○治痢疾（此病固）不（春）問赤白，肚痛裏急後重，渾身發熱，口乾發渴，用此通利即止。（兼治傷寒傳裏，大便結實，口燥咽乾，潮熱自汗，怕熱揭衣，譫語陽厥等證。用枳殼、柴胡、黃芩、大黃、白）芍、芒硝各一錢二分，甘草八分，水煎服。

黃楊木　味苦，氣平，無毒。

（李氏曰：黃楊木生諸山野中，人家多栽種之。枝葉攢簇上聳，葉似初生槐芽，綠而厚，不花不實，四時不凋。其性難長，俗說歲長一寸。其木堅膩，作梳剜印最佳。按酉陽雜俎云：世重黃楊，以其無火也。用水試之，沉則無火。凡取此木，必以陰晦夜無一星者，伐之作器皿，則不裂。）

○黃楊木葉，主難產，善催（[illegible]）生之藥也。（[illegible]）入達生散中屢效。又治暑月癤毒，搗末，水調敷之即消。

卮子　味苦，氣寒，無毒。氣薄味厚，輕浮上行，氣浮而味降，陽中陰也。入手太陰、手少陰、足陽明經。

（別錄曰：卮子生南陽川谷。蘇氏曰：今南方西蜀州郡皆有。木高七八尺，葉似李而厚硬，又如兔耳，色深綠。四五月開花，花黃白，芬香，六出。夏秋結實，如訶子，生青熟黃，中仁色紅。霜後采取入藥，以山谷產者，又以七稜至九稜圓小皮薄者爲上。如家園栽者，形大皮厚而長，雷氏稱爲伏卮子，只堪染家，入藥無力。治上焦中焦火病，連殼用；治下焦火病，去殼用。王氏曰：去肌表中熱用皮，去心胸中熱用仁，治血病連皮炒黑，搗碎用。蜀中有一種卮子，其花紅色，其實染物則赭紅色。）

○卮子，清氣涼血，散三焦（朱丹溪）火鬱之藥也。方（林谷山房）氏曰：蓋梔之爲性，可升可降，氣味雖居苦寒，而氣本輕清，故前古主五內邪氣，胃中熱氣，酒風面赤，鼻皶等證，專取此清空寒化之物，能解心肺之伏火，轉炎歊爲清肅者也。所以三

焦浮游之火，六鬱氣結之火，皆可清也。若頭皮疼而眉骨痛，白珠赤而頤頰腫，或喉閉牙疼，口舌腫爛，或熱極妄行，暴吐衄血，或頭肉耳筋跳扯不時，或心煩鬱悶，欲吐不吐，或濕熱蘊蓄，五疸發黃，或氣鬱火鬱，噯噦酸苦，或癃閉脹滿，小腹急疾，以上諸證，總屬氣火濕熱四端壅閉不通之所致，病惟山卮均可治之。又楊氏簡易方云：山卮瀉三焦之火，最清胃脘之血，其性屈曲下行，降火從小便中出。凡心胃痛，遇服熱耗之劑，愈痛不止，用卮子以清氣導熱，則痛自安。據此一論，則知山卮輕空寒化，發越鬱遏不升不降之氣明矣。但苦寒沉降，解五內一切邪熱，清有餘之火，如過服，不免有損胃伐陽之

弊。凡脾胃虛弱者忌之。血虛發熱者忌之。心肺虛而無邪熱者忌之。吐血。衄血。非陽火暴發者忌之。小便不通由于膀胱虛而無氣以化。而非熱結小腸者忌之。

皇甫雲州先生曰。凡氣鬱動火。火鬱動氣。濕鬱生熱。痰鬱生喘。熱鬱作煩。血鬱作疼。舍山巵之輕揚六出。宛勝六之飛舞。孰能治之

盧不遠先生曰、巵子有色。故主色變。凡苦寒之物。能下能堅。惟巵子反使堅結者。解而上出。火空則發之義也故并作湧洩之劑。如五内邪氣。胃中熱氣。結而未實者。易于分解。已成燥堅者。非所宜矣。

沈則施先生曰。仲景治傷寒汗。吐。下後。虛煩不得眠。若劇者。必反覆顛倒。心中懊憹。用巵子豉湯治之。巵子色赤。味苦入心而治煩。香豉色黑。味鹹入腎而治躁。益汗吐下後。胃中亡津液。藏府無潤養。内生虛熱。故不眠而甚至顛倒懊憹。非此不可止也。本草不言巵子能吐。仲景用為吐藥。巵子本非吐藥。為邪氣在上。拒而不納水穀。令其上吐。則邪因以出。所謂高者因而越之也。又用為利小便。實非利小便。乃清肺也。肺清則氣化行。而膀胱津液之府。得此氣化而出也。又治心經留熱。小便赤澁。用去皮巵子。酒炒黃連。連翹。炙甘草。等分。末之。水煎三錢服。無不利也。又古今名醫錄。治發黃。皆用巵子。茵陳。甘草。香豉。四味作湯飲之。觀此諸論。則巵子之清氣凉血。散三焦火鬱之說。確然矣。

○集方（以下四方出方龍潭家秘）治酒風面赤鼻皶。用山巵子炒黑三錢。桑白皮。枯梗。西河柳。麻黃。石膏各二錢。水煎。臨睡時服。○治頭皮疼。用山巵子。炒黑五錢。荊芥。薄荷。石膏各二錢。甘草。八分。水煎。食後服。○治眉骨痛。用山巵子。炒黑。川羌活各二錢。水煎服。○治時眼白珠暴赤。用山巵子。炒黑。二錢。桑白皮。薄荷葉各一錢五分。桔梗。連翹各八分。水煎服○治顋頰腫痛。用山巵子。炒黑。二錢。柴胡。半夏各二錢黃芩。防風。羌活。白芷各一錢。水煎服。○治火鬱喉閉不通。用山巵子。生研。五錢。荊芥穗二兩。水煎。徐徐服。先用米醋半盞。以鵝羽攪吐痰出。後服此藥立效。○治牙疼不止。用山巵子炒黑三錢。北細辛五分。石菖蒲。桂枝各一錢。水煎。頻漱。牙間緩緩嚥下。○治口舌腫爛。用山巵子。炒黑。五錢。川黃連。黃柏各二錢。枯礬六分。甘草。三錢共為末。時時摻入口内。或加冰片一分。○治暴吐衄血因熱極妄行者。用山巵子。炒黑。二兩。懷生地二兩。炮薑灰五錢。水三碗。煎一碗。徐徐服。○治頭肉耳筋不時跳扯。用山巵子。炒黑。三錢。天花粉。半夏。白芥子。玉竹各二錢。川芎。甘草各一錢。水煎。食後服。（一方加石膏三錢。如胃虛寒者不必。）○治心煩鬱悶。欲吐不吐。用山巵子。炒黑。半夏。薑製各二錢。陳皮。白茯苓各一錢五分。甘草七分。厚樸。薑水炒。一錢。水煎服。○治濕熱蘊蓄。五疸黃諮。用山巵子。炒黑。四

錢、茵陳、五錢、白茯苓、二錢。生薑皮、三錢。水煎服。○治氣鬱火鬱、嘔噦酸苦。用山梔子、炒黑、一錢五分。川黃連、薑水炒、一錢。黃芩、天花粉、薄荷葉、各二錢。紫蘇葉、八分。廣陳皮、廣木香、半夏、薑製、厚樸、薑水炒。木通、各一錢二分。水煎服。○治小便癃閉、脹滿不通、小腹急疾。用山梔子、微炒、五錢。車前、牛膝、木通、白茯苓、各一錢五分。甘草、一錢。水二碗、煎半碗、臨服時用生韭子、三錢、研、水半盞、白棗肉、三十箇、研汁半盞、沖入藥內、食前服。○治傷寒汗（以五方）吐下後虛煩不得眠、及心中懊憹者。（出仲景書）用山梔子、十四枚、香豉、二合。水煎服。○治傷寒濕熱發黃、腹脹。用山梔子、十四枚、茵陳、二兩、大黃、一兩。水三升、煎一升、徐徐服。服後小便當利、尿如皂角汁狀、正赤者。一宿腹減、黃從小便出也。○治發黃身熱。用山梔子、十四枚、黃柏、二錢、炙甘草、一錢。水煎服。○治傷寒下後、心煩腹滿、起臥不安者。用山梔子、十四箇、厚樸、枳實、各二錢。水煎服。得吐即愈。○治大病後勞復、小便不利者。用山梔子、十四枚、配鼠矢、五錢。作湯飲。得小便利即愈。

○續補雜方治胃脘火痛（丹溪方）。用山梔子、七枚、炒黑、水二盞、煎七分、入生薑汁、三四匙、飲之立止。○治鼻中衄血（黎居士方）。用山梔子、燒灰、作細末、吹之立效。○治小便不通（普濟方）。用山梔仁、十四枚、食鹽少許、韭菜、十莖、搗爛、貼臍及毛際。良久即通。○治小便淋血澀痛（經驗良方）。用山梔子、滑石、等分。研細末、葱

湯下。○治酒毒下血（聖惠方）。用山梔仁、焙、研爲細末、白湯調服二錢。○治熱毒血痢（肘後方）。用山梔仁、十四枚、搗細、加白蜜五匙、水煎服、立效。○治臨產下痢（勝金方）。用山梔子、炒黑、研細、空心白湯調服、三匙。甚者不過五服。○治小兒盤腸釣氣（普濟方）。用山梔子、五錢、草烏、五分、切片、同炒黑、揀去草烏、每服五分、茴香葱頭湯下。○治閃肭折傷腫痛。用山梔子仁、生研末、和小麥麪、水調塗之、甚效。

酸棗仁　味甘苦酸，氣平，無毒。陽中陰也。入足少陽厥陰，手少陰太陰四經。

蘇氏曰：酸棗出沭微及西北州郡，今天下南北東西處處皆有，但分土產厚與薄耳。多野生坡坂間及城壘之處。其木似棗而皮細，中心赤色，莖葉俱青。夏秋開花似棗。八月結實，紅紫色，似棗而圓小，味極酸。當月采實取核中仁。孟子曰：養其樲棘，是也。又嵩陽子言：酸棗縣所出為真，今之貨者皆是棘實，用者尤宜詳辨。此說未盡確然。蓋不知小則為棘，大則為酸棗。平地則易長，崖塹則雖大，故棘多生崖塹上，經久不樵，則成幹，人亦呼為酸棗，更不言棘，實一本也。此物纔及三尺，便開花結子，但科小者氣味俱薄，科大者氣味俱厚。今陝西臨潼山野間所出更佳，此亦土地所宜也。又據嵩陽子云：余家于滑臺，今酸棗縣即滑之屬邑也。其樹高數丈，徑圍二三尺，木理極細，堅而且重，可為車軸及象棋、商陸、匙箸等。其木皮亦細而硬，文似蛇鱗。其棗圓小而味酸，其核微圓而仁稍扁，色赤如丹。此為醫藥所重，上人亦不易得。今市貨者皆棘子也。兩說俱存之，以俟博學君子。○李氏又一說云：獨生而高者為棗，列生而低者為棘。故重束為棗，平束為棘。二物觀名，即可見矣。

○酸棗仁，斂氣安神，榮筋養髓，和胃運脾之藥也。（孫思邈）按爾雅（郭璞註）云：大者謂之樲，小者謂之棘，其仁均補五藏。如心氣不足，驚悸怔忡，神明失守，或腠理不密，自汗盜汗；肺氣不足，氣短神怯，乾咳無痰；肝氣不足，筋骨拳攣，爪甲枯折；腎氣不足，遺精夢泄，小便淋瀝；脾氣不足，寒熱結聚，肌肉羸瘦；膽氣不足，振悸恐畏，虛煩不眠等證。是皆五藏偏失之病，得酸棗仁之酸甘而溫，安平血氣，斂而能運者也。如前古所云主心腹寒熱，邪結氣聚，四肢濕痺，痠痛，久服安五藏，輕身延年。別錄之治久泄，虛汗，心煩，骨痺。此大哉至聖之言也。

方龍潭先生曰：酸棗性雖收斂，而氣味平淡，當佐以他藥，方見其功。如佐歸、參，可以斂心；佐歸、芍，可以斂肝；佐歸、朮，可以斂脾；佐歸、麥，可以斂肺；佐歸、柏，可以斂腎；佐歸、苓，可以斂腸胃、膀胱；佐歸、耆，可以斂氣而灌溉營衛；佐歸、地，可以斂血而榮養真陰。又古方治膽氣不和，甚佳。如膽氣空虛，心煩而不得眠，炒用可也。凡治肝、膽、心、脾四藏不足之病，不可缺此。

盧不遠先生曰：別錄主煩心不得眠者，心腹邪結氣聚使然耳。服之結散聚消，心定煩息，故得睡眠。又云：未有散邪結氣聚之物，能使衛氣入藏而就安寢者。世人見不得睡眠，便用棗仁，思之真堪絕倒。

○集方（以下七方出方龍潭小集）治心氣不足，驚悸怔忡，神明失守。用酸棗仁二兩，炒，當歸、茯苓、遠志、石菖蒲、麥門冬、柏子仁、人參各一兩，研末，蜜為丸，如梧桐子大，硃砂一兩，水飛過為衣。每服三錢，早晚燈心湯下。○治陽虛腠理不密，自汗盜汗。用酸棗仁一兩，炒，當歸、人參、黃耆、白芍藥、白朮俱酒拌炒，各八錢，乾薑七錢，分作五劑，水煎服。○治肺氣不足，氣短神怯，乾咳無痰。用酸棗仁一兩，炒，當歸、麥門冬、天門冬、百部、人參、茯苓、黃耆、款冬花各八錢，北五味三錢，甘草五錢，分作五劑，水煎服。○治肝氣不足，筋脈拳攣，爪甲枯折。用酸棗仁一兩，炒，當歸、白芍藥、葳蕤、麥門冬、枸杞子、川芎、牡丹皮各八錢，半夏、柴胡各五錢，分作五劑，水煎服。○治腎氣不足，遺精滑泄，或小便淋瀝。用酸棗

仁二兩炒。當歸、黃栢、懷生地、山茱萸肉、山藥、地骨皮、枸杞子、各八錢。俱鹽水炒。分作五劑。水煎服。○治脾氣不足、寒熱結聚、肌肉羸瘦、用酸棗仁一兩炒。當歸、白朮、木香、砂仁、茯苓、石斛、白蒺藜、柴胡、廣陳皮各八錢。用細陳壁土三錢拌炒。共爲末、煉蜜丸。每服五錢。空心白湯送下。○治膽氣不足、振悸恐怖、煩心不眠、用酸棗仁一兩炒。當歸、茯苓、半夏、膽星、石斛、柴胡各八錢。分作五劑。水煎服。臨服時、每鍾加眞天竹黃五分、研極細調入服。

○續補雜方、（醫類聚方）治膽風沉睡多眠、用酸棗仁一兩、生研末、蠟茶一兩微炒研末。二味和勻、每服二錢、午後白湯調服。

○（和劑局方）治膽虛不眠、心多煩悸、用酸棗仁一兩炒。人參五錢、辰砂三錢。俱研細末、煉蜜丸梧子大。每服十餘丸、口內噙化下。○（胡洽居士方）治振悸不眠、用酸棗仁二兩炒。茯苓、白朮、人參、甘草各一兩、生薑五十片。分作十劑。水煎服。○（深師方）治虛煩不眠、用酸棗仁二兩炒。乾薑、半夏、茯苓、川芎各一兩、炙甘草七錢。分作十劑。水煎服。○（太平聖惠方）治骨蒸不眠、心煩熱甚、用酸棗仁二兩炒。熟地黃一兩五錢、鱉甲二兩、湯泡洗再用酒炙研碎。分作十劑。水煎服。○（簡便方）治大人小兒睡中汗出、用酸棗仁炒。人參、茯苓、焙。各等分。大人每服二錢、小兒一錢、臨睡米湯調服。

蕤核、味甘、氣溫、微涼、無毒。氣薄味厚、陽中陰也。入足厥陰經。

（別錄曰、蕤核生函谷川谷及巴西。今彭城亦有。蘇氏曰、今雍州、河東、并州亦有。木高五七尺、莖間有刺、葉細、狹長、似枸杞葉。花白色。子附莖生、紫赤色、大如烏豆、形圓而扁、有文理。五六月熟。采實日乾。修治、去殼取仁、用湯浸、去皮尖、劈作兩片、研爛作膏用。）

○蕤核、去肝經風熱、爲目病專科之藥也。劉禹錫傳信方（甯沉修少）治風熱乘肝、目赤痛腫、或淚出眥爛、或昏澁羞明、或翳障凝結、或努肉攀睛、種種目疾、係于風熱所傷者、咸宜加用。如肝腎兩虛、血虧髓少者、當斟酌用之。前古又主心腹邪熱結氣、痰結痞結諸證。總之、熱則生痰、痰礙中焦、氣爲之痞。此劑甘涼、除熱熱邪去而痰自不生、痰結解而氣自通暢、痞滿亦無復留結矣。涼肝明目、亦推此意云。

○集方、（和劑局方）治肝虛風熱上攻、眼目赤腫癢痛、昏暗不能遠視、隱澁羞明、迎風出淚、時見黑花、用蕤仁去皮、壓去油淨、二兩、冰片一錢、研勻、入淨磁罐收貯、點眼、名春雪膏。○（譚春臺方）治眼病生翳、用蕤仁去油淨五分、青鹽一分、猪胰子五錢、共搗二千下、如泥、磁罐收貯、點之。○又方、用蕤仁一兩去油淨、入白硼砂一錢、麝香一分、搗勻收之、點眼去翳妙不可言。○（經驗良方）治赤爛眼、用蕤仁、杏仁各一兩、去皮、搗去油淨、研勻、入眞鉛粉爲丸麻子大。每用熱湯化、點大小眥上。

山茱萸　味酸澀、微甘、氣溫、性滑、無毒。陽中之陰、降也。入足厥陰、少陰經。

（別錄曰、山茱萸生漢中山谷及瑯琊、冤句。蘇氏曰、今海州、兗州、兩浙、入閩近道亦有之。木高一二丈、葉如榆而有刺。二月開花、白色微紅、似杏花。四月結實、如酸棗、深紅色。五六月采實、日乾、皮甚薄。雷氏曰、外一種所顆子、葉幹花實俱相似、但核有八稜、又名雀兒蘇、氣味功用與山茱萸甚相遠、不堪入藥、宜細辨之。修治以酒潤剝去核用。其核味澀、能耗精氣、不可服食。）

○山茱萸、固精暖腎之藥也。（陳一齋稿）澀滑則氣脫、澀劑所以收之。本草止小便、秘精氣、取其酸澀以收之也。甄氏又主婦人月水不定、老人小水不節、男子陽道不興、婦人陰器不振、能壯精強志、養髓榮筋、故起腰膝、扶疲弱、無稱捷劑。仲景八味丸用之爲君、其作用可知矣。但性味酸歛

而熱、如命門火熾、強陽不痿者、忌之。膀胱熱結、小便不利者、忌之。陰虛血熱、煩熱骨蒸、并暴吐衂血者、忌之。即不得已有當用者、須與知母同劑尤善。

○集方　治小水自遺不禁。（以下六方出方龍潭家秘）用山茱萸肉三兩、炒。益智子一兩、人參、北五味各五錢、牡蠣煅。三錢、懷熟地三兩、酒煮搗膏。丸梧桐子大。每早晚各服三錢、白湯下。如內熱者、本方加川黃柏一兩。○治精滑不固。用山茱萸肉三兩、炒。兔絲子、白朮、白芍藥、牛膝、各二兩。龍骨、牡蠣、俱煅過、各一兩。懷熟地四兩、酒煮搗膏。前藥俱爲細末、拌入熟地膏內、再加金櫻子熬膏、和爲丸梧桐子大。每早晚各服三錢、白湯下。○治婦人月水不依期而來、或參前、或差後。用山茱萸肉、當歸身、各三兩、川芎八錢、白芍藥、懷生地、香附、童便炒。各二兩、黃芩、牡丹皮、各八錢、丹參、川續斷、各二兩五錢、白朮、白薇、各一兩。俱酒炒。共爲末、煉蜜丸。每服三錢、清晨白湯下。○治老人小水不節、或自遺不禁。用山茱萸肉、二兩、益智子、一兩、人參、白朮、各八錢。分作十劑、水煎服。○治男子陽道不興、而不嗣。婦人陰器不振、而不育。用山茱萸肉、巴戟天、鹿茸、牛膝、白膠香、兔絲子、肉蓯蓉、車前子、枸杞子、懷熟地、沙苑蒺藜、各三兩、牛膝、一兩五錢、共爲末、煉蜜丸梧子大。每早服十丸、白湯下。如婦人服此、加香附、醋製益母草、酒浸蒸、各二兩。○治腰膝無力。用山茱萸肉、四兩、牛膝、杜仲、枸杞

子、白朮、半夏麴、當歸、川芎、木瓜、各二兩、真漢防己、三兩、酒浸炒。川黃柏、鹽水炒。蒼朮、米泔浸。各一兩五錢、共爲末、煉蜜丸梧子大。每服三錢、清晨溫酒下。一方加虎骨三兩、火炙酒淬。爲末同用。○治腦骨痛。（繆氏家抄）腦爲髓之海。髓足則腦痛自除。用山茱萸肉、五兩、沙苑蒺藜、熟地黃、各四兩、人參、麥門冬、去心。牛膝、甘菊花、各三兩、熟地黃、麥門冬、以人乳和酒同煮搗爛成膏。餘藥俱用酒拌炒、研爲末、熟地黃、麥門冬膏、和煉蜜爲丸梧桐子大。每早晚各服三錢、白湯下。

金櫻子，味酸濇，氣溫，無毒。氣薄味厚，陰中陽也。入足太陽少陰、手陽明經。

（韓氏曰：金櫻子，在處有之。蘇氏曰：今南中、江浙州郡多有，惟以江西、劍南、嶺外者最勝。叢生郊野，山林尤多。莖葉酷似薔薇而多刺。四五月開花白色，夏秋結實，實亦有刺，形如榧攢，有嘴如石榴，生青熟黃，核似營實子而有白毛。宜州本草誤爲營實，今校之，與營實殊別也。冬月采，日乾用。用水煎汁作膏，其質如蜜，甘酸可口，澁精甚效。又釀酒飲，補腎養髓有功。）

○金櫻子，止脾泄下利，截虛嗽，澁精滑，禁老人睡後遺尿（蜀本草），乃大收斂之藥也（日華子）。十劑云：澁可去脫（王景雲抄）。如脾虛滑泄不禁，非澁劑無以固之。膀胱虛寒則小便不禁，腎與膀胱爲表裏，斂腎氣則精滑止，而小便自遺亦可止。因此藥氣味酸澁，入腎與膀胱、大腸三經，而收斂虛脫之氣，故能主諸病也。但其氣味既酸且澁，如泄瀉由于虛脫者可用，由于火熱暴注，或有積滯者，不可用也。如小便不禁及精氣滑脫，由于陽虛腎冷，命門不足者可用，由于陰虛內熱，邪火妄熾者，不可用也。

盧子由先生曰：經云澁可去脫。開腸洞泄，便溺遺失，精神溢瀉，以及血液妄行，寢汗不禁，皆脫也。倘濇因濇用，亦莫之敢攖。

前賢李氏曰：大經絡隧道，以通利爲和平。昧者取收濇之味以爲養，此自作不善調攝也。若取縱慾而秘精以爲快樂，亦自速其禍也。如果精氣不固而自遺自泄者，服之稍可。

○集方（孫真人方）治精滑尿遺，并久痢不止。霜後用竹夾子摘取金櫻子，不拘多少，入木臼內擣爛，入鍋內水煎減半，濾出清汁，以渣再煎，仍濾出清汁，總和一處，緩火熬如飴糖，入淨磁瓶內。每早服十餘茶匙，白湯調服。又和雞豆粉爲丸，名水陸丹，秘精益元甚妙。

○金櫻花（氣味與子同）（大氏方）研爛，和鐵粉再研勻，拔白髮塗之，即生黑者。亦可染鬚。

○金櫻葉（李氏方）。五月五日同桑葉、苧葉采取，各等分，陰乾研末，敷刀傷，能止血合口，名軍中一捻金。

金櫻子丸，治精濁。（精濁與便濁不同，便濁是便溺渾濁；即白濁也，精濁是精隨溺而出，其精遺滑也。因相火動，心腎內虛，不能固守也。用金櫻子、芡實、粉、蓮花鬚、白茯苓、石蓮肉、熟地黃、枸杞子、當歸身、山查肉各四兩，牡蠣煅、黃栢各二兩，俱用醋拌炒，磨爲末，煉蜜丸梧子大，每早晚各服三錢，食前白湯下。○治人心有所慕而夢與人交而泄精者，謂之夢遺，係君心動而相火隨之也。用金櫻子三錢，生地黃、天門冬、麥門冬、黃栢、知母各二錢，茯神、酸棗仁、遠志、石菖蒲各一錢，甘草五分，燈心一圓，水煎服。○治夢遺日久，氣下陷者，宜升提腎氣以歸原也。用金櫻子、山茱萸、懷熟地、茯苓、石斛、萆薢、芡實、酸棗仁各四兩，黃栢、知母、升麻、藁本、川芎各一兩，鼈板一個，共煎汁熬膏，每早晚服。○治濕熱內虛而遺精者，無所思念而精遺，腰軟膝疼，口中時吐白痰也。用金櫻子八兩，醋拌炒，白朮六兩，蒼朮四兩，苦參二兩，俱用米泔水浸炒，牡蠣三兩，火煅，共爲末，神麴糊爲丸梧桐子大，每早服三錢，白湯下。）

郁李。味甘酸，氣平，無毒。性潤而降，陰也。入足太陰、手陽明、太陽經。

（別錄曰：郁李，即棠棣，生高山川谷及丘陵上。今南北山野處處有之。韓氏曰：樹高六七尺，花粉紅色，葉與枝幹並似李，惟子小若櫻桃，味甘酸而臭香也。郭氏曰：按詩小雅云：棠棣之華，偏其反爾。又棠棣之華，鄂不韡韡。是也。又一種赤郁李，葉如刺榆，其子正赤而小，五月始熟。關西、天水、隴西多有之。蘇氏曰：今汴洛一種枝莖作長條，花極繁密而葉亦多，亦謂之郁李，不堪入藥也。雷氏曰：修治去外殼，用湯泡去皮，取仁陰乾，研如膏，拌去油用。）

○郁李仁，利水消脹（甄權）之藥也。按（[illegible]）前古農皇經，治大腹水腫，面目四肢浮腫，利小便，通水道，緣脾虛而濕熱客之，則小腸不利，水氣泛溢于大腹四肢面目。此藥性專下降，善導大小二腸燥閉，通利周身水氣，小便一利，則水氣

浮腫悉從之而解散矣。如甄氏主腸中結氣，關格不通，大氏之泄五藏中宿積冷膿，膀胱中留垢惡涎，腰膀中瘀穢停水等疾，為脹為滿為疫痛者，咸宜用之，亦推此意而擴充之也。此藥宣行之性甚速，攻走之力獨專，乃治標救急之藥，如元虛津液不足者，慎勿輕用。如不得已必不可去者，宜少與之，見效即止。

○集方，治（楊氏方）大腹腫滿，氣急不得臥，用郁李仁半撮，搗爛，以大麥麪一撮，水和蒸熟，和入郁李仁作餅，吃入口即大便通行，泄水而愈。○治（張三丰方）老人小便不通，用郁李仁二錢，搗爛，放舌上，以白湯一口嚥之，立刻大小俱通。○治（林元仲方）大腸氣結不通，或關格，或腫脹，或有冷膿宿積惡涎停水等疾，用郁李仁三錢，葶藶子一錢，共搗爛為丸，如梧桐子大，每早服八十丸，薑湯下。○治（錢乙直訣）小兒襁褓中大小便不通，并有驚熱痰食結閉，欲得溏動者，用大黄（酒浸炒）、郁李仁（去皮）各一錢，俱研細，滑石（水飛過）二錢，水發為丸，如菉豆大，一歲一丸，白湯化下。

郁李根。（氣味同仁）宣結氣，破積聚，散風蟲牙痛。前古治齒斷腫齲齒堅齒，大氏方，入齒病諸方，屢用屢驗。

（積補方。治脚氣暴發，紅腫脹痛，發熱惡寒，頭疼嘔吐，遍身骨節痛，狀似傷寒者，用郁李仁一錢，前胡、紫蘇、葛根、防風、獨活、防己、蒼朮、木瓜、檳榔各二錢，加葱頭三個，生薑二片，煎服。表證退，腫痛不退者，加大黄一錢。兩腿熱痛如火燎者，濕熱盛也，本方加黄柏、龜板、牛膝。皮膚作癢，加蟬退、牛蒡子。或赤紅腫疼痛，手不可捫按者，風熱盛也，加薄荷、荆芥、秦艽、獨活、黄柏。大便不通者，加大黄，倍郁李仁。○不腫而痛，謂之乾脚氣，筋脉踡縮攣痛枯細也，宜潤燥養血，用郁李仁八錢，當歸、白朮、川芎、牛膝、白芍藥、木瓜、黄柏、黄耆、枸杞子各四兩，俱用酒炒，生熟地黄、麥門冬各六兩，俱用酒煮搗膏，共為丸梧子大，每早服五錢。○兩膝益痛而腫大，脚脛漸細者，名鶴膝風也，用郁李仁一兩，黄耆、白朮、當歸、枸杞子、生熟地黄各三兩，秦艽、鱉甲、松節、五加皮、川牛膝、杜仲、萆薢、防風、羌活各二兩，俱炒燥，虎脛骨一對，共入布袋內，浸好酒中，浮磁罈內，蒸半日，每日隨量飲。）

女貞實味苦甘，氣平。無毒。氣薄味厚，陰中之陰，降也。入足少陰經。（別錄曰：女貞實生武陵山谷，今處處亦有。山海經云：泰山多貞木，是也。李氏曰：木肌白膩，葉厚而柔，長者約四五寸，青綠色，面深背淡。花極繁，亥結子纍纍，滿樹而色蔚。冬月采子，即蠟樹也。立夏前後取蠟蟲種子，置枝上，半月後其蟲化出，延引枝上，造成白蠟，人獲其利。亦名冬青。其葉與冬青實異。按冬[illegible]來青葉微圓，子黑色，蟲不造蠟，為別也。世俗誤用冬青實女貞實，不良。[illegible]方川通[illegible]不[illegible]，宜辨之。）

○女貞實，補腎養精之藥也。蕭湘方云：主強陰精，健腰膝，明目睛，久服鬚髮變白為黑。此木凌冬不凋，得天地清陰之氣最厚，故入腎養陰，生精益髓。屢服頗効，前古謂安五藏，除百病。久服肥健，輕身不老。蓋腎本寒藏，因虛則熱而軟。此氣味俱陰，正入腎除熱補精之要品。腎得

補，則五藏自安，精神自足，百病去而身肥健矣。然氣味俱陰，此補腎經之陰，去腎經之熱。如命門火衰，腎間陽氣虛，而脾胃薄弱，飲食不增，腹痛泄瀉者，又當禁用。又觀繆氏云：變白家當雜脾胃藥及椒紅溫補之類同施，不則恐有消腸動腹之患，益可知矣。

盧不遠先生曰：形生本缺金水之精者，需此貞實堅固其形。然何服者亦須如女之貞，久而不變，乃獲其益。

○集方，治陽火煎熬，陰血虧損，或骨蒸內熱，煩渴引飲，或吐血、衄血，常愈常發，或小便時澀，小水赤濇，或大便久燥結閉不利，一切陰虛火勝之證。用女貞實八兩，酒浸晒乾，微炒；茯苓、山藥各四兩；牡丹皮、澤瀉各二兩；山茱萸肉三兩，俱炒燥，研為末，配入懷熟地八兩，酒煮搗膏，再加煉蜜為丸，如梧桐子大。每服三錢，早晚白湯下。

凍青子（木皮同）味苦，微甘，無毒。陽中之陰，降也。入足厥陰經。（李氏曰：凍青亦女貞之別種也，南北諸山野及平澤俱有之。其葉微圓而子黑者為凍青，葉長而子赤者為女貞。按救荒本草言：凍青樹高丈許，似枸骨子而極茂盛。葉似櫧子樹而小，微窄而頭圓。五月開細白花，結子如豆大，生青熟黑。）

○凍青子，去風虛，皮膚痛癢之藥也。曬乾，鹽酒浸一夜，九蒸九晒，每日空心酒吞百粒。善消痔瘡。與枸杞子各等分，浸酒飲，大益老人。

葉搗汁，灌喉中，祛毒，吐出立解。燒灰，入胡粉，去面上瘢痕、并雀斑，甚驗。

烏鬚明目丸：用女貞實一觔，槐角子八兩，何首烏二觔，（切碎）桑葉晒乾，揉碎，蒼朮各一觔，烏飯子二觔。六味總和，蜜四兩，酒六壺，入藥浸三日，晒乾，再浸再晒，以酒乾上甑，蒸一日，再晒乾，微炒，磨為細末，聽用。茯苓一觔，乳拌晒乾，炒；牛膝、山茱萸肉、人參三味各十二兩，俱酒洗，微炒，磨為細末，聽用；懷生地、麥門冬去心各二觔，酒煮搗膏，和入前九味末子內，搗勻，再加煉蜜少許，再搗三百下，丸如梧桐子大。每早午晚各食前服一次，每次服三錢，白湯送下。如脾胃不實者，去槐角子。○治思慮傷脾，憂愁損志，遇事多忘，或怔忡不寐，驚悸不寐，發熱盜汗，嗜臥少食。用茯苓、酸棗仁、人參、白朮、黃耆、當歸、

枸骨刺、味苦。氣涼。無毒。氣味俱陰。入足厥陰、少陰經。

（李氏曰、枸骨多生江浙間。詩言南山有枸是也。樹如女貞、木肌理甚白。葉長二三寸、青翠而厚硬、有五刺角。四時不凋。五月開細白花。結實如女貞及菝葜子。九月熟時紅色。皮薄味甘。核有四瓣。采其木皮煎膏、以粘鳥雀。謂之黐膠。取其木作礙盒器皿甚佳。）

○枸骨刺、去風濕。活血氣。利筋骨。健腰腳之藥也。（蔣思遇）繆氏曰。（去含）益肝爲風木之位。藏血之藏也。血虛則發熱。熱甚則生風。此劑苦寒能涼血清熱。故宜主之。其活血氣利筋骨。健腰膝者。腰爲腎之府。腎乃作強之官也。腎虛則濕熱乘之。而筋骨不利。腰膝痿弱。味苦入腎。正遂其欲堅之性耳。風濕熱去。而血氣利。筋骨強。腰膝自健矣。如脾胃虛寒作泄。及陽虛陰痿者。忌之。

○集方。治痰火（[illegible]方）久不愈。用枸骨刺葉煮汁飲。極驗。蓋痰火未有不因陰虛火炎。上爍乎肺。煎熬津液而成。此藥直入足少陰經。補養陰氣。則痰火自消。如釜底抽薪之意也。兼能散風毒惡瘡。昔老妓患楊梅結毒。二十年者。單服此藥。煮湯作茶飲。一年瘡愈。而顏色轉。筋骨強健。皆假其清熱涼血之功耳。○治婦人血氣阻痛。（陳氏家抄）及產後惡血、積血、血塊、兒枕諸血蓄聚證。用枸骨、紅花、玄胡索各一兩。當歸、川芎、白芍各八錢。俱用酒拌炒。研爲末。每服五錢。苓心白湯調下。○治一切風濕。腰腳不利。用枸骨刺、枸杞子、五加皮、牛膝、木瓜、當歸各等分。浸酒飲。

南天燭枝葉、味苦濇。子、味甘酸。氣俱涼。無毒。入手少陰、足少陰。足太陰經。

（蘇氏曰、南天燭生嵩山。今江東州郡及吳楚閩廣諸山極多。其枝葉是木而似草。凌冬不凋。人家多植之庭除。本極難長。初生是菘菜。十年後漸長成株。高三四尺。廬山有盈丈者。莖是蒴藋。枝節微紫。質極柔脆。易下摧折。葉似冬青而小。光澤圓厚。四季常青。其味少酸。七月開花。結子成穗。生青熟紫。得霜則赤。如丹。酸美可食。許言即楊桐也。寒食采其葉。漬水染米蒸飯。色青可愛。謂之烏飯。）

○南天燭益氣添精。涼（[illegible]）血養筋之藥也。（方古人抄）開寶方。益顏色。堅筋骨。止熱泄。益氣力。久服輕身延年。變白爲黑。取莖葉搗爛。取汁浸粳米。九浸九蒸九曝。米粒緊小。黑如瑿珠。布袋藏。可適遠方。日進一合。不饑。其子味甘酸。功效尤勝。以酒浸蒸曝。亦各九次。日服百粒。輕身却老。眞仙方也。

繆仲醇先生曰、髮者。血之餘也。顏色者。血之華也。血熱則髮早白。而顏色枯槁。脾弱則困倦嗜臥。而氣力不長。腎虛則筋骨軟疲。而行步不前。此藥入心涼血。入脾益氣。入肝養筋。入腎添髓。其云輕身長年。令人不饑。非虛語矣。凡變白之藥。多是氣味苦寒。有妨脾胃。惟南燭氣味和平。兼能益脾。爲修眞家所須。

五加皮。味辛苦，氣溫，無毒。氣味俱厚，沉而降也。入足少陰厥陰經。（別錄曰：五加皮生漢中及冤句。蘇氏曰：今江淮湖南州郡及汴京北地亦有之。宿根所發，春苗叢生，莖赤，葉青，莖類藤葛，高六七八尺，或丈餘，枝葉交加，間有刺，背名白刺。每葉五出，香如橄欖，或三出，五出者佳，三出者亦可用，惟四出者不堪用。葉類薔薇，邊有鋸齒，四月開白花，隨結青子，六月子轉黑色，得霜則紫。十月采根皮，黃黑色，肉白色，肉骨堅硬。南產者根類枸杞木皮，潤厚，極脆，芳香，可入藥造酒，最良。北產者類秦木櫱木樹皮，平直如板，其色白，無香氣，僅療風痺，餘無所宜。今吳中剝野椿皮，亦有香氣，偽充五加皮，然終無味，殊為乖失。李氏曰：春月于舊枝上抽莖，山人采為蔬茹，正如枸杞。生南方堅地者如草類，生北方沙地者如木類也。唐時惟取峽州者充貢。）

〇五加皮，活血袪風，舒筋定痛，治四肢痹（蹶脈）痿之藥也。依大（方書）（蒋萬）氏方，主四肢拘攣，腰脊疼痛，或痹風腳氣，腫痛難履，或小腹疝氣，睾丸挺脹，或男子陰痿囊濕，小便餘瀝，或女人血室不調，瘀留脹痛。蓋此藥辛香溫散，專疏厥陰。凡下部一切風寒濕熱，結聚不散，如陰癢、陰疽、陰腫、陰痛、陰脂、陰挺，有關肝腎二經濕滯血傷諸病，咸宜用之。如下部無風寒濕邪，而有火者，不宜用。肝腎陰虛，血少火熾者，亦須忌之。

方龍潭先生曰：五加皮配羌獨活，能散風清濕；配四物湯，能活血調血；配牛膝、杜仲，能健力腰腎；配青皮、白芍藥，能瀉肝氣；配熟地黃、枸杞子，能補腎精。又云：凡風病飲藥酒，多生痰火，惟五加皮一味浸酒，日飲數杯，最有益人。凡釀酒用五加皮與酒相宜，且色味俱美也。

〇集方（以下八方俱出繆氏方）治濕熱痿痹，腰以下不能行動者，用五加皮、牛膝、木瓜、黃柏、麥門冬、生地黃、薏苡仁、虎脛骨、石斛、山藥各等分。〇治腎虛寒濕客之，作腰痛者，用五加皮、川續斷、山茱萸、巴戟天、補骨脂、牛膝、杜仲、肉桂各等分。〇治風寒濕痹，及腳氣腫痛，用五加皮、白蘚皮、石菖蒲、薏苡仁、白蒺藜、川羌獨活、白朮、蒼朮、萆薢、牛膝、木瓜各等分。〇治小腹寒疝，睾丸挺脹，用五加皮、小茴香、胡盧巴、白朮、青皮、肉桂、荔枝核、當歸、烏藥各等分。〇治男子陰痿，小便餘瀝，囊濕作癢，或潰爛者，用五加皮、益智子、赤石脂、車前子、小茴香、茯苓、巴戟天各等分。〇治婦人血室不調，瘀留脹痛，用五加皮、當歸、川芎、玄胡索、白芍藥、紅花、牡丹皮、桃仁泥各等分。〇治下部濕瘡，久不愈，兼治周身膿窠瘡，用五加皮、薏苡仁、金銀花、石菖蒲、胡麻子、土茯苓、連翹、蒼朮、黃柏、黃耆、木瓜各等分。（以上數方各等分者，臨證置方，或煎湯，或作丸，或早晚服，隨證取法也。）〇治婦女陰中一切諸病，或瘡疽腫痛，癢脹，脂挺八種，只用五加皮一味，煎汁飲，并熏之洗之。〇治小兒（全幼心鑑）三歲不能行，用五加皮五錢，牛膝、木瓜、白朮各三錢，共為末，每服五分，米湯調入酒二三滴和服。

枸杞子，味甘微苦，氣寒，性潤，無毒。可升可降，陰中陽也。入足少陰、足厥陰經。

（別錄曰：枸杞生常山平澤，及諸丘陵阪岸間。蘇氏曰：春發苗，如榴葉狀，軟薄堪作茹食，莖幹高三五尺。李氏曰：古取常山者為上，後世惟取陝西甘州者，稱絕品。今陝之蘭州、靈州及九原以西者，並是大樹，其葉厚根粗，七月作花，紫色，隨結紅子，實形長如棗核，或圓如櫻桃。曝乾緊小，少核，色亦紅潤，甘美，味如葡萄，可作果食。凌冬不落，二月葉發，五月再發，其實乃謝，七月葉又發，花即隨之，極易延蔓，根深者一發三四尺，枝葉小莖或分劈，橫埋土中，旬日便發，易生如此。冬采根，春采葉，夏采子，秋采莖，功用並同。農皇經名祭葉，實根莖後世始岐而二之，以根皮有清熱滋補之異，而不言莖葉。更以根去骨存皮，則又不可詳矣。別有一種名枸棘，形類但實圓，枝節間有刺，不堪用。雷氏曰：修治取子鮮明紅潤者，洗淨，曝乾，臨用以酒拌，微炒，取莖葉根，俱曝乾用。）

○枸杞子，潤肺生津，補腎添（繆仲淳）精之藥也。前古言生（[illegible]小江[illegible]）血氣，強陰陽，耐寒暑，堅筋骨，止消渴，去風濕，周痹，有十全之功。

故甄氏方治內損不足，精元失守，以致骨髓空虛，腰脊無力，血虧眼花，虛蒙昏澁。又治骨間風痛，腎藏風癢，滋陰不致陰衰，興陽常使陽舉。俗云：枸杞善能治目，非治目也，能壯精益神，神滿精足，故治目有效。又言治風，非治風也，能補血生營，血足風滅，故治風有驗也。世俗但知補氣必用參耆，補血必用歸地，補陽必用桂附，補陰必用知柏，降火必用芩連，散濕必用蒼樸，祛風必用羌獨防風，殊不知枸杞感天令至陽之氣，而兼地之至陰之氣，以生四氣全備，五精具存，能使氣可充，血可補，陽可生，陰可長，火可降，風濕可去，有十全之妙用焉。繆氏曰：雖為益陰除熱之上藥，但質性甘滑而潤，如脾胃有寒痰冷癖，時作泄瀉者，勿入。如不得已，必須用者，當與苓、术、骨脂諸實腸藥同用，方穩。

前賢蘇氏曰：淮南枕中記載西河女子服枸杞法：正月上寅日采苗，即修治。二月上卯日服之。三月上辰日采莖，即修治。四月上巳日服之。五月上午日采葉，即修治。六月上未日服之。七月上申日采花，即修治。八月上酉日服之。九月上戌日采子，即修治。十月上亥日服之。十一月上子日采根，即修治。十二月上丑日服之。修治者，一以修煉須得法也。采苗、莖、葉、花、子、根，俱即用酒拌蒸，一晝夜，曬乾，或作丸服，或浸酒飲，以丸行陽，須早晨服三百丸，白湯下，以酒行陰，須黃昏臨睡時飲之，此即修治法也。○又一方，不拘時日，采苗、莖、葉、花、子、根，隨時收取，隨時曝乾，總藏布袋內，掛簷下有風日、無雨露處。俟苗、莖、葉、花、子、根俱齊，共搗碎，以好酒拌蒸，一晝夜，曬乾，研為末，或煉蜜丸服，或浸酒服，兩用隨便。

又按周浩然日鈔云：宋徽宗時，順州築城，得枸杞根于土中，其形如獒狀，馳獻闕下，乃仙家所謂千歲枸杞。其根如犬者也。據此說，則枸杞之滋益不獨在子，而根亦不止于退熱而已。又按李氏言，苗、莖、葉、花、子、根，氣味有殊，而主治未必無別。蓋其苗乃天精，苦甘而涼，上焦心肺客熱者宜之；根乃地骨，甘淡而寒，下焦肝腎虛熱者宜之。此皆三焦氣分之藥，所謂熱淫于內，瀉以甘寒也。

一〇〇七冊

至于子，則甘平而潤。性滋而補。不但退熱。更能補腎生精益氣潤肺。此乃平補之藥。所謂精不足者補之以味也。分而用之。則各有所主。兼而用之。則一舉兩得。善業者當自審而行之。

○集方。治（陳家抄方）老幼及少年男婦。血氣不足。精神短乏。用枸杞子一觔。酒浸半月。石臼內搗如泥。配當歸、白朮各四兩、茯苓二兩、人參一兩。俱微炒燥研爲末。和入枸杞膏內。煉蜜少許。搗爲丸梧子大。每早服五錢。白湯下。如脾胃虛寒。多滑瀉者。本方加補骨脂三兩、木香、肉桂各一兩。如肝腎陰虛。多夜熱煩渴者。本方加龜膠、生地、知母各三兩。如老人腸枯血燥。難大便者。本方加肉蓯蓉。搗膏

六兩。○治（陳氏家抄）筋骨血氣虛羸。腰膝乏力。用枸杞子。每早晨乾嚼六兩。或用濕酒吞送。亦可。○治（千金方）虛勞苦渴不止。用枸杞子八兩。酒拌微炒。地骨皮十兩。微炒。共研爲末。麥門冬去心、熟地黃各四兩。酒煮搗膏。和前藥共爲丸梧子大。每早晚各服四錢。白湯下。○治（聖惠方）痺證屬風濕。用枸杞子一觔。真漢防己四兩。俱用酒拌炒。真羌獨活一兩。川牛膝、木瓜各五錢。俱微炒研爲末。煉蜜丸梧子大。每早服三錢。白湯下。○治（李東垣方）內損不足。精神失守。以致骨髓空虛。腰脊無力。或血虧眼暈。虛蒙昏漲。用枸杞子一觔。酒拌濕一晝夜。懷熟地八兩。酒煮。俱放石臼內搗爛。配茯苓、白朮、山藥、沙參各二兩、人參、北五味子各一兩、龜膠、蛤粉炒三兩。俱研爲末。共搗丸如梧子大。每早晚各服四錢。白湯下。○治（朱心恒手抄方）骨間風痛。用枸杞子四兩、防風、秦艽、羌活、獨活、海桐皮、白朮、當歸、枸骨刺各二兩、桂枝五錢。俱炒燥。虎骨三兩。火炙酒淬搗碎。共爲末。煉蜜丸梧子大。每早晚服三錢。白湯下。○治（[illegible]）腎藏風。瘡血風皮洗。黃水浸淫。腿足瘡癬。延蔓不已。用枸杞子四兩、白蘚皮、金銀花、當歸、生地、蒼朮、紅花、真漢防己、木瓜、牛膝各二兩。分作十五劑。水煎服。○治（[illegible]方）眼目昏澁。淚出脹常。愈常發。用枸杞子四兩、甘菊花二兩、密蒙花三兩、當歸一兩、川芎八錢。俱酒拌炒研爲末。用熟羊肝十個搗爛爲丸如梧子大。每早服五錢。白湯下。○治（[illegible]方）一切風氣風

痺風痛風瘡風癱諸證。用枸杞子一觔、天麻、川芎、防風、當歸、黃耆、白芍藥、海桐皮、膽南星、川羌活、白朮各四兩。俱酒炒。殭蠶三兩。醋炒。白附子二兩。童便拌炒。共研爲末。煉蜜丸梧子大。每早晚各服三錢。白湯下。○治（[illegible]）腎經虛損。眼目昏花。或雲翳遮睛。用枸杞子一觔。好酒浸透曬乾炒。川椒、小茴香、芝麻、川楝肉各一兩。白朮、茯苓各二兩。俱炒燥。共研爲末。懷熟地四兩。酒煮搗膏。拌入藥末內。和勻。再加煉蜜丸梧子大。早晚各服五錢。俱用白湯下。○治（[illegible]）血虛變生一切風證。每日早晚只取枸杞子一兩。煎湯飲。并食其渣。服二兩。全愈。○治（[illegible]）一切癰疽惡毒潰爛不已。及瘰癧結核、馬刀、肉瘦延結不休。或風毒

流注、上愈下發、左消右起、延串不止、或便毒魚口楊梅破爛、日久不合、只用枸杞子、一味、每早晚一兩、乾嚼、以川萆薢、五錢、煎湯傳送、服百日全愈。

○續補集方、（千金方）治腎虛腰痛。用枸杞子、地骨皮各一觔、川杜仲、川萆薢各十兩、俱晒燥微炒。以好酒三斗、淨罈內浸之、煮一日、濾出渣、早晚隨量飲之。○（攝生方）治注夏虛病、每日用枸杞子、一兩、北五味子、三錢、俱研細。入淨磁壺內。白滾湯泡、代茶飲。一月即輕健。○（劉氏方）治虛勞內熱、時發寒熱、并肺熱咳嗽之因陰虛者。用枸杞子、一觔、懷熟地、麥門冬、天門冬、地骨皮、青蒿、百部、玉竹、各八兩、北五味、一兩、鼈甲、滾湯泡去垢膩、枇杷葉、刷去毛淨、各十二兩、清水

煎汁三次、去渣淨、又三次、汁總和、入砂鍋內、慢火熬成膏、量膏汁多少、加煉蜜減半、和入、再畧熬數十滾、入淨磁瓶內收之。早晚服數匙、白湯調下。

地骨皮　味甘淡、氣大寒、性沉、無毒。入手足少陰、足厥陰經。

（雷氏曰：地骨皮、即枸杞之根。掘取以清流水洗淨、刷去土、去心用。）

○地骨皮、益陰涼血之藥也。（金少湖稿）甘寒純陰。主瀉腎熱。去胞中之伏火、治虛勞。止有汗之骨蒸。陳氏方、又治吐血、衄血、腸風便血、淋血、諸疾、總不外滋陰涼血、去肝腎虛熱之意。如虛勞火勝、而脾胃薄弱。食少泄瀉者、宜減之。

王紹隆先生曰：骨中火熱爲侮、煎耗真陰、以地中之骨皮甘寒清潤、不泥不滯、非地黃麥門冬同流。

盧子由先生曰：其味甘、得土之正。其氣寒、得寒水之化。故主夏氣病藏之邪。致骨蒸煩熱也。

○集方、（婦人良方）治男婦骨蒸夜熱、不論有汗無汗。用地骨皮五兩、當歸身、一兩二錢、川芎、六錢、牡丹皮、白芍藥各二兩、懷生地、三兩。分作十劑、水煎服。○（[illegible]方）治吐血、衄血不止。（丹溪方）用地骨皮、三兩、懷生地、一兩八錢、白芍藥、一兩五錢、牡丹皮九錢、甘草、六錢、分作三劑、水煎服。○治腸風便血。用地骨皮、牡丹皮、蒼朮、米泔水浸、各一兩、分作四劑、水煎服、○治男婦血淋不止。用地骨皮、白芍藥、車前子、懷生地、各三錢。甘草一錢、水煎服。○（簡便方）治口舌糜爛、水穀難下、以地骨皮、柴胡各三錢、水煎服。

滋陰清化丸、清痰火、滋化源。養肺腎。用地骨皮、枸杞子、白茯苓、山藥、知母、黃柏、白芍藥、薏苡仁、沙參、各二兩、北五味、一兩、俱用鹽水拌炒、研爲末。天門冬、麥門冬、熟地黃、各四兩。俱用酒煮搗膏、煉蜜共和爲丸、如梧桐子大。每早晚各食前服三錢、白湯下。元虛者、加人參一兩。○（[illegible]）治思慮憂愁抑鬱、心中煩躁。以致小便赤濁、或成沙石血膏淋澀、或夜夢遺精、淋瀝澀痛。或黃赤白濁、色如米泔、或酒色過度、上盛下虛、心火炎上、口苦咽乾、漸成消渴。用地骨皮、石蓮子、車前子、生地黃、茯苓、黃耆、麥門冬、黃芩、知母、黃柏各二錢。人參、白芍藥、各一錢、水煎服。

牡荆實、味苦，氣溫，無毒。可升可降，陽也。入足陽明、厥陰經。（蘇氏曰：牡荆實生眉州、蜀州及汴京、南陽、冤句、武平、嵩都、鄴高岸上，及四野處處皆有，即黃荆也。古者刑杖用荆，故字從刑。荆楚之地獨多，因此地名荆也。山人多有樵采為薪，年久未經樵采者，其樹大如盌，其木心方，其枝對生而不作蔓，一枝五葉或七葉，葉如榆，長而尖，有鋸齒。五月開花成穗，紅紫色，其子大如胡荽子，而有白膜裹之。李氏曰：荆有青赤二種，青者為荆，赤者為楛，嫩條皆可作莒筥，古者貧婦以荆為釵，即此二木也。又按齊州記云：荆有三種，金荆可作枕，紫荆可作牀，白荆可作履，與他處牡荆、蔓荆異。又杜氏拾遺錄云：南海山中多金荆，大者十圍，盤屈瘤蹙，文如美錦，色如真金，工人采用，貴如沉檀，此又荆之別類也。）

○牡荆實散寒邪，下（李時珍）逆氣之藥也。別（汪大生）錄方止欬逆下結氣，止心胃卒痛，消腳氣腫疼，散小腸疝氣，除骨間寒熱如瘧諸證。此藥善走陽明、厥陰寒濕之疾，用之立時解散，誠輔正驅散之劑也。如欬逆由于氣虛，胃痛由于鬱火，

腳氣由于脾弱不運，諸證不因寒濕外邪者，俱忌之。

○集方（譚埜翁方）治欬逆結氣，不能升降，因有寒鬱者。用牡荆實三錢，紫蘇子二錢，俱研細，生薑三片，水煎服。○（朱氏方）治心胃卒痛，用牡荆實三錢，微研細，白湯吞服。○（別錄方）治腳氣腫痛而脹，用牡荆實五錢，牛膝、木瓜、川獨活各二錢，水煎服。○（李瀕湖方）治小腸疝氣作痛，用牡荆實五錢，小茴香炒、荔枝核火炙焦酒淬各三錢，共為細末，白湯調服三錢。○（別錄方）治骨間寒熱如瘧，用牡荆實一兩，微炒研，真銀柴胡、半夏麴、黃芩各六錢，甘草二錢，分作四劑，水煎服。

○牡荆莖葉。○（[illegible]元亮方）治腰腳風濕痛，用牡荆莖葉十數觔，煎湯淋洗腿足，自愈。又方，用牡荆莖葉，曬乾，罈內燒烟熏湧泉穴，及痛處，使汗出即愈。○（[illegible]方）治毒蛇咬傷，滿身紅腫發泡，用黃荆嫩葉搗汁，塗傷處，并將渣敷傷處，即消。

荆瀝、味甘，氣平，無毒。可升可降。入手少陰、太陰，足陽明、厥陰經。

（李氏曰：取荆瀝法，用新采牡荆莖，截長一尺五寸，兩頭架磚，中間用炭火燒炙，兩頭以碗承取瀝下。瀝汁每瀝汁一盃，加薑汁三匙，以湯頓熱服。又法：以牡荆莖截一尺長，束入瓶中，再以一瓶合住，兩瓶對口處，以綿紙糊封，再以好滋泥搪固，埋糠火中，煨燒其瀝汁，入下瓶中，取出。）

○荆瀝（李時珍）治痰利氣之藥也。善（王[illegible]）治中風昏危，痰迷氣閉，語言不出，目睛不活，或痰厥頭痛，頭風旋暈，或小兒風癎痰搐，急慢驚風諸證。此藥專除風熱，導痰涎，開經絡，行血氣，稱仙劑也。須元氣充足，能食者，宜加之。如中氣虛而

食少為大便不結者，宜少之。

○集方（[illegible]）治中風昏危，痰迷氣閉，語言不出，目睛不活，用荆瀝二盞，和生薑汁五六匙，調勻，用半夏三錢，南星二錢，木香一錢，當歸、白术各一錢五分，甘草五分，水二碗，煎七分，乘熱和荆瀝徐徐服。○（同上）治痰厥頭痛，頭風旋暈，用半夏、天麻各三錢，膽星、白芥子各二錢，茯苓、陳皮各一錢，黃芩一錢二分，水二碗，煎七分，乘熱和入荆瀝，徐徐服。○（同上）治小兒風癎痰搐，及急驚慢驚諸證，用荆瀝半盞，和生薑汁三四匙，用半夏、天麻各一錢五分，陳皮七分，茯苓一錢，甘草五分，蟬蛻、殭蠶三錢，水碗半，煎五分，乘熱和荆瀝，徐徐服。

蔓荊實，味苦，氣溫，無毒。氣味清薄，浮而升，陽也。入足太陽、陽明、厥陰經。

蘇氏曰：蔓荊子，出汴京及秦隴、明越州郡，今江南閩浙亦有。多生近水處。苗莖蔓延，長丈許，莖中心方，對節生枝，枝小弱如蔓，故名。春將舊枝發小葉，類小楝。五月葉大如杏葉。六月作穗，從出青蕊，將開則黃，開時花色紅中雜白。九月結實，有黑斑，大如梧子，極輕虛。實上近莖處有白膜蓋之。冬月葉凋，莖能耐寒，次年復發。修治，去蒂下白膜，酒炒乾用。

○蔓荊子，主頭面諸風疾之藥也。（孫思邈）前古主通利九竅，活利關節，明目，堅齒，袪除風寒、風熱之邪。其辛溫輕散，浮而上行，故所主頭面虛風諸證，推其通九竅、利關節而言。故後世治濕痺拘攣，寒疝腳氣，入湯散中，屢用奏效。（李子材）又不拘于頭面上部也。凡頭目風痛，不由風寒之邪，而出

于血虛有火者，勿用也。痿痺拘攣，不由風濕之邪，而由于陽虛血涸筋衰者，勿用也。寒疝腳氣，不由陰濕外感，而由于肝脾虧敗者，亦勿用也。

繆仲醇先生曰：邪去，則九竅通明；痺散，則關節活利。

○集方：治（淑秋水方）頭面諸風疾，用蔓荊子五錢，枸杞子、白附子、甘菊花、玉竹、防風各二錢，俱酒拌炒，甘草八分，水煎服。○治（孫仁存方）九竅不通，目昏耳閉，鼻塞口乾，二便不通，用蔓荊子三錢，研，川芎、北細辛、辛夷各一錢，茯苓、白朮各二錢，車前子、牛膝、萆薢各二錢五分，生薑三片，水煎，徐徐服。○治（潘都閫傳）關節不利，周身強痛，用蔓荊子三錢，川羌活、當歸身、紅花、牛膝、木瓜各二錢，川芎、黃柏、木通各一錢五分，水煎服。○治（杭州胡太守方）風寒侵目，腫痛出淚，澁脹羞明，用蔓荊子三錢，荊芥、白蒺藜各二錢，柴胡、防風各一錢，甘草五分，水煎服。○治（聖惠方）齒牙攻痛，動搖不堅，因風、因火、因寒濕者，用蔓荊子三兩，川芎、白芷各五錢，北細辛、辛夷各一錢五分，俱炒，研為末，每早以手指蘸末藥擦齒，絕妙。○治（以下三方齊常恒傳）濕痺拘攣疼痛，用蔓荊子四兩，酒拌炒，枸杞子、川萆薢、當歸、白朮、蒼朮、紅花、牛膝、秦艽、杜仲、川羌活、川黃柏各二兩，俱醋拌炒，共為末，每早午晚各食前服一錢二分，白湯調下。○治寒疝鑽痛，用蔓荊子一兩，乾薑、小茴香各五錢，吳茱萸三錢，木香一錢，甘草五分，服後不愈，倘加冷汗呃逆，吐蛔蟲者，本方加製附子四錢，人參、白

朮各五錢，水四大碗，煎二碗，冷服。○治腳氣重痛，難履，用蔓荊子三錢，牛膝、木瓜、青皮、陳皮、烏藥、半夏、川獨活、秦艽、藁本、黃柏各三錢，水三碗，煎八分服。○治（繆氏方）偏頭風痛，目將損者，用蔓荊子一兩，甘菊花、白蒺藜去刺、土茯苓、黃芩、荊芥、芽茶、川芎、羌活、黑豆各五錢，俱酒拌炒，研為末，每早午晚各食後服一錢五分，白湯調下。○治乳癰初起可消（花氏得効方）用蔓荊子一兩二錢，炒，研為末，酒、水各一碗，煎一碗半，飽服，渣敷患上。

紫荆味苦，氣平，無毒。入足厥陰經血分。（蘇氏曰：紫荆處處有之。寇氏曰：木似黄荆，葉小無椏，開紫色花，甚細碎，聯綴作朶，花不附枝，生無常處，或生于木身之上，或生于縱曲兩叉之間。花罷葉出，光緊微圓。人家園圃庭院多植之，即田氏之紫荆也。結子至秋熟，而紫圓如小珠。取皮入藥，以川中厚而紫色、味苦如膽者爲勝。）

○紫荆木皮，破宿血，活新血（日華子），解癰腫，散瘡毒之藥也（陳藏器）。開寶方（汪機）治婦人血氣刺痛，經水凝滯。凡一切血分不和之症，如瘀血爲病，作癥瘕痞積，或蠱毒淋閉，諸證咸宜用之。然苦能泄結，寒能解熱，紫色能入營分，故前人入外科諸方，外敷內服，屢奏功效，除癰毒方藥外，他用甚鮮。

○集方：治一切癰疽發背初生，單用紫荆皮爲末，葷汁酒調箍住，自然撮小，并內服之，乃救貧之良劑也。○治婦人血氣諸病（朱氏補遺方），用紫荆皮爲末，紅麯研細，醋煎滾，打糊爲丸，如梧子大，每早晚各服五丸，白湯下。○治血蠱不散（林氏方），用紫荆皮爲末，每早未食時服三錢，白湯下。○治五淋（林氏方）閉澀，用紫荆皮煎湯，每早飲一碗。○治鶴膝風攣（血積方），用紫荆皮三錢，好酒煎服，日三次。○治產後諸淋（熊氏補遺方），用紫荆皮五錢，酒水各一碗，煎服。

木槿花（根葉同皮）味甘，氣平，性滑，無毒。（寇氏曰：木槿花南北隨處即有，可插而活。其木如李，其葉末尖而有椏齒。五月開花，花小而豔，或白或粉紅，有單葉、千葉者。故月令云：仲夏之月，木槿榮，是也。結實輕虛，大如指頭，秋深自裂，其子如榆莢、馬兜鈴之仁形。種之易生，其嫩葉可作茹，又可作湯，搗汁洗諸去垢膩。南方婦女以此洗髮，去垢且令色黑。今瘍醫用皮治瘡癬，多取川中來者，厚而色紅，他處不及也。）

○木槿潤燥活血，去痢逐積，消癰瘀之藥也（李時珍）。其花葉性滑而利，善治赤白積痢，乾澀不通，下墜欲解而不解，搗汁和生白酒溫飲，即止。其根皮性靭而濇，善治疥癬、蟲蝕、諸瘡腫痛且癢。腫痛者，酒調敷之；搔癢者，米醋磨汁搽之，即愈。又花葉搗爛，敷消癰毒暑癤，取其滑利而散也；又根皮止赤白帶下，取其靭濇而收固也。分而論之，花葉苦寒，能除諸熱，滑利，能導積滯；根皮靭濇，能止帶下，能化蟲癬瘡痍也。惟取川中所產，肉厚色紅者良。

治五種淋證（劉[illegible]和甫傳）：氣淋者，小便澀閉，常有餘瀝也；沙淋者，莖中痛，努力而出，如沙石也；血淋者，尿中帶血，莖中抽痛也；膏淋者，尿出如膏糊白漿也；勞淋者，勞倦即發，尿出而欲通不通，澀且脹痛也。五淋總屬膀胱有熱，濇氣不化而然。用槿樹花葉搗汁一盞，配茯苓、黄芩、山梔、澤瀉、木通、甘草、黄連各一錢，白棗肉三十個，水煎，臨服加槿樹花葉汁。氣淋，本方加燈心；沙淋，加海金沙；血淋，加生地；膏淋，加白朮；勞淋，加人參、麥門冬、黄耆。已上五淋，加味俱各二錢。

木芙蓉花葉　味辛。氣平。無毒。

（李氏曰：木芙蓉，南北處處有之。插條即活。其幹叢生如荊，高者丈許，或六七尺。其葉大如桐，有五尖及七尖者，冬凋夏茂。秋半始作花，花類牡丹、芍藥，有紅者、白者、千葉者、單葉者，最耐寒而不落，不結子。花朝開其色白，薄暮稍紅，又日又深紅矣。花葉俱霜後采，陰乾入藥用。）

○木芙蓉花葉，清肺涼血，散熱解毒之藥也。（李時珍）丹溪方（四明[illegible]）治一切大小癰疽腫毒惡瘡，不拘未成已成、未破已破，並用木芙蓉，或葉，或花，或皮，或根，或生擣，或乾研，加赤小豆，水浸擣爛，和入，以蜜調塗于腫處四圍，中間留孔，如乾即以葛汁潤之。初起者搽上，即覺清涼，痛止腫消。已成者即膿聚毒出。已破者即膿出易歛。妙不可言。又章氏方，治久欬不已，以花葉爲末，蘸百合食之屢效。赤眼腫痛，以花葉水擣貼太陽穴，並止。

李蘋湖先生曰：此藥味辛，性滑，氣平，不寒不熱，質方涎粘，敷貼癰疽腫毒之功，殊有神効。即不全愈，亦減毒勢十之五。司瘍醫者，當早備臨病應用可也。

蠟梅　味辛。氣溫。無毒。

（李氏曰：蠟梅色似蜜蠟，雖臘月開，故字從蠟。樹小，長者不滿丈，叢枝尖葉。凡三種：以子種不經接者，開小花尖瓣而香淡，名狗蠅梅；經接而花大，開時含口者，名磬口梅；花密而香濃，色深黃如紫檀者，名檀香梅，最佳。三種俱結實如垂鈴，尖長近寸，內子下地亦能生。其樹皮及枝條浸水磨墨，浣字有光采。）

○蠟梅花葉，擣爛敷貼瘡痞，極神。（出虞氏方）

密蒙花　味甘。氣平。無毒。入足厥陰經。

（蘇氏曰：密蒙花出蜀中州郡。樹高丈餘，葉似冬青，但柔而不光，潔而淺綠，背有白毛。其花細碎，數十房成一朵，繁密蒙茸如簇錦，故名。利州甚多。冬蕋春開，三月采花日乾用。形與芫花相似，但芫花狹小而密蒙花差大爲異，用者宜細辨之。）

○密蒙花，養目血，去目風，解目熱之藥也。（開寶）王氏方言（陳五占抄）專入肝經，治眼目諸病，不拘久暴。或風熱暴感而目赤腫痛，眵障淚流；或血氣久虛而睛失所養，昏蒙不見；或青盲膚翳，或畏日羞明；或小兒疳痘成翳，疳氣攻眼，浸淫濕爛諸證，密蒙花統能治之。蓋肝開竅于目，肝氣調和，目無病矣。此藥治目之外，並無他用。

王紹隆先生曰：此藥蘩密蒙茸，巧如簇錦，此象形命名也。又說文云：朧朦目蒙，有目無眸也。此藥善治眼病眵淚翳障，以及青盲，此又以功用爲名也。

○集方：治風熱濕熱，眼赤腫痛。用密蒙花三錢，甘菊花、荊芥穗、龍膽草、川黃連、防風、白芷各一錢，甘草六分，水煎服。○治肝腎氣血兩虛，眼目昏暗，蒙昧不明。用密蒙花、枸杞子各四兩，甘菊花、穀精草各二兩，懷熟地、山茱萸各三兩，明天麻、白茯苓、當歸各二兩五錢，沙苑蒺藜、蒺藜各五兩，俱用酒洗炒，共爲末。用羊肝三十箇，先將羊膽汁拌藥末，隨用羊肝擣爛成膏，和入藥內，如乾，量加煉蜜少許，擣二千下，爲丸梧子大。每早晚各服三錢，白湯下。○治眼目青盲翳障。用密蒙花三錢，木賊草、白蒺

絜各一錢，決明子、穀精草各二錢，水煎服。○治目畏日羞明，用密蒙花三錢，生地黃、黃芩各二錢，水煎服。○治目胞濕爛，浸淫多淚，用密蒙花三錢，白朮二錢，葳蕤五錢，水煎服。○治小兒痘後餘毒不散，攻眼，用密蒙花一錢，黑豆、菉豆、赤小豆各四十九粒，水煎服。○治小兒疳積攻眼不明，目將瞎者，用密蒙花一兩，使君子肉三錢，白蕪荑五錢，胡黃連二錢，蘆薈一錢，共為末，餳糖為丸如雞豆大，每早晚各服一丸，白湯化下。○治一切目病，因積視、久視、專睛著視，有勞目睛，以致昏脹腫痛不明者，用密蒙花五錢，甘菊花二錢，麥門冬去心八錢，當歸身一錢五分，玉竹四錢，水煎服。（以上數方出江西楊尉宇經驗手集）

山茶味苦濇，氣平，無毒。

（李氏曰：山茶產南方，樹生，高者丈許，枝榦交加，葉面深綠色，背淡。其形中闊頭尖，厚硬有稜，嫩芽色味類茗，故得茶名。秋終作蕊，黃色，冬盡開花，紅瓣。又格古論云：花有數種：寶珠者，花簇如珠，最勝。又海榴茶花蒂青，石榴茶花中有碎心，躑躅茶花色如杜鵑，宮粉茶花、串珠茶花皆粉紅色。又一種一捻紅、千葉紅、千葉白等名，不可勝數，葉各小異。或云亦有黃色者。又虞衡志云：廣中有南山茶，花大倍中州，色微淡，葉薄有毛，結實如梨，中有數核，如肥皂核大。又有取嫩芽煉熟，水淘可食，救荒。花焯熟亦可作茗。）

○山茶花：涼血止血之藥也。丹溪方：治吐血、衄血、腸風下血。凡血因熱而動者，並用紅山茶花三兩，鮮者搗爛，生薑湯調服。如無新鮮，以花者為末，每早晚各服二錢，白湯調下。

柞木味苦，氣寒，無毒。

（李氏曰：柞木，南北東西在處山中有之。高丈餘，葉小而有細齒，光滑而韌。其木及葉丫皆有針刺，經冬不凋。五月開白色花，細碎，不結子。其木心亦白色。陳氏曰：柞木生南方，居多。今之作梳者是也。此木堅硬，可為斧鑿柄。又橡櫟之木亦名柞木，非此木也。）

○柞木：活血利竅，治難產，解癰毒之藥也。（李時珍）其性專于下達，（閻士謙）陳氏方以此木煎汁，治黃疸病者，何也？蓋黃疸因濕熱鬱于腸胃而發。此藥味苦氣寒，苦能利濕，寒能除熱，兼得下走利竅之性，則濕熱皆從小便出，而黃自退矣。故頻湖方，催生產，解癰疽腫毒之用，亦不外此意云。

○集方：治婦人難產，（張不愚方）不拘橫生倒養，及胎死腹中，用此屢效。用大柞木枝一尺，洗淨，大甘草五寸，俱寸折，以新汲

水四升，同入大砂鍋內，以紙再重緊封，文武火煎至半升，待腰腹重痛，欲坐草時，溫飲一小盞，便覺下路開豁。如渴，再飲一盞，至三四盞，下重便生，更無諸苦，切不可坐草太早，及穩婆亂為也。○治諸般癰腫發背，（普濟方）用柞木葉、乾荷葉中心蒂、乾萱草根、甘草節、地榆各四兩，細剉，每用五錢，水二碗，煎一碗，早晚各一服。未成者，其毒自漸消散；已成者，其膿血自漸乾收也。

本草彙言卷之十一

錢塘　倪朱謨純宇甫選集　男倪洙龍冲之氏蒐稿
　　沈公岐則施甫校正

木部（寓木類）

茯苓。味甘淡，氣平，無毒。氣味俱薄，浮而升，陽也。入手少陰、太陰、太陽、陽明，足少陰、太陰、太陽、陽明，八經。

（別錄曰：茯苓生大山山谷，及華山、嵩山、鬱州、雍州諸處古松根下。李氏曰：龜策傳作伏靈，蓋松之神靈之氣伏結而成，故謂之伏靈、伏神也。又曰：下有伏靈，則松頂盤結如蓋，時有形絲上蒼，非新雨初霽，澄徹無風，不易見也。陶氏曰：此即古松靈氣淪結成形，如得氣之全者，離其本體，故不抱根；如得氣之微者，止能附結本根，故中心抱木。小者如拳，大者如斗，外皮皺黑，內質堅白，形如鳥獸龜鱉者良；虛軟而色赤者，不堪用。蘇氏曰：又一種，即百年大松，爲人斬伐，枯折槎枿，雖枝葉不復上生，而精英之氣，亦淪結成形，謂之茯苓撥。即于四面丈餘地

內，以鐵錐刺地，有則錐固不可拔，無則作聲如甕者，謂之茯苓窠。中有白色蒙翳，蒸潤其間，如蛛網然，尚屬松氣之將結成形者也。亦可人力爲之。就所伐松樹，根則聽其自腐，取新苓之有白根者，名曰茯苓鑽，截作寸許長，排種根旁。久之發香如馬勃，則茯苓生矣。今浙江溫州、處州等處山農以此法排種，四五年即育成。修治去皮切片，或搗末，水淘去浮末、赤筋用。）

茯苓，利水健脾（李東璧），定志鎮驚（日華子），清氣化痰，分理水穀之藥也（李時珍）。（倪山柟）此得松木餘氣而生，甘淡和平。甘能實脾，淡能利竅，溫而不寒，利而不燥，補而不滯，解結熱，散結氣，而又無消伐之虞，至清至潔，至和至美之上珍也。凡五味之用，各有所偏。（酸味束而收斂，苦味直行而泄，甘味上行而發，辛味橫行而散，鹹味潤下。）惟甘淡之味，最得中和之用。故農皇治胸脇逆氣，憂恚驚邪，恐悸，（此肝氣不和也。）心下結痛，（此心氣不和也。）寒熱煩滿，（此脾氣不和也。）欬逆口焦，（此肺氣不和也。）舌乾，小便不利。（此腎氣不和也。五氣不和，爲病非淺。）用此甘淡平和之劑，五氣咸和，諸病自已矣。若李氏方之治腹脹肢腫，肉浮如泥；朱氏方之治夢寐驚恐，神魂不寧；張氏方之治肺痿肺癰，咳嗽膿血；魏氏方之治膀胱濕熱，水道不行；成氏方之治五痢五泄，（飧泄、溏泄、鶩泄、濡泄、滑泄。）大腸不實。此又後世諸醫，備詳古人未發之旨也。而明初戴氏直指方云：茯苓甘淡純陽，緩脾逐水，導氣生津，平火止泄。此數字，盡其用矣。善治者當致意焉。

魯當垣先生曰：質堅色白，類金；附生松下，類木。木體而金用也。凡金木互交爲病，如欬逆喘嗽，胸脇脹滿等證，蓋可想見。又如膀胱不利爲癃，不約爲遺，癃與遺病固

各異，均屬膀胱清氣不順使然，宜用茯苓之堅白甘淡以化其氣。氣化自能出，氣化自能止矣。有云陰虛者勿用，謂其利小便，水液下行之力居多，下行恐亡陰，故云勿用。此說殊爲乖謬，不知松枝歲寒不凋，原具堅骨，其精靈之氣，旋伏根下，潛受陰陽吐納之機，有陽長陰生之妙，何陰虛之不可用耶？不知補陰之藥，往往俱用茯苓，如六味丸、滋陰丸、養陰丸、益陰丸，未嘗不用茯苓者也。

濟鄧林先生曰：張三丰有茯苓贊云：形質塊磊，芳香清潔，幽潛深邃，恬憺勿烈，體陽用陰，充氣貫脈，能泄能收，勿寒勿熱，通神補魂，守志養魄，上可實，中滿可決，通

化無方。眞人之訣。

陳月坡先生曰。茯苓。甘平溫厚。淡滲利竅。觀利竅二字有無限功用。利竅則小便結閉可通。利竅則淋瀝遺溺可止。利竅則外邪可出。而汗可發矣。利竅則內神可收而汗可止矣。神而明之。將心者得之。粗工執一之士。勿語此。

○集方。治（聖濟總錄）胸脇逆氣。或脹或痛者。用白茯苓一兩。人參三錢。陳皮三錢二分。木香一錢。分作四帖。清水煎服。○治（許維心方）憂恚驚邪致成心志不寧。精神恍惚。怔忡健忘。甚至失魂喪志。顛狂痴醉。用白茯苓二兩。酸棗仁。遠志。半夏。當歸各六錢。川芎四錢。分作四帖。水煎服。臨服時。調硃砂末二分五釐。○治（濟治類方）恐悸。夜臥夢魘。則夢鬬爭敗負。恐怖之狀。此屬心血虛而有痰者。用白茯苓三錢。半夏麴二錢。水煎服。臨服時。加鹿角膠五錢。白湯溶化沖入。○治（俞居士選奇方）心常忪悸。行事懼怯。或忘前失後。用白茯苓。白檀香。各二錢。肉桂一錢五分。石菖蒲。天竺黃。犀角。各六分。麥門冬。遠志。酸棗仁。人參。各八分。甘草一錢。共爲細末。煉蜜丸。如彈子大。每服一丸。臨睡米湯化下。○治（何方）心下結痛。因心氣虛而有痰者。用白茯苓二錢。半夏麴一錢五分。當歸身。廣陳皮。各一錢。甘草五分。水煎服。○治（何方）寒熱煩滿。因脾虛有停水積飲者。用白茯苓。半夏各二錢五分。廣陳皮一錢五分。甘草五分。厚樸薑汁炒。前胡。乾薑。各二錢。生薑三片。水煎服。○（襲雲子方）治欬逆（氣急而咳即今之頓嗆也）。口焦。咽燥也。肺氣不順。用白茯苓二錢。半夏一錢。陳皮八分。川貝。五分。麥門冬。知母。黃芩各一錢二分。水煎服。○治（彭氏濟林衍方）舌乾小便不利。心火亢甚。腎水衰微。用茯苓二錢。懷熟地三錢。川黃連。白芍藥。黑山梔各一錢二分。甘草五分。燈心廿根。水煎服。○治（東垣方）腹脹皮腫。肉浮如泥。氣息喘促。用白茯苓。生半夏切片。生薑湯泡。葶藶子。各一錢。牽牛子一錢六分。微炒燥。共爲末。每早服二錢。生薑湯調下。○治（丹溪方）夢寐驚恐。神魂不寧。用白茯苓一兩。石菖蒲五錢。甘草三錢。硃砂二錢。共研極細末。煉蜜丸（濟生方）。如龍眼核大。每早晚各服一丸。燈心湯下。○治肺痿肺癰。咳嗽吐血。用白茯苓。百合。米仁。各一兩。白芨五錢。川貝母八錢。去心。共爲末。每服三錢。不拘時白湯調下。○治（濟生方）膀胱濕熱。水道不行。小腹脹悶。用白茯苓。海金沙。各五錢。車前子。淡竹葉。茵陳。葉各四錢。韭菜子三錢。共爲末。每服三錢。早晚白湯調下。○治（呂而康方）五泄五利。大便不實。用白茯苓一兩二錢。豬苓。澤瀉。麥芽。穀芽。防風。陳皮。升麻。各六錢。白芍藥四錢。俱炒燥。分作六劑。水煎服。內熱者。本方每劑加黃連八分。黃芩一錢。俱酒炒。內寒者。加補骨脂炒一錢。木香八分。內虛者。加人參二錢。白朮炒一錢。內實者。加麩炒枳實二錢五分。紅麴三錢。

○續補集方。治（許國方）心神不定。時復振跳。恍惚健忘。情緒不樂

水不上升，火不下降，常服消陰養火，保全心氣，用白茯苓二兩，沉香五錢，人參六錢，共爲末，煉蜜丸小豆大，每服五十丸，白湯下。○（證治要訣）治陰神虛耗，出心汗者，別處無汗，獨心孔有汗一片，此由思慮勞心過多，用白茯苓、人參各等分，共爲末，每服一錢，煎蘄艾湯調下。○（直指方）治心虛夢泄，或白濁者，用白茯苓爲細末，每服二錢，米湯調下。○（局方）治男子遺精白濁，小便後餘瀝常流，并夢寐多驚，頻頻遺泄，及婦人白淫白帶，穢水不淨，並皆治之，用白茯苓八兩，去皮，切作塊如圍棋子大，豬苓三兩，切片，用湯五碗同煮二三十沸，取出日乾，揀去豬苓，以茯苓爲末，用黃蠟溶化爲丸如彈子大，每早嚼一丸，空心津下，以小

便清爲度，忌米醋。○（三因方）治小便頻多不禁，并五淋白濁諸證，用白茯苓八兩，爲末，以新汲水挼洗去筋，日乾，乾山藥四兩，切碎，以白礬一錢泡湯浸一晝夜，日乾，共爲末，以熟地黃八兩，酒煮搗爛成膏，爲丸如彈子大，每早晚各食前嚼化一丸，米湯送下。○（濟生方）治水腫尿澀，用白茯苓皮、花椒子，煎湯，日日代茶飲，半月效。○（姚僧集驗方）治面上雀斑，用白茯苓末，蜜和，夜夜傅之，一月全愈。

治一人病遺精，聞婦人聲即泄，瘠甚欲死，醫告術窮，仲淳以茯苓、遠志、蓮鬚、石蓮子各二兩，沙苑蒺藜三兩炒，牡蠣一兩火煆，魚膠四兩切碎火焙，共爲末，煉蜜丸梧桐子大，每早晚各食前服五錢，白湯下。

琥珀，味甘，氣平，無毒。陽中之陰，降也。入手少陰、太陽、足厥陰經。

（別錄曰：琥珀生永昌舶上。寇氏曰：今西戎、高麗、海南諸倭國皆有。即松木榮盛時，脂流入土，千歲淪結所成也。中有蜂蠅蟻之類，形色如生，此因炎日所灼，脂流出時，諸蟲粘住，漸流漸結，內裹而成。甯氏曰：珀不一種，有象物珀，內有物形，即前蜂蠅之類；有血珀，深紅如血色；有赤松珀，滿大而脆，文理背錯；有水珀，淺黃色，多皺文；有石珀，深黃色，重如石；有花珀，文如新馬之尾松心，而黃白相間。凡諸木有脂者，入土千歲，皆能化珀，研末燒之，即有木氣，自知也。別有一種蜜蠟珀，臭之有蜜蠟香，色黃白，即深山野蜂蜜入土所化。今蹈滴山中銅多文。一種楓脂珀，燒之有楓木氣，即楓木脂所化也。入藥惟取松脂血珀，體輕者良。江元之云：薛立齋入禁內視疾，　孝宗賜枕珀，其色紅如霞，可知年久松脂入土亦能成珀。縱使樹雖枯，脂入地，自能成珀。惟東南海外諸木脂化珀者有之，西北方無有也。今市中有僞者，以雞蛋黃煮餅成，或青魚枕骨造成（[illegible]）珀也，宜細辨之。）

○琥珀鎮定心神，澄清濁氣，行逐瘀血之藥也。此得松木

清氣所結，精英所聚，質堅如石，體輕如樗。原其清明瑩潔之相，故大氏方治心氣浮越，躁亂不寧，以致失神喪志，魂魄不定，或驚悸怔忡，癲癇昏塞，或魘寐陰邪，鬼魅憑附。他如瘀血敗穢，留滯經絡，或目珠翳障，或腹胃癥瘕，或小便淋閉，結塞不通，此藥如神明在躬，莫安神室，故驚狂可定，如曉霞秋露，清淨無涔。故瘀血、癥瘕、目翳、淋閉諸證可退矣。但體質輕清，而性多燥，如血少陰虛，腎虧髓乏，以致水涸火炎，小便不通者，服之反滋燥渴之苦，用者審之。

李士材先生曰：琥珀感土木之氣，而兼火化者也。色赤味甘，有艮止之義，故能安神而斂魂魄。體輕滲利，有

注之象。故能行血而利小便。

許繼心先生曰、琥珀與茯苓皆自松出。而所禀所治各異。茯苓生于陰、而成于陽。琥珀生于陽而成于陰。茯苓所生日淺。但可治氣而安神。琥珀所禀日深、兼可治血而又鎮心神。化小腸氣也。

○集方（御眷毛鎮南傳五經署）治心虚有熱。神志不寧、若癲若癇。如癡如醉。或似神鬼憑附、或似妖邪牽絆。此藥並能治之。用血色琥珀三錢。以厚布包裹、以重斧錘擊碎。布損、再易新布再擊成碎小塊。用滾水泡蒸一時。入鐵碾內、研爲細末。茯苓、石菖蒲、川貝母、甘草、膽星、天竺黃各三錢。珍珠一錢。俱炒黃緩緩研爲細末。丹砂研細。一錢五分。眞牛黃七分。

眞冰片五分。俱研細。逼共十一味。總和。以乳鉢內再研二千轉。入淨磁罐內收貯。每有是患、五更早晚。一日三次。每次用一分。以燈心、生薑泡湯調服。或人參、生薑泡湯亦可。○治產後（保產齋方）惡血、內阻不行。胸腹脹滿、危在旦夕。用琥珀一兩。（製法同前）火硝、硫黃各一兩二錢。此二味俱研細。用米醋一碗、將硝、硫二味、入磁罐內、隔湯蒸。以醋乾爲度。和琥珀末、再總研極細。五靈脂、酒浸、淘去砂石。淨脂晒乾。二兩。乳香、沒藥各八錢。瓦上焙出油。同五靈脂共研細。恐粘乳鉢、和火酒一鍾共研、則不粘。研勻。和入琥珀、硝、硫末子。再研勻。用成丸藥。如彈子大。每遇此患。用淡薑湯化服一丸。重者不過三丸。即愈。此方不惟治產後瘀血。凡癥瘕蠱脹、及跌打損傷、內有瘀血者、亦宜服。○治跌撲損傷（外臺秘要）、及從高墜下、有瘀血在內。用琥珀末、二錢。大黃末、一錢。和勻。酒調服。○治金瘡（鬼遺方）出血不止、悶絕不知人事。用琥珀末、一錢。童便調服。外以琥珀末、和赤石脂末、各等分。敷之血即止。○治小兒胎驚（直指方）。用琥珀末五分。丹砂、二分五釐。共和勻。用乳汁調數匙。入口中。○治小兒胎癇（明指方）。用琥珀末、丹砂末、研極細。各五分。全蠍一箇。研極細。和勻。麥門冬湯調服數匙。入口中。○治目（姚氏）中生翳（三因方）。以琥珀末、珍珠末、嫩滑石、各等分。研極細末。點眼數日翳退。○治小便砂石（聖惠方）、諸淋、并小便不通、轉胞脹滿而痛者。用眞琥珀六錢（製法如前）。爲末。葱白廿莖。水五碗

煎三碗。取葱湯調珀末三錢。服之。重者不過三服效。○治產後（[illegible]集本草）血暈悶絕。或惡血凝脹、并癥瘕氣塊。及兒枕痛並宜服之。用眞血琥珀（製法如前）、鼈甲、用火燒酒淬、京三稜、玄胡索、俱酒洗炒。各一兩。眞沒藥、眞乳香、俱瓦上焙出油各八錢。大黃、酒煮、六錢。俱研細爲末。每服三錢。空心好酒調下。間日再服。神驗莫及。一方不用大黃。○宋高祖（陳氏方）時、寧州貢琥珀枕。碎之。賜軍士敷金瘡。立時止血生肌。

豬苓。味甘淡，微苦，氣平，無毒。氣味俱薄，降也，陽中陰也。入足太陽、足少陰經。

（別錄曰：豬苓生衡山山谷，及濟陰宛句。大楓樹下今所在楓樹亦有之。生堀零然，形如豬屎，故名。皮黑肉白堅實者佳。修治以銅刀刮去粗黑皮，淨水浸一夜，取出切片，曬乾用。李氏曰：豬苓亦是木之餘氣所結，如松之餘氣結茯苓之義。生于諸木根底，他木皆有。不定楓木爲有，但楓木根底生者爲多耳。）

○豬苓，滲濕氣，利水道，分解陰陽（李時珍）之的藥也。此藥（今月恒稿）味甘淡，微苦，雖下降而升，淡又能滲利走散，升而能降，降而能升，故善開腠理，分理表陽裏陰之氣，而利小便。故前古主痎瘧，解蠱毒。甄氏方。主傷寒溫疫大熱，能發汗逐邪，此分利表陽之氣于外也。張氏方。主腹滿腫脹急痛，心中懊憹，痢疾瀉，此分利裏陰之氣于內也。張仲景治太陽病，脉浮，發熱，消渴，而小便不利者，用五苓散，以發其汗。病消渴，欲飲水，而復吐水者，名爲水逆，用五苓散以止其吐。冬時寒嗽，兼寒熱如瘧狀者，名爲痰瘧，用五苓散以定其嗽。此三法俱重在豬苓，開達腠理，分利陰陽之妙用也。又繆氏方，單重前古神農氏主痎瘧立意云：瘧必由暑，暑必兼濕。此藥淡以利竅，引暑濕之氣上從腠理出，下從小便出，所以善解散而分消之也。又推淡滲之性，而利水道，故小便癃閉可通，身面腫脹可退，濕熱痞滿可除。解利之用，無如此快，但利水之功居多，分泄太甚。病人無水濕病者，忌之。腎虛津液燥乏者，亦忌之。

盧子由先生曰：苓曰豬苓，形相似耳。豬爲水畜，苓即木令。自上而下者，使之自下而上；自下而上者，使之自上而下。痎瘧則木鬱，蠱瘧則土鬱，腫脹、癃閉則水鬱。木鬱則達之，土鬱則奪之，水鬱則折之。豬苓兼而有也。轉氣化之機衡，故爾。（張石峯曰：世知行水，未知折木，併鏈耕鄉土盧公之言，實發先秘。）

○集方，治（秘究竹方）痎瘧不分新久，用豬苓一兩，茯苓五錢，柴胡四錢，半夏三錢，甘草一錢，生薑三片，大棗二枚，水三碗，煎一碗。未發前服，渣再煎，發後服。頭疼，加羌活；熱多，加知母；寒多，加桂枝、乾薑；煩渴，加天花粉、滑石；渴甚，加麥門冬；腹脹，加檳榔、厚樸；無汗，加葛根；汗多，加白芍藥；有食，加枳實、蘿蔔子；有痰，加蒼朮、白芥子；氣喘，加杏仁、蘇子；大便熱閉，加蔞仁、酒製大黃；精神疲憊，元氣虛乏，加人參、黃耆、白朮、當歸；嘔吐，加砂仁；遍身骨節痛，加秦艽、紅花；發久不止，加木瓜、牛膝、人參、白朮；腹中生瘧母，加桃仁、鼈甲、花椒、莪朮、附子、川黃連；腸中有停飲，加芫花、吳茱萸、木香、薑汁製南星。加減法，分兩多寡，隨病增用。

○治（醫林小品）蠱脹，腹脹痛，面黃體瘦。用豬苓一兩，燈心五十莖，水二碗，煎一碗服。

○治（郭氏方）傷寒溫疫，大熱大渴，無汗而小便不利，或自利者，用豬苓一兩，茯苓三錢，澤瀉二錢，白朮一錢，甘草五分，水煎服。

○治（張元素方）腹滿腫脹急痛，心中懊憹。用豬苓一兩，車前子、去殼三錢，蔞仁二錢，枳實一錢，陳皮八分，水煎服。

○治（張元素方）時行瘴瘧、瘴痢、瘴瀉。（山谷風濕嵐霧之氣，）

（人感之。不論傷寒瘧痢與泄瀉。兼發熱頭痛。胸滿不食。大小同病。名曰瘴邪。病在太陰。）用豬苓二兩，茯苓、紫蘇葉各五錢，蒼朮、厚樸各三錢，生薑五片，水六碗煎三碗。有是患者，俱可服之。○治小便癃閉不通，（外臺秘要）用豬苓一兩，茯苓、澤瀉各五錢，滑石二錢，真阿膠三錢，水煎服。○治通身腫滿，小便不利，（楊氏產乳方）用豬苓四兩，為末，每用五錢，白湯調服，日三次。○治腹滿，內有痞結者，（林氏方）用豬苓二兩，茯苓、白朮、枳實、砂仁各一兩五錢，為末，每用五錢，白湯調服，日三次。

治脾胃不和，水穀不化，陰陽不分，腹痛泄瀉，名胃苓湯。用豬苓、澤瀉、白朮、茯苓各二錢，肉桂七分，蒼朮、厚朴、陳皮各一錢五分，甘草六分，加生薑三片、黑棗二個，水煎服。○如水瀉，加滑石一錢。○暴痢赤白相雜，腹痛裏急後重，去桂，加木香、檳榔、黃連各一錢。○久瀉不止，加升麻、人參各一錢。○濕勝，加防風、升麻各一錢。○食積，加枳實、麥芽、神麴。○口渴，加葛根一錢五分。

治腹中痛，一陣瀉，一陣後去，如湯，後重如滯，或瀉下黃色，小水短赤，煩渴引飲，是火瀉熱瀉也，以四苓散加味方。用豬苓二錢，澤瀉、茯苓、白朮各一錢，黃連、黃芩、黑山梔、白芍藥各一錢二分，滑石、甘草各二錢，水煎服。○腹中作脹，加枳殼、厚朴各一錢。○腹痛，加砂仁、山查各一錢。○嘔逆惡心，加藿香、半夏各一錢。○小水短少，加木通、車前各一錢。瀉多不止，加人參一錢，肉豆蔻、烏梅各一錢。○瀉多元氣虛脫，加人參、黃耆、乾薑，去芩、連、梔、滑。

雷丸，味苦鹹，氣寒，有小毒。氣薄味厚，陰也，降也。入手足陽明經。

（別錄曰：雷丸生石城山谷及漢中，今建平、宜都、房州、金州諸處亦有。蘇氏曰：生竹林土中，乃竹之餘氣所成也。無苗蔓，狀如栗，紫黑相雜，不相連屬，又如豬苓而圓，皮黑肉白，甚堅實。八月采。雷氏曰：修治用甘草水浸一夜，銅刀刮去黑皮，切作四五片，以甘草水再浸一夜，晒乾用。如赤色者，能殺人，宜揀去之。）

○雷丸去蠱毒，（別錄）殺諸蟲之藥也。（本經）夫人腸胃有濕熱之氣，（大明）能令蟲生。此藥苦寒善逐，能去濕熱而破一切蟲積。又研細作膏，敷腹上，治小兒百病。觀夫小兒百病，則知食物停滯，停滯必生濕熱，濕熱必致百病。此藥破蟲攻積，一理而已。前古言利丈夫，不利女子。利乃疏利元氣之利，非補養利益之利也。故別錄有云：久服令人陰痿，正見其過于苦寒偏至之氣耳。除蟲積蠱毒之外，亦無他用。如病蟲積日久，脾胃衰憊者，亦禁用之。

○集方：（以下方氏經驗）治寸白蟲，用雷丸水浸去皮，切焙為末，五更初先食炙肉少許，以稀粥湯調服一錢，須上半月服，蟲乃下。○治小兒疳蚘，用雷丸、蕪荑、使君子、五穀蟲、蘆薈、胡黃連各等分，為末，砂糖湯調服一錢。○治腸胃一切蟲積，用雷丸、檳榔、鶴虱、楝根、貫衆、錫灰、薏苡根各等分，每服一錢，空心砂糖湯調下。

桑上寄生　味苦微甘，氣溫，無毒。陽中之陰，可升可降。通行手足陰陽十二經。

（別錄曰：桑上寄生，弘農山谷桑樹上。其他木如松檜柳楝櫸楓桃楊等樹上，間或亦有寄生，形類相似，氣性不同，服之反有毒。求此藥須得自行親督人采，或買服，惟根間連桑木者方眞。寇氏曰：近海州邑及海外之境，地暖不蠶，桑無采捋之處，氣厚意濃，乘氣而生，葉如橘而軟厚，莖如槐而肥脆，三四月作黃白花，六七月結黃綠實，大如小豆，汁稠粘，或斷莖視之，色深黃者佳。秋終采。雷氏曰：修治，根莖枝葉。一一揀用，用銅刀切細，陰乾，不可見火。此藥難得眞者，若以他木寄生者充之，不惟氣性不同，且反生毒害。○或一說，此藥是鳥食他草子木實，零落桑上而生，而寇氏非之曰：如此則麥當生麥，穀當生穀，草子木實當生草與木矣，不當生此一物也。○又按鄭樵云：桑上寄生有兩種，一種大者，葉如石榴葉。一種小者，葉如麻黃葉，其實與子皆相似。）

○桑上寄生，益血脈，養筋骨，安胎娠，去痺痛之藥也。此得桑木清英之氣，附結而生，故功用比桑尤勝。桑能清氣，

而此藥能養氣之精；桑能益血，而此藥能養血之精；桑○能去風，潤筋骨，而此藥能驅風濕，健筋骨，而利機關，補骨髓之精也。故別錄主婦人崩中下血，脹滿淋帶，及產後一切腹內諸疾；治男子臂膊腰膝，流注疼痛，及一切痿痺不用諸疾；又小兒背強，難以俛仰，娠婦腹痛，坐臥不寧，統能治之。而繆氏詮註曰：桑寄生益血脈，潤經絡，安胎娠，去風濕，不寒不燥，不滑不利，有和營衛，安內外之功焉。如他書又云消癰腫，堅齒牙，潤皮膚，長鬚髮等語，此又是益血脈，潤筋骨之餘力耳，合滋補血氣藥用，取効最神。

繆仲淳先生曰：此藥寄生桑上，故常主形骸寄生之胎，寄生之癰腫，寄生之齒牙鬚髮，能安之，消之，堅之，長之。其功獨著者，治腰痛，治背強，治臂膝上下筋骨流痛者，以形類孱聯纏絆桑木，相似筋脈之循行連絡，以類相應，故痛可止，強可柔，筋骨上下屈伸不利者，可療之也。

○集方（西醫李赤川傳）治血脈衰耗，骨髓虛乏之後，感風濕，乘虛侵于腠理；或先感風濕，以致留滯血脈，耗涸骨髓，漸成痿痺，手足不遂，臂膊腰膝疼痛，用眞桑上寄生、牛膝、木瓜各四兩，俱酒炒；羌活、防風、川萆薢、川石斛、川芎、秦艽、蒼朮各一兩，俱鹽水炒；白朮、黃耆、當歸各二兩，俱酒炒；肉桂、黃柏、薑黃各一兩五錢，海桐皮、石楠葉、五加皮各一兩八錢。

俱醋炒；虎骨五兩，酒炙酥；香附子一兩五錢，童便炒；白花蛇三條，乾者，切碎，酒炒；依方製炒，俱研為末，煉蜜丸梧子大，每早服五錢，晚服三錢，俱白湯下。（[illegible]方）一方加全蝎十五箇，酒洗炒，研入。○治婦人崩中下血，脹滿淋帶，及產後一切腹內諸疾，用眞桑上寄生、懷熟地、丹參各三錢，當歸身二錢，川芎、白芍藥各一錢五分，眞阿膠一錢，（梁儕方）水二碗，煎八分，不拘時服，十劑愈。○治男子風濕流注，臂膊腰膝疼痛，及一切手足痿痺不用諸疾，用眞桑上寄生四兩，牛膝三兩，俱酒洗；蒼朮米泔水浸一夜，炒；當歸，酒炒，各二兩；肉桂一兩，炒；川烏五錢，童便製過；草烏三錢，酒浸一夜，炒；共為末，每早飯後服三錢，白湯調

服。○（猪氏方）治小兒背强難以俛仰，無他疾者，用眞桑上寄生二兩，白朮、當歸各三兩，鼈甲一觔，用滚湯泡洗淨，用水一斗，四味共煎至一升，其渣再用水七升，煎至七合，二次汁總和一處，入砂鍋内慢火熬如飴，加煉蜜二兩收之，每日不拘時，用米湯調服數茶匙。如兼有熱疳者，加胡黃連五錢。○（産寳方）治妊娠腹痛，坐卧不寧，用眞桑上寄生二錢，當歸一錢五分，川芎、阿膠、杜仲、川續斷、白芍藥各一錢二分，砂仁殼、白朮各一錢，黑棗三箇，生薑二片，水煎服。

松上寄生（即女蘿）味苦，微甘，氣平，無毒。

（別錄曰：松上寄生，名松蘿，生熊耳山谷松樹上。山東甚多。雜樹上亦有，惟取松寄者入藥。李氏曰：按毛萇詩注云：松蘿即女蘿，又名菟絲也。陸氏言菟絲蔓生草上，非松蘿也。松蘿蔓延松上，枝葉似木，色正青，與菟絲蔓生草上，色赤莖細，殊異。然二物附物而生，有時相結，故古樂府云：南山羃羃菟絲花，北陵青青女蘿樹。由來花葉同一心，今日枝條分兩處。唐樂府云：菟絲故無情，隨風任顛倒。誰使女蘿枝，而來强縈抱。據此二說，則女蘿之爲松上蔓，菟絲爲草上蔓，陸氏之說爲的矣。）

○松上寄生，散頭風頭痛、風痰風癖之藥也。別錄方：治時行温瘧，痰瘧寒熱頭眩諸疾，用松上寄生二兩，半夏五錢，瓜蒂六枚，水煎探吐。又千金方：治胸膈痰癖積熱，用松上寄生一兩，瓜蒂十二枚，甘草五錢，酒水各三碗，煎一碗，分三服，取吐。如胃虚弱者，勿服。

木部（苞木類）

竹類不一種，味有苦，有甘，有辛，氣有温，有寒，俱無毒。

（陶隱居曰：竹類繁多，入藥惟用篁竹，次用淡苦二竹。又一種薄殼者，名甘竹，其葉最勝。蘇氏曰：按竹譜，篁竹堅而促節，體圓質勁，皮白如霜，大者宜刻船，細者可爲笛。苦竹有白有紫。甘竹似篁而茂，亦名淡竹也。李氏曰：竹惟江河之南甚多，故曰九河鮮有，五嶺實繁。大抵皆土中苞筍，各以時出，旬日落籜成竹也。莖有節，節有枝，枝又有節，節有葉。葉必三之，枝必兩之。根下之枝，一爲雄，二爲雌，雌者孕筍成竹。根鞭喜行東南，六十年一花，花實則枯。枯曰箹，實曰復，小曰篠，大曰簜。按戴凱之竹譜云：植物之中，有名曰竹，不剛不柔，非艸非木，小異實虛，大同節目。蓋種類甚繁。○倪朱謨曰：按休寧方築水、錢塘盧不遠兩先生集竹類有名有用，與有名未用，及切譜與筍竹搜之旁內外各書，共得一百二十種。曰籦龍竹，昔黃帝使伶倫伐于崑崙之墟，吹以應律者。曰員丘帝俊竹，節可爲船。曰箭竹，肌薄而勁。曰篁竹，節促而堅。曰棘竹，十數莖叢生，大者有二尺圍，肉至厚，中實，出交州諸郡，夷人破以爲弓，其笋食之，落鬚髮。曰單竹，大者如腕，虛細長爽，南人取其笋未成竹者，灰煮績以爲

布。曰弓竹，出東垂諸山中，長千餘丈，長且軟，不能挺立。曰蘇麻竹，斑駁如畫，明長數丈，葉大如履，裁可以爲弓，竹中可愛者，五嶺左右徧有之。曰棘竹，竹葉薄而廣，吳都賦所謂竹則篔簹、箖箊、節蓬、女試、劍竹是也。偃枝是其中最細者。曰筭竹，生崑崙之北，南嶽之山，長百丈，斷節可爲大船。曰服傷竹，大者五六寸，其中實滿白筆。摩竹，大者荼盤，尾而空，水見枯驗，皆有見，勞表縣曰筋竹，又名䈄竹，長三丈許，圍數寸，至堅利，可以爲矛，亦可作弩弓弦，其笋未成竹時，堆爲絲。曰篣竹，又名百葉竹，一枝百葉，生南垂界，甚有毒，觸其鋒刺，傷人必死。曰懸篃竹，爲莖叢生，見吳郡賦。曰篠竹，一叢二種，似苦竹而細軟，肌薄。曰䈽竹，其大，肌薄色白，生江南深谷中。曰簡質竹，節疎而笋可食。曰羅漢竹，似厚，大者不過如指，柴疎皮黃。曰蘆竹，似蘆，出揚州東垂，肌理勻淨，可以爲篾。曰簫竹，高者不過一丈，節間三尺，堅勁，中矢。曰箘簵一竹，亦皆中矢。曰箭竹，一尺數節，亦可作矢，葉大如扇，俗謂之篛竹，可以作篷。曰剃竹，若箭，可作箭。曰莽竹，節疎。曰都竹，中堅。曰篣竹，中空。曰伯竹，竹無笐，作孔。爾雅曰：桃枝竹，皮滑而黃，可以爲席。曰篔竹，質厚，號孔小，獲于實中，安成以南有之。曰桃竹，生江心礁石間，中實，節下可以爲杖。曰利竹，蔓生若藤，亦實而堅韌。曰淚竹，大者二節容一斛，小者容數升。曰斑條竹，大如腳指，頭角皮未落

往往有細蟲嚙之篠隕成赤文似繡畫可愛曰木竹出霧隱山中堅實通節脉曰蓀菜竹生于海南肉實外堅曰龍芽竹其竹長四五尺佛龕人取必有大風雨雷震入下山則止出永嘉大雞山內芳竹有刺閩繞之芒刺華然一脉不能入出新州石城宋紹興中州守見于東處植之曰蘆勤竹有芒可以剉爪甲老學菴筆記門縣梧竹長三四丈圍一尺八九寸可作屋柱出交阯曰背竹頭有文曰狗竹毛在節間見臨海異物志曰無節竹色如黃金堅貞疎節出嶺南見竺法真羅山疏曰石麻竹勁利可爲刀見裴淵廣州記曰苞竹堪作布見顧微廣州記曰實心竹文彩斑駁可爲器物曰垂絲竹枝弱下垂見雲南記曰對青竹黃而兼青成都所出今兩浙亦有之惟會稽頗多呼爲黃金間碧曰猴竹如苦竹長節而薄可作屋椽曰篗竹皮青肉白如雪軟韌可爲筏索曰三稜竹狀若椶櫚葉莖梢三脊曰玉泉竹葉有徑葉蘗不同佩之可以避蟲出陝州玉泉鬼谷于詞前見宋陳曰華項碎錄曰扁竹出鹽山善辟蛇行者手持北竹筍出亦區曰相述竹內空生黃堪作藥曰鱗竹內空可容米三升亦生黃俱出廣州曰新婦竹圓而直可作篁出武林曰疎節竹五六尺一節出高潘州見通志曰通竹空心直上無節出溱州見北戶錄曰筌竹大者圓二尺出桂陽縣曰棘竹中實有毒以刺虎中之即死出

交阯見山海經注曰龍絲竹高數尺細如針出辰州曰對竹葉斜結如蟲狀又名蚱蜢竹見清異錄曰叢管竹圍數其于他處叢篁堅而促節皮白如雪粉出嵩溪縣慈姥山曰産斤竹每月生笋出蜀嘉定曰雲母竹出扶南曰舜林竹見山海經此二竹廣大每一節皆可爲船曰縣陽竹若芭蕉狀曰黎母竹每丈一節曰人面竹有節一覆一仰如畫人面曰雪竹斑極大紅而有暈出廣西曰相思竹對抽並胤出蜀涪州曰苦竹出安思縣有青白紫黃四色曰天親竹末皆兩岐出浙中曰龍頭竹生若龍頭出成都府彭縣大隋山曰雙梢竹又名合歡竹初生枝葉即分兩梢出九嶷山曰荻蘆竹其竹似蘆荻冬天不凋曰鶴膝竹節下大小似鶴膝閩人又呼爲槌竹曰石癰竹似石竹而小生閩中曰苦散竹節似馬鞭葉似栟樹而小皮似椶櫚曰簕竹長七十丈只梢上有葉出襄州臥龍山諸葛亮祠中曰簹竹長百丈圍二丈五尺厚一尺可以爲船出南方荒中見神異經曰篛竹又名太極竹可以爲船曰觀音竹如藤長一丈七八尺色黑如鐵出古城國曰公孫竹高不盈尺出會稽縣曰越王竹狀若荻枝可代酒籌產越州又有沙箭竹欲採者輕步從之聞人聲則縮入沙中曰龍公竹大徑七八尺常有異鳥栖宿出羅浮山曰炎羅竹圍三四尺性堅可爲弓產增城縣倪山曰奉化縣新嶺山生竹高僅五

寸葉皆白色曰清江縣瑞竹山有竹色如爛銀一說係出齊民要術曰蕪竹皮黑有文斑節紫色子如大珠曰桂竹上合防露下疎來風勿日出雜統金翠望若花閒郭璞云出始興小桂縣又山經云雲山有一種桂竹狀若甘竹而皮赤甚毒傷人必死曰方竹形方葛仙植于定海靈峯者見寧波府誌又方竹體如削成勁挺堪爲杖產澄州見北戶錄又益部方物誌有方竹賛又澧州西游川鐵冶辰山產方竹又隔州亦出方竹長者數丈曰黑竹長二尺許如指大純黑色斑玄碧出西山見文從明太史墨竹銘又蘄水縣鳳棲山下有黑色小竹俗云王羲之洗筆池崖時出也曰丹竹每節一丈或八尺蓬不大裊裊搖空紛節上紋有赤色產道州瀧中見背識又紅竹大不過寸許鮮明可愛產宜都縣飛魚口曰赤竹產黔陽縣赤竹剛脆韻斜鬚而叢生者曰旋波竹紫莖綠葉花如石榴實如蓮子出居吳山筵如廣誌有種龍竹獅竹吳越春秋有習竹齊民要術有節竹杜臺獅非賦有桄榔竹身赤國有節竹漢書張騫至大宛得狹竹南方草木狀越漢陽有錫萃竹又異物誌云南方思勞國有葱勞竹又某處罽賓有篔竹玄倭國有篠幹竹少室山有爨器竹又篷山有浮筠竹又梧竹可作屋桂以上十四竹搜之名山書集中其形色未詳姑存此以便博物學士採擇用之又有似竹非竹而異名者曰

[illegible]曰樓偏曰夾竹桃等叢別類也

篁竹葉、淡竹葉、甘竹葉、苦竹葉、四種味雖不同。氣皆寒平。

俱氣薄味厚。陰中微陽。降也。俱入手少陰、足陽明經。

○竹葉、肅清氣分。涼心胃邪熱之藥也。（孫泌池）故仲景入白虎湯（林次崖稿）中。解傷寒內熱。津液乾枯。定虛熱凌心。煩躁不寐。導膀胱火鬱。淋閉赤澀。入藥惟取甘竹、淡竹之葉。假此寒涼清肅之性。使熱可降。液可生。痰可消。而大火煩渴之病可自已也。如胃寒有冷飲者。停食者。俱忌用之。

竹茹、味甘。氣寒。無毒。入足陽明胃經。

（陳氏曰、取大竹削去面上青色皮、取向裏黃皮是也。）

○竹茹清熱化痰。下氣止呃之藥也。（張卿）如前古治肺胃熱甚。（王宇泰）

欬逆上氣。喘嗽寒熱。及血溢崩中。諸證。此藥甘寒。而降善除陽明一切火熱痰氣為疾（緣喘嗽寒熱吐血崩中皆火熱客于陽明所致）用之立安。如諸病非因胃熱者。勿用。

竹瀝味甘。氣寒。無毒。可升可降。通手足陰陽十二經。行部經別絡。

陳氏曰。取大竹對劈開。留節居中。於無節處橫截段竹片仰放。兩頭用磚石架起。中節間用炭火烘逼。瀝從兩頭流出。以磁碗盛接。或沖入藥內服。或純用瀝。少加生薑汁一二匙服。無寒胃之弊。

○竹瀝利竅滑痰。通經走絡之藥也。故古方主暴中風痰。猝然僵仆。人事昏塞。偏痺不仁。及傷寒大熱。津液乾枯。煩渴昏悶。或產後陰虛發熱。口噤失音。并小兒驚風天弔。四肢搐搦。並皆治之。此藥甘寒而潤。性滑而利。開關豁痰。走經絡。搜剔一切痰結。火結。氣結為病。下咽即癒。如服用。必加薑汁數匙。凡諸病果屬風火燥熱者。宜用之。若寒痰濕痰及一切飲食停滯生痰。非所宜也。

本草衍義云。竹瀝行痰。通達上下。百骸毛竅諸處。如痰在巔頂。可降。痰在胸膈。可開。痰在四肢。可散。痰在藏府經絡。可利。痰在皮裏膜外。可行。又如癲癇狂亂。風熱發痙者。可定。痰厥失音。人事昏迷者。可省。為痰家之聖劑也。

盧子由先生曰。冬半而孕。春半而生。夏半代葉。秋半引根枝。必偶葉。必三。中空直上。具水火之象。故筍可發瘡。瀝通經脈。茹主嘔噦。葉清煩熱。皆透達水火之所不及者也。

○集方（仲景方）治傷寒陽明內熱煩燥不寐。枯渴引飲。用竹葉五十片。石膏三錢。知母二錢。甘草一錢。水煎服。○（小品方）治膀胱火鬱。小便不通。及淋閉便澀。用竹葉五十片。甘草一錢。滑石一錢五分。車前子三錢。白茯苓二錢。小薊根四錢。水煎服。○（仲景方）治傷寒陽明少陽傳邪熱病。身熱煩渴。自汗作嘔。或作呃者。用竹茹三錢。川黃連一錢。黃芩。知母。半夏各一錢五分。天花粉二錢。有食加枳實。腹脹加厚樸。泄瀉加豬苓。茯苓。元虛加人參。俱各一錢。水煎服。○治（經驗良方）暴中風痰。卒然僵仆。人事昏塞。偏痺不仁。用竹瀝一鍾。加生薑汁五匙。再用陳皮。半夏。茯苓各一錢。甘草五分。

石菖蒲一錢五分。肉桂。膽星各三錢。水煎。沖入竹瀝內服。○（玉函方）治傷寒大熱。津液乾枯。煩渴昏悶。用竹瀝一鍾。加生薑汁五匙。再用柴胡。知母。天花粉。川黃連。白芥子。川貝母各一錢。甘草五分。水煎。沖入竹瀝內服。○（婦人良方）治產後陰虛發熱。口噤失音。用竹瀝一鍾。加生薑汁五匙。再用當歸身。炮薑各三錢。川芎一錢五分。白芍藥酒炒一錢二分。黑荊芥。益母葉各二錢。膽星一錢。茯苓八分。水煎沖入竹瀝內服。○（全幼心鑑）治小兒驚風天弔。四肢搐搦。用竹瀝一盞。加生薑汁三匙。膽星末五分。牛黃二釐。調服。○（梅師方）治破傷風。如發痙狀。項強口噤。殺人甚速。急取竹瀝二三升灌之。如卒難得。可取十數塊竹。燒取之。○（十全方）治小兒鵝

寒熱病，發狂譫語。用竹瀝半升，徐徐灌之。○治（附後）消渴尿多。用竹瀝恣飲，數日愈。○治（李絳手集）肺痿咳嗽，胸中吸吸，欬出涕唾痰涎，臭穢如膿。用竹瀝日服一合，日三五次。○治（古今錄驗）丹石毒發，頭眩耳鳴，恐懼不安。用竹瀝二三升頻頻飲之。

天竹黃 味甘，氣寒，無毒。入手少陰經。

（李氏曰：按吳僧贊寧云：天竹黃生天竺國，及南海鏞竹中。此竹極大，其內有黃，如黃土，著竹成片，係竹之津氣結成。今廣州等竹，相述竹亦有之，常見海南大竹內往往多有。今市家取諸骨燒灰造亂真，故宜細辨之。）

○天竹黃豁痰利竅，鎮驚安神之藥也。李氏曰：其氣味功用與竹瀝大同小異，第竹瀝性速，直通經絡，而有寒滑之功；竹黃性緩，清空解熱，而更有定驚安神之妙。故前

古治小兒驚風天弔，夜啼不眠，客忤痢瘧，及傷風痰閉，發熱氣促。入抱龍丸治嬰科驚痰要劑。如大人中風失音不語，入風痰藥中，亦屢奏效。此錢月坡獨得之見也。

盧不遠先生曰：植物之靈，凝結在中，故可入藏以治其結，性本空達，風火自平。

○集方：（錢乙小兒方）治小兒驚癇瘛瘲疾，有痰者，用真天竹黃五錢，膽星、鉤藤各一兩，川貝母、茯苓、犀角、琥珀、丹砂各三錢，甘草一錢，牛黃一分，俱研極細末，每服三分，用竹瀝半盞和薑汁一匙調服。虛者可用人參五分，泡湯同竹瀝用。○治（同上）小兒驚熱內實者，用天竹黃二錢，雄黃、牽牛末各一錢，川黃連五分，共研極細，神麯打糊丸（粟米大，每服三五丸，薄荷湯下）。

木部（雜木類）

古廁木 味鹹，氣寒，無毒。（此係糞窖中爛板也。）

（李氏曰：古廁木主治金瘡伏痰，跌瘟撲損，擔取此木燒烟，牀下熏之，可令風邪不入。）

古櫬板 味辛苦，氣寒，無毒。（此係古塚中棺板也，得杉材最良。千歲者通神，可作琴底。）

（陳氏曰：古櫬板治中惡鬼氣，疰忤，心腹痛，并多惡夢鬼怪，及為鬼神作祟者，用數寸，鋸薄片，和桃柳枝各三七，水煮飲，當即吐下愈。以鬼物而治鬼邪之疾，此同類相感也。又聖惠方治小兒夜啼不止，用杉板棺木燃燈照之，即止。）

雷震木（此係經雷所擊之木也。方士取刻符印，以召鬼神有驗。又博物志云：用此木擊鳥影，其鳥必自墮也。）

（陳氏曰：雷震木治暴驚失心，煮汁飲之立定。又掛門戶，大厭火災。）

服器部（服帛類）

故錦 味苦辛，氣溫，無毒。

（李氏曰：錦以五色絲織成，故字從帛從金，諧聲。兗州承能織文是也。）

故錦燒灰，能止血滲漏，故聖惠方主失血，吐血，下血，血崩，取錦灰（二錢），白湯調服，立止。又金瘡出血不止，取錦灰掩之，立住。又小兒臍濕生瘡，取錦灰敷之，即收。

黃絲絹 味甘，氣溫，無毒。

（李氏曰：絹，疏帛也。生曰絹，熟曰練。入藥用黃絲絹，乃蠶吐黃絲織成，非染色也。）

黃絲絹能解消渴，善止血痢。故蘋湖方治血虛消渴，用黃絲絹一尺，大黑棗三十箇，共煮汁飲。集簡方治血痢。

延久不愈，以黃絲絹一尺燒灰，研細，白湯調服。

布

（李氏曰：布有麻布、絲布、木綿布。字從手從巾，俗作佈。）

新麻布能逐瘀血，治婦人血閉腹痛，產後一切敗血為患，燒灰存性為末，好酒調服一錢。（陳氏方）〇舊麻布，同旱蓮草俱切碎，各等分，入小砂鍋內，填實，外用鹽滷和泥搪裹寸厚，陰乾，炭火內煅通紅，待冷取出，研末，日用擦齒，能堅固。（陳氏方）〇青木綿布治天行熱毒，小兒丹疹毒，寒熱頭痛，煮汁溫飲之。暑月絞腸沙腹痛，霍亂吐利，煩渴，煮汁冷飲之。又燒灰研末，敷一切惡瘡經年不收口，并灸瘡潰爛出血不收斂，並疥瘡。又（陳氏方）臁瘡潰爛臭穢難近者，用舊布十塊，裹陳艾五錢，雄黃末三錢，捲作火炷，點火薰之，內有熱水從瘡內流出，數次漸愈。

綿

（李氏曰：古之綿絮，乃蠶絲纏延者，今之綿絮則多木棉也。入藥仍用絲綿。）

新絲綿燒灰，（陳氏方）治五野雞病，酒調，每服二錢。〇衣中故絲綿絮治吐血、衄血、崩中下血、腸風瀉血，以二兩煮汁服

褌襠

（李氏曰：褌亦作裩，袴衣也。以渾當為之，故曰褌。其當隱處者為襠，縫合今名為襠。）

褌襠，（陳氏方）治陰陽易病，取褌襠裏布近隱處，煮汁飲。男病用女，女病用男。李瀕湖曰：按張仲景云：陰陽易病，身重少氣，腹裏急痛，或引陰中拘急，熱氣衝胸，頭重不欲舉眼，開眼時見眼花，膝脛拘急，用燒裩散主之。取中裩對隱處前後二寸，燒灰，白湯調服，作三次進，小便即利乃愈。男用女，女用男。成無己解云：此以導陰氣也。童女者尤良。

破漆器

（李氏曰：乃故舊破損漆器，（李氏方）剝取用之。）

治產後血暈，燒烟熏之即甦。又勞病垂危，放氣之頃，床前取舊漆器，火缸內燒之，尸蟲不敢出竅，不出竅則勞病必不再傳人也。

本草彙言卷之十二

錢塘　倪朱謨純宇甫選集　男倪洙龍沖之氏纂稿

沈公棻定白甫校正

金石部　金類

金箔　味辛。氣寒。有毒。入手少陰。足厥陰經。

按許慎說文云五金黃爲之長久埋不生衣百鍊不輕從革不違生於土故字從土金之所生出產多方具質不一陶氏曰有山金沙金土金石金木金其色不一有七青八黃九紫十赤以赤爲足色和銀者性柔試石則色青和銅者性硬試石則色紅蘄浙有產嶺南夷獠洞穴山中出生金如赤黑碎石礫屎之類梁益寧三州水沙中生金屑建平晉安生金沙出石中高麗扶南及西域外國出碎金沙五嶺內富賓澄三州及浙江溪河中皆產金居人多養鵝鴨取屎以淘金沙日得一錢或半錢有終日不獲一星者又荊州嶺南出馬蹄金象馬蹄最難得又橄欖金形似橄欖二金俱有毒須久煉熟方可佩服胯子金象帶胯出湖南北瓜子金大如瓜子麩金如麩片俱出湖南高麗江河水中沙中淘得其色淺黃又五溪滇江亦產麩金小者如麥又沙金細如沙屑出蜀中葉子金出雲南又顆塊金亦出雲南或角或尖山至百十丈始見紛金石定見金也其石得色一頭如火燒黑之狀其金色赤黃大者如指小者如麻豆或咬極軟又饒信南劍登州所出有若山石狀者若米豆粒者又黔南遂府吉州水中亦產麩金生金與黃金全別然山海經所說諸山產金然華夏荒夷不能備錄又大食國前蘭風川金最多夷人貨易並用金錢又外國六種金瀑丹金川丹實出儼合丹砂色尤赤北番世之寶也又波斯國紫磨金東夷所金林邑赤金西戎金占城金也地鏡圖云黃金之氣赤夜月中有大光及白鼠或云山中有薤下有金種凡金在冢墓內近尸氣者名屍金不宜入藥用寶藏論云金有二十類五類真金十五類假金如水銀金丹砂金雄黃金雌黃金硫黃金曾青金石綠金石碌金丹砂金白錫金黑鉛金俱用藥製成者又銅金生鐵金熟鐵金鍮石金俱用藥難成者已上十五種皆假金也又來沽金色淡西南金色淡赤土地所宜大都以黃赤紫色爲貴餘色少差也生金未經鍛煉者有毒發後入不可最食須久煉熟方可入藥有中金毒者煮鷓鴣鶴鳥肉食之乃解金性惡錫畏水銀得餘甘子則微柔亦物性相感也洗金以鹽骨或駱駝驢馬脂皆能柔亮有質玄遇鉛則碎遇翡翠石能分亦物性相制也凡用金箔入藥惟宜純赤者爲良方術家有又以致神仙之說豈知腐肉之毒術數爲補可能堪此金石重墜墜下之物久在腸胃乎又古人官家以黃金塞九竅則尸肉不朽壞況醫近於理然亦多者意矣

○金箔安心志。平肝氣。鎮驚狂。養魂魄。壯精神。除邪熱。和五藏。寧六府（別錄）爲至寶之神藥也（沈孔庭）。如小兒初生有患驚風。驚癇驚哭用此立效。嬰孩初生。精神血氣尚未安定。如遇少驚。即恐惕而夕亂。或癲癇而搐搦。與金爲天地間神足氣滿之物。使神安而心定。氣壯而心和矣。何有於驚傷等證之不可已乎。

繆仲醇先生曰。按太淸法云。金稟中宮陰己之氣。性本堅剛。而服之傷肌損骨乎。屢見今之以難欲求死者。服金屑一二分。則心腹刺痛。腸胃如裂而斃。其爲損傷肌骨。槩可見矣。惟作箔入藥。可爲鎮心安神之用。如或止因心氣虛。以致神魂不安。並無驚邪外入者。當以補心安神爲要。而非金箔所能定矣。

集方。治（如聖丹）中風不語。痰閉氣絕。并尸疰暗風。中熱瘟疫毒癘氣。或山嵐瘴蠱。中惡惡氣。陰陽二毒。或產後血暈。惡血攻心。煩躁氣喘。或口鼻出血。并難產吐逆悶亂。或胎死不下。諸疾又療傷寒伏熱。唇口乾燥。譫妄發狂。并諸病神鬼恍惚。頭目昏眩眠暝。不寧等證。用金箔。銀箔。二分。天竺黃。朱砂。雄黃。琥珀。各二錢。生烏犀角。生玳瑁。各六錢。麝香。冰片。各一錢。人參末。南星。各七錢。已上一

十三味。俱研極細末。再用眞安息香二兩五錢。研爲末以無灰酒攪澄。飛過。濾去泥土。大約得淨數一兩。共十三味。總和一處。拌勻。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每遇前項諸證。用五丸至七丸。以人參湯化下。又療小兒諸癇。急驚心熱。卒中客忤。不得安睡而煩躁者。如風涎搐搦。每一歲兒。服一丸。二歲三歲。服二丸三丸。並用生薑湯化下。如四五六七八九十餘歲。只以三丸爲率。○（和劑牛黃清心丸）治諸風瘈瘲不隨。語言蹇澁。心忪健忘。恍惚去來。頭目眩冒。胸中煩鬱。痰涎壅塞。精神昏憒。又治神志不定。驚恐畏怖。悲憂慘慼。虛煩少睡。喜怒不時。或發狂顛。神情昏亂等證。用金箔一千張。人參。麥門冬。去心。白芍藥。黃芩。當歸

身。防風。白朮各亚兩。川芎。茯苓。杏仁。去皮尖。蒲黃。山藥。甘草五錢。肉桂。柴胡。桔梗。各卌兩。阿膠。蛤粉拌炒。大豆黃卷。各卌兩五錢。牛黃八錢。羚羊角。烏犀角。各亗一兩六錢。神麴迺兩廾錢。麝香。冰片。各四錢。俱研爲極細末。煉蜜丸。每丸重一錢。如遇前項諸證。每服一丸。白湯化下。小兒減半。○（和劑紫雪）治內外煩熱。口舌生瘡。狂呼叫走。瘴疫毒癘。卒死。溫瘧。熱瘧。五尸。五疰。心腹疞刺。切痛。蠱毒。卒黃。小兒驚癇百病。一切野道熱毒。用黃金一百兩。石膏。寒水石。磁石。滑石。四味各三斤。搗碎。水一斛。煮至四斗。去滓。入犀角屑。羚羊角屑。青木香。搗碎。沉香。搗碎。各五兩。玄參。洗淨。搗碎。升麻。各一斤。甘草。炙。八兩。丁香。搗碎。一兩。已上八味。入前藥汁中。再煮。取一斗五升。去滓。入朴硝。精者十斤。消石四升。如闕芒硝亦得。每升重七兩七錢半。已上二味。入前藥汁中。微火上煎。柳木篦攪不住手。候有七升。投在木盆中。半日。欲凝。入麝香當門子一兩二錢。研。朱砂。水飛研三兩。已上二味。入前藥中。攪調令勻。寒之二日。右件藥成霜雪紫色。每服一錢或二錢。用冷水調下。大人小兒臨時以意加減。食後服。○（幼科鎮心丸）治小兒風壅痰熱。驚悸譫妄。心神不寧。用金銀箔各四片。遠志去心薑汁拌焙。雄黃。鐵粉。琥珀。各二錢。硃砂。水飛研。一錢。麝香一分。共爲細末。煮紅棗取肉爲丸。如梧桐子大。每服三五丸。用麥門冬煎湯化下。○治疔瘡拔根方。

用金箔研細。挑開疔瘡頭上。搽入。能拔疔根。作金針。針疔出。○（集驗方）治風眼爛弦。用金篦頭燒紅。掠上下瞼肉。日數次甚妙。○（外臺秘要）治齒牙風痛。用金花扦火燒。針痛處立止。○治梅瘡服輕粉後。口瘡齦爛。用金器煮湯。頻頻含漱。其結毒自解。○（本草衍義）治水銀入肉。令人筋攣。以金器烙熱熨之。水銀自漸出。吸入金器中。候金色白是也。

辟邪丹。治衝惡怪疾。及家間山精水狐。一切怪類。憑人爲患。用金箔二十片。（人參。茯苓。遠志。九節菖蒲。白朮。蒼朮。當歸。桃奴。即桃樹上乾枯不落者。十二月收者。連核用五錢。人參已下共十味。俱炒研爲末。再配雄黃。硃砂各二錢。麝香五分。牛黃三分。和勻。四味另研極細。和入藥內。煉蜜丸。如彈子大。金箔爲衣。臨臥時。木香湯化下一丸。諸邪怪自退。）

銀箔，味辛，氣平，有毒。入手少陰、足厥陰經。

陶隱居曰：銀與金生不同處，所在皆有，而以虢州者爲勝。蘇氏曰：銀在礦中，與銅相雜，土人采得，以鉛再三煎煉方成，故稱爲熟銀。若生銀，不自礦中出，而特然生者，如絲狀，土人謂之老翁鬚，極難得。方藥中用生銀，必得此乃真。今術家以硃砂而成，以鉛汞而成，以焦銅而成者，皆爲造也。李氏曰：閩、浙、荊湖、饒、信、廣、滇、貴州、交趾諸處山中皆產銀，有礦中煉出者，有沙土中煉出者，其生銀俗稱銀笋、銀牙者，所謂鉛坑中出，色褐，形如石，武如笋，打破則白，名曰自然芽，亦曰生鉐。此有變化之道也。地鏡圖云：山有野葱，下有生銀，銀之氣入夜色白，流散在地，其精變爲白雄雞。寶藏論云：銀有十七種，又外國四種：生銀，生石礦中，成片塊，大小不定，狀如硬錫；母砂銀，生五溪丹砂穴中，色理紅光；黑鉛銀，得母子之氣，此四種爲真銀。外有水銀銀、草砂銀、曾青銀、石綠銀、雌黃銀、雄黃銀、硫黃銀、膽礬銀、靈草銀，皆是以藥製成者；丹陽銀、銅銀、鐵銀、白錫銀，皆以藥點化者，十三種皆假銀也。外國有四種：新羅銀、波斯銀、林邑銀、雲南銀，並精好。

○銀箔，定心志，安神明，鎮寃鬼，去驚癇，解毒火之藥（[illegible]）。按白（張）

銀稟西方辛陰之氣，堅墜之物，善能清氣下痰，解熱鎮驚。凡肝火爲眚者，煎汁飲之立定。蓋金銀原本無毒，前人每用硝、礬、水銀制煉服食，故有毒也，非金銀之毒，乃諸物之毒也。今人用銀器貯飲食，遇毒則銀色變黑，中毒死者，以銀物探入喉中試之，有毒即黑，則銀之無毒可知矣。又按雷氏曰：凡使金銀銅鐵鉛錫，只可渾放藥汁中煎煮，不過借氣助藥力而已，勿煉粉入藥服，恐服令人消脂墜髓，有暴亡之禍，戒之慎之。

○集方：治中風不語，中惡蠱毒，尸疰難產，血暈等證，及怔忡驚悸，恍惚恐怖，癲癇狂亂，及小兒風痙痰熱，驚悸不寧諸證，入丸散中，與金箔同功。○治妊娠腰痛如折者（子母秘錄），用白銀一兩，水三碗，煎八分，飲之。○治胎動欲墮（婦人良方），痛不可忍，用白銀四兩，苧根二兩，白酒一碗，水二碗，煎八分，服。○治風牙疼痛（集簡方），用白銀二兩，燒紅，淬白酒一碗，乘熱漱飲立止。○治口鼻疳蝕（[illegible]），甚至有穿唇透頰者，用銀屑一兩，水三升，煎七八合，日洗三四次。○治身面赤疵（千金方），常以銀指令熱，久久自消。

赤銅屑。味苦。氣平。微有毒。（李氏曰。銅爲赤金。又有赤白黃四種之別。赤銅出川廣雲貴。白銅出雲南。青銅出南番。黃銅出兩廣。皆出於山中。土人穴山采礦。鍊取之。惟赤銅爲用最多。亦可入藥。山海經言。出銅之山二百有六。今則不如其數也。諸銅得東南紫陽之氣而生。其氣禀陽。故其質剛戾。若赤銅屑者。即打銅落下飛屑也。或以紅銅火煆水淬。亦自落。以水淘淨。用好酒拌入鐵鍋內炒。見火星。即取出。研末用。）

〇赤銅屑。接骨堅齒。烏鬚髮之藥也。太清服鍊云。此藥秉東南乙陰之氣而生。承紫陽之氣而長。性堅味苦。能澁能飲。故合五棓子。染鬚髮即黑。火煆淬酒服。治跌撲筋骨斷折。煎水洗目去弦障。和醋水煎滚飲。治女子血氣心胃疼。諸病皆取此收澁堅凝之用也。此乃金石之劑。中病即止。不可過服。

〇集方。染白鬚髮轉黑。用紅銅細末一兩。研極細聽用。取五棓子十兩。敲碎研成末。鍋內炒成糊。初時黑烟出。將鍋提起放地上。不住手炒。將冷。又上火炒。待黃烟出。又提起放地上。不住手炒。將冷。再上火炒。待青黃烟間出。即住火。先以真青布一大幅。浸濕。將五棓子傾在布上。捏成一團。用脚踏成餅。上用濕黃泥一擔。蓋一夜。色如烏鴉羽爲妙。配膽礬、白礬各七錢。潔白鹽一兩四錢。和人紅銅末內。再研勻。和入製過五棓子餅內。再總研勻。貯磁罐內。臨染鬚髮時。取藥末一錢。配小麥麵二分。用酒調如稀糊。隔湯頓稠。黃昏時乘熱刷鬚髮上。待有二個時辰。用熱湯洗去藥。鬚髮即黑矣。〇治跌撲折損筋骨。用赤銅末。每用三分。熱酒調服。折傷在上。食後服。折傷在下。食前服。不過三五服愈。〇治風爛眼弦。淚久不愈。用紅銅末五錢。日逐煎湯頻洗。半月尋愈。〇治女人心胃作疼。用紅銅末二錢。米醋半盞。和水一碗。煎滚。澄去銅末。取醋湯飲。立止。

銅青。味酸澁。氣寒。微有毒。入足少陽。足厥陰經。（陳氏曰。生熟銅皆有青。是銅之精華。遇濕熱鬱蒸之氣而生。刮取淘淨。研細用之。李氏曰。近時以銅燒紅。米醋澆之。數日即生青。亦可用。）

〇銅青。拔風痰。吹喉毒。去翳障。治齒㾦之藥也。李氏曰。此藥酸澁鎮重。酸澁能拔痰吸毒。鎮重能去翳搜蠶。故陳氏本草。主風痰閉結。喉咽不通。舌強不語。又竇氏方。治

癰疽瘡毒內潰。膿漏腫頭不出。若風熱外障。目澁腫疼。蟲牙疳瘡。潰爛牙齦宣露。一切蟲蝕牙蛀。咸可奏功。皆取此酸澁。所適塞服。鎮重可墜浮性也。但金石之劑。中病則止。多服常服。有燥耗津液。枯損血氣之患。司業者。當審而用之。

〇集方。治卒中急風。眩暈僵仆。痰涎壅塞。心神迷悶。牙關緊急。目睛上視。及五種癇病。涎潮搐搦等證。用銅青九錢。研極細。附子尖、烏頭尖、蝎稍各七個。後三味爲末。入銅青。令勻。麵糊爲丸。如雞豆肉大。每服急用薄荷湯化下一丸。更入酒半盞。溫煖服之。須臾吐出痰涎。如牙關緊急。斡開灌之。立驗。然後隨證以調補藥治之。〇治癰

（外科）疳匿毒，膿頭不出，用銅青一錢，為末，瀝青一兩，麻油一錢，先將油熬滾，入瀝青熔化，再入銅青末，攪勻，用單油紙攤貼毒上，膿頭即出，後換長肉膏貼之。○治風熱外（[illegible]）障眼目不明，用銅青一分，川黃連三分，防風一錢，食鹽一分，泡湯頻洗。○治牙（方）疳（正宗）潰爛，牙齦宣露，一切蟲䘌牙蛀，用銅青三分，北細辛一錢，獨活、肉桂各一錢，共研極細末，再加芒硝一錢五分，冰片一分，總研勻，貯磁瓶內，封口勿泄藥氣。每遇牙疳，先以髮根蘸溫茶洗淨牙齦，用簪頭挑藥少許敷之，不過三次愈。

治諸般惡毒，初起疔瘡，發背，一切疔毒，遍身癢痛。又治小兒痘瘡黑陷不起，及喉閉腫痛，并蟲毒與破傷風。用銅青二分，朱砂、雄黃、片腦各三分，乳香、沒藥、輕粉各五分，血竭三錢，真蟾酥一錢，當門子二分，右共為極細末，用稀米粥一盞和為丸，如扁豆大，每一丸噙化，用白湯下。

古文錢，味辛澁，氣平，無毒。（李氏曰：管子言禹以歷山之銅鑄幣，以救人困，此錢之始也。至周太公立九府泉法，泉後轉為錢。古銅錢但得五百年外者，即可用。而唐高祖所鑄開元通寶，得輕重大小之中，尤古今所重。）

○古文錢活滯血，療跌撲，去翳障，通淋閉之藥也。按日華（朱正）方（朱[illegible]）又主婦人生產橫逆不順，及月隔經事不來，心腹卒痛諸疾。蓋古錢因時移世變，必年遠零落於地穴坑壍之中，得之歷年既久，雖具金體，純受水土至陰之氣，能達下焦陰分，散凝滯之血氣，開壅塞之道路，故善去翳障，通淋閉，活滯血，而療跌撲也。但性味辛澁而涼，治風熱眼，佐以薑汁點之，即從治之意，借其熱以拔出風火之毒也。如肝腎虛而內障生花不明者，又不宜用也。跌

撲疼痛，月隔淋閉，心腹諸疾，因瘀血凝滯不行者可用。如血枯髓虛，營弱經少者，亦不宜用也。

○前賢寇氏曰：古銅錢治目中翳障，及瘀腐努出脂膜，并時氣風火腫痛目疾，目不能開者，用生薑一塊，洗淨土，并去皮，以古銅錢刮薑汁點之，初甚苦痛，熱淚一點，少頃即愈。更不必再點。如眼沿生瘡者，不可用也。

○集方：治跌（青囊秘）撲傷損筋骨，用古銅錢五個，火燒醋淬，計四十九次，甜瓜子五錢，共研末，每服三分，好酒調，隨傷上下，食前後服。○治赤目生（金方）翳，用古銅錢一文，潔白食鹽五分，煎水點眼眥內。○治（[illegible]氏方）沙石淋澁（普濟方），用古銅錢十二文，煮汁飲。○治產理橫逆不順，用古銅錢五十文，酒一升，

資牛升隨臺飲。治心腹卒痛。用古銅錢二十文，胡桃肉三個，同炒熱，入米醋一鍾，水一鍾，㕮服。〇治時氣溫病，頭痛發熱，脈大，始得一日者，用古錢百文，煎湯飲之，即吐毒出也。

〇諸銅器氣味有毒。

李氏曰：諸銅器收飲食茶酒，過夜有毒，煎湯飲損人聲。錫器亦然，惟磁砂瓦器無毒也。

〇諸銅器用滚湯煮熱，熨霍亂轉筋，及臍下腎堂痛，并奔豚寒疝等疾。又三代古銅鐘鼎彝器，藏家能辟邪祟，而李時珍言山精水魅，多歷年所，故能興妖作祟，而鐘鼎彝器歷年又過之，所以能辟邪祟也。

黑鉛。味甘，氣寒，有微毒。入手足厥陰經。（名黑錫）

蘇氏曰：鉛生蜀地平澤，今產銀處皆有之，燒礦而取也。李氏曰：生山穴石間，人挾油燈，入進數里，隨礦脈上下曲折斫取之。其氣毒人，若一月不出，則皮膚痿黃，腹脹不食，多致疾而死。獨孤滔云：嘉州、利州出草節鉛，此生鉛未經鍛也，打破燒取之，氣如硫黃。紫背鉛即熟鉛之精華也，有變化，能碎金剛鑽。雅州山澗砂中出釣腳鉛，形如皂子大，又如蝌蚪子，黑色。盧氏鉛麤惡力劣。信州鉛雜銅氣，陰平鉛出劍州，是銅鐵之苗，並不可用。外丹波斯鉛，堅白如錫，為大丹第一。銜銀鉛產銀坑中，內含五色，俱可入藥。上饒樂平鉛、負版鉛外，有倭鉛，只可勾金，亦不入丹藥。又土宿真君曰：鉛乃五金之祖，能伏五金而死入石。雄黃乃金之苗，而中有鉛氣，是黃金之祖。銀坑之鉛，乃白金之祖。信州鉛雜銅氣，是赤金之祖。又與錫同氣，是青金之祖。又硃砂伏於鉛而死於硫，硫戀於鉛而伏於硇，鐵戀於磁而死於鉛，雄戀於鉛而死於五加。故鉛變化最多，一變而成胡粉，再變而為黃丹，三變而為密陀僧，四變而為白霜。

〇黑鉛鎮心安神，化痰定癇之藥也（時珍）。李氏曰：黑錫稟北方癸水之氣，陰極之精，其體重實，其性濡滑，其色青黑，內通於腎，故局方黑錫丹、宜明養正丹，皆用之，得水交感，能治一切陰陽混淆，上盛下虛，氣升不降，發為嘔吐眩暈，噎膈反胃，危篤諸疾，所謂鎮墜之劑，有反正逐邪之功。其性又能入肉，故女子以鉛珠紝耳，墜即自穿孔。實女無竅者，以鉛作鋌，逐日紝之，久久自開，此皆昔人所未知者也。但氣帶陰毒，不可多服，恐傷損心胃之氣。

〇集方：黑錫丹（和劑局方），治痰氣壅塞，上盛下虛，心火炎盛，腎水枯竭，一應下虛之證，及婦人血海久冷無子，赤白帶下等證。用黑錫、硫黃各二兩，沉香、葫蘆巴（酒浸炒）、附子（童便製）、陽起石（研細水飛）各一兩，肉桂（五錢），補骨脂、舶茴香（炒）、肉荳蔻（麪裹煨）

木香。金鈴子、（蒸去皮核、各一兩。）右用新鐵銚內、如常法結黑錫硫黃砂子。地上出火毒、研令極細、餘藥俱為細末、和勻。自朝至暮。以研至黑光色為度、酒糊丸、如梧子大。陰乾、入布袋內、擦令光瑩。每服四十丸、空心淡鹽薑湯下、或棗湯下。女人陳蘄艾湯下。○養正丹（和劑局方）治上盛下虛、氣不升降、元陽虧損、氣短身羸、及中風涎潮、不省人事。傷寒陰盛自汗、唇青、婦人血海久冷、諸證用黑錫、水銀、硫黃、（研細）朱砂、（研細、各一兩）右用新鐵銚一隻、火上熔黑錫、化汁、次下水銀。以柳條攪勻。次下朱砂末、攪令不見星、放下少時、方入硫黃末、急攪成汁、和勻、如有焰起、以米醋灑之、候冷。取出研極細、糯米粥為丸、如菉豆大。每服三十丸、淡鹽棗湯下。（聖濟錄）

○集方、治腎藏氣發攻心、面黑欲死。及奔豚諸氣喘急、或婦人血氣冷結。攻心腹作痛。用黑鉛、石亭脂各二兩、木香一兩、麝香一錢、先將鉛炒化、次入亭硝、急炒焰起、以米醋灑之、傾入地坑內、覆住待冷。取研。粥糊丸、如芡實大。每用二丸、熱酒化服、取汗、或下、或通氣即愈。○治風（普濟方）癇吐沫、抽掣目反、久患不愈、用黑鉛、水銀結成砂子。一兩、南星炮。一兩二錢、共為末、粥糊為丸、菉豆大、小兒一（全集）歲一丸、大人以十九為率、乳汁下。○治水腫浮滿、用黑錫、五兩、皂莢一挺炙、白酒一斗、浸二日、煎百餘沸、頻頻飲、漸消。○治小便不通（普濟方）用黑錫挫末一兩、生薑五錢、燈心五十枚、井水煎服。先以葱搗爛、炒熱、熨臍上。○治瘰癧結核、用黑錫三兩、鐵器炒、取黑灰、醋調塗上、以故帛圍裹、出惡汁黃水、頻頻換藥、如此半月、不痛不破、內消而愈。○取輕粉毒、用黑錫五斤、打壺一把、盛好酒十五斤、納土茯苓、搗爛一斤、乳香五錢、封固、重湯煮一日夜。埋土中三日、每日早晚隨量飲、後用瓦盆接小便、自有粉出、服至筋骨不痛乃止。○解硫黃毒、用黑錫煎湯飲即解。

胡粉　味酸辛、氣寒、有微毒。（李氏曰、按墨子云、禹造粉。又張華博物志云、紂燒鉛作粉餅如已、則粉之來亦遠矣。今金陵、杭州、韶州、辰州皆造之、而辰州尤妙、其色帶青。彼人言造法、每鉛百觔、鎔化、打成薄片、卷作筒、安木甑內、甑下甑中各安米醋一瓶、外以鹽泥固濟、紙封甑縫、風爐安火四兩、養之。一七、便掃入水缸內、依舊封養、次次如此、鉛盡為度。不盡者、炒作黃丹。每粉一斤、入菉豆粉二兩、蛤粉四兩、水內攪勻、澄去清水、用細灰按成溝、紙隔數層、置粉於上、將乾、截成方塊、待乾收起。而范氏虞衡志又言、桂林所造鉛粉、以黑鉛著糟甕中罨化成粉。而何孟春餘冬錄又言、嵩陽產鉛造粉、其法用鉛塊懸酒缸內、封閉四十九日、開之則化為粉、化不盡者、炒為黃丹、黃丹滓又為密陀僧。三物收利甚博、其巧者捐出新意、以速化為利、故彌其鉛氣有毒、工人必食肥豬犬肉、飲酒及鐵漿以厭之。枵腹中其毒、輒病竟至死者有之。毒發急必筋搐腹痛、緩則身面痿黃、手足癱瘓、關節拘攣而斃者多矣。欲解其毒、則日臥地上一二月、病愈而手足復舊、雖黃得胡粉失色、[illegible]）

胡粉、墜痰涎、化癥瘕、下胎娠、消積聚、殺三蟲、攻疳痢之藥也。李氏曰、此藥即鉛之變黑為白者也。其體用雖與鉛及黃丹同、而無硝鹽火燒之性、雖能墜痰化癖消積、殺蟲攻疳止痢、然金石之類、終能損胃延脾、泄氣耗血、

性冷而不守，體重而質墜，無故妄服，有損藏府，壞腠絡之咎。如脾胃虛弱，稟賦薄之者，雖有已上諸病，不宜輕試，僅可作敷藥解毒，收濕入膏藥，止痛護肌外用之功。受益恒多，充服食劑中，余未敢輕投也。集方數首，因古人因病制用，可否當視證之緩急輕重，酌行之，毋濫也。

○集方。治脾傷食滯，（[illegible]方）痰涎痞脹，老痰凝結不化，黏礙胸胃，其人形質氣壯者，宜用胡粉五分，水飛過，用豆腐漿調服。○治腹中癥瘕，（[illegible]方）或癥癖不時作痛，痛極欲死，用胡粉五錢，米泔水調，澄清，取泔水煎滾，溫飲之，即將胡粉取起，和食鹽二三撮，鍋內炒熱，布裹熨腹上。○治死胎不下。（救急方）

用胡粉二錢，研粉為丸，如菉豆大，每早服八分，白湯下。不過五六服即下。○治大人小兒食積停滯，（[illegible]）不論穀食血食瓜菓諸食，脹悶不通，（陳氏秘方）用胡粉一分，溫酒調灌下，氣吞下。○治諸蟲積，用胡粉二三錢，史君子肉六錢，俱研末，粥糊丸菉豆大，每早服一錢五分，溫酒下。○治疳積下利赤白頻數，（[illegible]方）腸內作痛，用胡粉二錢，雞子白十個，調成糊，鍋內炙熟，冷茶調食一錢。○治寸白蛔蟲引動不止，（[illegible]方）用胡粉二錢，炒燥，精猪肉煮爛蘸食，再用烏梅花椒湯度之。○治小兒無辜疳，（[illegible]）下痢赤白，以胡粉炒黑，用白湯調服二分。○治小兒無故腹脹，唇青，腹皮青色，不速治即死，（[illegible]）用胡粉、食鹽各一兩，炒微熱，腹上輕輕熨之。○治婦人（[illegible]）

心胃作疼，急甚者，用胡粉一錢，為末，葱汁和如豆粒大，放舌上，白湯下，立止。○治墜墮跌撲，（肘後方）瘀血搶心，面青氣短欲死者，用胡粉一錢，溫湯調服即安。○治杖瘡疼痛，（救急方）用胡粉一兩，赤石脂三錢，水銀一錢，以麻油少許調，杵成膏，攤油紙貼之，肉潰者填滿，用帛紮縛。○治抓傷面皮，（集簡方）用胡粉少許，香油調敷，一夕愈。○治黃水流膿瘡，（[illegible]方）用胡粉、瀝青各二錢，黃丹一錢，枯礬一錢五分，共研末，香油調搽。○治小兒月蝕耳瘡，（子母秘錄）用胡粉和黃土減半，共研末，猪膽汁調敷。○治妬精陰瘡，（集簡方）用胡粉三錢，白菓肉九個，搗碎同炒，至白菓肉焦黃，去白菓，取粉敷瘡。○治人（備急方）兩腋下、兩胯下常濕，用胡粉炒燥，研末摻之。○治一切（[illegible]方）

捌花惡瘡，用胡粉、胭脂各一兩，研勻，用鹽湯洗敷之。

黃丹　味辛鹹，氣寒，無毒。（圖經曰：即黑鉛燒粉未化盡之渣也，用消石、礬石炒成丹。若轉丹為鉛，用葱連根搗汁拌丹，慢煎成金汁，傾出地上，即還鉛矣。凡用以水淘去消鹽，乾，微火再炒紫色用。）

○黃丹，平肝鎮驚，解毒護肌之藥也。繆氏曰：（[illegible]）此藥係熬鉛所作，稟先天壬癸之氣，得火成丹，有靈通變化之妙。其體重而降，質潤而涼，故前古主吐逆胃反，驚癇癲疾，痰聚心絡膜絡之內，以此陰沉下降之物，胃氣上逆可平，心氣浮怯可定也。別錄又主瘛瘲，瘛瘲者，即小兒初生臍風是也，風熱入肝，則筋自攣急，辛寒鎮重，能散風熱，金液之性，能平肝木，故主用專之。李氏曰：今世用以解

毒散熱、去瘀長肉、治一切惡瘡癰毒、及入諸膏藥中、爲外科必用之物也。但金石火煆之性、燥寒有毒、如驚癇由於血虛、吐逆由於胃弱者、毋亂投也。

○集方治吐逆不止（集驗方）、碧霞丹、用水飛過黃丹四兩、米醋半升、煎乾、傾在地上、用炭火就地上煆紅、冷定爲末、粥糊丸梧子大、每服七丸、醋湯下。○治小兒吐逆不止、用黃丹研末、棗肉和丸、如芡實大、每以一丸、用鍼簽於燈上燒過、研細、乳汁調下。○治痰閉驚悸、用黃丹水飛過三錢、研末、粥糊丸、梧子大、每日臨睡時服一丸、薑湯下。○治風癇發止不常（王氏博濟方　肘後方同）、用黃丹、白礬各二兩、鐵鍋內炒、以礬枯丹黑爲度、取起爲細末、每服一錢二分、溫酒下。○治

小兒臍風撮口、并客忤中惡、又令人心腹刺痛、氣衝心胸脹滿、用真飛丹方寸匕、蜜湯調灌之。○治一切惡瘡腫毒、潰爛疼痛、用真飛丹八兩、麻油一斤、共熬成膏、貼之能拔膿長肉。

○續補方治赤白痢（青囊方）、用水飛黃丹、炒紫色、川黃連炒、各等分爲末、米糊丸麻子大、每服五十丸、甘草湯下。○治寒（方）熱久瘧不止（薛立齋）、體虛者、用飛過黃丹、百草霜各等分、爲末、發日空心米飲服二錢、不過二服愈。○治小兒癉瘧（子母秘錄）、但熱不寒、用飛過黃丹一錢、蜜湯調服。○治小兒重舌（普濟方）、用飛過黃丹一豆粒大、安舌下。○治小兒口瘡糜爛、用飛過黃丹二錢、生蜜一兩、調勻、蒸黑色、每以雞毛蘸搽、甚效。○治金瘡出血不止（[illegible]方）、以飛過黃丹、滑石各等分、研細末傅之。○治血風臁瘡（[illegible]方）、用黃丹一兩、黃蠟一兩、香油五錢、熬膏、先以葱椒湯洗淨瘡上、貼之。

先賢成氏曰、仲景龍骨牡蠣湯中用黃丹、乃收歛神氣以鎮驚也。

密陀僧、味鹹辛、氣平、有小毒。

蘇氏曰、密陀僧出嶺南閩中銀銅冶處、是銀鉛之腳。采礦時銀銅相雜、以鉛同煎煉、銀隨鉛出、又采杉木葉燒灰、開地作爐、填灰其中、謂之灰池、置銀銅鉛於灰上、加以炭火燒煆、鉛銅滲於灰下、銀浮灰上、退火候冷出銀、其灰池感鉛銀氣、積久成此物、形似黃龍齒而堅重。亦有白色作理石文者、今市中所貨者、是小瓶實鉛丹、煆成大塊、尚有瓶形。銀冶所出最良、而少有。李氏曰、此乃是取銀冶者。今銀冶難得、取煎銷銀鋪中爐底用之、造黃丹者、以腳滓煉成密陀僧、其似瓶形者是也。

○密陀僧入服食方、下結痰、定驚癇、止反胃、療口瘡、截瘧（朱丹）疾（[illegible]）、禁久痢也。入外敷方、去面䵟、退鼻皶、滅汗斑、愈臁瘡、拔多骨、消痔瘻、散腫毒、呼膿穢也。李瀕湖曰、其體重墜而沉、直走下焦血肉之裏、故能下結痰、去面䵟等證云。如夷堅志云、驚氣入心絡、瘖不能言者、用此藥爲末一匙、茶調服、即能言。此乃驚則氣亂、密陀僧之重以鎮怯而平肝也。其功用與黃丹同。今瘍科入膏藥方中、代黃丹、胡粉用之。又繆氏言、惟治䵟黯、敷塗外疾諸證之外、少用於服食料中者、大都可外敷、不可內服。此藥係銷銀爐底、乃鉛銅之氣所結、能潰爛一切生物、不宜輕用也。

○集方（聖惠方）治痰結胸中不散，用密陀僧一兩，米醋和水各一盞，煎乾爲末，每用二錢，以酒水各一盞，煎一盞，溫服，少頃當吐出痰涎爲妙。○治驚氣失音，方見前論中。○治（閻氏小兒方）反胃吐食，用密陀僧三錢，醋煮過，每用五分，米湯調服。○治口瘡（聖濟方），不拘大人小兒（方脈正宗），用密陀僧火燒，研爲細末，用少許，摻口內。○治痰瘧久不愈，用密陀僧火煅爲細末，每服八分，生薑湯調服。○治久痢（聖惠方），不拘赤白，用密陀僧一兩，火燒，研極細，每服八分，清晨白湯下。○治面上（外臺秘要）䵟斑點，并鼻皶赤皰，用密陀僧二兩，銀硃五錢，共研，人乳調，夜塗旦洗。○治夏月汗斑（活人心統），用密陀僧一兩，雄黃四錢，胡粉二錢，先以薑片擦斑上，仍以薑片蘸末擦之，次

日即焦。○治血風臁瘡（孫氏方），用密陀僧研細末，鮮猪油調攤（壽域方）薄油紙上，再以油紙夾住，兩面反覆貼之。○治骨疽瘡，不時出細骨，用密陀僧研末，桐油調勻，攤油紙上貼之。○治腸風（濟急方）痔瘻，用密陀僧、銅青各二錢，麝香少許，共爲末，用津唾調塗患上。○治癰疽（外科方）瘰癧未潰可散，已潰呼膿，未潰用薑汁和米醋調敷，已潰用作細末，填敷瘡內。或以麻油熬稠，密陀僧研末收作膏藥貼之。

鉛霜　味甘酸，氣冷，無毒。

（蘇氏曰，鉛霜用鉛雜水銀十五分之一，合煉作片，置醋甕中密封，經久成霜。李氏曰，以鉛打成錢，穿孔，以繩條貫成串，瓦盆盛米醋，以鉛錢串橫閣盆中，離醋二寸，以瓦盆覆之，置陰處，候生霜刷下，仍合住，再刷取也。）

○鉛霜消實痰，定驚悸（日華），止吐逆，去伏熱（時珍），開胸膈煩悶（本草）之藥也。李氏曰，此藥係鉛汞之氣交感英華所結，其墜痰去熱，治嬰孺驚悶諸證，甚有奇功。然性極冷，非久服常用之物，病稍已即去之。如胃弱脾虛，食少腸滑者，勿用，風寒咳嗽而生痰者，亦忌之。

○集方治小兒（聖濟錄）心肺積熱，夜臥多驚（普濟方），用鉛霜、牛黃各二分，研勻，每服一分，竹瀝調下。○治驚風癇疾，喉閉牙緊，用鉛霜三分，蟾酥五釐，共爲末，用烏梅肉，滚湯泡軟，蘸藥於齒齦上揩之，良久便開。○治喉閉（聖濟錄）腫痛，用鉛霜三錢，甘草一兩，共爲末，醋糊丸如芡子大，每含嚥一丸，立效。○治口瘡（宣明方）齦爛，氣臭血出，不拘大人小兒（聖濟錄），用鉛霜、銅綠各二錢，白礬一錢，共研末，摻齒齦爛處。○治痔瘡腫痛，

用鉛霜、冰片各一分五釐，酒調塗痔上，立效。

鐵，味辛，氣微寒，無毒。

李氏曰：鐵名黑金，於五金屬水，皆取礦土炒成。秦、晉、淮、楚、湖南、閩、廣諸山中皆有之，以廣鐵為最，其土錠鐵色黑性堅，宜作刀劍。西番出賓鐵，又勝其精者。寶藏論言鐵有五種：荊鐵出當陽，色紫而堅利；上饒鐵性澀，相若而稍次之；賓鐵出波斯國，堅利可切金玉；太原、蜀山之鐵頑滯而鈍；剛鐵生西南瘴中山石間，狀如紫石英，水火不能壞，用之作鑽穿珠，作刀切金石如土也。蘇氏曰：鐵初鍊去鑛，用之鑄器物者，為生鐵；再三銷拍燒鍊日久者，為熟鐵；愈鍊愈久，纔火百餘遍者，為剛鐵。如鍛家燒鐵赤沸，砧上打下細皮屑，為鐵落。鐵爐竈中飛出如塵，輕虛紫色，可以磨瑩銅器有光者，為鐵精。作針家磨鑢細末，謂之針砂。取諸鐵于器中，水浸之，經久色青沫起，可以染皂者，為鐵漿。以鐵拍作片，置醋糟中，積久生衣，刮取之，謂之鐵華粉。入火飛鍊者，為鐵粉。○鍛內有硬處不可打者，名鐵核。以香油塗上，燒之即散。

○生鐵，平肝氣，安驚癇，解丹毒，散瘀血，清（液[illegible]錄）耳聾之藥也。李（時珍）氏曰：鐵於五金，色黑屬水，而其性則制木，而又降氣清火也。素問治陽氣大盛，病狂善怒者，用生鐵落酒煮飲之，正取伐木之意。日華子言其鎮心安五藏，豈其然哉。又太清服食法言服鐵至長生，其說荒謬，不可依從。

○集方：治（方脈正宗）大人小兒驚癇頻發，能食而力足者，用生鐵煮汁飲。○治小兒（陳氏本草）丹毒，用生鐵燒紅，淬水三次，飲一合。○治打（肘後方）撲瘀血在骨節及脇內外，以生鐵二觔，酒三升，煮半升服。○治熱（千金方）甚耳聾，用生鐵燒紅，投酒中飲之，再以慈石塞耳內，日用夜去之。

○鐵落，味辛，氣寒平，無毒。

李氏曰：生鐵打鑄，皆有花出，如蘭如蛾，今造烟火家用之。又鐵末浸醋書字於紙，背後塗墨，如碑字也。

○鐵落，平肝氣，定狂怒，去賊風，暴痒，安驚癇，客忤，鬼擊，鬼疰之藥也。日華子言煎汁飲服，不留滯於藏府，借金虎之氣以制肝木，使不剋脾土，土不受邪，諸疾咸消，而麥雨南治水腫溺脹，屢奏奇功，有自來矣。則驚狂暴怒，賊風鬼擊諸病，一本於肝強木實，火盛氣逆，用此一袪而下。倘肝虛內乏，中氣虛寒者，不必需也。

○集方：治（方脈正宗）暴怒發狂，用鐵落三錢，甘草一錢，煎湯飲。○治賊（戴氏方）風流痛，關節不能轉動，用鐵落炒熱，投酒中飲之，立解。○治小（大氏方）兒驚癇客忤，鬼擊鬼疰，用鐵落二錢，炒熱，浸水沖服。

○鐵精，味苦辛，氣溫，無毒。

陶氏曰：鐵精，鐵之精華也，出鍛鐵竈中，如塵飛出，色紫而體輕者為佳，用之磨一切銅器，光亮可觀。

○鐵精，療驚癇，安心氣，拔疔毒，止小兒（日華）陰癀脫肛之藥也。質（本草[illegible]）雖重墜，而體實飛騰，故能安心志，驚癇之證，因火盛氣怯，而神惝浮越不靜者，服之立安。倘由勞倦神疲氣虛，魂亂神不守舍，以致驚癇頻潰者，非所宜用也。

○集方：治火（[illegible]方）熱煩心，暴發驚狂如癇者，用鐵精一錢，甘草二錢，煎汁飲。○治疔腫（普濟方）拔根，用鐵精研極細一錢，輕粉五分，麝香三釐，共研勻，以銀鍼畫十字於疔上，將藥敷上，神效。○治下（至寶方）痢脫肛，用鐵精研極細如塵，敷之。

○鐵華粉，味鹹，氣平，無毒。

馬氏曰：作鐵華粉法，用鋼鍛作葉，如笏或團，平面磨錯令光淨，以鹽水灑之，於醋甕中埋土一百日，鐵上衣生，鐵華成矣。刮取乳鉢內，細研如麪，合和諸藥為丸散用。此鐵之精華，功用勝如鐵精也。

○鐵華粉安心神止驚悸化痃癖癥結推食積頑滯諸疾之藥也堅金之質體重而降急趨直下少無留難病非堅結體非強壯能食之人不可輕用開寶方去有餘百病隨所冷熱和諸藥以棗膏爲丸服仍次用不過四五六分據甯氏得効方治婦人陰挺用鐵華粉一二錢米片一分研細水調敷落門上

○鐵鏽味辛苦氣寒無毒

（陳氏曰此鐵上自生赤衣也以水磨塗用）

○鐵鏽解疔毒消惡瘡退風癬散脚氣瘇腫之藥也按陶氏言鐵鏽水性沉重和藥服最能墜熱開結嘉祐方治傷寒熱實結胸磨水入承氣湯服之極驗（此必強實有力人方準此）

○集方治疔腫（普濟方）惡瘡初起用多年土内鏽鐵器火煅醋淬不論遍次落下鏽末收遂研細先用銀鍼挑破用鐵鏽少許入乳調和傅之○治風癬作癢不止先將癬瘡抓破用鐵鏽水塗之○治脚氣紅腫熱如火炙俗名赤遊風用鐵鏽水塗解之○治重舌腫脹用鏽鐵器燒紅打下鏽末一錢研細水調噙嚥○治小兒口瘡用鐵鏽末水調敷之

○鍼砂味辛氣寒無毒

（陳氏曰鍼砂是造鍼家磨鑢細末也須真鋼砂乃堪用人多以柔鐵砂雜和之飛爲粉人莫能辨）

○鍼砂平肝氣散癭核消積聚療黃疸脹滿之藥也

⊙集方治項下癭核用鍼砂八兩入水缸中浸之飲食皆用此水十日一換砂半年自消散○治腹内一切積聚久不消散用鍼砂三合勿晚臨睡時炒熱用布包熨之○治脾勞黃病用鍼砂二兩研極細米醋炒七次乾漆燒存性三錢蒼朮厚朴陳皮香附各五錢甘草四錢共爲末和鍼砂蒸餅爲丸如菉豆大每早食前服三丸食後臨睡服四丸白湯下○治水腫尿少鍼砂五錢醋煮乾甘遂末三錢生蚯蚓三條葱三枝連根葉共搗作餅用薄布襯傅臍上用帛縛之一日一換以小便大通爲度○治虛寒下利或泄瀉無度用鍼砂一兩肉桂枯礬各三錢共爲末以米湯調用薄布襯攤臍上下用帛縛之當覺大熱即愈○染白鬚髮用鍼砂一兩米醋炒七次百藥煎廿錢訶子白芨各四錢綠礬二錢共爲末用熱醋調刷鬚髮止用軟帛包住次早熱湯洗藥即黑

○鐵漿味鹹寒無毒

（陳氏曰鐵漿以生鐵浸水中日久色青沫出者鐵上浸出黃膏更勝）

鐵漿解疔毒瘡腫及蛇犬虎狼毒氣所傷或内服或外洗兩者皆可

○集方治一切疔腫用鐵漿日飲一升○治發背（外臺秘要）初起用鐵漿速飲二升取利

○鐵㷡味苦有毒

（李氏曰以竹木紙草樹葉等燒火於刀斧劍一切鐵器上烑之津出如漆者是也江東人多用之）

⊙鐵㷡治一切惡瘡蝕爛臭爛不收及金刃傷損皮肉或

手足軟折。或筋結痹癱、或蟲疥癬瘡等疾，用此須乘熱未凝時取塗之，以須乾硬，無所用也。

○鐵秤錘，味辛，氣溫，無毒。開寶方：主賊風，關節不利，男子疝瘕，奔豚，婦人產後瘀血脹痛，及橫生逆產，胞衣不下。等證，並燒赤淬酒中，俟滾響聲息，取飲之。（鐵杵、鐵斧、取刃亦同）

水銀味辛。氣寒，有毒。

盧氏曰：水銀原名澒，又名汞（綱目），又名靈液（藥性論），又名姹女（別錄）。曰：水銀生符陵平土。蘇氏曰：今秦州、商州、道州、邵武軍亦產，而秦州乃來自西羌界者。山中所生極多，而自折裂，土人取砂石，皆大塊如升斗，碎之乃可燒煅，故西來水銀極多於南方者。淮南子曰：弱土之氣御於白天，白天生白礜，白礜生白澒。陶弘景言是山硃砂腹中者佳，亦有別出沙地色青白者，爲之生澒。或硃砂爐采，或山石折裂采其砂石燒煅成者，色小白而濁，皆不及生澒之能應化無方也。陳霆墨談云：拂林國當日沒處有澒海，周匝七八十里，國人取之，近海十數里掘坑塹數十方，乃使健夫駿馬偏體粘貼金箔，行近海間，出光晃耀，澒則滾沸如潮湧逐而至，若琥珀之遇芥、磁石之見鐵，益前以金爲食也。遂回馬疾馳，俟澒逐之勢漸緩，遇坑塹則溜積于中，否則人馬亦爲之吸沒矣。取得此品，合香草煎製，便成白金，爲丹家至寶。世用熟澒燒煉經數十百世，曾未成丹者，以熟澒氣去形在，名曰陰符，又曰死尸，徒有年歲，終不可得也。一種神澒法，用補藥馬齒莧，先以槐木椎熟，向日東作架，暴二三日，經久更善，乃燒灰存性，置瓦甕中，封固甕口，埋土內四十九日，取澒成矣。每莧百觔，可得澒三兩或十兩。胡氏丹藥祕訣云：取硃砂澒法，用瓷罐盛硃砂，不拘多少，以紙封罐口，香艸湯煮一伏時，先[illegible]掘地坑，置一鐵盞于坑內，次以瓷罐倒覆盤上，邊用鹽泥封固，近罐口更築實，以土壅罐下，繞之半，其出上面，以栗炭煅一炷香，火息氣冷，揭開，自流溢盤中矣。每硃砂末一觔，可得澒十兩；舊坑明透好砂，可得澒十五兩。辰州溪洞燒取極易，以百兩爲一鍋，鍋之制似豬脬，外糊厚紙數重，貯之即不走漏。若散失在地，以川椒末或茶末收之，或真金及鍮石引之即上。陳氏曰：去澒之秘，鬼名曰天琉，丹竈家用之。雷氏曰：修事勿用草澒，并硃漆中燒出者，或經別藥制過者，或死尸中流出者，誤服爲害，其深不可不慎。必取生澒，但不易得，唯硃末燒取者，乃可用之。用紫背天葵、夜交藤汁，同煮一伏時，以去其毒，修事十兩，二汁合用七鎰。寇氏曰：澒得鉛則凝，得硫黃則結，銅得之則明，灌尸中則後腐，以五金置其上則浮，得紫背天葵、紫河車則伏，得川椒則收，可以勾金，可以涌泉，匱蓋藥死，服澒之氣也，並棗肉研乳則散，別法制之則成膩粉、粉霜，唾研之可死蝨蟲也。土宿真君曰：荷葉、松葉、松脂、穀精艸、萱艸、金星艸、瓦松、夏枯艸、忍冬、莨菪子、鴈來紅、馬蹄香、獨脚蓮、水慈姑、萬年青、蒼耳艸、陸六藤、白花、蓬蒿，皆能制汞。相氏曰：人服水銀病拘攣，但炙金物熨之，則水銀必出。

第九九五册 續修四庫全書第 14 反正內

○水銀。墜痰下食。落胎絕孕。殺蟲滅疥。去虱辟邪。點搽楊梅惡瘡。化金銀銅鐵鉛錫之毒之藥也。東璞子曰。此藥其味辛。其氣寒。其體重。其質柔。其性流走而無停止。故前古主疥癬白禿。殺蟲破胎。有死生傾腐之力焉。故陳藏器言入耳能化人腦至盡。入肉令百節攣縮倒陰絕陽。人患瘡疥。多以水銀塗之。性滑體重。直入肉裏。宜謹慎之。頭瘡切不可用。恐毒氣入腦故也。僅堪外敷。不宜內服。歷觀前人。惑於方士。有久服致神僊不死之說。烹煮假煉。服食而至暴卒者。不可勝數。婦人誤服。多致絕孕。其爲毒害。昭昭不爽。可不戒哉。

盧子由先生曰。水銀似銀。如水也。原名澒。按周伯溫曰。

澒者。天地澒洞。未分之象也。故澒含水而流。含風而動。含火而鎔。含地而堅。顯諸木而色華青。顯諸火而還丹赤。顯諸土而媚粉黃。顯諸金而凝霜白。顯諸水而結秋玄。隨合仍分。隨分仍合。徧周四大。攢簇五行。神僊不死藥也。鎮注留尸竅死。且不朽。孰知其體性流活。善能變化五色五形。澒煉爲丹。丹還爲澒。神僊不死之質。斯可見矣。有言氣寒爲陰金之屬者。恐失體用相盪之爲性歟。

○集方。治痰迷閉塞不通。此方墜涎立效。用水銀五錢。生南星一兩。麝香一分。共研勻。以水銀不見星爲度。入石腦油少許。同搗和丸。如菉豆大。每服一丸。薄荷湯下。○治食積結胸。脹悶不通。用水銀一錢。陳粽一個。燒炭存性入水銀同研。少加黃米粥糊爲丸菉豆大。遇是患每服一丸。生薑湯下。○治婦人難產。用水銀一兩。以白水一碗煎湯半碗。飲之立出。○治婦人多產絕孕。用水銀二兩。麻油二兩。煎一晝夜。油耗半。取出水銀。以麻油空心服三五匙。米湯調服。以油服完爲度。永絕胎孕。不損人。○治一切諸瘡生蟲。瘙癢。或痔上生蟲。疥瘡生蟲。用水銀五錢。紅棗肉廿兩。煮膏和水銀搗爲丸。如菉豆大。於諸瘡癢處擦之。漸消。○治一切惡瘡。并楊梅痔毒。用水銀胡粉。乳香。沒藥各一錢。共研細末。用香油少許調敷。○治失心風疾。用水銀一兩。藕節四個。共搗極細。米糊丸

如芡實大。每用五丸。磨刀水化下。○治疥癬蟲瘡。用水銀二錢。枯礬。雄黃。樟腦。芒硝。蛇牀子各三錢。研細末。大楓子肉二十個。搗膏和入前末藥內。搗勻。以水銀不見星爲度。熱湯洗淨瘡。用藥少許擦之。

○秘方。升煉靈藥法。治癰疽惡瘡。及楊梅諸瘡。拔毒長肉神驗。用水銀一兩。黑鉛七錢。硃砂。雄黃各三錢。研細末白礬。火硝各二兩五錢。研細末。其法先將鉛化開。投水銀。凝成餅。入硃砂。雄黃末。總研極細。然後將硝礬鎔化。投前四味末入內。離火急攪。令勻。用陽城罐盛之。用鐵燈盞仰蓋罐口。上加鐵梁。鐵線紮緊。鹽泥固濟蓋口。放神僊爐內。先以小炭火鋪罐底四圍。以水濕紙不住手

在燈盞內擦勿令間斷逐漸加火以三分爲率至鑵中身不必至鑵頸毋焚官香一炷則加一分火如是煉三炷官香爲度候冷取開於盞底刮取靈藥研極細用甘草湯飛過入淨絹上瀝乾再曬燥入冰片少許點搽上時時以指頭撫藥按之三日自脫此神方也

○李時珍先生曰水銀乃至陰之精稟沉着之性得凡火煅煉則飛騰靈變得人氣熏蒸則入骨鑽筋潰血蝕腦陰毒之物無似之者可恨神農經言其久服神僊甄權言其還丹元母大明言其無毒抱朴子以爲長生之藥六朝以下貪生者服食致成殘廢而喪厥軀者不知幾千人矣方士之罪固不足道而先賢本草其可妄言以惑世哉則服水銀之長生不死之說不待刪劈而翕然矣而其治病之功有不可掩者同黑鉛結砂能鎮墜痰涎同硫黃結砂則拯救危病此乃應變之兵在用者能得肯綮而執其樞機焉又有一節之長也（餘見鉛白霜及靈砂下）

○輕粉味辛氣燥有毒升也浮也

（李氏曰升煉輕粉法用水銀一兩白礬二兩食鹽一兩同研不見星鋪于鐵器內以小烏盆覆之以滋泥鹽竈和築封固盆口以炭打三炷香取開則粉升于盆上矣其白如雪輕盈可愛一兩汞可升輕粉八錢○又法水銀一兩皂礬七錢白鹽五錢同研如上升煉○海客論云諸礬不與水銀相合而皂礬和鹽能制水銀成粉何也蓋水銀者金之魂魄綠礬者鐵之精華二氣同根是以暫制成粉無鹽則色不白）

○輕粉下痰涎推積滯利水腫臟腑之藥也繆氏曰此係水銀升煉而成燥體與水銀相似第其性稍輕浮倘李氏曰觀其輕飛靈變化純陰爲燥烈其性走而不守善劫痰涎消積滯故水腫濕熱風痰驚癇惡瘡潰爛等疾用此劫劑去惡涎從齒齦而出邪鬱爲之暫開而瘡疾亦因之而愈若服之過劑或不得其法則毒氣被蒸竄入經絡筋骨藏府莫之能出涎毒雖去血液耗亡筋骨失養營衛不從變爲筋攣骨痛發爲癰腫疳漏或手足皸裂蟲癬頑痺經年累月遂成廢人其害無窮嘗觀丹客升煉水銀輕粉鼎器稍失固濟鐵石亦爲之迸裂況人身皮肉筋骨乎蓋此物本成於頃則頃之毒尚存又得火煉則火之毒氣亦未出神農經言其無毒誤也凡閉結由於虛燥血不潤澤者小兒驚風痰涎壅上由於內熱者疳積病由於脾胃兩虛者楊梅結毒發於氣血兩虛久病之人者臨用尤須斟酌

○李時珍先生曰陳氏方言輕粉下痰而損心氣小兒常病不可輕用初生尤宜慎之而演山氏又謂小兒在胎日受母之飲食血毒之氣畜在胸膈故嬰兒生下發驚痰十有四五初生三日之內用黃連一分去熱輕粉五釐散血毒又配硃砂二分蜜湯三匙滌解心肺積毒積毒既化可免驚痰搐搦之患二說不同各有所見一謂即有胎毒者不可輕服一謂有胎毒者宜預服之（朱附）錄於此以便後之君子審其證之緩急而取舍焉庶不負前兩人之用心矣

○集方：治小兒驚風痰熱四證俱盛。用輕粉一錢，巴霜五分，南星炮五錢，全蝎炒，真青黛、滑石各二錢，俱研極細末，稀糊丸如麻子大。一歲兒五丸，二三歲七丸，五六歲至十歲多則以十丸爲率。薄荷湯化下，以通利爲度。○（同前）治小兒天釣、臍風、客忤、卒死、撮口、噤口、木舌、痰壅、腮頰風壅，吐涎後以他藥隨證調理，用輕粉五分，蠍尾十四個，銅青、硃砂各二錢，共爲末，每服五分，薄荷湯調下。○（同前）治小兒急驚，陽癇熱證，面赤身熱，發搐直視，牙關緊者。用輕粉、赤腳蜈蚣炙、蠍尾各五分，蘆薈、胡黃連、白附子、甘草各一錢，麝香二分，共爲末。二歲已上兒服五分，薄荷湯化下。○（同前）治急驚天釣撮口，此方通利痰熱，用輕粉

五分，麝香、冰片各三分，全蠍七個，南星炮，白附子、青黛各一錢，硃砂水飛過六錢，共爲極細末，粟米糊丸如綠豆大。每用一丸，薄荷湯調下。先研半丸吹入鼻中。○治急驚壯熱，喘麤痰嗽，大小便不通。用輕粉、滑石、南星、青黛各等分，共爲末，稀糊丸如小豆大。一歲兒三丸，多則以七八丸爲率。此方疎流蘊積涎熱。○（錢氏利驚方）治急驚痰熱潮搐。用輕粉、青黛各一錢，天竺黃二錢，牽牛末四錢，共爲末，煉蜜丸如小豆大，以薄荷湯化下。○治小兒涎喘，服藥不退者，用輕粉一錢，以雞子清二個，拌和，銀器盛置，隔湯蒸熟。三四歲者食盡，當吐痰或泄而愈。一二歲者減半，氣實有力者方可用。○治小兒哭泥及臌肚，用輕粉一分，研細，砂糖湯調服，良久泄出泥土瘥。○治大小便閉，脹悶欲死，二三日則殺人。用輕粉一錢，生蔴油一合，相和，空心服。○治水腫臌脹，氣促，大小便不通，用輕粉二錢，韭菜子炙五錢，共搗作膏，以鹽汁調傅臍上，或作末藥，每服八分，蔥湯調服亦可。○治楊梅瘡癬，用輕粉三錢，大風子肉二十個，共搗爲末，以鵝膽汁調塗。○治下疳陰瘡，用輕粉末乾摻之，即結靨而愈。○治臁瘡久不合，用輕粉一二錢，蔥汁調傅，先以米泔水溫洗。○治抓破面皮，用輕粉末調生薑自然汁搽之，更無痕迹。○治牙疳臭爛有膿血者，用輕粉二錢，川黃連五錢，共爲細末摻之。○治大人小兒耳邊爛瘡，用輕粉一錢，配黑

棗灰三錢，共研細，菜油調搽。○治耳底腫痛，膿水不絕，用輕粉、爐甘石各一錢，麝香七釐，共爲末摻之。○治爛弦風眼，用輕粉末，以津和，以銀簪腳蘸藥點大眥內，日卄五次。

○粉霜　味辛，氣溫，有毒。（李氏曰：以輕粉轉升成霜，故名粉霜。○升粉霜法：用真輕粉一兩，入瓦罐內，以鐵燈盞仰蓋罐口，鹽滷和滋泥塗縫，先以小炭火鋪罐底四圍，以水濕紙不住手在燈盞內擦，勿令間斷，逐漸加火，至罐頸住火，候冷定取出，即成霜如白蠟狀。）

○粉霜，下痰涎，推積滯，利水腫，治傷寒積熱，顛狂，驚妄，見鬼，及小兒急驚等證之藥也。張氏曰：粉霜係輕粉轉升，得水銀之清中之清者，大能滌淨臟府，沉痰積滯，去膀

胱中宿垢積膩之物，故下結痰，解結毒，去傷寒積熱，小兒驚癇諸證。此亦無奈之藥，必不得已而用之，用之得宜，可稱應變之兵也。既毒而有損真氣，豈可嘗試。

○集方：已上諸證，用他藥不効者，獨用此一味，不佐諸藥。急病用一二分，小兒用四五釐，以白湯調服。

○靈砂味甘，氣溫，無毒。

李氏曰：按胡演丹藥秘訣云：升靈砂法，用新鐵銚安逍遙爐上，以蜜揩鍋底，文火下燒，入硫黃二兩熔化，投水銀八兩，以鐵箸急攪，作青砂頭，如有焰起，噴米醋解之。待水銀不見星，取出細研，盛入水火鼎內，鼎口用鐵燈盞仰蓋，鹽泥固濟，下以自然火升之，燈盞內盛水，計乾十二盞爲度，候冷取開，砂結如束針紋者，成矣。○庚辛玉冊云：靈砂者，至神之物也。硫汞制而成形，謂之丹基，奪天地造化之功，竊陰陽不測之妙，可以變化五行，鍊成九還。其未升鼎者，謂之青金丹頭，以升鼎者，乃曰靈砂。靈砂有三：以一伏時周天火而成者，謂之金鼎靈

砂；以九度抽添，用周天火而成者，謂之九轉靈砂；以地數三十日炒煉而成者，謂之老火靈砂，並入藥用，並宜桑柴灰淋醋煑伏過，方可入藥。○李氏曰：以靈砂拌飲食，飼猢猻、鸚鵡、犬、猫等，變其心，輒會人言。

○靈砂益精神，安魂魄，和臟腑，通血脈，下逆氣，殺精魅鬼（祟）（惡）邪之藥也。李氏（時珍）曰：硫黃陽精也，水銀陰精也，以之相配，二體合璧，有夫婦之道焉，故能奪造化之功，而升降陰陽，既濟水火，爲扶危拯急之神丹也。主上盛下虛，痰涎壅盛，頭旋吐逆，反胃膈噎，霍亂轉筋，心腹冷痛，能升降陰陽，既濟水火，調和五臟，補助元神。研末，米糊爲丸，如梧子大，陰陽水吞下七丸，最能鎮墜虛怯。龐安常方：治久患反胃，及一切吐逆之證，小兒驚吐，其効更神。但不可久服多服爾。繆氏曰：前賢雖稱配合陰陽，既濟水火，

然而硫汞有毒，性亦下墜。止可暫用，其墜陽交陰，邪將於一時，安能資其養神益氣，補助元神於平日哉。凡胃虛嘔吐，傷暑霍亂，肺熱生痰，心虛神鬼不寧等證，病屬於虛火，非關陰寒，久病陰寒驟發者，咸在所忌。如必不得已而用之，重配參、耆、歸、朮稍可。

○集方：治上盛下虛（證治準繩），氣不升降，痰涎壅盛，及中風涎潮不省人事，或傷寒陰盛陽衰，自汗厥逆，或婦人血海久冷。用靈砂一錢，薑汁打米糊丸，如小豆大，每服七丸，急者九丸，薑湯送下。○頭旋吐逆，人參、白朮湯下。○反胃膈噎，人參、砂仁湯下。○霍亂轉筋，淡鹽湯頓冷下。○胃脘心腹冷痛，木香湯下。○疝瘕弦氣，茴香湯下。○偶感暴

驚而得諸病，用人參湯下。○產後血脹不行，腹痛上攻心胃，用五靈脂湯下。

○銀硃味辛，氣溫，有毒。

李氏曰：按胡演丹藥秘訣云：升煉銀硃法：用石亭脂二觔，新鐵鍋鎔化，次下水銀一觔，炒作青砂頭，如有焰起，以米醋噴之，炒不見星爲度。研末入陽城大罐內，石片蓋住，外用鐵絲縛定，鹽泥固濟，大火煅之，以三炷香爲度，待冷取出，貼罐者爲銀硃，貼口者爲丹砂。每石亭脂二觔，水銀一觔，燒上銀硃一十四兩八錢，次銀硃三兩五錢。

○銀硃，劫痰涎，破積滯，散結胸，殺蟲蝨，療疥癬，斂惡瘡，潰（時珍）爛之藥也。李氏曰：硫黃同汞升煉而成，其體重墜，其性燥劣，用之不當，亦能爛肉攣筋，其功過與輕粉同也。

○集方：治小兒驚痰，內釣多啼（全幼心鑑）。用銀硃五分，乳香一錢，尾

上焙出汗共爲末生蒜肉一錢煨熟和搗爲丸如黍米大一歲服五丸三四五六歲服七八丸薄荷湯化下○治痰氣飲食結胸不問陰陽虛實用銀硃五錢明礬一兩同研細末鐵蓋內鎔化調勻候冷再爲極細末神麴糊爲丸如梧子大每服二錢薑湯吞下心上隱隱有聲結胸自散不動臟府不傷真氣明礬化痰銀硃破積攻也○治男婦陰毒傷寒用銀硃一錢輕粉一錢生蒜肉二錢煨熟共搗和作餅貼手心男左女右兩手合定於陰下○頃間氣回微汗出口中微有蒜氣即活○治蟲癬用銀硃一二錢桐油調塗○治頭生蟣虱用銀硃不拘多少米醋調塗梳掠上通髮用帕巾包頭一夜至旦盡

死○治疽瘡發背潰爛用銀硃白礬各三錢煎湯溫洗外用桑柴火遠遠焙之日三次甚效○治魚臍疔瘡四圍紅中央黑者用銀硃五分水和丸白湯下○治楊梅毒瘡用銀硃輕粉各二錢俱研細末黃蠟清油各一兩鐵盞內煎油滾投蠟鎔化取起將凝入硃粉二末攪勻用油單紙攤貼瘡上痂自脫也○治血風臁瘡用銀硃五錢黃蠟一兩香油二錢鐵盞中油內鎔化黃蠟將凝入銀硃攪勻攤單油紙上再夾單油紙一層貼之○治男婦身染楊梅毒氣筋骨疼痛用銀硃三錢枯礬四錢作三紙撚每旦以一撚蘸香油點燈照臍被覆臥之取汗

玉石類

玉　味甘氣平無毒（陶氏曰玉出藍田及南陽徐善亭部界中今西域于闐國疏勒諸處出玉晉鴻臚卿張匡鄴使于闐作行程記載其國采玉之地云玉河在于闐城外其源出崑崙山西流一千餘里至於闐界牛頭山乃疏爲三河一曰白玉河在城東三十里二曰綠玉河在城西二十里三曰烏玉河在綠玉河西七里其源雖一而其玉隨地而變故其色不同每歲五六月大水暴發則玉隨流而至玉之多寡實由水之大小七八月水退乃可取又王逸民下經載玉之色曰赤如雞冠黃如蒸栗白如截肪黑如純漆而青玉獨無說焉今細考之青白者嘗有黑者時有之黃赤者絕無雖禮之六器亦不能得其全真者今儀州出一種石色如蒸栗彼人謂之栗玉或云若黃玉之類但少潤澤聲不清亮爲不及也然服食者惟貴純白他色亦不取焉李氏曰披太平御覽云安州出白玉夫餘出赤玉挹婁出青玉大秦出菜玉西蜀出黑玉藍田出美玉觀此諸說則玉出產之處亦多矣而獨以于闐玉爲貴焉周禮玄圭蒼璧黃琮赤璋白琥玄璜以象天地四時而立名禮記云石蘊玉則氣如白虹精神見

於山川也博物志云山有野穀生下有玉玉之精見如於山而木潤產於水而流芳藏於石而文采露於外此諸說則玉有山產水產二種不同細考之中國之玉多在山于闐之玉多在河也其石似玉者如珷玞琨理與等類也北方有礦石子玉室石有浮眼乃土藥燒成者然無溫潤光明之氣色不可不辨又硬官藏火玉色赤可烹鼎暖玉可辟寒寒玉可辟暑香玉有香軟玉質柔又外國有觀日玉洞照日中山水宮闕此皆希世之寶不可多得也）

○白玉潤心肺助聲音止煩渴定虛喘安神明滋養五臟六府清純之氣之藥也（[illegible]）與金銀人參竹葉麥門冬同煎服有益又按玉經有青黃赤白黑碧六種之色凡入藥惟取生玉純白無瑕者佳如他色者性劣而燥不可用也

青琅玕味辛，氣平，無毒。（蘇氏曰：書云雍州厥貢球琳琅玕。又西域記言：天竺國亦有之。又按許慎說文云：琅玕，石之似玉。生南海石崖間，狀如珠，質似玉，體如石，感陰陽之氣而成。又列子云：蓬萊之山，珠玕之樹叢生。據此諸說，則琅玕生於西北山中，及海上山崖間。其生於海底以鐵網取者，是珊瑚，非琅玕也。產於山石崖者為琅玕，青色；產於海底者為珊瑚，紅色。此說明甚。又回回地出一種青珠，與碧靛相似，恐是琅玕所作者也。）

○青琅玕（日華子諸家本草）療吐逆氣附手足逆臚，熱瘡身癢，疥瘙死肌，及石淋淋閉不通，產後惡血悶脹諸疾，俱宜火燒投酒中淬之三次，取酒飲一二合愈。

治乳蛾腫脹（廣筆記）：用雄黃一錢五分，膽礬、明礬各一錢，芒硝一錢，俱研極細，和勻，吹入喉中。○又方：用雄黃二分，火硝一錢五分，硼砂五分，冰片三釐，麝香一釐，共研細末，用蘆管趕藥一二匙，吹喉間，即吐痰涎愈。○治坐版瘡：用雄黃二錢研極細，瀝青六錢研碎，和勻，以綿紙包裹，撚成紙條，用豬油熬化浸透，點火燒着，取滴下油搽上立效。○治蛇咬傷：用雄黃五錢研細末，以菜油半盞調，再以白芷一二段在油內，和雄黃磨，以白芷磨去少許，蘸雄黃油搽傷處，濕火烘之，滴盡黃水為度，水出腫漸消。

治小兒癖疾積塊，僻居兩脇，生于皮裏膜外也；又有痞結者，否塞中脘，堅硬可按也。二證總因飲食失調，停滯不化，邪氣相搏而成，用藥必先固胃氣為主，使養正則癖積自除；若欲直攻其積，損其脾土，脾土一虧，必變證百出矣。以運脾消癖散：用雄黃五錢研細，白茯苓、厚朴、白朮、三稜、莪朮、甘草各一兩，俱用醋拌炒，磨為末，每早晚各服一錢，米湯調下。外用磨癖膏，見硇砂下。

珊瑚味甘，氣平，無毒。（李氏曰：珊瑚生南海，及波斯國、師子國來。今廣州亦有。生海底，作枝柯，五七株成林，居水中，直而軟，見風則曲而硬。枝柯多者更難得。明潤如赤玉，膩脂色，有細縱文者為上，淡紅者次之，黑色者不堪用。按海中經云：取珊瑚先作鐵網沉水底，珊瑚貫中而生，歲長一尺，因絞網得之，皆摧折在網中，故難得完好者。不知今之取者果爾否。按東明史記言：漢積翠池中有珊瑚高一丈二尺，本有三柯，上有四百六十條，云是南越王趙佗所獻，夜有光。晉石崇家有珊瑚高六七尺，今並不聞有此高大者。）

○珊瑚散瘀血，去目翳之藥也。繆氏曰：此得水中陰堅之氣以生，體潔而氣清，質堅而性墜，故唐本草善消瘀血而去翳障。大氏方又言鎮心志，止驚癇，皆取此堅潔清重之義云。

○集方：治心肺鬱熱，吐衄不止（彭氏家抄）：用大紅珊瑚，以布包鐵錘徐徐擊之，候碎，入鐵研中徐徐研，極細如粉，每服二分，白合煮成糊調服。○治目中膚翳（眼科要方）：用珊瑚、貝子、真珠、馬腦、琥珀、石蟹各等分，為極細末，用米許，點入目中。○治心神昏冒，驚癇卒倒，或怔忡煩亂（方脈正宗）：用大紅珊瑚、琥珀、真珠各一錢，研極細，入人參、白朮、當歸、膽星各三錢，共研末，和珊瑚等末，每服一錢，燈心湯調下。

瑪瑙。味辛，氣寒，無毒。（李氏曰：瑪瑙生南北東西四野外國中，非玉非石，而又玉石之屬，乃重寶也。有紅、白、黑、花斑四種，有花文如纏絲者爲上品。得自然灰即軟，可刻字也。甚曹昭格古論云：多出南北東西四番外，非玉非石，堅而且脆，刀刮不動。其中有紅、黃、白、黑斑點。又顏氏負暄錄言：瑪瑙品類甚多，出產有南北。大者如斗，其質堅硬，碾造費工力。東南產者出大食國，色正紅無瑕斑，可作杯斝。西北產者色青暗，今寧夏、瓜沙、羌地砂磧中亦皆有之。外有柏枝瑙，花如柏枝。有夾胎瑙，正視瑩白，側視又若凝血，一物二色也。截子瑙，黑白相間。合子瑙，色如漆黑，中有一條白絜間之。錦紅瑙，其色赤如錦花。纏絲瑙，其色紅白如絲之細。此皆貴重之品。又有紫水瑙，其色如淡水花醬。斑瑙有紫紅花點。曲蟮瑙有協紅花條，皆其次者。又有紫雲瑙出和州上。石璃出沂州。此二瑙亦有紅色雲頭、纏絲、胡桃等花。花又竹葉瑙出淮，有花如竹葉，重可作桌面屏風。又金陵而花臺小瑪瑙，止可充玩好。○試瑪瑙法：以瑙研木，不熱者爲真。）

○瑪瑙。辟惡氣，解客忤，去目瞖之藥也。繆氏曰：此乃玉之

屬也。觀寶藏論言：研木不熱，其性寒可知；光潔明淨，其體清可知。故陳氏方辟惡氣而解客忤，去目翳而熨赤爛，皆取此寒潔清淨之氣而辟除卒暴鬱結之疾也。

○集方（楊木公方）：治卒暴惡邪鬼氣及小兒客忤、神亂氣閉之證。用明淨瑪瑙，麤石上酒磨汁，薑湯衝和灌之，即甦。○治目生翳障，用瑪瑙配珊瑚用。（見珊瑚集方中）

雲母。味甘，氣平，無毒。（別錄曰：雲母出泰山、齊山、廬山、瑯琊北定。蘇氏曰：今雲夢山、方臺山及江州、淳州、杭越間亦有，生山石間，並二月采。李氏曰：候雲氣所出之處掘取，無不大獲。但掘時忌人聲也。小者長二五寸，大者長五七尺，作片成層，可折，光瑩如水，自澤瑩透者爲上。以沙土養之，歲月生長。置于一室中，雲氣常起。前日觀照正采，並其產地，下見諸色也。多青色者名雲英，春月宜服；多赤色者名雲珠，夏月宜服；多白色者名雲液，秋月宜服；多黑色者名雲母，冬月宜服；只青黃色者名雲砂，季夏宜服；晶晶純白色者名磷石，不拘四時宜服也。[illegible]宜服。候服令人病淋瀝[illegible]即陽起石[illegible]治設經婦人千便火雲[illegible]）

○雲母。下痰飲，退瘧疾，止久痢，禁淋帶之藥也。繆氏曰：此藥色白，屬金而主肺，石藥中溫良之品也。以其法金，故主肺胃痰飲；金能平木，故退瘧疾而定寒熱；且平和胃以溫中，故又止久痢，禁白帶淋濁之疾焉。但味性雖居

非不終屬石類，與人身臟府氣血實非同器，秪宜用以治病，取效則已。如前古所云煉服益精明目、輕身延年之語，此後世妄誕之士假神農之言附會其說，以欺世愚俗，不可依從。

○集方（方脈正宗）：治痰飲吐涎沫，或頭痛者。用雲母水飛過五錢，半夏薑汁製、南星薑汁製各一兩，於白朮土拌炒一兩五錢，共爲極細末。每早晚各服三錢，食後白湯調下。○治（御院方）牝瘧寒多熱少者，用雲母燒半日，蜀漆燒半日，龍骨燒紅，各等分爲末。未發前服一錢，薑湯調下。○治（千金方）赤白痢積年不愈，用雲母經煉過，爲細末，每早晚各服八分，薑湯調下。○治婦人（同前）帶下白淫，用雲母煉過，爲細末，每早

晩各服一錢，黑棗泡湯調服。○治難產催生方。用雲母經煉過五錢，爲極細末，溫酒調服，入口即產，不順者即順，萬不失一。○治金瘡出血不止，用雲母經煉過，研細末，傅患上即止。

治小兒驚風，大人癲癇，及男婦骨蒸勞熱，咳嗽吐痰，如中風語澀，舌強，久不瘥者，又傷寒大熱不解，狂躁不寧，一切陽熱火盛之證，悉皆治之。名安神丸，用上潔雲母石研細水煮過五錢，烏犀角、硃砂各三錢，玄明粉一錢，冰片、牛黃、麝香各四分，共研極細，再配人參、白茯苓、膽星、地骨皮、甘草各四錢，微炒，爲細末，（麥門冬去心一兩，酒煮爛，搗膏爲丸，如雞豆大，曬乾，淨磁器貯藏，每遇是患，大人服三丸，小兒服一丸，生薑湯化下。）○治小兒一切

痰喘，名萬金散，用上潔雲母石水煮過五錢，全蝎、殭蠶、甘草、膽星、黃連、天麻各四錢，俱微炒，牛黃、巴霜、冰片各二分，（共爲末，每服一分，薄荷湯化下。）○治小兒急慢驚風、癲癇、天弔、中惡、客忤、臍風、撮口、胎驚、胎癇，牙關緊急，痰熱搐搦，反弓鼠視，昏迷不醒，一切驚怪危惡緊急之證，並皆治之，名大聖奪命丹，用上潔雲母石水煮過，全蝎、殭蠶、烏梢蛇尾、烏犀角、羚羊角、赤足蜈蚣各五錢，石菖蒲、羌活、白附子、茯神、半夏、膽星、北細辛各四錢，沉香、川烏、童便製、人參、甘草各三錢，琥珀、硃砂、珍珠、雄黃各二錢，天竺黃一兩，川烏泡一個，金箔四十張，麝香一錢，（薑汁打糊爲丸，如芡實大，每用一丸，薄荷湯化下。）

白石英，味甘，氣微溫，無毒。入手太陰、陽明二經。氣分。（蘇氏曰：白石英，出澤州、虢州、洛州，多有。今取澤州者爲勝。別錄曰：白向出華陰山谷，大如指，長三四寸，六稜如削，白澈有光，長五六寸者更佳。黃端白稜者名黃石英，赤端白稜者名赤石英，青端赤稜者名青石英，黑澤有光者名黑石英。若細而長，及大而不正，與多瑕疵者俱不可用。李氏曰：澤州有英雞，啖石英而性補。）

○白石英，養陽氣，滋陰臟之藥也。王氏曰：色相瑩潔如華萼，故名石英。以石質可入腎，白色可入肺，中含火光，可散寒，故前古主腎氣不周於胸而消渴，天癸枯竭於內而陰痿，肺氣衝逆不平而欬逆，風濕留滯不行而痺結，或心陽失令而胸膈作寒，或脾胃衰弱而中氣不運，此藥體堅而氣潤，質重而性輕，味甘溫而能補中逐冷，雖屬石種，實無燥劣剛暴之性，大有資化育神之功，柰何

前人以功用載之方冊，而後人竟棄之不用，惜哉。然僅可暫用，應效即已，又不可使人多服久服也。

○集方：治腎藏陽氣衰微，津源不能上濟於華池，頻作渴者，用白石英四兩，煎湯飲。一方加枸杞子二兩，同煎亦通。○治婦人年未五十，天癸久絶不行，用白石英四兩，當歸身二兩，煮酒飲。○治形寒飲冷，肺氣衝逆，作欬作喘，或爲哮嗆，或爲冷怯，用白石英二兩，日煎湯飲，一月平復。○治風濕留滯筋脉，四肢木強，不能舉動而痺痿者，用白石英四兩，用好酒十壺，重湯蒸三日夜，酒耗去半，白石英仍浸酒內，逐日隨量飲。飲畢，再加酒十壺，如法蒸飲，全愈。○治心火失令，胸膈時作寒冷，陽氣不運，

漸成中滿，減飲食者，用白石英八兩，用好酒十壺，重湯蒸三日夜，與前風濕留滯方同法製服。○一方治虛寒（孫真）百病（千金翼），用白石英打碎，如小豆大，取一合，每日煮粥食。次日取起水洗淨，再和粥煮，如此煮粥食百日，即見顏色悅澤，精神強健，百病全消。

紫石英味甘，氣溫，無毒，味厚於氣，陽中之陰，降也。入手少陰、足厥陰經血分藥。

（別錄曰：紫石英生泰山山谷。吳氏曰：今會稽山、諸暨山、陽山、山烏程山俱有之。李氏曰：今江夏攀山、永嘉固陶村小山亦有。其色淡紫，其質瑩澈，如水晶，不拘大小，皆具五稜，兩頭如箭鏃。修治：凡入丸散，用火煅，醋淬七次，研末，水飛過用。）

○紫石英溫中暖藏之藥也。（本經）如前古治欬逆上氣，（李仁甫稿）寒熱邪氣，婦人風寒在子宮，絕孕無子，蓋取溫以除寒，甘以補中也。如別錄又言定驚悸，安魂魄者，蓋取重以去怯，明以達幽也。此藥填補下焦而走腎藏，爲婦人煖子宮，壯胎娠，治半產，誠爲要藥。然而止可暫用，不宜久服。凡係石類皆然，不獨石英一物也。如婦人絕孕，由於陰虛火旺，不能攝受精氣者，又忌用之。（下三方出[illegible]秘方）

○集方：治肺寒欬逆上氣，用紫石英（火煅，醋淬七次，研細末，水飛過），每早用五分，花椒十粒，泡湯下，十服全愈。⊙治時行寒瘧，頭痛寒熱如瘧，用紫石英五分（製法如前方），生薑五片，煎湯調服，三服愈。⊙治婦人胎胞虛冷，久不受孕，或受孕多小產者，用紫石英二兩（製法如前），配香附（醋炒）、當歸、川芎（俱酒炒）、白朮（土拌炒）各三兩，枸杞子（酒洗炒）、熟地黃（酒煮搗膏），煉蜜丸，梧子大，每早晚各服三錢，好酒送下。○治怔（[illegible]家秘）忡驚悸，魂魄不寧，或心虛不寐，精神煩亂，用紫石英一兩（製法如前），配當歸、遠志、棗仁、川貝（切）、茯苓、柏子仁各二兩，川黃連三錢，俱用鹽水拌炒，研爲末，煉蜜丸，每早晨服

三錢，臨睡服四錢，俱用黑棗湯下。○治風熱痰癡及驚癇痰癡，用紫石英、白石英、寒水石、石膏，俱打碎，大黃、乾薑、龍齒、牡蠣、滑石、甘草，各五錢，水一升，煎半升，食後溫呷，無不效者

菩薩石，味甘，氣平，無毒。

（蘇氏曰：菩薩石，出嘉州峨嵋，五臺諸山，及匡廬嶽寶蓋。其質六稜，或大如栗棗，或小如櫻桃，其色瑩白明澈，如狼牙石、水晶之類。日中照之，有五色光彩，映日可愛，亦石英之類也。）

○菩薩石，解百藥毒，化諸蠱毒之藥也。宋人日華子：治藥毒、蠱毒，及蛇蟲、蜂蠆、狼犬諸毒，并一切金石藥毒變動作癰疽、渴疾，又傷寒熱狂，譫語，產後血閉，驚癇諸證，俱用白湯磨服，如蛇蟲、狼犬等傷，再為末，并傅傷處。

金石類

石青，味甘，氣平，無毒。

（別錄曰：石青，生朱崖山谷及武都、朱提，南海中。吳氏曰：生蜀地、朱崖、巴南及林邑、扶南，舶上來者，形塊大如拳，其色甚青，腹中亦時有空者。武昌者，片塊小而色更佳。今簡州、梓州者，形扁作片，而色稍淺。李氏曰：今繪畫家用之，其色青翠不渝，楚蜀滇黔諸處亦有之。而今貨石青者，有天青、大青、西夷青、回回青、佛頭青，種種不同，而回回尤貴，外有扁青、層青、碧青、白青，皆其類耳。）

○石青，下頑痰，去風癇，定驚悸（時珍），明目疾（神農），堅筋骨，折傷之藥（別錄）也。蘇氏（水門）曰：此藥色青質細，光潤瑩徹，通東方甲膽乙肝之神，故善能明目，退翳，鎮驚，定狂，下痰，破結，立見奏功。然終屬石藥，但中病即已，不可多服久服也。如前古又主折傷，筋骨損壞，溫酒調服數分，日漸完固。軍醫黃杏

功用，收陣後傷殘，屢見神應也

○集方：治頑痰阻塞不化，時發風癇，用上翠嫩石青五錢，石綠二錢，俱研極細末，以神麴打糊丸，菉豆大，每服十丸，溫湯下，能吐痰一二盌，不損胃氣。○治小兒急驚風，用石青一兩，天竹黃五錢，牛黃一分，俱研極細末，每服一二分，生薑湯調下。○治目痛目癢，并翳膜不明，用石青三錢，珍珠一錢，研極細，用銀簪脚點少許。已上三方，出燕容道子用秘。

空青味甘酸氣寒無毒入足厥陰肝之用藥。（陶氏曰空青生益州山谷及越巂山有銅處則生其腹中空蘇氏曰今蔚蘭宣梓諸州亦有宣州者腹中空甚州蔚州者成片或成塊色青無空腹者大氏曰空青大者如雞子小者如相思子其殼青厚如荔枝其內有漿味酸甘又按漿果玉潤要訣云空者言其質青者言其色也產上饒信饒究脊佳尤片段皆金紫色有光彩次產蜀嚴道及北代山者亦紅受庚辛赤金之精甲乙陰靈之氣迸泉多生久而含潤初從坎中出者其內有水如漿味頗甘酸經久即乾如連珠金星燦燦然又按庚辛玉冊云多生金坎中生生不已故青爲之月有如拳大及卵形者乃得空中有漿一如水出銅坑者亦佳止堪作畫又有石青楊梅青皆是一體而質有精麤不同耳點化以曾青爲上空青次之楊梅青又次之但鬪質如珠者乃白青非空青也修治各隨方製酒浸醋拌製過乃可變用）

○空青明目聰耳利九竅之藥也（神農）葉氏曰（掃葉）此藥得金礦精英之氣熏蒸而生輕虛玲瓏力走空竅故前古主目病一切諸證凡腫赤翳淚痛癢昏蒙及目珠傷損破壞咸得救全目疾諸方首稱之也推此而外如頭風腦脹中風口喎蘇甄兩氏屢用奏功色青主肝去肝經風熱爲最故爲治目神藥此藥中之珍貴妙品也一時難構除目疾之外他用稀少然治目病其應甚捷倘目珠疙枯翳乾并傷損致瞳神走裂者用之亦無益也。

○王紹隆先生曰空青色青法木故可入肝功能明目肝主開明於目故也然瞳子神光專司在腎空青中空有漿宛如骨中之髓且金星燦燦然象形從治持易以耳

○集方治雀目赤目青盲內外翳障及風眼爛眼淚眼（聖濟錄）并膚翳昏暗一切目疾俱可治之用空青胡黃連俱用天落水洗淨各三錢曬乾爲極細末加大冰片一分總研勻用潔淨瓷瓶收貯每臥時仰頭用鵝管吹藥一二分入兩鼻內便覺目中有凉爲驗○治中風口眼喎斜用空青豆粒許乾嚼含嚥甚效○治頭風腦痛百藥不效用空青一錢冰片一分共研極細末吹一分於兩鼻孔中或用一二分白湯調服亦可○治斑瘡入目不退者用空青一錢丹砂二錢共研細末蠐螬五枚搗汁和藥點之。

○曾青味酸氣寒無毒。（別錄曰曾青出蜀中及越巂蔚州鄂州諸山谷中李氏曰其山有銅曾青生其陽曾青者銅之精也色理相類空青累累如黃連相綴又如蚯蚓屎而方稜色淺如波斯青黛層層而生故名曾青川之作金漿者如眞又造

化指南云空青多生金礦曾青多生銅礦乃石綠之得道者稟東方之正色也須酒醋浸炙乃有神化修治勿用夾砂石及有銅青者每一兩取紫豆二合荔藤二兩入瓷鍋內同煮一晝夜勿令水火失時取出再用東流水浴過研如粉用。）

○曾青治目義同空青茲不重錄。

○石綠（又名綠青）味苦濇氣平有小毒。（李氏曰綠青即石綠陰石也生銅坑中乃銅之祖氣也銅得紫陽之氣而生綠綠久則成石謂之石綠而銅生於中與空青曾青同一根源也范成大桂海志云石綠銅之苗也出廣西右江有銅處生石中質如石名石綠一種脆爛如碎土者名泥綠品最下按大明會典云青綠石礦一十一觔淘淨綠一十一兩四錢暗色綠礦一觔淘淨綠一十兩八錢礦砂一觔燒造礦砂綠一十五兩五錢修治揀上色深綠精好者研細水飛過用）

○石綠吐風痰消喉痺殺蟲蠱之藥也蘇氏曰此藥酸濇善能逐涎化風痰眩悶用一二錢研末白湯調服偃臥

須臾。涎自口角流出。即愈。其功更勝於他藥。故著之。李（時珍）氏曰。痰在上。宜吐之。在下。宜利之。亦視人虛實強弱。更察其脉。如痰鬱火閉。氣盛有餘之人。乃可投之。如腑燥。陰虛血少。胃弱之人。并六脉虛數。亦須斟酌行之。故初虞世有金虎碧霞之戒。正此意也。

○集方。治風痰迷悶。（和劑方）用石綠一兩。川烏頭尖。蠍梢各七個。共研為末。米糊丸。芡實大。每服二丸。薄荷湯化下。須臾吐出痰涎。○治喉痺脹塞。（方脉正宗）水藥不通。用石綠一錢。研末。白湯調服。須臾吐出涎痰立通。○治小兒疳熱生瘡。（集玄方）或頭瘡。鼻瘡。耳瘡。咽頸窩瘡。久不瘥者。用石綠。白芷各等分。為細末。先以米泔溫水洗瘡。用豬膽汁調搽。數日

愈。○治齒縫斑䘌臭爛。用前藥少許。搽齒縫間。即愈。○治急驚昏迷不省人事。用石綠四分。輕粉三分。共研細末。每服二分。薄荷湯調下。取吐。

丹砂。味甘。氣微寒。有毒。可升可降。陰中陽也。入手少陰經。

別錄曰。丹砂出符陵山谷。符陵。涪州也。接巴郡之南。今不復采矣。出武陵西川諸蠻夷中。今通屬巴地。謂之巴砂。蘇氏曰。近出辰州。宜州。階州。而辰州者為最。生深山石崖間。穴地數十丈。始見其苗。乃白石。曰硃砂牀。砂生牀上。大者如鷄卵。小者如榴子。狀若芙蓉頭。似箭鏃。連牀者。色黯而光明瑩徹。碎之嶄巖。作牆壁。如雲母石成層。可析者。辰砂也。過此以往。皆淘土石中得之。無石者顆。作宜州者。亦有大顆。亦作牆壁。但罕類物狀。色亦淡赤。為用不及辰砂。蓋出土石間。非生石牀故也。宜之郴地。邢州。融州。亦有砂。故其水盡赤。每烟霧鬱蒸之氣作赤黃色。土人謂之硃砂。紫能作瘴癘。為人患也。階州者但可作畫。不堪入藥。雷氏曰。砂凡百等。有妙流砂。如拳許大。或重一鎰。具十四面。面如鏡。遇陰沉烟雨。即有紅漿溢出。有梅柏砂。如梅子許大。夜有光。照見一室。有白庭砂。如帝珠子許大。面有小星燦爛。有神座砂。金座砂。玉座砂。不經丹竈。服之自延壽命。次有白金砂。澄水砂。陰成砂。辰錦砂。芙蓉砂。平面砂。金星砂。馬牙砂。神末砂。曹末砂。豆斑砂。石砂。埧砂。溪砂。土砂等。不可一一細述。

寇氏曰。出蠻洞錦州界。猜獠峒老鴉井者。井深廣數十丈。聚薪焚之。石壁迸裂處。即有小龕。中生石牀。如玉。牀上結砂。光明可鑒。砂洎牀大者重七八兩。或十餘兩。張果老人云。丹砂者。萬靈之主。居南方。或赤龍建號。或朱鳥為名。上品生辰錦。中品生交桂。下品生衡郴。清濁體異。真偽不同。辰錦者。生白石牀上。十二枚為一座。如未開蓮花。光明耀日。座中大者為君。小者為臣。四面朝護。又有紫靈砂。圓長似笋。而紅紫。為上品。又有如馬牙光明者。亦上品。有色若雲母者。為中品。石片稜角生青光者。為下品。交桂所出。但是座上及打石得之。形似芙蓉者。亦入上品。顆粒通明者。為中品。片段不明者。為下品。衡郴所出。雖是紫砂。得之砂石中者。亦下品也。陳氏曰。金州。商州。一種色微黃。作土氣。信州一種。形極大光芒埼紫州顆宜州所產而有砒氣破之作生砒色若入藥用見火殺人虞辛王柳六郴州一種余似辰砂塊圓如見所子不入藥用出商黔宜信州州者內含毒氣毀[illegible]

○丹砂、鎮定心氣之藥也。龍潭方、主寧心定志，安魂魄，伏癲狂，散驚癇，避卒忤，殺鬼邪狐魅，解鬱熱痰火等證。究其功用之所長，陰清鎮重，安煩下熱，故於心神魂魄志意不寧之證，每需用之而不棄也。至於殺鬼邪狐魅者，蓋鬼魅妖狐，係陰浮無定之邪物耳。丹砂火赤，鎮重得靈明之體，稟陽明離麗之光，使之重以鎮之，明以燿之，則陰浮無定之邪而自滅矣。故道家書符咒水，藉此爲法寶也。何前人與本草，遂託神農之名，而謬言治五臟百病，久服通神明，長生不老，能化爲汞，豈理也哉。故唐甄氏撰藥性論，謂其有大毒，若經伏火及一切烹煉，則毒等砒礵，服之必斃。何唐以來，上而人主，下而縉紳，僉餌斯藥殺身之禍，鮮克免者，戒之戒之。（朱）又讀本草於蘇氏集解中云：每有煙霧鬱蒸，作赤黃瘴氣，尤能作災癘，爲人疾患等語，洵非良善無毒之物也，可知矣。焉有久服能致長生之道乎。

○方龍潭先生曰：小兒初生，用硃砂一二分，研細，乳調塗口中，令兒吮之，能化胎毒。又不宜多服，多服反發毒也。此藥生研服之性涼而降火，煉熟服之，必亂氣潰血，走泄精神，反致煩悶，或多生惡毒，損壞臟府，爲害有不可勝言者。

○集方（方脈正宗）治心志不寧，或怔忡，或驚悸，或驚癇恍惚，或昏昏多寐，或煩躁不眠等證，用上品好硃砂二錢（用好酒米醋煎便蒸

甘草少許煮之），石菖蒲、當歸、川貝母、陳膽星、茯神各五錢，俱微炒，研爲末，琥珀、真珠各二錢，研極細末，煉蜜丸如龍眼核大，硃砂爲衣，不拘時服。虛煩，人參湯下；有痰，生薑湯下；內熱，燈心湯下；內寒，桂附湯下。臨證酌用，妙執也。○治一切驚憂思慮多忿，及心氣不足，癲癇狂亂，用上品硃砂二兩，打成豆粒（製法如前），燈心二兩，豶豬心二個，切開，入燈心、硃砂在內，麻札住，磁鍋內煮一伏時，取硃砂爲極細末，外用茯苓二兩爲末，酒打米糊爲丸梧子大，每服十四丸，漸加至二十一丸，川麥門冬湯下。甚者用乳香、人參湯下。○治小兒驚熱，夜臥多啼，用上品硃砂二錢（製法同前），牛黃一分，共爲極細末，每服二分，羚羊角磨白湯調下。○治小兒急驚搐搦，用上品硃砂五錢（製法同前），天南星一個，重一兩者，切片，酒炙黃，全蝎三個，共爲極細末。凡一歲兒病，每用一分，薄荷湯下。○治大人小兒打（直指方）撲驚忤，血入心竅，不能言語者，用上品硃砂三錢（製法同前），爲極細末，以雄豬心血爲丸如麻子大，每用三七丸，黑棗湯下。○治無故客忤卒死（肘後方），用上品硃砂二錢（製法同前），爲極細末，用生蜜一合，和白湯少許，調灌之，即甦醒。○治瘟疫（外臺秘要）可辟禳，不致傳染，用上品硃砂一兩，細研如粉，棗肉和爲丸如麻子大，當以太歲日平旦，一家大小勿進一切飲食，向東各吞三七丸，苦茶送下，永無瘟疫災癘。并治鬼魅妖狐憑附人者。○治鬱熱痰火，浮遊不定，用

上品硃砂二錢，（製法同前）川貝母一兩，共研極細末，用竹瀝半盞，和膽星末三錢，打作稀糊，爲丸如麻子大，每早晚各服五分，白湯下。○治產後敗血邪氣入心，癲狂見祟。（劉氏方）用上品硃砂二錢，（製法同前）研細，以紫頸蚯蚓一條，搗爛拌入硃砂末內，入無灰熱酒一盞，調服。○治心腹卒得癥積。（外臺秘要）用上品硃砂五錢，（製法同前）研極細，拌飯一碗，用雄雞一隻，餓二日，以飯飼之，收糞曬燥爲末，溫酒服一錢，日三服，服盡更作，愈乃止。○治男婦心胃痛。（摘玄方）用上品硃砂、明礬、枯礬各等分，爲細末，白湯調服一錢二分。○治胎死腹中不出。（十全博救方）用上品硃砂五錢，（製法同前）白酒調服，即出。○治面上皯黯。（外臺秘要）用雞子一個，去黃，入上品硃砂末五錢，入雞子內，綿紙封固，入雌伏雞窠抱，至雞出，取汁塗面，即去，不四五次愈。

通靈五寶散

（凡人病過楊梅、天泡、棉花等瘡，致成一切毒發之疾，或楊梅粉毒，爛見骨，經年不愈者，或筋骨疼痛，舉發無時，或遍身斑瘡不消，或出膿血，或遍身起皮，發露好一層起一層，或赤燥白屑，鵝掌風癬，或皮好骨爛，口臭雞脂，及年久臁瘡不愈，一切頑瘡惡毒，並皆治之）

大丹砂二分　鍾乳粉三分　琥珀　冰片各五厘

珍珠三厘半

（右爲細末，每服五釐，入飛麵一分，和蒸餅搗洽作一服，每料十服，分作十帖，每日用土茯苓一觔，用水煎汁十二碗，[illegible]晨以一碗送[illegible]，其[illegible]隨[illegible]服，其茯苓湯十一碗，一日服盡，不可別用湯水茶，以口渴只服，盡一料以十日即愈，或有不終劑而愈者，如未痊者，再服一料，無不愈也。忌發百物、惡雞鵝牛肉、房事，服藥完不忌。此方乃王光泉遊宦廣東得來，極其治楊梅瘡，乃是古今第一仙方也，幸寶之寶之，莫浪傳爲屑劑者）

雄黃　味苦，氣寒，平，有毒。氣味俱厚，升也，陽也。入足陽明經。

（吳氏曰：雄黃生山之陽，是丹之雄，所以名雄黃也。別錄曰：生武都山谷、燉煌山之陽。武都氐羌也，是仇池宕昌亦布之，但少劣耳。燉煌在涼州西北千里，近來流通不絕，貨取不便。抱朴子云：今石門始興之好者，純而不雜，一色如雞冠，光明曄曄者最勝。蘇氏曰：階州接西戎界出一種水窟雄黃，生山巖中有水流處，其石名青煙石、白鮮石。黃出其中，其塊大者如胡桃，小者如栗如豆，有孔竅，色淡紅而微紫，體極輕虛，而功用更勝，丹竈家尤貴重之。劉禹錫曰：按水經注云：黎陵縣西北連巫山之溪出一種，名黃水雄黃，有神異，每冬月祭祀山神，鑿石淺數丈，方采得之，故以溪水取名焉。但凡雄黃色純黃，似雌黃色而無光明者，外有黃，中帶青黑而堅硬者，曰熏黃；氣臭者，曰臭黃，並不堪服食，只可療瘡疥，作熏塗藥。修治：每雄黃三兩，用甘草、紫豆各一兩，以新汲水入坩鍋中煮一伏時，取出搗如粉，水飛，澄去黑者。其內有劫鐵石，能劫鐵，並不入藥用。）

○雄黃殺百蟲，療疥癬，化涎痰，止癲癇，消死肌，磨積聚，逐癖氣，祛精邪鬼魅之藥也。成氏曰：此藥稟火金之性，得

正陽之氣以生，善辟陰凝留閉諸疾，故前古之殺百蟲、疥癬，王好古之化涎痰、癲癇，別錄之消死肌、積癖、精魅鬼邪、瘧疾寒熱，悉屬陰凝障痺之氣，藉此雄明正黃之令，轉陽精純健之力，則陰凝留閉諸疾，不驅而自消夷矣。繆氏曰：此藥體屬金石，性墜氣悍，雖能殺百蟲，及傳疥癬、惡瘡、疔腫，辟鬼魅邪氣，在所必用，然而燥烈有毒，外用易見其所長，內服難免其無害。凡在服餌中，病即已，毋盡劑也。前古稱爲煉食之，延年益壽，輕身神僊，此乃唐間方士託僞神農之言，妄誕欺世之語，不可信從。

○集方：（孫氏方）治蠱毒蠱毒，用雄黃、生明礬各等分，端午日研化，蠟丸梧子大，每服十九，熟水送下。○治遍身蟲疥蟲癬，

用雄黃、蛇牀子各等分，俱研，和水銀減半，以猪油和搗勻，入水銀再研，以不見星爲度。早晚以湯洗淨搽藥。○治頑痰涎結不散，胸滿頭眩，不能飲食者，用雄黃研極細，水飛過，每服五分，米湯調服。○治癲癇卒倒，常愈常發，用雄黃水飛過、膽星俱研細，草麻肉各等分共研勻，米糊爲丸如菉豆大，每早飯後服一錢，白湯下。○治死肌惡瘡瘻痔疽痓、潰爛久不收口，用雄黃研細，水飛過，以少許日敷之。○治積聚痞塊，用雄黃、白礬各一兩，俱研細末，用水粉一兩，炒焦，米醋調和雄黃、白礬末，作膏，用細密布攤貼患上，連貼三四個即愈。○治腸下痃癖，因傷食成者，用雄黃一兩，爲末，巴豆肉五錢同研，入紅麴五兩，爲末，滴水跌成丸，梧子大，每服七丸，溫湯下，以利爲度。○治飲酒多而成癥，頭眩惡心，嘔吐，或酒積停於胃間，遇飲即吐，久而成癖，用雄黃一兩，爲末，巴豆肉六錢，嫩稍十五個，同研勻，入紅麴二兩，爲末，滴水跌成丸如梧子大，每服七丸，溫酒下，以利爲度。○治卒中邪魔，用雄黃研細末，吹鼻中，立甦。○治鬼擊成病，腹中煩滿欲絕，用雄黃爲細末，服一錢，酒調下。○治男婦病邪，爲鬼物所憑，或夢與交通，獨言獨笑，悲思恍惚者，用雄黃一兩，松脂二兩，溶化，以虎爪攪之，丸如彈子大，夜燒爐鉢中，上架無板椅櫈，令病人坐其上，以被遍身蒙之，露頭在外，不過三丸自斷，再以人參、白朮、防風各二錢，雄

黃一錢，共爲末，每早服一錢，白湯調下。○續補集方治小兒諸癇，以雄黃、硃砂各等分，爲極細末，每服一錢，猪心湯調下，七服愈。○治傷寒狐惑，蟲蝕下部，痛癢不止，用雄黃五錢，研細末，火盆內燒烟熏其下部，即愈。○治偏頭風痛，用雄黃、北細辛各等分，爲細末，每以一字吹鼻，左痛吹右，右痛吹左。○治楊梅惡瘡，用雄黃一錢，爲細末，杏仁三十粒，去皮，輕粉一錢，俱研細末，用米泔熬水洗淨瘡，以雄猪膽汁調搽瘡上，一日二次，三日全消。○治纏喉風痺，用雄黃一錢，爲細末，白湯一盞調服，取吐下愈。○治走馬牙疳，臭爛，用雄黃三錢，銅綠二錢，俱爲細末，大黑棗去核十個，共雄黃、銅綠末同搗成膏，丸如彈子大，火內燒紅，存性，爲細末，摻少許，以去涎爲度。○治耳爛出臭膿水，久不愈，用雄黃、雌黃、硫黃各等分，爲極細末，吹少許。○治鼻準赤色，用雄黃、硫黃、鉛粉各二錢，蜜陀僧五錢，共爲極細末，每臨睡時以糯米湯加生蜜一二匙，調傅，五次全退。

○雌黃　味辛，氣平，有毒。

（陶氏曰：雌黃出武都仇池者，謂之仇池黃，色小赤。出扶南林邑者，謂之崑崙黃，色如金而似雲母，有甲錯層，可析，畫家所重。李氏曰：今舶上來，如噀血者爲上，湘南者次之。軟如爛金者更佳。雖有雌雄二種，其實一處同生。山之陽產雄黃，山之陰產雌黃也。有火石及色黑如鐵者，俱不堪用。試法：以銅器燒熱，以雌黃劃之，有赤黃線一道者真，佳。一說雄黃日久變鐵，雌黃日久變鉛。雷氏曰：修治勿令婦女雞犬及犯房事人，或刑獄臭穢之地犯之，色必變黑，不可用也。製法：每雌黃一觔，和菉豆一觔，瓷罐中同煮三伏時，其色如金花一樣，在鍋底中。）

（用淨淡水，徧投於中，漉去蒸豆，再用淡水浸一日，濾水乾，石臼中搗細如塵用。）

○雌黃主治功能，與雄黃等，如鎮邪辟鬼，殺百蟲毒。力稍不及。李氏（時珍）曰：但同產一地，而以山陽山陰，受氣各異有別，故服食家重雄，取其得純陽之精也。若雌者，則兼有陰氣，故徧成鷄金精之所鍾。若治病見功，亦彷彿不甚遠矣。

花乳石，味酸、澁，氣平，無毒。入厥陰經血分。

（蘇氏曰：花乳石出陝州閿鄉，體堅重，色正黃，如硫黃色，間有淡白點。彩塊有極大者，有極小者，大者可鐫爲器用。李氏曰：花乳石，陰石也，生代州山谷中，有五色，若蜀中汶山、彭縣亦有之。修治以陽城罐鹽泥固濟，頂火煅過，候地上出火毒，研如塵，再水飛過，曬乾用。）

花乳石止血生肌，散血定暈之藥也。（[illegible]）善入厥陰血分。（[illegible]尹九）嘉祐方治金瘡傷損，出血不止，即刮末傅之，隨合，仍不作膿。又療產後惡血血暈，其功專於散血止血，能使血化爲水，故葛可久治吐血來升斗，有花乳石散；又和劑局方治諸血證，及金瘡胎產，亦有花乳石散，此專治血之功可知矣。而又能下死胎，落胞衣，去惡血，惡血化則胎與胞無阻滯之患也。東垣氏所謂胞衣不出，濇劑可以下之，故赤石脂亦能下胞胎，與此同義。

○集方：治金刃傷肌肉，出血不止，急研花乳石，合石硫黃各等分，傅之，止血如神。（[illegible]八方）○治五內崩損，噴血出升斗，用花乳石一兩，傾銀罐盛，鹽泥封固，栗炭火煅三炷香，取出，研如粉，用二錢，以童子小便一鍾，白湯一鍾，和勻調服，能使瘀血化爲黃水，後以獨參湯補之。（[illegible]人方）○治一切金刃箭鏃傷，及打撲跌損傷，狗咬傷至死者，急以花乳石研細末，摻傷處，其血化爲黃水，再摻便活，更不疼痛。如內有損傷，血入藏府，急用熱酒一鍾，和童便一鍾，調花乳石末二錢服下，立效。（和劑局方）又治畜牲抵傷人腹，或有腸出，急納入，以桑白皮線縫之，外摻花乳石末，內服花乳石

末依前法。藥下。血止立活。〇又方用硫黃四兩花乳石一兩。並爲麤末拌勻。以鹽泥固濟烘乾用栗炭火五觔。煅至炷香。以泥赤爲度。待冷取出藥爲極細末淨磁瓶收貯。治婦人產後敗血不盡。血暈血昏。惡血奔心或胎死腹中。胞衣不下。至死但得心頭溫暖者。即可治也。出箭方。用花乳石一味。火煅半時。爲極細末。摻在箭頭四圍。即出。

慈石。味辛鹹。氣溫。有微毒。氣味俱厚。沉而降。陽中陰也。入足少陰厥陰經。

（別錄曰。慈石生泰山山谷及慈山山陰。有鐵處則生其陽。蘇氏曰。今徐州及南海傍山中。亦有之。慈州者歲貢最佳。能吸鐵虛連數十鐵。或一二斤刀器。回轉不落者尤良。采無時。石中有孔。孔中有黃赤色。其上有細毛。功用更勝。按南州異物志云。漲海崎頭水淺而多慈石。徼外大舟。用鐵葉固之者。至此皆不得過。以此言之。海南所出尤多也。雷氏曰。修治慈石一斤。用新綿裹鐵錘打作二三七塊。以淨水煮二日夜。取出拭乾。布裹再搥細乃碾如塵。水飛過再碾用。凡使勿誤用玄中石并中麻石。二石形俱似慈石。只是不吸鐵耳。而中麻石。更有赤皮且麤。是鐵山石也。誤食令人生惡瘡。不可療。）

〇慈石養腎藏。強骨氣。益精髓（別錄）。去風濕。周痺。肢節痠痛之（甄權）藥也。薛氏曰。腎爲水藏。慈石色黑而法水。故能養腎而強骨益髓。鎮重以象金。故能平肝而主風濕痛痺。善通

肢節者此也。如治耳聾。明目昏。安驚癇。消鼠瘻。癰腫。亦莫非肝腎虛火逆爲眚耳。此藥色黑味鹹。體重而降。有潛引以制陽光之意。但諸石藥俱有毒。而不宜久服。獨慈石性禀沖和。無猛悍燥烈之氣。實有補腎益精明目生子之功。用以煮酒。優於丸散。緣體重達下故爾。

〇繆仲醇先生曰。風淫末疾。發於四肢。而肢節爲之痛。慈石質屬水而體類堅金。對待治之。風息而火安矣。

〇集方。治老人虛損。腎氣衰微。兼風濕。腰肢痺痛。用爍鐵酒。慈石五十兩。白石英五十兩。俱用菉豆五升。同煮三伏時。取出綿裹搥碎。潔淨瓷甕盛水二斗。浸於露地。經日取水煮粥飯食。經年氣力強盛。顏如童子。〇治腎陽

衰，痿不起。用慈石五觔，（製法同前）清酒浸二七日，每飲三合，日三夜一。○（[illegible]）治老人耳聾。用慈石一觔，（製法同前）和猪腎一副，以水煮熟，加鹽椒調和食之，煮粥亦可。○（[illegible]）治眼昏內障，或神水寬大漸散，昏如霧中，或睹空花，或視物成二體，久則光散不收，竟成內障，瞳光淡綠色，或淡白色者。用真吸鐵活慈石，要四面俱能吸鐵者，用二兩，（製法如前）綿裹搥碎，再碾為細末，硃砂一兩，同慈石再總研極細，水飛過，澄底者再研，以飛盡為度，用神麴一兩，為末，打糊丸梧子大，每服三十丸，早晚各食前米湯下。服後仰視微見星月，此其効也。久患目昏屢發者，永不再作。○又方，用慈石三兩，硃砂一兩，（[illegible]製法同前）大懷熟地四兩，酒煮擣膏，山藥、山萸肉、茯苓各四兩，牡丹皮、澤瀉各三兩，鹽水炒，俱研為末，和熟地膏，再加煉蜜少許，和勻搗杵，入慈石、硃砂末研勻，為丸梧子大，每早晚各食前服五十丸，米湯下。治癲癇同前。○（[illegible]）治小兒驚癇暴發。用慈石（製法同前）研細末五錢，膽星、天竺黃、雄黃、紅麴各二兩，俱研細末，總和一處，竹瀝、[illegible]汁稀糊為丸，如彈子大，每服一丸，薄荷湯化下。○（[illegible]）治癲癇冷痰，併鼠瘻瘰癧。用慈石（製法同前）為極細末，瘡破者，乾摻少許，堅硬者，用慈石三錢，配紅麴末一錢，醋調敷。○（[illegible]）治諸般腫毒。用黃丹八兩，豆油二觔，熬成膏，攤油紙上，量瘡大小攤膏，摻慈石末少許，貼患上，即愈。○治金瘡出血不止，（用慈石末傅之立止。）

自然銅　味辛，氣平，無毒。

（馬氏曰：自然銅，石類也。其色青黃如銅，不從礦鍊，故名。出信州鉛山縣。今醫家所用自然銅，一類，市中每以鉛石亂真，燒之有青焰如硫黃，頃刻消盡者，非真也。如真者，燒之無臭氣，并不畏火。此藥出近銀鑛處，鑛氣結成，似銅非銅，似石非石也。陳氏曰：今辰州川澤中出一種自然銅，形圓似蛇含石，大者如胡桃，小者如栗，外皮黑色，光潤，破之與鉛石無別，但比鉛石不作臭氣耳。入藥用之殊驗。再按寶藏論云：自然銅生曾青石綠穴中，色紅膩，光明，有觜縱，又一類似丹砂，光明堅硬有稜，中含銅脈，尤佳。又一種如樹根，不紅膩，擊之即碎，色精明。凡近銅之山，則有之。今俗中所用自然銅，皆非真也。雷氏曰：采得真者，以火煅，醋淬七次，研細，水飛用。）

○自然銅，接骨（日華子）續筋之藥也。開寶方（[illegible]）主跌撲折傷筋骨，以此散血止痛，接骨續筋，以火煅酒淬，研末用，如中病即止。金石之類，火煅有毒，過用頗能損人。

李時珍先生曰：自然銅接骨之功，與銅屑同，不誣也。不可多服、常服。如骨接之後，仍服火煅金石之劑，火毒金毒相扇，又兼香燥熱藥，雖有接骨之功，燥散之禍，甚於刀劍，戒之慎之。

○集方：（危氏方）治跌打損折筋骨，用煅過自然銅七分，當歸、沒藥各一錢，共為末，酒調服。○（衛生方）治心氣刺痛，用真正自然銅火煅醋淬七次，研末，醋湯調三分服，立止。

蛇黃石、味、　氣寒無毒。（又名蛇含石）

（蘇氏曰、蛇含石、出嶺南渡山中。圓重如錫。有黃、黑、赤、雜色。今越州、信州亦有之。李氏曰、今廣西平南縣有蛇黃岡。土人九月。掘下數尺。始得蛇黃石。大者如雞子、小者如彈丸。圓重如錫。團其外有相間黃黑赤紫雜色不一。擊碎其色如錫。俗云蛇黃是蛇腹中者。屢見諸人剖蛇。又腹中並無有黃。非出蛇腹。而出土中。掘出可信矣。俗云是蛇入蟄時含土一塊。起蟄時吐出化爲此石。皆人掘蛇窟。並無此石。此言更無稽也。係土中掘取。益可信矣。明係一石。曰蛇黃、蛇含者。何。蛇黃者指其圓之名而言也。蛇含者、黃字之訛音也。）

○蛇含石。唐本草。（蛇山出）主大人心胃攻疼。小兒驚癇客忤。婦人氣逆胞阻。產難諸證。服之極驗。

○集方、治心胃攻疼、驚癇客忤。並宜火煅醋淬七次。研末極細。大人服五六分。小兒服二三分。並宜白湯調下。○治氣逆胞阻。難產者。不宜煅淬。僅宜水煮汁。飲之。

土石類

禹餘糧、味甘澁。氣寒。無毒。入手足陽明經。

（陶氏曰、禹餘糧、生東海池澤及山島中。池澤中。亦有。今多出東陽。形如鵝卵。外有殼重疊。中有黃色細末。如蒲黃。無沙者佳。近年茅山鑿池得之。極精好。狀如牛黃。重重甲錯。其佳處乃紫色。靡靡如麪。嚼之無複滲。蘇氏曰、今南江平澤中。一種藤葉如菝葜。根作塊。有節。味似薯蕷。亦名禹餘糧。又張華博物志言。海洲有一種篩草。其實食之如大麥。名自然穀。亦名禹餘糧。世傳禹治水。棄其所餘于江海中。則此二種與此異物同名。祗與生池澤者同種乎。李氏曰、禹餘糧乃石中黃粉。生于池澤。其生山谷者。爲太乙餘糧。本文參究甚明。蘇氏引藤生草生。雖名同而實不同。殊爲迂遠。雷氏曰、修治見禹餘糧一斤。用黑豆一斗。水煮。以黑豆爛。去豆。取禹餘糧。用水漂淨。曬乾。研萬杵。極細用。凡使勿用石中黃并卵石黃。此二石。眞相似禹餘糧也。其石中黃。裏赤黑。味淡。卵石黃。味酸。箇箇如卵。內有子一塊。不可用也。沈氏曰、萬曆戊申。歲大歉。左新尤甚。倫山中。土人掘取黃石末。研細如粉。滚水調食。味甘膩。可充饑。此亦名禹餘糧也。）

○禹餘糧、養肺金。固大腸之藥也。（李時珍）盧氏曰、此得水土沖氣所種。故前古主欬逆煩滿、寒熱、下血閉。赤白漏下。凡屬水土不和。清濁混亂諸疾。用之奏効甚捷。但質性燥澁。如病馗虛血燥之證。勿用。

○前賢李知先曰、下焦有病人難會。須用餘糧赤石脂。推此則陳廷采所云、主下焦前後諸病。最的。

○盧子繇先生曰、續平水土。有如神禹。故曰禹。煉餌服食。能止饑。故曰餘糧。

○集方、治欬嗽則大腸遺矢者。用禹餘糧、赤石脂。各等分。（保命方）總和。以黑豆煮過。爲極細末。每服二錢。白湯調服。○治（仲景傷寒論要）傷寒下痢不止。心下痞鞕。此痢在下焦也。用禹餘糧、赤

石脂（製法如前）各八兩。水四碗。煮減半服去渣。再煮服。○治（經驗方）婦人產後煩躁。用禹餘糧一味。用鹽泥數層封固。炭火煅半日。待冷取出。研末。每服二錢。甘草湯調服。○治（[illegible]方）婦人諸病。小腹脹痛。用禹餘糧一味（製法如前）爲末。早服二錢。米湯調下。○治（[illegible]金方）婦人赤白帶漏。用禹餘糧一味（製法同前）和炮薑等分。爲極細末。每服一錢。溫酒調下。○治（[illegible]急方）婦人崩漏久不止。色兼青黃赤白雜色者。有此病者必無子。用禹餘糧（製法同前）、赤石脂、牡蠣。俱火煅。各一兩。烏賊魚骨三兩。肉桂八錢。共研極細末。每服三錢。白湯調服。（或用煉蜜作丸亦可。）○治（[illegible]方）老人多滑泄。氣虛者。久愈不止。用禹餘糧四兩（製法同前）。白朮八兩。甘草一兩。補骨脂三兩。俱用酒拌炒。研

爲末。和入禹餘糧末內。每服三錢。早晨參湯或米湯調下。（或用飴糖作丸亦可。）

○太乙餘糧。味甘。氣平。無毒。

李氏曰。按陶氏言禹餘糧生東海池澤及山島中。太乙餘糧生太山山谷。又石中黃生餘糧處。乃殼中未成餘糧先生黃濁水。後凝結也。據此則三者一物也。今世知有禹餘糧。不復識太乙餘糧矣。諸山久不見采。唯會稽王屋澤路所在諸山時有之。外殼若甲。甲中有白。白中有黃。似鷄子黃。而重重如葉子雌黃。輕敲便碎。如粉霏至先消者是也。設中無黃粉。但有黃濁水者。爲石中黃水。有疑結如石者。爲石中黃。非太乙餘糧也。其修治製度與禹餘糧同。其主治功能亦與禹餘糧同。茲不復贅。細考登真隱訣長生四鎮丸。云太乙餘糧定六腑。鎮五藏。滑久病或卒暴致神志委頓不振者。服此立安。此又賴禹餘糧稍濇一功也。識者當心揣何如耳。

滑石。味甘淡。氣寒。無毒。入足太陽經。兼入足陽明、手少陰太陽、陽明經。

別錄曰。滑石出赭陽山谷。及太山之陰。或掖縣。李氏曰。今廣之桂林各邑及始安猺峒中皆有。又山東蓬萊桂府村所出者亦佳。初取出柔軟如泥。久漸堅實。白如凝脂。滑而且膩。根即不灰木。中有光明黃子。即石腦芝也。蘇氏曰。若理麤質硬。色青有黑點者。謂之斑石。或有碧色、綠色、黃色、蒼色、五色者。質皆麤燥。而不滑膩。僅可作器。不堪入藥。初出時柔軟未堅。土人就穴中製作。或琢或磨。或雕刻諸物。用力甚少也。修治。宜研極細。水飛過用。凡油膩污衣帛。用末研極細。以熨斗盛火。蓋紙熨之。能去。

○滑石。清暑解熱、利水竅之藥也。王氏（好古）曰。此藥味甘。氣寒。性堅質滑。甘能和胃氣。寒能解熱氣。堅能推壅滯。滑能利諸竅。化垢膩也。故能濯。本草主小便癃閉不通。泄瀉暴注。或時行中熱。中暑發熱。發渴。或山嵐瘴氣。水土不

服。能泄此氣。行下氣。滲脾濕。清三焦。利六府。解燥渴。去妄火。莫可加也。觀滑能利竅。不獨利小便也。益肺主皮毛。爲水之上源。上通肌表。利毛腠之竅。下通水道。利精溺之竅。且甘淡之味。先入於胃。滲走經絡。遊溢精氣。上輸於肺。下通膀胱。故爲蕩熱利竅之劑。夫熱散則三焦寧而表裏和。竅利則闌門通而陰陽順矣。然利竅行水。消暑清熱。上滋逐積。稱爲要劑。若病人因陰虛不足。內熱以致小水赤澁短少。或不利。而煩渴身熱。由於陰虛水涸火熾者。皆禁用之。如作泄瀉。因於脾腎俱虛者。亦勿服也。

○前賢劉河間曰。益元散通治表裏上下諸病。其效甚多。

不可殫述。葉氏曰凡難產或死胎不下。皆由子宮風熱燥澁結滯緊歛不能舒緩之故用此藥滑以利之。則結滯頓開。而胎自立下矣用嫩白滑石六兩研細水飛過。大甘草一兩共爲細末每服二錢。白湯下。○治中暑熱渴。涼水下。○治傷寒疫癘傳染初起用葱頭三個。生薑三片煎湯下取汗。汗後遺熱不淨用白芍藥二錢煎湯下日久不愈用人參一錢黑棗五個煎湯下。勞復用白朮二錢煎湯下。○治傷酒用陳皮葛根各一錢五分煎湯下。○治傷食不消用厚朴枳實各一錢煎湯下。○治百藥邪熱諸毒用菉豆二合煎湯下。○治癲癇用青黛天竹黃各一錢研細配益元散一錢白湯下。○治懸癡

用人參、二錢玉竹三錢煎湯下。○治煩滿短氣。用生薑五片煎湯下。○治腹脹悶痛。用木香一錢磨汁。調湯下。○治五淋閉澁作痛。或小便不通。用車前草、淡竹葉各三錢煎湯下。○治胸中積聚蓄水。用猪苓、蒼朮各一錢煎湯下。○治泄瀉不止。不拘冷熱。用茯苓、陳皮各一錢煎湯下。如冷瀉用砂仁、補骨脂各二錢煎湯下。熱瀉用川黃連、黃芩各一錢煎湯下。○治下痢不拘赤白。用川黃連、廣木香各一錢煎湯下。○治腸澼瀉血水用白朮、炒三錢、猪苓二錢煎湯下。○治五種黃疸用龍膽草、燈心各五錢煎湯下。○治脚氣濕腫用木瓜、杜仲、薏仁各二錢煎湯下。○治生胎不下。用五靈脂煎湯下。○治死胎不下。用生附子、芒硝各二錢煎湯下。○治牙痛用蛇床子、三錢煎湯下。○治齒齦疳爛。用銅青、一錢。配益元散。一錢研細。摻齒縫中。○治婦人轉脬。因過忍小便而致者。用葱頭五個煎湯調下。○治兩腋兩胯濕汗。本方散子。加枯礬末等分研細和入摻之。○治杖瘡腫痛。本方散子。一兩。加赤石脂大黃各五錢爲末總研勻。用米泔溫湯洗淨貼之。

○王紹隆先生曰滑从水从骨。故能散精於骨。淫氣於骨。以助髓液流通之用。

皇甫氏家製導水丸。主泄瀉濕熱。通利二便。凡高燥之地。黑瘦之人。膏粱之家。熱燥之病。服之切當。若下濕之地。肥白之人。淡食之家。寒濕之病。猶未當也。用大黃、黃芩各二兩。牽牛子、滑石各四兩。共爲細末。米糊丸。如菉豆大。白湯下二十丸。日二服。

赤石脂。味甘，氣平，無毒。氣薄味厚，降而能收，陽中陰也。入手陽明、手足少陰經。

（吳氏曰：五色石脂，名五色符。青色符生南山或海涯。白色符生少室、天婁山或泰山。黃色符生嵩山，色如豚腦、雁雛。黑色符生洛西山。赤色符生少室或泰山延州，色如絳，滑如脂。皆揭兩石中取之。以理細、粘舌綴唇者爲上。修治：研如粉，新汲水飛過，曬乾用。諸家本草有五色之分，今入藥餌，爲湯液丸散料中，惟用赤色一石脂，餘四種不復用矣。○李氏曰：膏之凝者曰脂。此物性粘，固濟爐鼎甚良，蓋兼體用而名也。）

○赤石脂，滲停水，去濕氣，斂瘡口，固滑脫，止瀉痢腸澼，禁崩中淋帶之藥也。（劉綠）曾氏曰（當垣）：經云，澁可去脫，龍骨、赤石脂是也。故前古治瀉痢腸澼，時珍方；主滲水去濕，甄氏方；主斂瘡固脫，別錄方；禁女子崩中淋帶諸證，因其甘溫收澁，體重而降，於一身上下內外，並大小腸虛泄虛悶諸疾悉主之也。繆氏曰（仲醇）：洩痢腸澼，久則下焦虛脫，無以收藏，其他固澁之藥，性多輕浮，不能下達，惟赤石脂，體重而澁，直入下焦陰分，故爲久利洩澼之要藥耳。如暴瀉暴痢，積滯未清，法當用清利之藥者；血崩白帶，陰陽兩虧，法當用補氣血之藥者，此劑定非所宜，操工者當慎擇而取之也。

○張卿子先生曰：此藥味甘，氣溫，體燥質潤，性澁而收，故能益氣生肌，調中固脫，而斂實腸胃。仲景桃花湯治傷寒下痢便膿血，取此重澁入下焦血分而固脫也。

○集方：治水飲停注心胃，漉漉有聲，或兩脇脹悶，或大便溏，小便閉，用赤石脂六錢，火燒，乾薑、半夏、陳皮、木香、白芍藥各四錢二分，分作六帖，清水煎服。○治諸濕瘡病，用赤石脂一兩，火燒爲極細末，每早服一錢，陳皮湯調下。○治諸瘡多膿水，久不乾，不斂口，用赤石脂，研細，水飛過，曬乾，日日摻之。○治脾胃虛寒，久泄滑脫不固，用赤石脂一兩，火燒，白朮、人參、補骨脂、北五味、茯苓各八錢，俱炒燥爲細末，與石脂和勻，每服二錢，早晨米湯調送。○治瀉痢腸澼，或下白凍，或下紫血水，因熱者，用赤石脂五錢，火燒，黃芩、川黃連各三錢，甘草一錢，共爲末，蓮肉糊爲丸梧子大，每早服二錢，白湯下。○治瀉痢腸澼，或下白凍，或下紫血水，因寒者，用赤石脂一兩，火燒，乾薑炒，一兩二錢，花椒五錢，共爲末，米醋打神麴末作糊爲丸梧子大，早晚各食前服三錢，米湯下。○治傷寒下痢便膿血不止，用赤石脂二兩，半生研極細末，乾薑八錢，粳米二合，水一升，煎半升，徐徐飲，三服乃止。○治經水過多，將成崩漏，用赤石脂一兩，火燒，炮薑灰一兩五錢，白芍藥一兩二錢，川黃連五錢，俱炒，研末，煉蜜丸梧子大，每服二錢，白湯下。○治赤白淋帶，用赤石脂、龍骨各一兩，俱火燒過，山藥四兩，炒，共研細末，煉蜜丸梧子大，每早服四錢，白湯下。○治痰飲吐水，發無時候，其原因飲冷過度，遂令脾胃氣弱，不能消化飲食，飲食入胃，皆變成冷痰涎水，用赤石脂一斤，火燒，搗極細末，每早晚各服二錢，乾薑湯調下。此方亦可治反胃吐食物者。

爐甘石，味甘，氣溫，無毒。陽明經藥。（李氏曰：爐甘石生川蜀湘東，所在坑冶處皆有，而太原、澤州、陽城、高平、靈丘、融縣及雲南諸處者更勝。其塊大小不一，狀似羊腦，鬆如石脂，亦黏舌，不落。產金坑者，其色黃爲上；產銀坑者，其色白或微青綠或粉紅色。乃金銀之苗也。受金銀之氣，熏陶三十年方結成。此藥係爐火所重，其味甘，故名。）

○爐甘石，去目翳，收濕爛之藥也。衛生方治目病諸般翳膜，眼風弦爛，冷淚時出。又耳聤濕爛，出水不收，及陰瘡下疳，周爛并兩脇陰汗，濕癢諸疾，或點搽，或敷摻，或配諸藥合用，隨證施治。

○集方：治一切目疾，或暴赤腫痛，或驟生翳障，或眼風弦爛，冷淚時出，用嫩爐甘石五錢，研極細，以川黃連三錢，川花椒二錢，煎濃汁，調入爐甘石末內，晒乾，再配瀝淨潔白玄明粉六錢，總研勻。凡遇目疾，用溫湯洗目，以清水一點，取藥米粞大，調之，點大小眥內。○治耳聤濕爛（普濟方），久不愈，用嫩爐甘石二錢，枯礬一錢，冰、麝各五釐，共研勻，先用軟綿作撚蘸濕，吹之。○治下疳陰瘡，用嫩爐甘石三錢，孩兒茶一錢，研極細，加冰片一分，再總研，隨時摻之。○治兩脇陰汗濕爛（直指方），用嫩爐甘石一兩，研極細，隨便敷之。

青礞石，味甘、鹹，氣平，無毒。其性下行，陰也，沉也。入厥陰經。（李氏曰：礞石出江北諸山，有青、白二色。以青色堅細，擊開有白星點者佳。修治：以大坩鍋一只，用礞石四兩搥碎，入消石四兩拌勻，用炭火十斤簇定，煅至消石盡，星黃如麩金爲度，取出研細，水飛三次，晒乾用。）

○礞石，消食積，化結痰，鎮驚癇風搐之藥也。體重色明，乃石中之金劑也，故治厥陰風木爲病。李氏曰：風木太過，則脾土受制，氣不運化，積滯生痰，壅塞上中二焦，變生風熱諸病，宜此藥使風平氣順，而痰積通利，諸證自除矣。然止可用之救急，如脾胃虛而氣弱者，不宜久服也。王隱君謂痰爲百病根，不論虛實寒熱，概用滾痰丸通治百病，豈理也哉。（滾痰丸雖若集方之末，司工者當擇而取之可也。）

○集方：治大人小兒食積成痰，胃實多眩暈者，用青礞石○七錢，焰硝七錢，同研炒，以焰硝過性爲度，配枳實、木香、白朮各三兩，共爲末，紅麴二兩爲末，打糊丸梧子大，每早服三錢，白湯下。○治痰結成癖積，用青礞石一兩（製法）、海石、燒膽南星、橘紅，俱炒，各二兩，共爲末，神麴二兩，打糊爲丸梧子大，每早晚各服二錢，白湯下。○治痰厥驚癇搐搦者，用青礞石一兩（製法同前）、天竹黃、膽南星、石菖蒲、白朮，俱炒，各二兩，共爲末，竹瀝和薑汁煎滾，打神麴末二兩作糊，爲丸梧子大，每服三十丸，皂角湯調化下。○滾痰丸治痰之爲病，或偏頭風，或雷頭風，或太陽頭痛眩暈，如坐舟車，精神恍惚，或口眼瞤動，或眉稜耳輪俱癢，或頷腮四肢遊風腫硬，似疼非疼，或渾身燥癢

搔之則瘾疹隨生。皮毛烘熱。色如錦斑。或齒頰似癢似痛。而疼無定所。滿口牙浮。痛癢不一。或噯氣吞酸。鼻悶焦臭。喉間豆腥氣。心煩鼻塞。咽嗌不利。咯之不出。嚥之不下。或因噴嚏而出。或因舉動而唾。其痰如墨。又如破絮。或如桃膠。或如蜆肉。或心下如停冰鐵。閉滯妨悶。噯嚏連聲。狀如膈氣。或寢夢刑戮。刀兵劍戟。或夢入人家四壁圍繞。暫得一竅。百計得出。則不知何所。或夢在燒人地上。四面烟火。枯骨焦氣。撲鼻無路可出。或不因觸發。忿怒悲啼。雨淚交流。或時郊行。忽見天邊兩月交輝或見金光數道。回頭無有。或足膝酸軟。或骨節腰腎疼痛。呼吸難任。或四肢肌骨間。痛如擊戳。乍起乍止。並無

常所。或來時兼臂麻疼。狀如風濕。或臥如芒刺不安。或如毛蟲所螫。或四肢不舉。或手足重滯。或眼如薑蜇膠粘。癢澀開闔甚難。或陰晴交變之時。胸痞氣結。閉而不發。則齒癢咽痛。口糜舌爛。及其奮然而發。則噴嚏連聲。初則涕唾稠粘。次則清水如注。或眼前黑暗。腦後風聲耳內蟬鳴。眼瞤肉惕。治之者。或曰腠理不密。風府受邪或曰上盛下虛。或曰虛。或曰寒。或曰發邪。惟洞虛子備此疾苦。乃能治療。病勢之來。則胸腹間如有二氣交紐噎塞煩鬱。有如烟火上衝。頭面烘熱。眼花耳鳴。痰涎涕淚並從肺胃間涌起。凛然毛竪。噴嚏千百。然後遍身煩躁。則去衣凍體。稍止片時。或春秋乍凉之時。多加衣衾

亦得暫緩。或頓飲冰水而定。或痛飲一醉而寧。終不能逐去病根。乃得神秘沉香丸方。屢獲大効。愈人數萬。但不欲輕傳匪人。故以隱語括之。詩曰。甑裹翻身甲帯金於今頭戴草堂深。相逢二八求斤正。硝煅青礞倍若沉。十七兩中零半兩。水丸桐子意須斟。除驅怪病安心志。水瀉雙身却不任。用大黃（蒸少頃翻過再蒸少頃即取出不可過。）黃芩（各八兩）青礞石（硝煆如金色。）沉香、百藥煎（此用百藥煎。乃得之方外秘傳。蓋此丸得此藥乃能收斂周身頑涎聚于一處然後利下甚有奇功曰倍若沉者言五倍子與沉香非礞倍于沉之謂也以上各五錢。）右爲末。水丸如梧子大。白湯食後空心服。○一切新舊失心喪志。或癲或狂等證。毎服一百丸。氣盛能食。狂甚者。加二十丸。臨時加減消息之。○一切中風癱瘓。

痰涎壅塞。大便或通或結者。毎服八九十丸。或加至百丸。永無閉結之患。○一切陽證風毒脚氣。遍身遊走疼痛。毎服八九十丸。未効。加至百丸。○一切無病之人。遍身筋骨疼痛。不能名者。或頭疼牙痛。或搖或癢。風蛀等證。風寒鼻塞。身體或疼或不疼。非傷寒證者。服八九十丸。痰盛氣實者。加之。○一切吞酸噯逆。膈氣。及胸中疼悶。腹中氣塊衝上。嘔沫吐涎。狀如反胃。心下恍惚。如畏人捕。怵惕不安。陰陽關格。變生乖證。食飢傷飽。憂思過慮。心下嘈雜。或痛或噦。或晝夜虛飽。或飢不喜食。急慢喉閉。赤眼。毎用加減服。○一切新舊痰氣喘嗽。或嘔吐。頭運目眩。加減服之。○一切頸頷腫硬。若瘰癧者。及口

糜舌糊。咽喉生瘡者。每服六七十丸。加蜜少許。一處研碎。噙化。睡時徐徐嚥之。曾有口瘡者。服二三十丸。依前法噙之。二三夜瘥。○一切男婦大小虛實。心疼連腹身體羸瘦。發時必嘔綠水黑汁冷涎。乃至氣絕。心下溫煖者。量虛實加減服之。若事屬不虞之際。至於百丸。即便回生。未至瀕危者。虛弱疑似之間。只服二三十丸或五十丸。立見生意。然後續續進之。以瘥爲度。兼服生津化痰溫中理氣之藥。○一切荏苒疾病。凡男婦患非傷寒內外等證。或酒色過度。或吐血。或月事愆期。心煩志亂。或腹脹脇痛。勞倦痰眩。或暴行日中。因暑伏痰。口眼喎邪。目痛耳憒。鼻塞骨節痠疼。乾嘔惡心。諸般內外疼痛。

百藥無效。衆醫不識者。依前法加減服之。効。大抵服藥須臨卧。在牀用熱水一口許。嚥下便卧。令藥在喉膈間徐徐而下。如日間病出不測。疼痛不可忍。必欲急除者。須是一依前卧法服。大半日不可食湯水。及不可起身行坐言語。直候藥丸除逐上焦痰滯惡物。過膈入腹。然後動作。方能中病。每夜須連進二次。次日痰物既下。三五次者。仍服前數。下五七次。或直下二三次。而病勢頓已者。次夜減二十丸。頭夜所服並不下惡物者。次夜加十丸。人壯病實者。多加至百丸。惟候虛實消息之。或服過仰。服咽喉稠粘壅塞不利者。痰氣泛上。乃藥病相攻之故也。少頃藥力既勝。自然寧帖。往往病久結實於肺胃之間。或只暴病。全無泛溢者。服藥下咽。即仰卧。頓然百骸安靜。五臟清寧。次早先去大便一次。其餘遍數。皆是痰涕惡物。看甚麼糞。用水攪之。盡是痰片粘涎。或稍稍腹痛腰腎拘急者。蓋有一種頑痰惡物閉氣。滑腸裏急後重者。狀如痢疾。片餉即已。若有痰涎易下者。快利不可勝言。頓然滿口生津。百骸爽快。間有片時倦怠者。蓋因連日病苦不安。一時爲藥力所勝。氣體暫和。如醉得醒。如浴方出。如睡方起。此藥並不洞泄。刮腸大瀉。但取痰積惡物。自腸胃次第而下。腹中糟粕並不相傷。其推下腸腹之糞。則藥力所到之處。是故先去其糞。其餘詳悉。不能備述。服者當自知之。

代赭石、味苦澁、氣溫無毒。入手足厥陰經血分。

（蘇氏曰、赭、赤土也。出代州山中。今齊州鳴沙、河北平地。入深四五尺。得赤土滑膩、中紫如雞冠、大勝代州所出者。今醫家所用、多取大塊。其文有如浮漚丁者爲上。李氏曰、赭石、處處山中有之。以西北者爲勝。宋時虔州歲貢萬斤。崔氏本草云、代赭、陽石也。研之作朱色、可以點書。張華以赤土拭寶劍、倍益精明、即此也。修治須研極細、以水飛過用。）

○代赭石、去蠱毒、殺鬼邪。止女子赤沃漏下。（神農）安小兒驚癇（大明氏）入腹。止大人血痢腸風、脫精（別錄）遺溺之藥也。附九江曰、此藥得土中純正之氣、體重色赤。故能去蠱毒而殺鬼邪、定驚癇也。味澁氣濇、故能禁赤沃漏下、血痢腸風、遺精遺溺也。乃肝與心包絡二經血分之藥、故所主用、皆二經血分之病也。張仲景治傷寒發汗、若吐若下、外解後、

心下痞鞕。氣滿噫噯、噯餌不除者。固因痞鞕亦屬焦脘室遏、失於宣發故也。以旋覆代赭湯主之。亦推此意耳。

○集方（濟推方）治急慢驚風、眼吊口撮、搐搦不定。用代赭石、火燒醋淬三次、研細、水飛過。每服一錢或五分、金銀湯調下。

○治慢脾風（本草發明）因瀉後、吊眼成慢驚。用代赭石、火燒研細、每服五分、冬瓜仁煎湯調下。

○治腸風（方脉正宗）血痢、久不愈、以代赭石二兩、火燒醋淬二次、以柿餅一個、煑爛、搗爲丸梧子大。每早服二錢、白湯下。

○治遺精（方脉正宗）白濁、及老人小兒遺溺、或女人赤白帶漏。用代赭石二兩、牡蠣一兩、俱火燒研極細末。山茱萸肉、茯苓、山藥各三兩、澤瀉一兩、俱鹽水炒、懷生地四兩、切片炒、俱研爲末、煉蜜丸梧子大。每早服三錢、白湯下。

○治傷寒發汗（仲景方）若吐若下、解後、心下痞鞕、噫氣不除者。以旋覆代赭湯、用代赭石一兩、旋覆花八錢、生薑二兩、甘草、人參各七錢、半夏三兩、用水三升、煑取一升五合、去滓、換水再煑一升。溫服、日三次。

○治傷寒無汗（傷寒蘊要）用代赭石、乾薑各一兩五錢、爲細末、熱醋調塗兩手心、合掌定、夾於大腿內側、被覆汗出乃愈。

○治嬰兒瘧疾（保幼大全）無計可施、用代赭石二錢、燒紅醋淬二次、硃砂一錢、人言一分、麝香五齊、共研爲末、以香油調一字、塗鼻尖上、及眉心四肢、立効。

○治哮（普濟方）呷有聲、不得睡臥、用代赭石二錢、爲末、每服一錢、醋湯調服。

水石類

浮石味鹹氣寒無毒。

（李氏曰浮石乃江海間沙上。水沫凝聚日久結成者。狀似牛肺有細孔如蛀窠有白色紫色者體而輕今皮作家用磨皮垢甚妙抱朴子云燒泥爲瓦燔木爲炭。水沫爲浮石此皆去其柔脆變爲堅剛也。）

○浮石止渴治淋定咳嗽消積塊之藥也。李氏曰此石乃水沫結成色白而體輕其質玲瓏肺之象也氣味鹹寒潤下之用也故入肺除上焦痰熱止咳嗽而軟堅清其上源也又治諸淋澁脹不通而痛者蓋以結而化結也。

○集方治咳嗽不止（肘後方）用浮石一兩水三碗煮減半作茶飲○治消渴引飲（本事方）用浮石白蛤殼各一兩煮水飲○治血淋砂淋石淋澁痛不通（[illegible]方）用黃殼浮石二兩甘草一錢水三碗煎減半隨時飲毋用甘草逐日換煎浮石可嘗煮煲也

石膏味辛甘氣大寒無毒。陰中之陽可升可降。入足陽明手太陰少陽經氣分。

陶氏曰石膏生青州徐州齊山廬山魯蒙山及剡州彭城今錢塘山中亦有之生石中大塊作層細文短密宛若束針其色瑩白如水精鬆軟易碎者良寇氏曰按石膏一種諸書紛辨不爽未悉其義然本草命藥之名實有意義或以色或以形或以氣或以質或以味或以能或以地或以時也用以火煅細研醋調同濟丹爐堅結甚密苟非有膏豈能爲用此兼質與能而得名後人以方解石爲石膏誤矣蘇氏曰石膏方解石大體相似今市家皆以方解代石膏石膏生於石旁其方解不因石而生或生土中或生溪水其皮隨土色及水苔色端然獨處破之方解大者方尺小者方寸或如豆粒或如米粒仍然方稜今人以此爲石膏療風去熱雖同而解肌發汗不如也李氏曰觀石膏有軟硬二種軟者大塊生於石中作層如壓扁米糕形每層厚數寸白潔細文短密如束針若凝成白蠟狀鬆軟易碎燒之即白爛如粉其如色白潔而微帶青文長而細密如束絲者名理石也與軟石膏乃一物二種碎之則形色如一不可辨矣硬者作塊而生地中直理起稜如馬齒色堅白擊之則段段橫解光亮有牆壁燒之赤易散仍堅硬不作粉也其如潔白成塊而大者如升小者如拳擊之大而方尺小而方寸或如豆粒米粒仍有方稜燒之則姹散亦不作粉名方解石也與硬石膏乃一類二種碎之則形色如一不可辨矣繆氏曰自陶氏大氏雷氏閻氏皆以硬者爲石膏軟者爲寒水石至宋氏李氏始斷然以軟者爲石膏而今人遵用有驗千古之或始明矣蓋昔人所謂寒水石者即軟石膏也所謂長石者即硬石膏也石膏理石長石方解石四種性氣皆寒俱能去大熱結氣但石膏又能解肌發汗爲異爾再按理石即石膏之類長石即方解石之類俱可通用○今人以軟石膏收豆腐能止水乃古人所不知修治以火煅石臼中搗研成粉用

○石膏清內熱解燥渴辟暑邪散陽明伏火退三焦大熱之藥也。繆氏曰此藥稟金水之正得天地至清至寒之氣故前人治傷寒陽明病內熱發熱惡熱躁熱天行暑熱疹瘄內悶鬱熱病見上氣喘急面垢齒燥大汗煩渴

引飲無厭、小便短赤等證、或火盛、氣實熱勞骨蒸、或風火上升、頭風頭痛、或火熱內結、齒牙脹痛。凡一切有餘大熱、甚有神效。虛則爲人參、使實則爲大黃、使古之人參、白虎、三黃、石膏、意可見矣。但金石之類、妄用多用、有傷胃氣、如溫熱二病、若頭痛遍身骨痛、而不渴不引飲者、邪在太陽、未傳陽明、勿用也。如病至八九日、來邪已結、裏內有燥糞、往來寒熱、宜下者、勿用也。如暑病兼濕作瀉、脾胃弱甚者、勿用也。如內熱燥熱、由於陰極發躁、陽亡神亂者、勿用也。如產後寒熱、由於惡露未淨、或兼血虛者、勿用也。如骨蒸勞熱、由於陰虛精髓不足者、勿用也。如頭風頭痛、齒牙作痛、由於血虛營損者、勿用也。

善治者、臨證當細加斟酌、行之無忽也。

○張卿子先生曰、石膏氣寒、性緊質潤、體鬆善解肌勝結熱、欲清欲散者用之、卻當。如胃府結熱、欲攻欲下者、非其宜也。如前賢云解肌發汗、解肌解肌熱也、發汗發熱汗也。若認作麻黃桂枝葛根之解肌發汗、等便失主治寒熱之從逆也。

○集方、治內熱燔灼、解燥渴、靜暑邪、散陽明伏火、退三焦大熱。以白虎湯、軟石膏一兩、知母五錢、甘草二錢、水煎服。○治痧瘄鬱熱、內悶不出、發熱口渴、唇焦、咳嗽作瀉。用軟石膏二錢、荊芥、西河柳、蟬退、防風、花粉、黃芩各一錢、羌活、甘草、甘菊花各五分、水煎服。○治陽明邪熱、其證頭疼、壯熱、煩躁、口渴、鼻乾、不得眠、或畏火光、或畏人聲、木聲、用軟石膏一兩、知母七錢、甘草五錢、麥冬一兩二錢、竹葉五十片、粳米二百粒、水一升、煎半升服。若勞役人元氣先虛者、本方加人參二錢。有娠婦人病此證者亦同。○治傷寒汗後煩熱、煩渴不解、用軟石膏五錢、知母三錢、甘草八分、竹葉五十片、水煎服。○治暑熱內甚、及傷寒陽明熱甚、上氣喘急、面垢齒燥、大汗、煩渴引飲無厭、小便短赤等證、用軟石膏一兩、知母五錢、甘草一錢、川黃連一錢二分、北五味五分、水煎服。○治火盛氣實、骨蒸勞熱、用軟石膏、知母各三錢、甘草、川黃連各一錢、青蒿二錢、鱉甲五錢、香附子、醋炒一錢五分、水煎

服。○治風火上升、頭風頭痛、用軟石膏、知母各二錢、甘草八分、荊芥、蔓荊子、防風各五分、水煎服。○治火熱內結、齒牙脹痛、用軟石膏三兩、火煅、加防風、荊芥、細辛、白芷各一錢、共研末、日用揩牙、甚效。又方、用軟石膏五錢、荊芥、桔梗各五錢、甘草八分、水煎服。○續補集方、治傷寒熱極發狂、踰垣上屋、裸露不避、用軟石膏二錢、川黃連一錢、甘草八分、水煎服。名鵲石散。○治乳石發渴、用軟石膏五錢、爲細末、甘草四錢、微炒、熱共研勻、每服一錢、用綠豆湯調服。○治痰熱喘嗽、痰湧如泉、用軟石膏五錢、火燒、研極細、每服一錢、人參六分、泡湯下。○治食積痰火、用軟石膏、火煅一兩、甘草三錢、共研細末、神

麯爲末。醋打糊丸梧子大。每服一錢。韮湯送下。○治老人火鬱生風。目赤頭痛。視不見物。用軟石膏二兩。竹葉五十片。粳米三合。水二升。煑粥食。臨食時。加白糖數茶匙。○治雀目晚昏不見物。百治不効。用軟石膏二兩。爲細末。和豬肝煑熟。臨食時去石膏。○治濕溫妄言煩渴自汗。用軟石膏、火燒。甘草、各等分。爲細末。每服二錢。米湯調服。○治熱油湯火傷。痛不可忍。用軟石膏、研極細末敷之。○治胃家實熱。或嘈雜消渴。善饑。或齒痛。用軟石膏五錢。知母三錢。甘草一錢。竹葉五十片。白芍藥一錢。水煎服。

治胃火攻胃。齒牙作痛。用石膏五錢。研細。大懷熟地一兩。水二大碗。煎七八分服。○治憂忿抑鬱之人。痰涎沃恐傷致心氣不舒。漸成健忘驚悸怔忡。不寐。後成心風語言錯謬。人事不明。用高枕無憂散。用石膏半夏各五錢。茯苓、陳皮、竹茹、龍眼肉、人參、麥冬、各二錢。枳實、甘草各一錢。生薑三片。水煎服。○治多睡反不睡。用石膏[illegible]三錢。酸棗仁炒三錢。白朮、茯苓各一錢。水煎。如要睡冷服。如不要睡熱服。○治齒牙疼痛不堅固。用石膏一觔生研。食鹽十二兩。入烘火煅紅半日。白芷四兩。北細辛八兩。共爲極細末。重羅篩過。每日擦牙。永無牙[illegible]疼之患。○治齒痛鬱極。服涼藥過多。轉成寒牙疼者。用石膏三錢。附子、童便製、二錢。人參一錢。水煎。頻漱齒間。徐徐嚥之。

石鍾乳。味甘。氣溫。無毒。經火煅則有毒。入陽明經氣分。

別錄曰。石鍾乳生少室山谷及泰山中。惟出始興者佳。今江陵及東境各山石洞中亦有。李氏曰。范氏桂海志所說甚詳。云桂林界接宜融。山洞穴中鍾乳甚多。仰視石脉湧起處。即有乳牀。白如玉雪。乃石液融結所成者。乳牀下垂。如倒生山峯。峯端漸銳且長。若冰柱。柱端輕薄中空。如鵞翎。乳水滴瀝不已。且滴且凝。此乳之最精者。以竹管仰承取之。而煉治家又以鵞管之端尤輕明如雲母爪甲者爲勝。又孫氏曰。取乳石必須土地清白光潤。如羅紋鳥翮蟬翼。一切皆成白色者可用。其非土地者。慎勿服之。殺人甚於鴆毒。又別本註云。凡乳石生深洞幽穴者。皆龍蛇潛伏之處。或襲龍蛇毒氣。或洞口陰陽不均。或通風氣。或黃色赤色。乳無潤澤。或煎煉火色不調。一煎已後。不復易水。服之令人發淋。又有乳有三種。一種石乳。其洞純石。石津相滋。陰陽交備。具蟬翼紋者。其性多溫。一種竹乳。其洞遍生小竹。竹津相滋。石狀如竹。其性多平。一種茅乳。出茅山。其山土石相雜。遍生茅草。茅津相滋。形質潤滑。其性多寒。三種皆以光澤者爲善。餘處亦有。不可輕信。雷氏曰。凡使勿用頭麤厚并尾大者。爲孔公石。不可用也。如色黑及經火驚過。并久落在地上收者。與曾經藥物製者。俱不可用。須

要鮮明白亮。輕薄潤澤。如鵞翎筒子者。乃佳。修治。取石鍾乳八兩。用沉香、零陵香、藿香、甘松、白茅香各一兩。水豆腐漿一斗。煑過。以漿乾取出。五味香料並紫背天葵、甘草各一兩。取新汲井華水一斗。同煑。水乾取出。拭乾。緩火焙之。入臼杵粉。篩過入鉢中。令有力少壯者二三人不住手研。三日夜勿歇。然後以清水飛澄過。以絹籠中。鍾乳法云。取細末置金銀器中。以瓷蓋。勿令洩氣。湯蒸之。自然化作水也。○藥性論云。石之津氣。鍾聚成乳。滴溜成石。故名石鍾乳。又名鵞管石者。象其中空之狀也。若蟬翅輕薄。色白光潤。得此無問厚薄。並佳。燥如枯骨。死灰色。及黯赤二色。俱不堪用。

○石鍾乳。溫肺氣。主欬逆。壯元陽。健脚弱之藥也。成氏曰。此藥水煑則平。火煉則毒。前古主欬逆上氣。以氣虛寒則不得歸原而上逆矣。石乳溫而鎮墜。使氣復丹田而病自愈。如別錄之壯元陽。健脚弱。甄氏之通節竅。發聲音。亦取此溫中降下。達丹田之意耳。繆氏曰。雖能溫中

煖、下焦、倘須審察投用、况病有涉溫熱者耶。世人病陰虛有熱者。十有八九、陽虛內寒者。十無二三、自唐迄今。因服石乳而發病者、不可勝紀。服之而獲効者。嘗今十無二三、經曰、石藥之性悍、真良言也。尊生之士。無惑方士有長年益壽之說、而擅服之。自取其咎也。

○李時珍先生曰、內經云、石藥之氣悍。朱丹溪痛言其害。則乳可廢耶、夫石鍾乳爲慓悍之劑、令陽氣暴充、飲食倍進、而形體壯盛、昧者得此自慶、益肆淫泆、精神暗損。石氣獨存、孤陽愈熾。久之營衛不從。發爲淋渴、變爲癰疽、是果乳之咎耶、抑人之自取耶。凡陽明氣衰、用此以救其衰、疾平則止、亦何不可、但不當久嗜以濟慾耳。種

樹書云、凡菓樹中作一孔、納鍾乳末少許、固密。勿洩其氣、則結菓實多而味更美、納少許於老樹根皮間、則老樹復茂、則鍾乳益氣。令人有子之說、亦可類推、又按張杲醫說載。帥臣雷世賢。多侍妾。常餌砂母、鍾乳、其妾父苦寒泄、不嗜食、求丹十粒服之。即覺臍腹如火、少頃狂發、投井中。急救出。則遍身發紫泡而死。又沈括筆談載夏英公性豪侈。纔睡即身冷僵如死者。常服僊茅、硫黃、每日以鍾乳粉入粥食之。無恙。有小吏竊食、遂發疽死。人之稟賦、萬有不齊。不可一概論也。或云服鍾乳、當終身忌朮。朮能助鍾乳也。然有藥勢不能發。須其動而激發者。正如火少必借風氣鼓之而後發。火盛則鼓之反爲害矣。凡服諸藥皆倣此。

○集方、治肺氣虛（千金方）欬逆上氣、元陽不固、腰脚冷疼、關節不通、乳汁不行、音聲不振等證、取韶州鍾乳石、無問厚薄、但明淨光澤者、即堪入藥、惟黃赤者、不用、置於金銀器中、大鐺著水煮之。令如魚眼沸、水減即添、如乳石少、煮三日夜、乳石多、煮七日夜、候乾、色變黃白、即熟、取出去水。更以清水煮一日、其水色清不變即止、乳石無毒矣。入石臼中。著水。徐徐槌之。候碎。再研、覺乾濇、即添水、令如米泔水狀、取出、入瓷鉢中。徐徐研之。研至四五日、揩之光膩、如書中白魚、便以清水洗之、不隨水落者、即熟、如落者、更研、乃澄取、暴乾、每用一錢、溫酒空心調下。

亦可作丸服。○治肺虛喘急（聖濟總錄）。連綿不已。用鍾乳石、（製煉如前）五錢、黃蠟三兩。鎔化、和鍾乳粉、飯鍋上蒸軟。丸如梧子大。每溫湯送下一二丸。○治吐血損肺（十便良方）。用鍾乳石、（製法如前）每服一錢、糯米湯調下。立止。○治廣瘡結毒（如大先方）、爛壞鼻梁、及陰蝕陽物、用鍾乳石（製法如前）一兩、配乳香、沒藥（瓦上焙出油）、象牙末、各五錢、蛀竹屑、八錢、枯白礬三錢。俱爲細末、白蠟用鐵刀輕輕刮下、浮衣。四錢、總和勻。每早晚各服二錢、土茯苓煎湯調下。

麥飯石味甘。氣温。無毒。

（李氏曰。麥飯石隨處山溪中有之。大小不等。或如拳。或如鵝卵。或如盞。或如餅。狀似一團麥飯。有粒點如豆如米。其色黄白。於溪間麻石中尋有此狀者即是。）

○麥飯石。治一切癰疽發背之藥也。蘇氏曰。大凡石類多治癰疽。世傳麥飯石膏。治發背瘡甚效。乃山人呂子華秘方。其方取麥飯石。碎如碁子。炭火燒赤。投米醋中浸之。如此十次。研末。篩細。再入乳鉢内。用數人手力。更碾五六日。要細膩如麪。狀取四兩。鹿角一具。要生取連腦者更好。截成寸許。用炭火燒。令烟盡存性。爲末。研極細。取二兩。白蘞生研末。取二兩。三味總和勻。用三年陳米醋入鐵鍋内煎。令魚目沸起。旋旋入藥在内。用竹杖子

不住手攪。熬一二時久。稀稠得所。傾在磁器内。待冷。以油紙蓋收。勿令塵入。用時以鵝翎蘸膏。於腫上四圍赤處盡塗之。中留錢大穴。洩氣。如未有膿即内消。已作頭即撮小。已潰即排膿。如病久肌肉爛落。見出筋骨者。用塗軟帛上貼之。乾即易。逐日瘡口收斂。已潰者洗以豬蹄湯洗去膿血。軟帛挹乾。後用藥。初時一日一洗一換。十日後二日一洗一換。此藥要研極細。方有效。若不極細。塗之反作痛也。用此藥時。切忌行經并有孕婦人及雞犬見之。瘡口切忌風吹。及一切穢氣。誠能守禁忌。無有不瘥。○又按北齊馬嗣明。治背瘡方。取溪中麄黄石如鵝卵大者。猛火燒赤。納濃米醋中。當有屑落。再燒再淬。醋乾再加。至石盡。醋中取屑。日乾。研細。篩極細末。和醋塗之。立愈。

石蟹味鹹。氣寒。無毒。

（馬氏曰。石蟹生南海州土。云是海畔活蟹。年月深久。水沫相着。因而化成石。每遇海潮即飄出。李氏曰。按顧玠海槎錄云。崖州榆林港内半里許。土極細膩。水最寒。但蟹入則不能運動。年月後久。覓成石矣。外有石蟹似蟹。出南海。石魚似魚。出湘山縣石魚山。並不入藥用。）

○石蟹。開寶方。主目淫膚瞖。青盲。解天行熱疾。煩渴。化蠱毒。丹毒。喉痺。並宜熟水磨服。

石燕味甘。氣凉。無毒。

（蘇氏曰。石燕出永州祁陽縣江畔沙灘上有之。形如蚶而小。堅重如石也。李氏曰。石燕有二種。一種是此石狀類燕而有文。圓大者爲雄。長小者爲雌。一種是鍾乳穴中石燕。狀似蝙蝠。食鍾乳汁。能飛。乃禽類也。今俗人不察。往往以此石燕爲助陽藥用。於方書誤矣。）

○石燕。唐本草主摩目翳。通淋閉。止消渴。催難產。止赤白濁帶之藥也。用以麄石器中磨水服之。一月諸疾悉平。

原缺

陽起石，味鹹，氣溫，無毒。入右腎命門。（別錄曰：陽起石，卽雲母根也。出齊山及雲山、泰山[illegible]諸山谷中。蘇氏曰：今唯齊州采取，他處不復見矣。州土山石出其中，彼人謂之陽起山，其山常有一股氣[illegible]。冬大雪，獨無積白，石氣熏蒸使然也。山惟一穴，[illegible]禁不開。每歲初冬，州官遣夫監采鑿。歲月久，其穴益[illegible]鑿，繫他石，得之甚難。以白色明瑩，頭兩廉[illegible]，較若狼牙者爲上，黃色者亦佳。其中[illegible]帶與母者，稱上品也。擇上供剩餘者，州人方貨出，不爾，雜由街也。玉冊云：[illegible]州[illegible]金山出者爲勝。其尖似筍簇者次，如狗牙者[illegible]。置雪中，倏然沒跡者爲眞；置紙上，溫炙飛舉者爲[illegible]。）

○陽起石：壯元陽，暖子藏，逐寒濕痹，健腰膝，補養命門不足之藥也。方龍潭曰：此稟純陽之氣以生，其山產石之處，冬不積雪，爲壯陽暖腎、逐濕除寒之用，可知矣。故前古主崩中漏下，癥瘕結氣，寒積腹痛，陰痿無子。別錄又主莖寒，陰冷，陰汗，濕癢，水腫，腹脹。大氏又主婦人冷帶，宿

血瘕，腰疼，子宮久冷，諸虛冷病。此藥專補陽氣，益精氣，血中[illegible]者服之，立見神功。倘陰虛有火，營虛血熱者，不宜服。

○集方：治男子命門虛寒，精冷無子，婦人衝任不調，血虛不能成孕，或有病腰膝冷疼，手臂麻木，水腫腹脹，疝瘕莖寒，囊冷，囊汗濕癢，大便溏泄，或癥瘕積聚，脅腹作痛，三陰久瘧，休息久痢，血崩帶漏，月水不定等疾。用陽起石四兩，火燒酒淬三次，補骨脂、菟絲子、於白术、巴戟天、枸杞子、鹿茸、人參、黃耆、當歸、茯苓各五兩，俱酒拌炒，研爲末，用附子[illegible]，肉蓯蓉、懷熟地，俱酒煮，俱搗膏，煉蜜和丸，梧子大，每早服三錢，白湯送服。服之能令陽道堅隆，使人有子。總治男婦痼冷百病。

石煤味苦甘辛。氣溫，有毒。可升可降。（李氏曰：石炭南北諸山生產亦多，昔人不用，故識之者少。今北方以代薪炊，煨鍊鐵器，大爲民利。土人皆鑿山爲穴，橫直十餘丈取之。有大塊如石而光者，有疏散如炭末者，俱有硫黃氣，以酒噴之則解。昔人言夷陵有黑土爲劫灰者，即此類也。援神契云：王者德至山陵則出黑丹。水經言：石煤可書字，然之有焰。夷堅志云：彰德南郡村井中產石墨，宜陽縣有石墨山，汧陽縣有石墨洞，燕京之西山，楚地之荊州、興國州，江西之廬山、袁州、豐城、贛州，浙之嘉湖郡縣，皆產石煤，可以炊爨，並此石也。人有中石煤氣者，昏瞀至死，惟灌冷水即解。）

○石煤主婦人血氣刺痛欲死，小兒痰癎搐搦未進，金瘡跌撲血出不止（寇氏）之藥也。薛氏曰：此得地之伏陽，天之玄靈之氣以生，似土不石，而質含陽燧，遇火作焰，有水亦燔。此石藥中之神品也。以其法火，如癥瘕血結，惡血血暈刺痛如死狀，痰癎搐搦，客忤卒死，金瘡跌撲肉破血泄。凡死厲之屬，陰凝留礙，有妨生氣者，使此陽煖爲之救藥，則血氣可行，痰癎可定，血出可封。倘涉火勝血燥之疾，自當束置。

○集方（方脈正宗）治產後兒枕刺痛，及月經不行，惡血結滯疼痛。用石煤五錢，當歸尾四錢，川芎三錢，玄胡索二錢，烏藥二錢，俱爲極細末。每服一錢五分，白湯調服。（幼科）○治小兒痰癎搐搦，客忤等疾頻發者。用石煤五錢，膽星三錢，天竺黃二錢，俱研極細，遇發分服五分，薑湯調服。○治金瘡出血不止，急以石煤研極細末厚敷之，即止。如淋潑不宜速合者，本方加滑石末減半和用。

石灰味苦辛。氣溫，有毒。（蘇氏曰：石灰南北皆有，取石山不勝采燒。李氏曰：今人作窯燒之，一層柴或石炭，累青石一層，相間打疊窯中，自下發火，二層度層自焚而成灰，大塊不夾生石者佳。可以風化，可以水化。風化者，取灰置風中，片片自解；水化者，以水灑之，即刻熱蒸而解。入藥惟取風化者多。或用水灑，即刻熱蒸，液化成糊，以粘砌牆壁，極堅固。）

○石灰止生血，散死血，墮胎娠，化積聚，消死肌，滅蟲疥，去（別錄）默黯之藥也。陶氏曰：此藥性燥至烈，古人用療金瘡，止血大効。五月五日採青蒿搗汁，和古石灰搗爲團，陰乾爲末，傅跌撲破損出血，立止，倂不消爛。李氏曰：但不可着水，着水不免爛肉。

○集方（衛生易簡）治中風口喎，用新石灰炒熱，米醋調如泥，塗之。左喎塗右，右喎塗左，立時牽正。（集玄方）○治痰厥氣絕，心頭尚溫者，用千年古石灰三錢，爲末，和水煎滾澄清灌之，再和冰一盞，煎滾澄清灌之，痰降自愈。○治乾霍亂轉筋，腹痛欲死，用千年古石灰一錢，爲細末，沙糖水調服。○治死胎不下，用千年古石灰爲細末，滾酒調下一錢，至心服。○治腹脇積塊，用新解風化石灰四兩，爲末，鐵鍋炒極熱，入大黃末一兩，再同炒紅，取起，入肉桂末五錢，和勻，米醋調成膏，攤厚紙上貼之。○治婦人血氣刺痛，用千年古石灰爲細末，拌豬血和成餅，晒乾，再爲細末，每服五分，醋湯調服。○治癰疽瘀肉不落，用新解風化石灰、蕎麥稭灰各八兩，和勻，用竹籠盛灰，以水二十碗淋汁，盡復須入灰籠內，如此淋五遍，熬成稠糊，取少許塗

第992册　續修四庫全書　第16　反正内

瘀肉上自落。○治瘻，瘡久不合，用古塚中石灰厚傅之。○治痔瘡有蟲，用千年古石灰、川烏炮各等分爲細末，取少許傅痔上，日一次，再以米糊爲丸，梧子大，每服二三十丸，白湯下。○治疥瘡有蟲，用新解風化石灰淋汁，煎熱洗之。○治痰核紅腫發寒熱，用新解風化石灰爲極細末，和白菓肉同搗成膏，傅貼之。○治面黶疣痣，用新解風化石灰一盞，水調稠糊，用囫圇糯米數粒半插石灰糊中，半露石灰糊外，經宿米色變如水晶，先以針微撥疣痣，點少許，經半日，汁出，則去藥，不得着水，二日愈。○治疣鼠，用新解風化石灰、桑柴灰各二兩，拌勻，用竹籮盛灰，水十碗淋汁，盡復頭入灰籮內，如此淋七遍，熬

膏刺破疣痣，點之自落。

○續補集方：治血風寒濕瘡，用千年古石灰，配白蛤粉各等分，研極細敷瘡上，痛止而愈。○治卒發風瘮，用新解風化石灰爲極細末，淡醋水調塗，隨手滅去。○治夏月痱疱，用新解風化石灰一兩，白蛤粉二兩，甘草八錢，共研細撲之。○治杖瘡腫痛，用千年古石灰麻油調搽，不問甚效。○治身面疣目，用新解風化石灰，米醋浸六七日，取汁頻滴之，自落。○治風蟲牙痛，用千年古石灰爲末四兩，蜂蜜三兩，拌勻成團，鹽泥封固，火煅一日，研末搽牙立效，兼治酒積下痢，每早服一錢半，日愈。○治偏墜疝氣作痛，用千年古石灰、五棓子、山巵子各等分，俱炒燥，爲極細末，白麪少許，酒和稀糊，敷之，一夜即消。○治白帶白淫不止，用千年古石灰一兩，白茯苓三兩，共爲末，米糊丸梧子大，每服五十丸，半月即愈。○治水瀉不止，用千年古石灰爲細末，白湯調服一錢，立止。○治血痢休息二三年不止，用千年古石灰爲末，取三錢，煎水一盞，澄清飲，日三服，次日再如法煎飲，十日愈。○治產後產門不閉，或陰挺脫，用新解風化石灰五合，和水十碗煎滾，以瓦鉢盛湯，腿下熏之，用被覆蓋。○治刀刃金瘡，併跌蹼打損傷出血，用千年古石灰爲極細末，敷之，以布帛緊裹，不可經風，立時止血定痛。

治杖瘡，用隔年風化石灰五錢，研細末，用井水一碗調，用銀簪順攪千餘轉，如膏，用鵝羽搽上即佳。○治狗咬潰爛不收，并治刀斧傷損，及跌打傷損，用風化石灰一合，大黃二錢，炒燥研末，和勻，菜油調塗患處。

治杖打敷藥方，用風化石灰生半夏末、降香末、大黃末、黃芩末各等分，麻油調敷患上，內有服藥方，見隰草類苧根集方下。長肉生肌，併藥方見蟲部卵生類白蠟集方下。○治痄腮腫痛，用礦石灰爲末，不拘多少，炒七次，地上窨七次，米醋調敷腫處立消。

治跌打損傷，用糞窖中磚瓦多年者，火煅紅，研極細，以好酒調服五分，立愈。

毒石類

砒石、味苦酸。氣大熱。有大毒。

（李氏曰、砒石性猛如貔、故名。出信州、近錫坑處有之。鑿坑下取生砒、謂之砒黃。色如牛肉、或有淡白路。謂石非石。謂土非土。一種碎屑夾石者、乃燒煉去夾石、凝結者大塊色微黃、毒更甚。凡入藥用必須生者。中此毒、以菉豆、楊梅、清冷水。皆可解。）

○砒石、祛時瘧。除齁喘。化瘀肉之藥也。李氏曰。砒乃大熱大毒之藥。其性猛烈。誤食頃刻殺人。如時瘧之藥。少服一二釐。亦嘗奏効。故聖人亦存而不棄也。凡時行瘧疾。因暑熱外受。生冷內傷。寒熱不均。相因病瘧。內蓄痰涎。伏於營分。故發則寒熱往來。頭眩胸悶。少服一釐。冷水吞下。伏涎頃消。故瘧疾可止。如齁喘之病。因肺有伏積冷涎。或觸冒寒暑風濕之邪。即發。或遇怒氣勞傷。即發。或值饑飽失度。即發。少用一二釐。溫湯調服。伏涎頓開。故齁喘可除。如化瘀肉一證。凡癰疽發背諸潰瘍。潰膿血肉閉不出。瘀肉堅硬不腐。以致膿潰日深。生肉日敗。以砒石末數釐、和入黃蠟條內。納入癰毒瘡中。則瘀腐自化。膿血自行。但見効即去。不可多用久用也。然大毒之性。又不可輕行妄試。如瘧疾邪汗未出。表邪未清。（宜清解散）或久瘧陰虛陽乏。（宜大補氣血）砒石不可用也。如齁喘肺熱裏虛。或兼陰虛勞損。（宜滋養正氣）砒石不可用也。如瘀肉不化。由於陽氣不充。胃虛不食。癰瘍見七惡。而神氣委弱者。砒石亦不可用也。何氏陳氏不究藥性如此酷烈有毒。救本草方云。解熱毒。化熱痰。治癖積。磨服數分。調水飲之。倘依方誤服此。真殺人不待刃耳。兩賢立方之意。不知其何如也。特書此痛言之以為後人之戒云。

○樓奇曰。一婦病心痛數年間。月日皆發。百藥不愈。一醫用砒石三釐。茶末一分。共為末。白湯調下。吐瘀血一塊而愈。得日華子治婦人血氣心痛之旨乎。○一童子遍身生雲頭癬。作圈如錢。或大如錢。或小如筆管文印。一醫用砒石一二分。研極細。以米湯五六匙。稀調。用新毫筆依癬圈塗之。三日滅跡。

○今之藏瓶酒者。往往以砒烟熏瓶藏酒。數年不壞。今造

○烟火家火藥內用少許。則爆聲更大。其急烈之性可知矣。

礜石味辛甘。性大熱。有毒。

（李氏曰。礜石有數種。白礜石、蒼礜石、紫礜石、紅皮礜石、桃花礜石、金星礜石、銀星礜石、特生礜石。俱是一物。但以形色立名。其性皆熱而有毒。並可毒鼠。制汞。惟蒼白二色入藥用。諸礜石生于山。則草木不生。霜雪不積。生于水。則水不冰。夾或有溫泉。其氣之熱可知矣。）

○礜石、化腹內冷積癥瘕堅癖。除冷濕風痺。寒熱邪氣之藥也。陸氏（農師）曰。礜石之力。十倍鍾乳。溫肺暖胃。無出其右。宜火煉百日。可服。如生用。毒若砒石。損人臟腑。為害莫救。

本草彙言卷之十三

錢塘　倪朱謨純宇甫選集　男倪洙龍沖之氏增補

鄭元復子來甫校正

石部（鹵石類）

鹽　味鹹，氣寒，無毒。可升可降，陽中陰也。通行上下表裏。（二十五經。）

沈氏曰：鹽有五種，海鹽、井鹽、鹻鹽三者出於人；池鹽、崖鹽二者出於天。此外戎鹽生於土，石鹽生於石，木鹽生於樹，蓬鹽生於艸也。李氏曰：海鹽取海鹵煎煉而成，今遼冀、山東、兩淮、閩浙、廣南所出是也。井鹽取井鹵煎煉而成，今四川、雲南所出是也。鹻鹽刮取鹻土煎煉而成，今并州、河北所出是也。池鹽疏地爲畦隴，而塹圍之，引清水注入，待夏秋南風大起，一夜結成，今河東、安邑、西夏、靈州，惟解州種之是也。崖鹽生於土崖，狀如白礬，又名生鹽，今階州、鳳州所出是也。此五種皆食鹽也。他如戎北戎鹽、西羌石鹽、湖中樹鹽、東林草鹽，此造物

生成之妙，誠難窺測也。然出處雖有多種，而主治功力亦不相遠。倪朱謨曰：予生南地，且以南鹽論之。據李時珍先生綱目云：南鹽煮海水作之，謂之澤鹽，又謂之海鹽。海邊掘坑，上布竹木，覆以蓬茅，積沙于上，每潮汐衝沙，鹵淋于坑中，水退則以火炬照之，鹵氣衝火即滅，因取海鹵貯盤中煎之，頃刻而就。其煎鹽之器，或鑄鐵爲之，或以編竹爲之，上下周以蜃灰，其器橫丈深尺，平底，置於竈上，謂之鹽盤。○又山西一種鹵鹽，秋間生鹵，遠望如水，近觀如積雪，土人刮取，熬之爲鹽，微有黃色，淋鹵熬鹽也。

○食鹽和陰回陽，引吐，化食，消癖，定痛，去風熱，明目疾，開（新錄）關格，利二便之藥也。（[illegible]）經曰：熱淫於內，治以鹹寒，正此之謂也。（繆氏）人之受命，非飲食不生；非蔬菜不養；蔬菜非五味不爲美；五味無鹽，則不能調劑以奉養生身。故周禮鹽人掌鹽之政，以供祭祀。蓋王公上裕國計，下濟民生，其用非淺小也。方藥需用甚多，而奏効亦復不少。今發吐藥用之者，鹹引水聚而上逆也；化食藥用之者，鹹通停滯而潤下也；消癖藥用之者，鹹能去垢而逐積也；定痛藥用之者，鹹能止暴而緩急也；和陰回陽用之者，鹹能升清降濁，逐邪以輔正也；去風熱用之者，鹹爲水母，水化而風熱自降也；明目疾用之者，鹹爲水精，目爲水神，精與神合，而目自明也；利二便用之者，鹹能潤下而通結也；諸癰疽瘰毒用之者，鹹走血而解毒也；諸蟲毒及百蟲咬傷用之者，鹹能解蟲毒，鹹能殺蟲毒也；開關格用之者，鹹氣上升，而鹹味下降，升上而復降下，關格安有不通者乎。又論服補腎藥而用鹽湯者，鹹歸腎，引藥氣入本藏也；服補心藥而用鹽炒者，心苦虛，以鹹補

之也；服補脾藥而用鹽製者，虛則補其母也。素問曰：鹽走血，血病無多食鹹，多食則脈凝泣而變色。今西北人食不耐鹹，而多壽少病；東南人食必用鹽，而少壽多病。則食物中固不可缺，似宜少用爲佳。凡喘嗽、水腫、消渴者，宜全禁之。或引痰吐，或泣血脈，或助水邪故也。鹽收豆腐，亦引水聚之意。然以浸魚肉，則經久不敗；以沾布帛，則易致朽爛。物各有宜忌，識者當悟此理。

○集方：（方脉正宗）治陽脫虛證，四肢厥冷，不省人事，或小腹緊痛，冷汗氣喘，用鹽炒熱，熨臍下氣海，用此方能和陰回陽取效。（肘後方）○治中惡腹痛，或中蠱吐血，或中痰昏眩，或中食腹脹，用鹽一二兩，炒熱，泡湯二三鍾，乘熱飲之，得吐而愈。○治

食積不化。鹽生用泡湯乘熱飲。○治（簡便方）食酒肉過多脹滿不快。用鹽花擦牙。溫水漱下二三次。即如湯沃雪也。（方脈正宗）○治痰飲成癖。用鹽五錢炒。膽星半夏各一兩。乾薑六錢。三味俱炒燥研末。後和炒鹽。神麴末打糊爲丸如梧子大。每早飯後服二錢。白湯下。（藥性論）○治男子疝核痛。婦人疝瘕痛。用鹽三兩。炒熱熨小腹。其痛立定。（摘玄方）○治風熱牙痛。用槐枝煎濃湯二碗。入鹽二兩。攪清澄去底脚。用槐枝湯煮乾。取白鹽日用擦牙。（永類鈐方）○治目昏生翳膜。大利老眼。用鹽以百沸湯泡澄去底脚。磁鍋熬乾。有白花起。入淨磁瓶收貯。每早擦牙。或用清水一點。調鹽花半米許。點兩目眥內。（方脈正宗）○治關格不通。用鹽炒微熱。以布包前後心揉熨。鹽冷再微炒。不可太熱。如此揉熨十數轉。漸通。（[illegible]）○治二便不通。用鹽二兩。和水一桶。作湯傾入盆內。扶病人坐湯中。揉摸小腹。湯冷和入熱湯。半時許立通。（肘後方）續補集方。治金瘡中風。用鹽半升炒熱。取一二匙着瘡上。冷即更着。一日勿住手。大效。（[illegible]）○治乾霍亂。上不得吐。下不得利。腹絞痛。大汗出。脹悶欲死。用鹽一兩。炒黃色。白湯一升。童子小便一鍾。乘熱一氣吞下。即吐下立愈。如不吐下。更作。（[illegible]）○治心腹卒時脹堅痛悶欲死。用鹽一兩。白湯一升。沖和。一氣飲。得吐下即定。不吐更作。（救急方）○治一切脚氣疼痛。用鹽醋爛。每夜擦腿膝至足半時許。以熱湯淋洗。用五七次。（外臺秘要）○治諸痛。兩脇肋脹痛。用鹽炒熱

布包熨之。○治卒中尸遁。其狀宴時腹脹。急悶沖心。或有塊起。或牽腰脊。取鹽一撮。調白湯二碗。一氣吞下。取吐立止。（產寶）○治妊婦心痛不可忍。取鹽一塊燒紅。白湯調服。（千金方）○治胎孕逆生。用鹽一撮。擂爛。擦妊婦兩肋脅并兒足底。以一指搔之即順。（藥性論）○治小兒不尿。安鹽一撮於臍中。以艾丸鹽上灸之三五壯。此方并治臍風撮口。（直指方）○治無故精漏不止。用鹽一兩。鹽泥固濟。火燒一日。用白茯苓、山藥各一兩五錢。炒燥共爲末。和燒鹽。棗肉爲丸梧子大。每用百餘丸。棗湯下。（普濟方）○治喉中小舌垂長半寸。名帝鍾喉風。用鹽一塊。火燒赤。用筯頭頻點之即消。（[illegible]）○治風病耳鳴。用鹽一升。炒熱。以耳枕之。冷即易。○治身體肌肉表裏如蟲行。用鹽一斗。水十石。煎湯入缸中浴之三四次。亦療一切風氣。○治蜈蚣蛇蠍蠼螋蚯蚓芫青班蝥蜂蠆蜘蛛黃蠅螞蝗鼠犬黿鱉等。并一切惡毒禽獸蟲魚諸物咬傷。先用鹽湯洗。後用鹽一撮。和風化石灰一撮。拌勻掩傷處。用軟帛縛住。不痛不悶。并無毒氣內攻。倘有危急轉重者。隨用艾丸置傷處。大小即於鹽灰上灸七八壯。永無他慮。（方脈正宗）○治潰瘍作癢。以鹽一撮擂爛。醮少許摩其瘡口四圍即止。

○戎鹽。味鹹甘。氣寒。無毒。

盧氏曰。戎鹽即青鹽。亦赤鹽也。陶氏曰。史書言。虜中鹽有九種。曰白鹽。食鹽。駁鹽。胡鹽。柔鹽。黑鹽。赤鹽。臭鹽。馬齒鹽。而胡鹽即戎鹽也。大氏曰。戎鹽生沙崖山坂之陰土石間。大小不常。形作塊片。間有方稜。或如雞卵。或如

凌米凝結如石，色玄紫白，味不甚鹹，臭若毈雞之氣，之不鳴烊者是也。又蜀云：鹽山二色，赤丹黑漆，鏤成龍虎，佩之爲吉，可以辟惡，可以療疾。張果云：赤戎鹽生西戎，稟自然水土之氣，結而成質，不假人力煎煉。其地水土之氣黃赤，故鹽亦隨土氣黃赤也。味淡于石鹽，力伏陽精。火中燒之，汁乃紅赤，凝定時色猶赤者爲真；再燒之最久，亦轉爲青矣，故一名絳鹽。西京記云：有青鹽池出青鹽，正方半寸，其形如石，味甚甘美。真臘記云：山間有石，味勝于鹽，可琢爲器。梁杰公傳云：交河之間，掘磧下數尺，有紫鹽，色紫鮮而味甘。其下丈許，必有堅珀。北戶錄云：張掖池中生桃花鹽，色如桃花，隨月盈縮。今寧夏近凉州池鹽所出青鹽，四方皎潔如石。此二鹽者，即戎鹽之青赤二色也。今方家但用青鹽，不用赤鹽，并目赤鹽爲異物矣。本草云：北海產青鹽，南海產赤鹽，總從西戎來，所謂南北者，指西海之南北耳。嶺南一種紅鹽，用色染成，非真赤鹽也，燒之出白汁，凝定仍轉白色矣。

○戎鹽，主治病能與食鹽同功，但出天成，不假人力煎煉，而味鹹兼甘，似勝食鹽一倍也，茲不復贅。

○凝水石，味鹹辛，氣寒，無毒。入足陽明胃經。

別錄曰：凝水石，鹽之精也，色如雲母，可析者，出并州。[illegible]李氏曰：生于鹵地積鹽之下，精液滲入土中，年久結而成石，有齒稜如馬牙硝，清瑩如水精，亦有帶青黑色者，至暑月回潤，入水浸久亦化。夏月研末煮湯，入瓶，倒懸井底，即成凌冰。蘇氏曰：出同州韓城及河東汾州、隰州及德順軍，亦有色青，文理橫如雲母者爲良；出澄州者，文理斜而色白者，次也。修治用薑汁和水煮乾，研粉用。外有一種冷油石，與此酷相似，但投滚油鍋中，油即冷者，是也。此石性冷有毒，誤服令人腰以下不能舉。

○凝水石，解胃火，去伏熱之藥也。聞人氏曰：經云：小熱之氣，凉以和之；大熱之氣，寒以取之。又曰：熱淫於內，治以鹹寒。此藥味鹹氣寒，生於鹵地，稟積陰之氣而成。善治一切伏熱，五藏（甄氏）六府積熱，天行時氣，疫熱煩滿消渴，小（別錄）便淋閉，并丹石藥毒諸疾。但陰寒沉降之性，能除有餘邪熱，如陰虛火熾，潮熱骨蒸，咳嗽多痰，并脾胃作泄者，勿服。

○集方：治五藏六府（方脉正宗）積熱，天行時氣，疫熱以致煩滿消渴。用凝水石、石膏、滑石各五錢，甘草三錢，研末，每服一錢，白湯調服。○治丹（同前）石諸藥毒。用凝水石一兩，研極細，每用二錢，菉豆湯調服。○治小（永類方）便淋閉不通，并男女轉脬，不得小便。用凝水石二兩，滑石一兩，冬葵子八錢，共爲末。水五升，煮二升五合，時時服。○治小（經驗方）兒丹毒，皮膚熱赤。用凝水石五錢，水調和，猪膽汁塗之。○治湯火灼傷。（衛生易簡方）用凝水石，研末傅之。

○玄精石，味鹹，氣寒，無毒。

蘇氏曰：玄精石，出解州及通泰州，所積鹽倉地中，多有之。李氏曰：是鹽鹵津液流滲入土，年久成石。大者如杏

葉，小者如魚鱗，皆有六角，形如龜背，又如扁圓棋子。其色青白，有光者佳。叩之則直理而拆，浸水中亦能化解。今蜀中赤鹽井之液所結者，色稍紅，非若解池之色青白耳。今天下所用玄精石，多是絳州山中所生絳石，水浸不化，此係方中偶充，非真玄精石也。

○玄精石，消熱痰，化積聚，蕩目翳，止頭風頭痛之藥也。（明賢）李氏曰：此藥稟至陰之精，與鹽同體，其味鹹，其氣寒，其性降，其形六出，象老陰之數也。同硫黃、硝石，治上盛下虛，升降不順，有扶危拯逆之功，故申鐵甕入來復丹用之，取其寒以和硝硫之熱也。成氏之消熱痰，開竇之化積聚，普濟之去目翳，千金之止頭風頭痛者，皆本於結熱爲病之取用焉。倘屬陽虛胃冷之疾，自當廻避。如寇氏方之治陰證四肢逆冷，狂言煩渴者，此指邪熱傳陰之

諸也設屬宜中。安敢言此乎。

○集方（方脈正宗）治肺胃蘊熱生痰。用玄精石、研極細，每服三分，煉蜜一匙，和白湯調下。○治心腹積聚因熱結者。（同上）用玄精石二兩，研極細，紅麴三兩，炒，為末，山藥糊為丸梧子大。每服一錢，薑湯送下。○治目生翳障。（眼科方）用玄精石五錢，研極細，用簪脚蘸點目中。○治赤目失明，并內外翳障。（朱氏集驗方）用玄精石、石决明各一兩，研極細，蕤仁二兩，共研勻，和羊肝并膽汁七個，搗爛為丸梧子大。每服三十丸，甘菊花十朵泡湯送下。○治頭風頭痛。（同上）用玄精石一兩，研極細，入羊膽中，陰乾，水調一字，食後服之。又千金方用一分，吹入鼻中。○治傷寒（[illegible]類本）天行瘦疾二日，頭痛壯熱，四肢不利。用玄精石、硝石、硫黃各二兩，蓬砂一兩，俱研細，入土罐內，鹽泥固濟，以炭火一觔，於罐子周一寸，煅之，約近半日時候，候泥罐青紫色，住火，待冷，取出，入淨磁瓶中，埋屋內地下二尺，深二七日，取出，研末，麵糊為丸豌豆實大。每服二丸，燈心湯送下。○治上盛下虛，裏寒外熱，（和劑局方[illegible]）伏暑泄瀉，下注如水。用玄精石、研細，硝石、硫黃各一兩，二味入鐵盞內，以米醋拌濕，微火炒，以竹箸不住手拌攪，火不可太過，研極細，五靈脂、水飛去沙石，曬乾，青皮、陳皮各二兩，三味俱微炒，共為末，次入玄精石末及前硝硫末拌勻，好米醋打大麥麵糊為丸梧子大。每服三十丸，溫米湯下。

朴硝（又名水硝）味苦鹹，氣大寒，無毒。沉也，陰也，降也。通行腸胃十二經走藥。

（別錄曰：水硝生益州山谷有鹹水之處。李氏曰：此物見水即消，又能化諸金，故謂之硝。生於鹽鹵之地，狀似末鹽，凡牛馬諸皮須此治熟，煎煉入盆，凝結在上，有鋒芒者，謂之芒硝；有牙者，謂之馬牙硝；凝結在下成塊者，謂朴硝。以芒硝、牙硝再四煮煉，凝如水雪者，謂之玄明粉。以芒硝懸掛風處，吹去水氣，淨謂之風化硝也。義湯再四考究，水硝有三，生西蜀者，俗呼川硝，最勝；生河東者，俗呼鹽硝，次之；生河北青齊者，俗呼土硝。皆生於鹽鹵之地，土人刮掃煎汁，經宿結成，狀如末鹽，猶有沙土猥雜，其色黃赤，須再以水煎化，澄去渣脚，入蘿蔔數枚同煮熟，去蘿蔔，傾入盆中，經宿則結成白硝，如冰如蠟，俗呼為盆硝。齊衛之硝，則底多而上生細芒如鋒，別錄所謂芒硝是也；川晉之硝，則底少而上生牙尖，如圭角，作六稜，縱橫玲瓏，明白可愛，嘉祐所謂馬牙硝是也。二硝之底，則通名朴硝也。取二硝置之風日中吹去水氣，則輕白如粉，即為風化硝。取二硝同甘草再四煎煉，裝罐升煅，則為玄明粉。陶弘景及唐宋諸人皆不知諸硝為一物，但分精麤之異，因名失實，謬度亂猜，殊無 [illegible]者增互詳，以在火硝下。）

○芒硝（[illegible]）化積聚，破留滯，（[illegible]）消熱脹，通利大小二便之藥也。薛氏曰：此藥稟天地至陰極寒之氣所生，乃太陰之精，以消物為性，故能去積聚留滯，脹滿，行大小二便等證。成氏曰：經云：熱淫於內，治以鹹寒。氣堅者，以鹹軟之；熱盛者，以寒消之。故張仲景大陷胸、兩承氣湯皆用此，以取其鹹寒潤下而降，去實熱固結不通之病耳。若非真實燥熱秘結不通之證，當斟酌行之。

○方龍潭先生曰：辛能潤燥，鹹能軟堅，芒硝辛鹹，化腸胃蘊熱燥屎秘結，又通經絡，行留血，墮胎破孕，通淋利濁，推陳致新，莫可加也。然雖墮胎，妊娠傷寒有熱盛邪堅

在所必下者。用此潤燥耎堅熱瀉而母子俱安所謂有故無殞是也。

○繆仲醇先生曰。硝者消也。五金八石其堅莫比。惟硝能消之。苟非大辛至鹹極苦最烈之味。其能消化之乎。究其芒硝功用。無堅不磨。無結不散。無熱不蕩。無積不推。可謂直往無前。性無留礙之物也。別錄謂煉餌服之輕身神仙。失其本矣。故仲景於諸承氣湯用之。非邪結下焦堅實不可按者。不用。恐其伐真陰故也。病不由於邪熱深固閉結難通斷不可輕投。至於血涸津枯。以致大腸燥結。陰虛精乏。以致大熱骨蒸。火炎於上。以致頭痛目昏。口渴耳聾。咽痛吐血。衄血。咳嗽痰壅。虛極而似

實等證。切戒勿施。至如唐玄宗所召道士劉玄真謂取芒硝煉成玄明粉。服之遂無病長生中。所載有益精壯氣。助陽補陰。不拘丈夫婦人。幼稚襁褓。不問四時。冷熱俱治之說。廼是荒唐不經之語。不識本草何緣載入。豈歷代董修儒臣。本不知醫。但廣異聞。未暇覈實。而悞收之耶。正所謂盡信書。則不如無書也。

○集方（方脈正宗）治積聚久着不化。用水芒硝三兩。每早服五分。白湯沖服漸消。○治胸膈（同前）并腹有積熱內脹。用水芒硝一兩。如治積聚同法。○治大（[illegible]方）小二便不通。閉脹欲死。兩三日。即殺人。（[illegible]）用水芒硝一兩。泡湯一升服。取吐即通。○治傷寒表邪內陷。心下因鞕。則為結胸。以大陷胸湯。用大黃六錢。水芒硝一合。甘遂二錢。以水二大碗。先煮大黃。去滓。取七分。入水芒硝。煮一兩沸。次入甘遂末。攪勻。溫服。得快利。止後服。○治傷寒（同前）七八日後。邪結下焦。少腹按之堅痛者。宜下之。大承氣湯。用水芒硝一合。大黃一兩。酒洗。厚樸二錢。枳實一錢五分。以水二升。先煮樸枳去渣。取七分。後入大黃。煮十餘沸。再入水芒硝。煮十餘沸。傾出。溫和服。得下。餘勿服。本方去水芒硝。名小承氣湯。本方去厚樸枳實。加甘草四錢。名調胃承氣湯。三承氣湯統治邪熱內結。大便不通。量病輕重擇取。○治傷寒。邪熱失汗。蓄血少腹。或先因內傷。留血下焦者。用桃仁承氣湯。下之。用桃仁十個。去皮。大黃五錢。甘草三錢。

桂枝二錢五分。水芒硝二錢。先四味。以水三升。煮熟去滓。取七合。再入水芒硝。更上火微沸。傾出。溫和服。當微利。○治死胎（保[illegible]方）不下。用水芒硝三錢。熱湯沖服。立下。

續補集方（千金方）治暴赤時眼。用水芒硝五錢。和銅青二分。泡湯頻洗。○治小兒重舌。（[illegible]和[illegible]方）用水芒硝研細末。塗舌上下。三日効。○治小兒鵝口（簡要濟衆方）用水芒硝研末。搽舌上。日三次効。

○治風熱喉痺（[illegible]方）及纏喉風。用水芒硝、火芒硝各五錢。銅杓內炒。待冷。配白硼砂三錢。共研極細。用米醋調以鵝羽蘸藥塗喉內。吐涎即通。

○風化硝味鹹甘。

李氏曰。以芒硝置于簷下。無雨露處。風日中吹之。水氣消散。自成輕粉白粉。亦有裝入黃牯牛膽殼內。待硝滲出

（皮，亦隨示收取，最效。）

○風化硝，治上焦心肺痰熱之藥也。何氏曰：此藥體重降下，經風日吹蕩，飄散陳氣，則轉變爲輕，出沉爲浮，主胸膈、心胃、肺府。一切風火浮越之疾，如小兒痰熱、昏驚，大人胃暑、發暈，以白湯化服數分，立效。

○玄明粉，味鹹辛，氣寒，無毒，沉而降，陰也。入手少陰、足厥陰、陽明經。

（李氏曰：製玄明粉法，用淨芒硝十斤，長流水一[illegible]，用白蘿蔔十斤，切片，同煮熟，濾淨，蘿蔔再用蘿蔔二十斤，同煮，濾去汁，[illegible]取出，將凝結十、次[illegible]再[illegible]之，[illegible]沉[illegible]，[illegible]身厚半寸，不蓋口，置爐中，[illegible]大十[illegible]，文至武[illegible]之，待沸定，以鐵蓋蓋口，以鹽泥固濟，再[illegible]十[illegible]，五[illegible]火[illegible]之，放冷一伏時，取出，隔紙[illegible]盛二三日，去火氣，研細，以淨磁罐收貯。）

○玄明粉，開結潤燥，通利大腸之藥也。方氏曰：此藥治一切火熱爲病，凡心熱煩躁，譫語狂言，腸熱結燥，宿垢積滯，痰熱壅塞，關膈不清，目熱昏澀，腫赤疼痛，胃熱牙疼，齒根浮脹，及喉痹乳蛾，脹閉不通等證。此鹹寒之物，潤燥爽堅，通閉滑滯，一切熱毒悉能治之。凡三焦腸胃實火積滯者，服之速効。若脾胃虛寒，及陰虛血虛，虛火妄動者，切禁用之。

硝石（又名火硝），味苦，氣溫，有小毒，陰中陽也。

（別錄曰：火硝生益州山谷及武都、隴西、西羌等處。馬氏曰：今南北東西所在諸山澤有鹹土處皆有，地上有霜，淸晨掃取，以水淋汁，煎煉而成白雪。李氏曰：諸鹵地皆產之，而河北慶陽、山東諸縣及蜀中尤多，秋冬間遍地生白，掃取多有泥土，雜不潔，以水淋汁，煎煉結于盆底者，狀似朴硝，在上者或有鋒芒稜角，亦有芒硝、牙硝之名，與朴硝同稱，而水火之性各異也。丹爐家用制五金八石，銀工用化金銀，兵家用作烽燧火藥，得火即焰起。陳氏曰：二硝自晉唐以來，諸家都無定見，不知硝有水火二種，形質雖同，性氣迥別。今以前古朴硝、硝石爲正。朴硝，水硝也，有二種，煎煉結出之細芒爲芒硝，爲牙硝；凝結盆底者爲朴硝也。硝石，火硝也，亦有二種，煎煉結出之細芒亦名芒硝、牙硝；凝結盆底者爲硝石。但二硝初生于鹵地時，消石色白易煉，朴硝色黃，亦須再三煎煉方始成也。火硝煎熟，入盆內，凝白如雪，下聚黃水，取出入鍋再煎成霜，[illegible]魚肉不壞，[illegible]家多收之。）

○硝石，治陰伏陽格，寒熱兩逆，開結閉，破積聚之藥也。士宿眞言曰：此物感海鹵之氣所產，得火則焰，入地千年，其色不變，制七十二石，能化爲水，伏草木，柔五金，煉八石，大丹不舍此也。兵家用作銃機，橫衝百里，直入雲漢，其性升達可知矣。此與朴硝形質雖同，性氣迥別。水硝其性下走，陰中之陰也，故惟蕩滌腸胃積滯，折抑三焦實火；火硝其性上升，水中之火也，故能破積散堅，升散三焦火鬱，調和臟府虛寒。與硫黃同用，則有升降水火之功，治冷熱緩急之病；煆制礞石，則除積聚痰飲。蓋硫黃之氣熱而下行，礞石之性寒而下行，硝石之性熱而上行，一升一降，一陰一陽，此制方之妙也。如入來復丹，濟寒暑不調，裏寒外熱，或腹痛如絞，泄瀉如水，甚至六脈欲脫，四體如冰，服之回陽返陰，升降順理，阻逆旋通。

而卒病暴絕之證自甦矣。如病非陰逆陽阻，而屬氣陰虛眞陽脫，漸至脈絕肢冷者，急宜大劑參附，佐以鹿茸、朮等類，庶可回生，又非硝硫開劫之力可奪也。

○集方治諸心腹卒痛，用火芒硝一錢，硫黃五分，研細末。醋煮過，每服三分，溫湯調服。○治頭痛欲死，用火芒硝，研細末，吹鼻內，即愈。○治重舌鵝口，用火芒硝研細，以竹瀝調，點腫處。○治風熱喉痺及纏喉風，用火芒硝五分，研細，以米醋調，用鵝羽蘸醋拂喉間，吐涎即甦。○治伏暑泄瀉，用火芒硝、舶上硫黃各一兩，生明礬、滑石各五錢，俱研細，用米醋一碗，鐵杓內煮乾，研極細末，紅麴二兩，打糊丸梧子大，每服五六十丸，溫湯下。○治女勞

黑疸，身黃額黑，膀胱急，小腹滿，小便黃，大便黑，足下熱，用火芒硝、枯白礬各等分，研為末，以大麥粥汁和丸，早晚各服二錢，白湯下。○治產後瘀血不行，腹脹悶痛，並有物直衝心胸，甚至昏暈欲死，身熱煩燥者，用火芒硝、舶上硫黃各十兩，共研末，米醋十碗，煮乾，滴乳香、眞沒藥各四兩，瓦上焙出油，研末，五靈脂五兩，水澄去砂淨，曬乾，木香二兩，研末，共六味共研細末，以米醋打蕎麪稀薄糊為丸，如彈子大，每丸重一錢，臨證白湯化下。○治上盛下虛，裏寒外熱，中暑泄瀉，或暈倒昏不知人，冷汗自出，手足微冷，或吐或瀉，或喘或滿，以來復丹和蘇合香丸各一丸，用溫米湯調灌。（[illegible]）

硇砂，味鹹、苦、辛，氣熱，有毒。

蘇氏曰：硇砂出西戎，今西涼夏國及火州、河東、陝西近邊州郡亦有之。然西戎來者顆塊光明，大者如拳，重三五兩，小者如指，頭入藥最緊。邊界者雜碎如麻豆粒，又夾砂石，雖可水飛澄去，入藥則力稍減。李氏曰：硇砂乃鹵液所結，亦硝石之類，出於青海，與月華相射而生，附鹽而成質，戎人采取，淋煉成砂，狀如鹽塊，以白淨者為良。其性至透，五金藉此以為先鋒，用醋熬鍊，盛懸火上，則常燥，若近冷及得濕，即化為水，或滲失而走也。張匡鄴云：高昌北庭山中常有煙氣湧起，而無雲霧，至夕光焰若炬，照見人形并禽鼠皆赤色，為火焰山。采硇砂者著木底取之，若履底皮革為者，即焦敗矣。服之使人硇亂，故名。一說西土置鹽肉以代鹽用，食之又無害，豈久與性習耶。寇氏曰：修治用水飛三次，去塵土，淨，再用米醋煮乾如霜，刮下用之。冬瓜、白萵苣、烏梅肉、牡蠣、海螵蛸五種，能伏硇毒。

○硇砂化積聚，攻癥癖（唐本草），去死肌，消肉食脹滿（日華子）之藥也。李氏曰：此藥大熱有毒之物，唐人治噎膈反胃，積塊內癥之

疾用之，則有神功，并除目翳胬肉、疣贅疵瘢。其性善爛金銀銅錫，況人腹中有久積，豈不腐化？蓋此疾皆起於七情飲食所致，痰氣鬱結，遂成有形，妨礙道路，痛脹吐食，非此物化消，豈能去之？觀庖人煮硬肉，以硇砂淩水入少許，即爛，可類推矣。多服能腐壞腸胃，生用能化人心為血，此係無妄之劑，非若良性草木平常藥石之比，司業者當慎擇而取之，毋嘗試也。如瓶器方治欬嗽痰瘰癧，補水藏，暖子宮，又經驗方久服令人能食肥健，此眞失心病狂之語，慎勿信從。

○集方治噎膈反胃，用硇砂二錢，研細，水飛三次，和蕎麥麪包之，燒焦，待冷，取出，入檳榔二錢，丁香二個，研極

細每服五釐燒酒調下日二服○治目翳不退并努肉服突用杏仁百個煮熟去皮尖研細入硇砂一錢（製法如前）與杏仁一總研極細臨用時取水一點以簪脚蘸杏仁末半米許點目中努翳盡落○治面上疣目用硇砂硼砂鐵鏽各等分研細末取少許搽三次自落

神化丹消癖積破血塊下鬼胎通經脈及諸痞積氣塊用硇砂乾漆炒血竭各三錢乳香紅娘子二十個去翅斑猫二十個去翅足共爲細末棗肉丸如豌豆大每服一丸至三五丸臨卧時用淡醋湯吞下

磨癖膏用硇砂胡黃連三稜莪朮各五錢麝香二錢俱研極細末聽用再用桃仁四兩亂頭髮四兩生猪腦子八兩桐油八兩香油四兩先將桐香油熬滾入桃仁亂髮猪腦子文武火熬以腦子盡用麻布濾出渣次下飛過黃丹十四兩白蠟五錢熬成膏待溫再下前硇砂胡黃連等五項藥末攪勻收貯鐵杓內勿令泄氣如有積塊用絹帛攤藥貼上後用鞋底炙熱熨之四五十遍覺內熱烘烘方止其癖卽自消縮

蓬砂味苦辛其氣溫無毒沉也降也入手太陰足陽明經（蘇氏曰蓬砂出南番西戎狀甚光瑩有黃白二種南番者其色褐其味和其効速西戎者其色白其味焦其効緩皆是煉結所成如礬石類柔物去垢制汞啞銅殺五金入石與硇砂同功今銀工用作銲藥亦爲不缺）

○蓬砂化結痰通喉閉去目中翳障之藥也李氏曰此屬鹵石之劑其性能柔金石而去垢膩體雖重墜而氣質輕清故本草敘上焦胸膈之熱如通喉閉噎膈消痰聚骨硬用此取其柔物也如化結痰退目胎翳障用此取其去垢也此劑淡滲清化如諸病屬氣閉而呼吸不利痰結火結者用此立清倘屬陰虛津燥髓竭營枯而成肺痿熱脹鬱悶不通諸疾法當禁用

○集方（方脈正宗）治氣閉痰結火鬱喉脹不通用蓬砂一錢放口中

噙化立消○治木舌腫脹用蓬砂二錢研細以薑汁調鵝翎蘸塗腫處○治咽喉腫痛用蓬砂一錢白梅肉一個搗丸芡實大每噙化一丸○治目翳并努肉遮睛用南蓬砂一錢片腦五釐研細以燈草頭蘸點之○治小兒陰癩腫大不消用蓬砂一錢研水塗之卽消○解一切毒食并治一切惡瘡疔毒用蓬砂四兩研細真菜油一觔瓶內浸之遇有毒者服油一小盞

石硫黃味酸，氣熱，有毒。氣味俱厚，純陽之物也。入手厥陰經。

（別錄曰：石硫黃出東海牧羊山谷及太行、河西山。陶氏曰：今南海諸番嶺外州郡亦有，不及崑崙、雅州舶上來者。此火石之精凝結石之液也。李氏曰：所在之處必有溫泉，作石硫黃氣，以顆塊瑩淨光膩色黃嫩之無聲者佳，夾土及石者不堪入藥。蘇氏曰：一種赤色者曰石亭脂，青色者曰冬結石，鵞黃色者曰崑崙黃，半白半黑者曰神驚石，並不堪用。又有一種水硫黃，出廣南及資州，從溪澗水中流出，以茅收取，熬出者曰真珠黃，氣極腥臭，堪入瘡藥。一種土硫黃，出閩濱對海有山，名雞籠頭，刮取山邊砂土，日中暴乾，和牛脂煎，研去砂土，漉出清汁乾之，即土硫黃也。入藥亦佳。修治：先以萊菔刻空，置硫黃于萊菔空內，合定，用稻糠火煨熟，去其臭氣，再以紫背浮萍同煮一日，煞其火毒，更以皂莢煎湯淘之，去其黑漿。）

○石硫黃，暖血壯陽之藥也。李氏曰：此藥秉純陽火石之精氣而成，質性通流，色賦中黃，故名。方氏曰：善治一切冷病。凡氣、血、筋、骨、臟、府、形、骸中，陽神失令，陰氣迷留，以致惡血血結，悶墜死，或腰腎久冷，頑痺痠痛，或心腹積聚，冷飲痰癖，或老人寒秘，大便不通，或命門久衰，精寒不固，或白帶淋瀝，腰脊痠麻，或下元虛冷，脾胃久泄，或陰陽交紐，霍亂絞痛，或雀斑汗斑，皮膚蟲疥，其氣雖熱，而疏利大腸，與燥澀者不同，是亦救危要藥也。寒證服之，固有速效，但中病即已，不可假此以常服多服也。

○繆仲淳先生曰：硫黃古方未有服餌者，農皇所用，止於治瘡蝕、疳、痔等。而近世遂為常服丸散，如來復丹、半硫丸、金液丹、黑錫丹諸方，稱其功用，亦未能殫述。然而人身之中，陽常有餘，陰常不足，病寒者少，病熱者多，苟非真病虛寒，切可服此大熱毒藥。世人徒知其取効輕捷，而不知其有酷烈之害也。韓退之作文戒服食，晚年服硫黃而死，可不懼哉。

○集方（方脈正宗）：治男子婦人血氣久冷，陽道不振，遍體肉寒，四肢痿弱，脾胃不實，日多溏泄。用石硫黃四兩，豆腐汁水煮三日夜，為細末，當歸身八兩，於白朮八兩，山藥四兩，砂仁二兩，俱炒燥研為末，配硫黃末和勻，神麯六兩，炒，研末，打糊為丸，如梧子大。每早服一錢，白湯下。男婦俱可用。○治婦人產後惡血，血閉，腹悶垂死。用石硫黃、火硝各二兩，醋炒，結成砂，乳香、沒藥各一兩，瓦上焙出汗，共研為末。每服一錢，白湯調下。○治腰腎虛冷，頑痺痠痛。用石硫黃二兩，醋煮三日，附子一二兩，童便煮爛搗膏，萆薢、牛膝各四兩，俱酒拌炒，共研為末，煉蜜丸梧子大。每早服二錢，白湯下。○治心腹積聚，冷飲涎癖。用石硫黃二兩，豆腐汁水煮三日，研末，生半夏三兩，生薑三兩，泡湯浸二日，瀝去水，連薑同搗千下，如泥，和硫黃末為丸，如梧子大。每早服一錢，白湯下。○治老人寒秘，大便不通。用石硫黃一兩，豆腐汁水煮一日，研末，生半夏二兩，切碎，生薑二兩，取汁拌炒熟，搗爛，和硫黃末為丸，梧子大。每服一錢五分，溫酒下。○治命門久衰，精寒不固。用石硫黃二兩，豆腐汁水煮三日，研末，鹿角膠四兩，龜板膠二兩，和酒一觔頓化，山茱萸肉四兩，山藥三兩，共炒

燥，研細，和入硫黃末，以膠酒和爲丸，梧子大，每早服二錢，白湯下。○治婦人（方脈正宗）脾胃虛寒，時多溏泄，及白帶淋瀝，腰脊痠疼，用石硫黃一兩，豆腐泔水煮二日夜，白朮四兩，黃耆五兩，當歸三兩，俱炒燥爲末，和硫黃一兩，搗勻，煉蜜丸，梧子大，每早服二錢，白湯下。○治下元（同方）虛冷，脾胃久泄，用石硫黃一兩，豆腐泔水煮二日夜，人參、白朮、補骨脂各二兩，丁香一兩，俱微炒，入硫黃末和勻，神麴三兩，炒燥研末，打糊丸，梧子大，每早晚各服一錢二分，白湯下。○治（衛生方）寒暑交紐，霍亂轉筋，中脘痞結，或吐或瀉，腹痛厥逆，二氣丹，用石硫黃、豆腐泔水煮一日，火硝各等分，研細末，醋煮乾，炒成砂，再研末，遇此患，每服一錢，陰陽水調服。此劑又治久瘧不止。○治酒（直指方）鼈血鼈氣塊，攻痛搖頭掉尾，上氣喉間，下抵腸腹，或附脇背，此藥俱用白湯調服。又治小兒一切吐瀉，不拘冷熱驚食，用此藥二三分，生薑一片，泡湯調服。又治頭風頭痛，百藥不效，用苦茶調服五分。○治雀（[illegible]方）瘢汗斑，并皮膚蟲疥，以石硫黃一兩，生用，雄黃八錢，眞鉛粉六錢，三味同研極細，如雀斑汗斑，用茄蒂醮擦，如蟲疥，以臭椿皮醮擦，三四次立效。○治酒（[illegible]方）皶赤鼻，并面紫風疙瘩，用生石硫黃五錢，黃丹三錢，輕粉三錢，枯白礬一錢五分，共研極細，每晚臨睡時，用糯米粥湯調塗，早辰用熱湯洗，塗一月效。○治諸（[illegible]方）瘡努肉突出，如田螺頭，或如蛇頭，出長至寸許

者，用石硫黃生研末摻之，即縮。○治頑癬（[illegible]方）不愈，用石硫黃生研末一兩，配傾銀過熟罐子一兩，同研極細，每日搽之。○治癰（外臺秘要）疽久不收口，用石硫黃、豆腐泔水煮半日，研細末，摻少許於瘡口。○治欬逆作呃（醫方摘要），用石硫黃燒烟，嗅之立止。○治（心傳方）玉門寬冷，用石硫黃煎水頻洗。

○石硫（赤　青）味酸苦，氣熱，有毒。

（別錄曰：石硫赤、石硫青，俱生羌道山石間，理如石耆。李氏曰：此二種即石硫黃之多赤色、青色者。石硫赤又名石亭脂，石硫青又名冬結石，較之石硫黃，力稍不及。）

○石硫（赤　青）主治功用於石硫黃同，茲不復贅。

○續補集方：治欬逆（萬病回春）即呃，服藥無効者，用石硫黃、滴乳香各二錢，共爲末，以白酒半壺煎滾，入長嘴壺內，以病呃人鼻中嗅之，即止。○治自汗盜汗，用石硫黃、五棓子一個，枯礬一錢，共爲末，以酒調塡臍上，以絹帛緊綁一宿，即止。

礬石味酸濇氣寒無毒

別錄曰礬石出河西山谷及隴西武都石門猛州晉州青州慈州無爲州諸處蘇氏云初生皆石燒碎煎鍊乃成礬也凡五種其色各異白礬黃礬綠礬黑礬絳礬也李氏云折而辨之不止五種白礬方士謂之白君出晉州者上青州吳中者次之潔白者爲雪礬光明者爲明礬亦名雲母礬文如束針狀如粉撲者爲波斯白礬並入藥爲良黑礬鉛礬也出晉地其狀如黑泥者爲昆崙礬其狀如赤石脂有金星者爲鐵礬其狀如紫石英引之成金線畫刀上即紫赤色者爲波斯紫礬並不入藥惟丹竈及瘡家用之綠礬絳礬黃礬俱見本品條下其雜色者則有鷄屎礬鴨屎礬雞毛礬粥礬皆下品亦入外科家用也雷氏曰修治凡使白礬石貯瓷瓶內置于火中煅令內外通赤鉗揭起蓋旋安石蜂窠入內燒之每十兩用巢六兩燒盡爲度取出放冷研粉以紙裹安五寸深土坑中一宿取用又法取光明如水晶酸鹹濇味俱全者研作細粉以瓷瓶用六一泥泥之候泥乾入粉三升于瓶內旋入五方草及紫背天葵各取汁一鎰候汁乾蓋瓶口更泥封上下用火百斤煅之從巳至未去火取出則色如銀研如輕粉用李氏云今人煅乾謂之枯礬不煅者爲之生礬入服食家法用新桑合盤一具于密室淨地以火燒地令熱灑水或苦酒于上乃所白礬于地上以盤覆之四面用灰壅定候一日夜其石精皆飛于盤上即掃取之更如前法凡數遍乃止名曰礬精若欲作水即以掃下礬精一斤納三升苦酒一十中浸清之號曰礬華百日彌佳若急用之七日亦可

○礬石解諸毒化痰涎之藥也薛氏曰經云澁可止脫白礬有之前古主泄痢白沃寒熱等疾蓋指泄痢久不止虛脫滑泄因發寒熱耳此藥味澁氣寒體質以澀堅明爲用故寇氏方主濕熱染汚垢濁不淸之疾若癰疽疔毒若喉痺壅腫若毒蛇百蟲諸癬若中風涎痰語音渾濁或癲癇卒暴人事昏迷諸證服此立安能解毒消瘴石藥中之救急劑也但性燥急而能却水如齒骨之疾用之不利岐伯有曰久服傷人骨因劫水故也如陰虛內熱火熾水涸發爲涎痰爲咽喉痛者不宜用如泄痢日久由於脾胃氣虛婦人白沃由於中氣下陷營血不足以致寒熱者亦不宜用如前古煉餌服之輕身不老增壽此漢人僞托神農之言誑世駭俗不足信也

○集方（朱氏方）治泄痢日久內無積滯而滑脫者用白明礬一兩鐵杓內熬枯爲末醋打麵糊爲丸如梧子大每服五十丸烏梅湯送下○治婦人（金匱方）白沃因經水不利子藏堅僻中有乾血時下白物者用白明礬一兩如前法熬枯棗肉和丸如棗核大納入戶內日一易之○治癰疽（李迅方）腫毒疔瘡發背不問老少用白明礬一兩生研末以好黃蠟七錢鎔化拌礬末衆手急丸梧子大每服十丸漸加至

二十丸白湯送下服至一二兩以上無不作效最止疼痛不動藏府不損元氣活人不可勝數此藥不惟止痛解毒善防毒氣內攻護膜止瀉托裏化膿生肌收口服至八兩尤佳今名蠟礬丸○治喉痺（濟生方）喉癰乳蛾用白明礬三錢鐵杓內溶化入劈開巴豆三粒熬乾去豆取礬研極細吹入喉中立愈甚者以礬末五分以米醋調噙喉間少頃吐涎愈○治中（濟生方）諸蠱毒用白明礬細茶葉各二錢共爲末新汲水調服吐瀉即效未吐瀉再服○治毒（肘後方）蛇蟲傷人及射工沙虱等毒氣入腹口噤目黑手足厥直用白明礬二錢爲末溫湯調灌○治蛇（劉禹錫傳信方）咬蠍螫及虎犬等傷用白明礬少許熬化乘熱滴傷處立安○治中（陳）

風痰厥四肢不收氣閉昏塞人事不明者用白明礬一兩猪牙皂角五錢共爲末每服一錢溫湯調下吐痰即甦○治風痰癇病（[illegible]）用白明礬一兩細茶葉五錢共爲末紅麯打糊爲丸梧子大一歲十九大人以五十九爲率久服痰自大便中出

續補集方治風熱喉痛（普濟方）用浙磚一塊浸糞廁中一月取出洗淨晒乾用白明礬八兩研末化水浸磚三日透取出晒乾又浸又晒以礬水乾爲度放陰處待霜出掃收每服五分白湯調服○治初生小兒舌生白膜如皮裹（姚和衆至寶方）舌或遍舌根用指甲刮破令血出以生白明礬燒枯爲末傅之即退○治齒牙腫痛（簡要方）用白明礬一兩燒枯露天

大蜂房一兩微炙每用三錢水煎含漱去涎○治舌木（集簡方）腫强用生白礬肉桂各等分爲末安舌上下○治小兒（普濟方）鵝口滿口白爛用白明礬一錢燒枯朱砂二分共爲末每以少許傅之日三次神驗○治口中氣臭（生生編）用生白明礬二錢入麝香數釐爲細末擦牙上○治目翳努肉（摘玄方）用生白明礬一錢水一合煎半合入白蜜些須調之以綿濾過每日點三四次○治時行風熱目赤腫痛（集簡方）用生白礬銅青食鹽川黃連各二分泡湯用軟白絹蘸洗兩眼胞上○治聤耳出汁（聖濟錄）用白明礬五錢枯黃丹一錢共爲末日吹一次○治脚氣衝心（千金方）用白明礬三兩水一斗二升煎沸浸洗○治黃腫水腫（濟急方）用白明礬一兩綠礬一兩白麪半觔同炒令赤色研爲末以辣醋打米糊爲丸梧子大白湯下○治女勞黃疸（金匱方）書云黃家日晡發熱又惡寒膀胱急少腹滿目黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便黑時溏此女勞之病非水也自大勞大熱交接後入水所致腹滿者難治用白明礬燒枯火硝炒黃各等分爲末每服二錢以大麥粥汁調日三服病從大小便去○治二便不通（經驗方）以白明礬生用研末塡滿臍中以濕水滴之十餘點半刻即通如臍眼平而不深者以麥麪水和作條圍之○治卒時吐瀉不止（華佗方）用白明礬燒枯研末五分白湯調服○治反胃嘔吐（普濟方）用白明礬硫黃各一兩研末米醋煮乾再研細用麥麪打

糊爲丸梧子大每服五十丸薑湯下○治刀斧金瘡（救急方）用白明礬燒枯黃丹各等分爲細末傅之○治漆瘡作癢（千金方）用白明礬廿塊泡湯拭之○治小兒臍腫濕爛（聖惠方）用白明礬燒枯傅之○治頭上黃水脂瘡（生生編）用白明礬燒枯瀝青各等分爲末清油調塗○治足趾甲入肉作瘡不可履（肘後方）用白明礬燒枯傅之去惡肉生好肉用修脚匠細細割去甲角旬日愈○治陰汗濕癢（御藥院方）用白明礬燒枯撲之又泡湯洗

原缺

赤、香附八兩，童便浸，厚朴、薑汁拌炒。白芍藥、山查肉、蒼朮、米泔浸。各三兩，苦參、陳皮、茯苓、白朮各二兩，炒。甘草、青皮各一兩五錢，針砂四兩，炒紅醋淬三次，共爲細末，醋打紅麴末作糊爲丸，如梧子大，每早晚各服百丸，白湯下。人虛者服五十丸，人參湯下。忌一切生冷、油膩、雞、鵞、羊、鴨、生硬并黏粽難化之物。服過七日後，便覺手掌心凉，口唇旁有紅暈起，調理半月愈。○又方，治黃胖病。用綠礬，炒紅，四兩，蒼朮，米泔浸，厚朴，薑汁拌，陳皮，酒洗，俱炒燥，各三兩，甘草六錢，炒，共爲末，醋打紅麴末作糊爲丸梧子大，每早晚各服三錢，米湯下。○治食勞黃病。（救急方）身目俱黃，用綠礬二兩，醋拌炒赤，研爲末，棗肉和丸梧

子大，每服三錢，食後白湯下。○治癬瘡作癢。（集簡方）用礬紅五錢，檀樹葉五十片，螺螄肉二十個，同搗爛，用夏布裹擦之。○治走馬牙疳。（[illegible]方）用綠礬三兩，醋拌炒赤，爲末，入雄黃、蓬砂、水芒硝各一錢，共研極細，用溫茶漱洗淨，摻之。○治喉風腫閉。（[illegible]方）用綠礬四兩，用好米醋四兩，拌濕，日下晒燥，研末，吹之。少頃，用生薑二錢，茶葉一錢，泡湯汨漱，再吹，再汨漱，半日愈。○治重舌、木舌。（[illegible]氏方）用綠礬，刀頭上燒紅，研末摻之。○治食積成鼓脹。（方脈正宗）用綠礬，刀上燒紅，一兩，研末，入巴霜五分，共研勻，紅麴打糊爲丸，如梧子大，每早服三丸，或五丸，白湯下。○治痞疾多嘔吐涎者。（聖濟錄）用綠礬炒赤，一錢，乾薑三錢，生半夏二錢，甘草五分，水二碗煎

半服。○治久痢（方脉正宗）虛積不淨。用礬紅三錢，茯苓五錢，共研極細，水發爲丸，如菉豆大。每早晚各服一錢，人參湯送下。○治小兒疳積，好食泥土灰炭及生米生肉等。用綠礬一兩，醋拌炒紅，研末。每服五分，米湯調下。○治腸風（永類鈐方）下血，積年不止，虛弱甚者，一服取效。用綠礬四兩，入砂鍋內填實，瓦片蓋定，外用鹽泥固濟，大炭火煆通，冷取出，入青鹽、硫黃各一兩，共研細勻，再入一新砂鍋中，鹽泥固濟，如前法煆，取出研細，附子一兩，童便煮爛，搗成膏，調入煆過藥末內和勻，再和稀粥糊爲丸，梧子大。每空心白湯下五十丸。

治遍身瘋癬疥瘡不常，用綠礬、芒硝各一兩，煎湯頻洗浴，漸愈。○治床褥中生臭蟲，用綠礬、樟腦各等分，同床四角，永無臭蟲。○造屋棟柱關眼中，用綠礬拌和灰末，拌勻，藏紙，一切蟻蠹蟲蠶不生，並屑棺木亦○治小兒重舌，用膽礬研細敷之。

膽礬，味酸澁，苦辛，氣寒，有毒。入足少陽膽經。（蘇氏曰：膽礬出蒲州虞鄉縣東亭谷窟中，有塊如拳，或如栗，其色碧綠，如鴨觜，而有白文者爲上。爲末揉鐵，即變銅色爲真。味極酸苦澁辛。多生銅坑中石間，擊之縱橫解，皆成疊文。又玉洞要訣云：膽礬，陽石也。出嵩嶽及蒲州中條山，稟靈石異氣而生。○今市家以綠礬僞作，揉鴨充之，不可不辨。）

○膽礬吐風痰，消喉痺，療齒疳齦爛之藥也。李氏曰：此藥得銅氣之精，相感而生，故色青，味澁，如銅味也。其性收斂上行，能湧風熱痰涎，故治咽喉口齒諸毒，有奇功也。攻喉痺極速，垂死者，以鴨嘴膽礬一錢爲細末，溫醋一鍾調灌，大吐膠痰升許，即瘥也。但硝石之劑，多服有損津氣，宜暫用，不宜久服也。

○集方：治大人（[illegible]氏方）小兒風痰，用鴨嘴膽礬七分，小兒二分，溫

醋湯調服，並吐出涎便甦。○治（衛生方）喉痺喉風腫塞不通，用鴨嘴膽礬二錢，白殭蠶五錢，炒，共研細末。每以少許吹之，吐涎。○治口舌生瘡（千金方），久不瘥，用鴨嘴膽礬五錢，入銀鍋內火煆赤，取起細研。每以少許傅之，吐出酸涎水，愈。○治走馬牙疳（[illegible]氏[illegible]方），用大棗一個，去核，入鴨嘴膽礬，濕紙包燒赤，研末傅之，追涎。○治小兒齒疳（[illegible]方）齦爛，用鴨嘴膽礬一錢，匙上燒紅，研細末，加麝香五釐，再研勻，取少許傅齦上，立效。○治小兒鼻疳（[illegible]方）蝕爛，用鴨嘴膽礬，火燒紅，研末摻之，一二日愈。○治風眼（[illegible]經驗方）赤爛，用鴨嘴膽礬三錢，食鹽一錢，紙裹火燒赤，研勻。每日取五分，泡湯一碗，隨時洗眼。○治風犬咬毒（[illegible]方），用鴨嘴膽礬研末敷之。

伏龍肝（即竈心土）味辛，苦，微甘，氣濕，性燥，無毒。土部 火土類

（陶氏曰：此乃竈心對釜月下黃土也。以十餘年之竈，得火土之氣，方可取用。研細，水飛過，入藥用。）

○伏龍肝，溫脾滲濕，止大便穢血之藥也。張相如曰：藏而不出曰伏，隱而不見曰龍，藏血而收攝諸身之納氣曰肝，故命名曰伏龍肝也。體雖土質，深得積年火氣而成，性燥而平，氣溫而和，味甘而斂，以藏為用者也。故善主血失所藏，如金匱方之療先便後血，別錄方之止婦人血崩漏帶赤白，蜀本草之治便血、血痢、污穢久延難病方之定心胃卒痛，及魘寐暴絕，凡陰幽伏隱之疾。一時卒難治者，溫湯調服七劑即定，有神奇變化之莫測也。他如藏寒下泄，脾胃因寒濕而致動血絡，成一切失血諸疾，無用不宜。爾觀結陰便血，當便溺時，血隨便下，經言結陰便血一升，再結二升，三結三升。若人節養失宜，以致陰血內結，滲入腸間，滲而即下，則色鮮；滲而留滯而後下，則色黯。治宜溫補，惟用此藥，加桂、朮、參、耆最善。

○集方治結陰便血。（今醫方名集十要）用伏龍肝四兩，研細，水飛過，熟地、白朮、黃芩、甘草，俱酒拌炒，阿膠蛤粉拌炒，各一兩，附子童便製，八錢，以水四升，煮一升，溫服。○治婦人血崩，并白帶，或延久血痢，用伏龍肝二兩，（製法同前）白朮、茯苓、當歸各四兩，白蘞三兩，桂枝一兩，俱用酒拌炒，磨為末，煉蜜丸，每蚤服五錢，熟地煎湯下。○治卒中惡氣，及魘寐暴絕，并心胃痛極，用伏龍肝為細末，白湯調服二錢。

土部 火土類

百草霜 味苦，氣溫，無毒。

（李氏曰：此乃竈額上積煤，及爐蒸上墨烟皆是。以鍋刷掃之，其質輕細，故謂之霜。）

○百草霜，解三焦結熱，化臟府瘀血之藥也。車體和曰：發百草積烟凝結，烟雖發于火之先，而烟之氣，係百草津氣熏蒸，此得木之津，火之氣也。如蘇頌主化小兒食積癖塊，婦人氣痞血瘕，取此得火氣之輕揚，而散陰凝陳聚之物也。蘋湖治黃疸瘧脹，咽喉腫閉，口舌生瘡，取此得火氣之輕升而發越濕熱痰氣搏結之疾也。又古人有黑奴丸治傷寒陽毒發狂者，謂其清陽烟火之氣，從治上焦心肺之火邪也。雜病方用治吐衄崩血不止者，謂其輕浮火化，[illegible]之黑也。血見黑即止，亦從治熱勝動血，而安營血之暴走也。如陰虛火爍，咳嗽肺損者，勿用也。（方脈正宗共方五首）

○集方治小兒食積痢疾，用百草霜三錢，巴豆霜一分，研勻，以飛羅麪打糊為丸，如綠豆大，每服一丸，白湯化下。○治婦人氣痞血瘕，用百草霜二兩，三稜、莪朮各二兩，乾漆五錢，俱用酒拌炒，紅麴為粉，打糊丸梧子大，每蚤服一錢，酒送下。○治黃疸或瘧疾作脹，用百草霜一兩，研極細，每服一錢。病疸者茵陳湯下，病瘧者草菓仁湯下。○治咽喉無故腫閉，用百草霜、白硼砂各二錢，研細末，吹入喉間。○治口舌生瘡，用百草霜二錢，甘草一錢，

肉桂五分。頻頻搽之。○治（[illegible]）傷寒陽毒發狂。用百草霜、金底煤各三錢，麻黃一錢，大黃一錢五分。水煎服。○治吐（[illegible]）血衄（[illegible]氏方）血不止。用百草霜，白湯調服二錢即止。○治婦人（倪氏）崩血（家傳）大脫。用百草霜、炮薑末各三錢，用人參三錢煎湯飲立止。○治積熱痢（[illegible]方）。用百草霜五錢，川黃連三錢，微炒，共研極細。每服七分，米湯調服。○治胎前（杜氏方）產後一切危證。用百草霜、香白芷各等分，爲細末。每服二錢，童便調下。二服即安。

○釜臍煤。（味苦，氣溫，無毒。）止吐血、血暈。亦解中惡蠱毒、小兒客忤之藥也。臨病以童便調服。大人數錢，小兒數分。其治病大略與百草霜同。

○京墨。（味苦。氣溫。無毒。以松木燒烟，宜遠細者良。偽雜者不可入藥。如以他物燒烟者次之。）其治病，與百草霜、釜臍煤大同。

土部（水土類）

田中泥（李瀕湖方）治誤吞馬蝗入腹者。取此泥，水飛，去砂石，湯調數錢服，當利出。如入耳者，取泥一碗，枕耳邊，聞氣即出。

井底泥療妊娠熱病。取此泥傅心下，及丹田，可護胎氣。

螺螄泥治暑毒痢。取螺一斗，水浸，取泥，白湯調服二錢。

蚯蚓泥（沈氏曰：係蚯蚓食土，遺出累累如珠粒，粒成塊者。園圃階砌間及道途陰乾處多有之。）散火毒，解天行狂熱之藥也。簡便方治傷寒陽毒譫狂，及時行赤白熱痢，取半升，調沸湯飲之即止。如被狂犬毒蛇咬傷，和鹽水調敷。

本草彙言卷之十四

錢塘　倪朱謨純宇甫選集

金之赤振先甫校正　男倪洙龍沖之氏刪補

穀部（麻麥稷類）

胡麻（又名脂麻，因石勒天下名胡，改名脂麻。）味甘，氣平，無毒。

（李氏曰：胡麻本生大宛，故名。今江南北俱種之。有早遲二種。有黑白赤三色。其莖皆方。秋開白花，亦有帶紫色者。節節結角，長者寸許。有四稜六稜者，房小而子少。七稜八稜者，房大而子多。皆隨土地肥瘠而然也。其莖高三四尺。有一莖獨上者，角纏而子少。有開枝四散者，角繁而子多。皆因苗之稀稠而然也。其葉有本團而末銳者，有本團而末分三丫如鴨掌形者。葛洪謂一葉兩尖也。蓋不知烏麻、白麻原有二種葉也。又賈思勰謂胡麻即脂麻。又名巨勝子者。後人因莖方有稜，又以茺蔚子爲巨勝，以大麻子及大藜子僞爲胡麻，以訛傳訛，誤而又誤矣。按茺蔚子，莖有三稜，子長一分許。大麻子，黑如細韭子，味極苦。大藜子狀如壁虱，味辛。其三子並無油脂。[illegible]胡麻須[illegible]大者盛。雷氏曰：[illegible]以水淘去浮者，[illegible]乾，臼中舂去麤皮用。）

○胡麻，潤養五臟之藥也。劉氏完素曰：胡麻，油穀也。甄氏言：仙經所重，久服潤五臟，填精髓，於男子有益。如患人久神氣虛而噓噓吸吸者，宜加用之。陶氏又言：病風人久食，則步履端正，語言清利，無蹇澀之虞。則知養元氣，潤筋脈，正骨力，可徵矣。所以日華子又言逐遊風、風濕，胎前催生落胞，及產後血瀝，諸虛之證，咸取用之。亦惟陶氏養氣潤脈之意云。但多服令人腸滑。緣體質多油故也。若蒸熟食之良，生食者發痰生蟲、脫髮，炒食者發熱燥血，悶心者，當斟酌行之，有不脉其用矣。

○集方（外科正宗）治五臟虛損，補精髓，益氣力，堅筋骨。用胡麻九蒸

九暴收貯，每用二三合，清晨白湯送下。○治風痺痿軟無力，行步艱辛，語言蹇澁。用胡麻蒸熟，暴乾，每清晨乾嚼五錢，白湯送下。○治一切風濕，腰脚疼重，并遊風行止不定。用胡麻一觔，白朮八兩，葳靈仙酒炒四兩，共研爲末，每早服五錢，白湯調下。○治胎孕足月，過期不產。用胡麻蒸熟，日服三合，乾嚼化，白湯送下。不惟善能催生下胞，平速，且無一切西難諸疾。

續補集方：治牙齒腫痛。用生胡麻五合，水一升，煮汁五合，含口中，泪漱，不過二三次愈。○治小兒下痢赤白。用生胡麻一合，搗爛，白湯濾出汁，入煉熟白蜜五錢，調勻，不時用重湯頓溫，以大茶匙徐徐飲之。○治小兒瘰癧，

用胡麻炒，連翹微炒，共爲末，早晚頻頻食之。○治胎毒，小兒初生，以生胡麻滾湯泡熟，研爛，絹子包，與兒咂之，其胎毒自解。十日用一次，以三年爲止。○治小兒頭上軟癤，用胡麻炒微焦，搗碎，用酒少許，調塗。○治坐板瘡疥，以生胡麻搗爛敷之。○治乳瘡肺癰，以生胡麻搗爛以香油調塗即安。

○胡麻油，味甘，氣微寒，無毒。

（李氏曰：胡麻油入藥，以烏麻油爲上，白麻油次之，須生作者良。蒸炒作出者，止堪飲食料也，不堪入藥。若市肆者，不惟已經蒸炒，而又雜之以菜子油也。）

○胡麻油，解百藥百蟲五金八石諸毒之藥也。綱目曰：取油以生胡麻生作者良，能解毒潤燥，瘍科用此止痛消腫，去一切惡瘡疥癬，以此煎膏，配鉛粉，能生肌長肉，止痛，補合皮裂。又主天行熱毒，熱腸內結熱，及蚘結攻心作痛。如炒熟榨取出者，氣雖香烈，入廚料中充餚食用甚美，不免能動痰發氣，久食亦能損聲。

○集方：治百藥百蟲及河豚諸毒，治山嵐瘴蠱諸毒，及中五金八石毒，及砒霜毒，並用生胡麻油一碗灌之，吐出毒物立愈。（易簡方）○治天行酷熱，昏暈，用生胡麻油一盞灌之。（方脈正宗）

○治蚘結攻心作痛，用生胡麻油一盞灌之，隨用烏梅五個，花椒三十粒，泡湯一鍾飲之。（同前）○治難產不下，因血乾澁也，用生胡麻油和白蜜一鍾飲之，胎滑即下。一方用生胡麻油命穩婆手灌入產門內，收之即來，并治死

胎不下。○治癰疽發背，初起服之，使毒氣不內攻。以生胡麻油、無灰好酒各一觔，和勻，分五次飲。○治打撲傷腫，用生胡麻油和酒飲之，以火燒熱地，臥之，覺即疼腫俱消，了無痕跡。

治悞食銀幼，漸爛腸胃，延日隨死，每日用飴糖四兩，撚成小丸，不時以胡麻油吞下。○胡麻湯，治一切腰痛。用胡麻仁、杜仲、當歸、川芎、續斷、白芍藥、牛膝各三錢，水煎服。○腰痛宜分新久，新痛宜疏逆氣，利濕熱；久則補腎，兼補氣血。（如痛由風寒，本方加羌活、防風；風濕，加蒼朮、半夏；氣滯，加枳殼、木香；腎虛，加生熟地黃、枸杞子、補骨脂；氣血兩虛，人參、黃耆、白朮，倍當歸、白芍藥；瘀血，加乳香、沒藥、桃仁、紅花。）

大麻味甘，氣平，無毒，沉也，降也。入手陽明、足太陰經。

李氏曰：大麻處處有之，剝皮可績布，收子可壓油。有雌雄二種，雌者結子，名枲麻、苴麻；雄者不結子，名牡麻、芓麻。故枲者，大麻之有子也。花名麻勃，子名麻蕡，麻仁則子中仁也。爾雅翼云：菜黃種麥，麥黃種枲。葉狹而長，狀如益母草，一枝七葉或九葉，一葉又分五歧。五六月開細黃花，成穗，隨結實，大如胡荽子，其色黑，其稍白而有稜。稈虛可爲燭心。若子，放勃時須去雄者，於未放勃而先去之，則又不成子矣。寇氏曰：修治大麻仁，極難去殼。取仁帛包，置沸湯中，浸至冷，乃出之，垂井中一夜，勿令著水。次日日中暴乾，就新瓦上挼去殼，簸揚取仁，粒粒皆完。張仲景方用麻仁丸，即此大麻子中仁也。先落地中者，食之有毒。

○大麻仁，潤大腸風熱（陳士良）燥結之藥也。劉氏（完素）曰：麻木穀也，而治風去燥，同氣相求也。如傷寒論陽明病，汗多胃熱，便難者，屬火燥而結也，仲景方用此以通潤之。如老人氣閉血燥，脾弱而大便難者，婦人產後血澁，氣結營衛凝

澁而大便難者，屬血燥而結也，證治方用此以潤養之。他如癘風癩疾，皮枯，肢廢，津衰，毛落，而營衛之氣不通者，屬風燥而結也，陳士良用此以轉運風機，聖惠方用此釀酒以通肌竅之風結耳。然質性滑利，多食有損血脉，滑精氣，痿陽事，婦人多食即發帶疾，以其滑利下行，走而不守故也。

○集方：治（仲景方）脾弱氣不行，大便秘而小便數，用麻子仁二兩，另研，杏仁四兩，另研，白芍藥、厚朴、枳實、大黃各五兩，俱酒拌炒，研爲末，入大麻子仁、杏仁二總和勻，煉蜜丸梧子大，每服五十丸，以知爲度。○治（本事方）婦人產後氣結血燥，大便不通，用大麻子仁、紫蘇子各二兩，水洗淨，研細，再以水研，濾取汁一盞，分二三次服。此方不惟治產後血燥，凡老人諸虛血燥，風秘氣秘，大便不通，皆得力也。○治大風（聖惠方）癩疾，皮枯血燥，眉髮脫落，將成敗廢，用大麻子仁五升，水淘淨，晒燥，水氣以酒一斗浸一夜，研取白汁，用紗濾出，入瓶中，重湯煮數百沸，收之，每早晚以量飲之。

續補集方：治風水腹大，腰臍重痛，不可轉側，用大麻子仁四兩，研碎，水濾汁，入白米二升，煮粥食。此方并治老人風痺，疼痛，大便不通者。○治（普濟方）婦人無故月經不通，或兩三月，或六七月，或一年者，用大麻子仁二升，桃仁四兩，研勻，熟酒三升，浸一夜，隨量不拘時飲之。○治消渴（肘後），

飲水日至數斗，小便赤澁，用大麻子仁一升，水三升，煮百沸，飲湯代茶，不過五升愈。○治血痢（外臺方）不止，用大麻子仁三合，水五碗，煮百沸，取湯再煮綠豆三合，空心食，極效。○治跌打損傷，瘀血在腹中，用大麻子仁二升，葱白二十枝，水六升，煮二升，服，血散不盡再服。

○大麻皮（味甘）、麻根（味苦），氣平，無毒，通血脉諸經絡。麻根皮，活瘀血，通小便之藥也。蘇氏（[illegible]）方治撻打內傷心腹，瘀血脹悶，及骨痛不可忍，或產難，胎孕不落，或胞衣不出，或瘀血血淋，小便結閉不通者，並宜用麻皮或麻根數兩，煮汁飲，立效。

浮小麥，味甘苦，氣平，寒，無毒。升也，浮也。入足太陰經。（李氏曰：浮麥，即小麥之有皮無肉，而空殼也。水中淘，即浮起者。）（登山）

○浮小麥，止自汗盜汗之藥也。虞氏曰：此藥係小麥之皮，枯浮無肉，體輕性燥，善除一切風濕在脾胃中。如濕勝多汗，以一二合炒燥，煎湯飲，立止。倘陰陽兩虛，以致自汗盜汗，非其宜也。

麥粉（又名小粉）味甘，氣寒，無毒。沉也，降也。（李氏曰：麥粉，即小麥之麩皮洗筋澄出漿粉，氣白如蠟。今人漿衣，用多糊之。）

○麥粉，解熱毒，止酒積之藥也。萬氏曰：此藥係小麥麩裹弱膜，見水下沉，體重而滑，善解一切熱毒。

○集方：治癰（五月午方）腫發背，初起未破者，取效如神。用麥粉不拘

多少，陳年者，鍋內炒化，如飴糖，炒久則乾焦而黑色，乘熱以米醋調成糊，磁罐收之。遇瘍毒，以藥敷毒上，留中孔，以綿紙貼蓋，少頃痛止腫消而愈。○治酒（敬方）毒成積。用麥粉炒黃五錢，白湯調服，不過二三次立止。

麥麵、麵筋二件，詳載食物本草。

大麥芽，味甘，氣溫，無毒。可升可降。入足太陰、陽明，手陽明經。

（蘇氏曰：大麥南北皆有，形似小麥而大，色青有芒。頌曰：以水浸濕，而以濕草蓋之，數日即生芽，又名大麥蘖。曬乾去芒鬚用。凡粟、黍、穀、豆、麥，凡種皆可水濕蒸芽。）

○大麥芽，和中消食之藥也。方（紳沖）氏曰：蘖麥之萌芽已出，發生之機已萌，有傷於麵食四，而不行者，用已發之物，而發未發之物，則未發隨已發腐也。李氏方，謂其能解麥麪米穀瓜菓之積，良有意耳。此劑補而又能利，利而又能補，如腹之脹滿膈之壅結，或飲食之不納，中氣之不利，以此發生之物而開關格之氣，則效非常比也。如脾胃虛而中氣滯者，大安服之，與砂仁、歸、半、茯、朮同用更善。

○集方：治諸（朱子垣家傳）病腹脹，不拘老幼男婦，初病久病，虛實寒熱等候，用大麥芽微炒，磨為粉，去皮淨。虛脹加參、耆、茯、朮；實脹加厚朴、蘿蔔子；寒脹加乾薑、木香；熱脹加黑山梔、黃芩。以麥芽粉一觔，配所屬佐用，每味十之一。或水發，或煉蜜丸，隨證合用可也。（配用佐使，隨諸見證加入，不必拘泥。）

大麥中仁，詳載食物本草。

糯米泔、味甘。氣溫。無毒。

（說文曰、糯、粘米也。秫、不粘米也。然秫糯酷相似、以粘不粘爲異。寇氏曰、糯米其性溫、故可爲酒。酒爲陽、故多熱。西域天竺、土濕熱、糯歲四熱、亦可驗矣。）

○糯米泔、益氣止煩渴之藥也。李氏（時珍）曰、此甘寒解熱氣、有人食鴨肉膨脹不消者。頓熱飲一盞。即消。

○糯稻稈、（味甘、氣熱、無毒）活血解毒之藥也。陳氏（藏器）方、治黃疸、身面如金色、煮汁飲之、并沐面浴身、即退。又燒灰、治墜撲傷損、酒調服二三錢。又取糯稻稈煮、治作紙、取嫩心以爲褋大、爲民利。紙不可貼瘡、能爛肉、

○糯米糠（味苦、氣溫）治齒黃、燒取白灰、日日擦之。（時珍）

○糯米、主治功能。詳載食物本草。

○粳米泔、味甘。氣寒。無毒。

（李氏曰、粳乃穀稻之總名也。有早中晚三收。諸本草獨以晚稻爲粳者、誤矣。與糯米不同。糯者懦也、其性粘。粳者硬也、其性不粘而種各異。）

○粳米泔、清熱涼血之藥也。李府珍用此頓熱作飲、能利小便。夏月入井浸冷。善解暑渴。戴元禮以此頓熱、曬時洗目。善治風熱赤眼、

稷、黍、粱、粟、秫、籼、稗、及菰米、八種。俱詳載食物本草

薏苡仁、味甘、氣溫。無毒。沉也。降也。入足陽明。手太陰經。

（別錄曰、薏苡仁出真定平澤田野間。今所在皆有。蘇氏曰、今多用梁漢者、但氣劣於真定。陶氏曰、出交趾者最良、彼土人呼爲簳珠。故馬援在彼餌之、載種還。人讒以爲擄珍珠也。李氏曰、二三月宿根自發、高四五尺、葉如初生芭蕉。五月抽莖開紅白花。六月結實、重累、殼青、殼堅薄而殼中仁如珠、味甘美、咬着粘齒、可以作粥飯食、可以和糯米釀酒。一種形圓殼厚者、名菩提子、但可穿作念佛珠、其仁少且無味、即粳糯也。二種根並白色、大如箸柄、糺結而味甘也。修治、以八九月采實、曬乾、去殼用。）

○薏苡仁、餐胃健脾、清肺導腎之藥也。繆氏（仲醇）曰、此藥得天地冲和沉厚之氣以生。色白體重、質凝味甜、爲脾、胃、肺、腎、調和水火之劑。寒而不泄、溫而不燥、補而不滯、利而不劫、至和至美之品也。前古謂久服益氣、輕身去風濕痹氣、以致筋急拘攣、不可屈伸者、作粥、釀酒、或爲湯散

丸劑。如久病虛人、老稚幼弱之疾、咸宜用之。方氏（龍潭）曰、凡風濕之證、或麻或痛、而肢體拘攣、或脹或腫、而脚膝難履、或痿或痺、而腰脊痠疼。或脹或浮、而皮膚水腫、或欬或嗽、而痰涎壅盛、或泄或瀉、而大便不實、或癃或疼而咳唾膿血、或癰或閉而淋瀝、帶濁。是皆脾、肺、腎、經蘊濕鬱火之爲病、惟此劑可以治之。其味甘、入脾。氣平和、肺微寒入腎。爲養正去邪之神藥、

○集方、（仲景方）治周痹、筋脉緩急偏虛、用薏苡仁一觔。炒黃、大附子、切片、一兩六錢、童便煮。乾、分作十劑、水煎服。○（方脈正宗）治風濕痹氣、肢體麻木、筋骨攣。用薏苡仁一觔、炒、當歸、白朮、天麻、牛膝、各四兩。道寄生、八兩。分作二十劑。

水煎服。○治風濕痺氣（姚和衆方），肢體痛脹，腳膝難行，用薏苡仁一觔，木瓜、牛膝各四兩，桂枝二兩，分作十六劑，水煎服。○治風濕痺氣（同濟方），肢體痠痺，腰脊痠疼，用薏苡仁一觔，真桑寄生、當歸身、川續斷、蒼朮（米泔水浸炒）各四兩，分作十六劑，水煎服。○治風濕痺氣（衍方），侵腳以致肌肉浮脹，皮膚木痹成臨急者，用薏苡仁一觔，炒，肉桂、乾薑、砂仁、車前子、葶藶子、白芥子各二兩四錢，郁李仁三兩，研去油，分作十六劑，水煎服。○治風濕痺氣（范汪方），妨礙胸胃，嘔吐痰涎，用薏苡仁一觔，炒，半夏、膽星各四兩，乾薑、陳廣皮各二兩，生薑、白芥子各一兩六錢，分作十六劑，水煎服。○治風濕痺氣（陳正宗方），時作泄瀉，大便不實，用薏苡仁一觔，炒，砂

仁三兩二錢，研，木香五兩，研，白朮炒四兩，甘草炙一兩二錢，分作十六劑，水煎服。○治風濕痺氣（楊師方），內成肺癰，肺痿，咳吐膿血，用薏苡仁一觔，炒，百合、百部、茯苓、紫菀各四兩，川貝母、桔梗各二兩，甘草炙一兩，分作十六劑，水煎服。○治風濕痺氣（楊仁齋方），小便癃閉不通，或成淋瀝，或成白帶白濁，用薏苡仁一觔，炒，淡竹葉、車前子、滑石（研）、茯苓各四兩，白朮炒二兩，甘草炙一兩二錢，分作十六劑，水煎服。

續補集方，治孕婦生內癰（婦人良方）（補遺），用薏苡仁，煮汁頻頻食之。

治消渴飲水（經驗方），用薏苡仁，煮粥飲之。

罌粟米，味甘，氣寒，無毒。

（蘇氏曰：罌粟花處處有之，人隔年糞地，八月中秋布子，涉冬至春始生，苗極繁茂，嫩苗作蔬，油醬拌食甚佳。李氏曰：葉如白苣，三四月抽薹，結青苞，花開則苞脫。花凡四瓣，大如仰盞，亦有千葉起樓子者。其色變態不常，有白者、紅者、紫者、粉紅者、杏黃者、半紅者、半紫者、半白者，艷麗可愛，故又名麗春。花開三日即謝，而罌在莖頭，長一二寸，大如馬兜鈴，上有蓋，下有蒂，宛如酒罌，中有子，如白米極細。一罌有數百粒，可煮粥食，取子水研爛，加漿同綠豆粉作腐，食尤佳。其殼入藥，可止瀉痢，原味澁也。）

○罌粟米，清熱消痰，潤燥結之藥也。蘇氏曰：體輕質浮，氣寒性滑，而下痰涎，潤燥結。作粥食極美，如發丹石、金銀、銅鐵、鉛錫諸毒者，需此煎湯飲，立解。如無熱疾痰疾者，勿多食也，否則有傷脾冷胃之咎。

○罌粟殼，味酸澁，氣寒，無毒。

○（李氏曰：凡用，以水洗淨，去蒂及筋膜，取外薄皮，陰乾，細切，以米醋拌炒入藥用。）

○罌粟殼，斂氣澁腸，禁瀉痢之藥也。李氏曰：凡泄瀉下痢，日久則氣散不固，而腸滑肛脫者有之；凡欬嗽諸病，日久則氣散不收，而肺脹痛劇者有之，俱宜此澁之固之，收之斂之之藥是矣。然瀉痢必須腹中無積滯，咳嗽必須肺家無風寒客邪，方可用此。如積邪一有未盡，劇爾服此斂澁之劑，積邪得斂而愈甚，所以多有變證作，而淹延不已者，亦有之，所以後人多疑畏而不敢用也。即有可用之際，必宜醋拌炒，或烏梅湯浸炒，或入佐四君子湯，用之不致閉胃妨食，而獲奇効也。

○集方：治久痢不止（普濟方），用罌粟殼二兩，去膜，醋浸，火烘三次，

爲末。每服二錢。烏梅湯調下。虛甚可加參朮。熱甚可加芩連。○治水瀉不止（[illegible]方）用罌粟殼一枚。去膜。大棗十枚。烏梅五個。水二盞。煎七分服。○治久嗽不止（[illegible]方）用罌粟殼一兩。去膜。火烘。蜜拌三次。水二盞。煎七分服。

○治小水不通因熱結者。用罌粟殼二錢。滑石、豬苓、澤瀉、黃柏、瞿麥、扁蓄各一錢。車前子、川牛膝、甘草、黃連各一錢。○治小水不通因氣血兩虛而結者。用罌粟殼、人參、茯苓、麥門冬、當歸、熟地黃、黃耆、白朮、甘草各一錢五分。車前子三錢。○治小水不通而渴者。是熱在上焦氣分。用罌粟殼、茯苓、升麻、澤瀉、燈心各一錢。黃芩二錢。○治小水不通而不渴者。是熱在下焦血分。用罌粟殼一錢。黃柏、知母、當歸、生地、車前、牛膝、丹皮各三錢。甘草五分。○咳喘不利而小水不通者。是痰氣阻塞也。用罌粟殼一錢。半夏、陳皮、茯苓、枳殼、桔梗、杏仁、白芥子、蘇子、旋覆花各一錢五分。○治大瀉而小水不通者。後去多而前來自少也。用罌粟殼、赤石脂各二錢。枯礬一錢。豬苓、澤瀉、白朮、茯苓各一錢六分。肉桂八分。或問罌粟殼止澀之藥。何以復通小便。膀胱之收攝則氣降化而能小便。氣散而逆。則小便逆脹不通。取罌粟殼之斂澀。小便自行矣。

穀部　菽豆類

大豆　味甘。氣平。無毒。（李氏曰。大豆有黑、白、黃、褐、青、斑數色。黑者可入藥用。及充食作豉。黃者可作腐、榨油、造醬。餘但可作腐及炒食而已。皆以夏至前下種。苗高三四尺。葉團有尖。秋開小白花成叢。稍見日則黃瘦而根枯焦矣。結莢長寸餘。經霜乃枯。）

○黃黑大豆解百毒。下熱氣之藥也。繆氏曰。善解五金、八石、百草、諸毒。及蟲毒、蠱毒、諸毒。宜水浸生搗作膏。白湯調服一合。又去風、利水、散熱。故風痹、癱瘓方中用之。黃疸、水腫方中用之。煩渴熱結方中用之。又煮熟食之。則利腸。炒熟食之。則閉氣。水浸生搗食之。解毒之肉上。散癰腫。又黃豆煮汁飲。能潤脾燥。故消積痢。黑豆煮汁飲。能潤腎燥。故止盜汗。但性利而質堅滑。故多食令人腹脹而利下矣。故孫真人曰。加少食醒脾。多食又損脾也。（於老人小兒宜少食之。）

○集方治中風口喎及癱瘓不仁。或頭風頭痛。諸證。又治產後百病。或煩熱痰瘀。身熱嘔逆。或背強口噤。或身頭背風。或呵欠。面靦頭旋。眼眩。手足頑痹。此皆虛熱中風也。以豆淋酒治之。其法用黃黑大豆各二升。炒焦有微烟出。乘熱入瓶中。以好酒六升沃之。半日許。傾出。頓熱隨量徐徐飲之。覆被令少汗出。又不可多出汗。以身潤津津即愈。○治新久水腫。身面虛浮。[illegible]小水不利。用黑豆五升。微炒熟。又清水五升。煮取二升。去豆再加生白酒

一升，煎取二升，日三服，水當從小便中出。○治乳石發熱（外臺秘要），用黑大豆三升，水九升，鐵鍋內煮至二升，取汁徐徐飲之。○治久病陰虛，夜熱消渴（普濟方），用黑大豆五升，微炒，天花粉、天門冬、麥門冬各四兩，水一斗二升，煮至三升，濾出渣，再如法煮，去渣淨，將二次汁總和，入砂鍋內，微火慢熬，用竹箸不住手攪，熬稠如餳，加煉白蜜八兩，攪勻，入磁器收之。每早、午、晚不拘時，白湯調服十餘茶匙。○治消渴飲水（肘後方），用黑豆入烏牛膽中，懸掛無雨濕處陰乾百日。每次吞五十粒，早晚米湯下。

續補集方，治腳氣（廣利方）衝心，煩悶不知人事，以黑大豆一升，水三升，濃煮汁服，未散再服。○治熱毒攻眼（普濟方），赤痛臉浮，

用黑豆二升，分作米袋，沸湯中蒸過，更互熨之，三五次則愈。○治妊娠（婦人良方）腰痛，用黑大豆二升，水三升，煮一升，頻頻飲之。○治跌墜折傷（千金方），有瘀血在腹，氣短，用黑大豆五升，水一斗，煮汁三升，頻頻服，劇者不過三作。○治打傷毒（廣利方）腫，用黃大豆水浸搗爛敷之。○治解巴豆毒（肘後方），下痢不止，用黑大豆或黃大豆一升，水三升，煮汁一升，飲之。擣黑大豆葉（廣利方）擣爛敷蛇咬，頻易取瘥。

大豆黃卷，味甘，氣平，無毒。

（陶氏曰：大豆黃卷，取黃黑大豆以井華水浸三日，取出籮內，不時以水灑之，俟生糵芽長四五寸，曬乾用。北人以油炒爲日用蔬菜。）

○大豆黃卷，活血（注生）氣，消水脹（李時珍）之藥也。繆氏曰：豆蘖之穀也，有容物之量也。體所堅脆，而性滑利，非米穀之柔紉堅滯之比。今水發爲芽，啓開通透發之機，所有陳故滯藏之氣，以此沛然發露，若瘀血，若水脹，毋容負固而強恃矣。故孕婦藥中多用之，有行瘀血之妙也；水脹方中多用之，有行水之功也。仰思前古治濕痺久着爲筋攣膝（神農本經）痛，皆血與水氣之所結也。其名曰卷，有卷舒發越之意。故局方牛黃清心丸用此以去風痰，解煩鬱，通心氣，安神明，昏亂亦藉此開通發越之意云。

○集方，治周痺（[illegible]）邪在血脈之中，上下周身，痺閉不通，及胃中留滯，五臟結聚，或屬風，或屬水，或屬血者，用大豆蘖一斤，炒香爲末，每服一錢，溫湯調下。○治水氣腫滿喘

急，小便澀難，用大豆黃卷醋炒、大黃酒炒各等分，爲細末，每服八分，葱薑、陳皮各三錢，泡湯服，以利爲度。○治老人痰火咳嗽（方屏汪宗）頻發，胸腸滿悶，百節攻痛，形羸氣弱，飲食少進，用大豆黃卷一斤，曬乾炒燥爲細末，每晚服一錢，黑棗泡湯調下。

赤小豆味甘苦酸氣平無毒。（蘇氏曰赤小豆江淮間多種之寇氏曰今關西河北汴洛多食之李氏曰此豆以緊小而赤黯有黑斑者入藥最良稍大而鮮紅及紫紅色者名赤大豆俱可供食用并不療疾俱于夏至後下種苗科高尺許枝葉似豇豆葉微圓峭而小至秋開花亦似豇豆花淡銀褐色而有腐氣莢長二三寸似綠豆莢而稍大皮色微白帶紅三青二黃時收之可食入藥用者必須赤而老也）

○赤小豆解毒消腫利水實脾（時珍）之藥也李氏（時珍）曰此豆小而色赤心之穀也其性下行通乎小腸故別錄稱爲行津液利小便消腫脹治下痢腸澼脚氣腫痛癰疽寒熱而唐本草又謂通乳汁下產難胞衣凡一切氣血壅逆不通作痛脹腫結有形之疾咸需用之如久服則降令太過津血滲泄所以陳藏器有驢食足輕人食身重之說也。

○許長如先生曰吹鼻瓜蒂散及辟瘟疫用之取其通氣除濕散熱耳又仲景方療傷寒瘀熱在裏身必發黃用赤小豆湯亦取此意也。

○集方治癰疽（小品方）初作用赤小豆搗末水調塗之即消散。○治痘後（同前）結毒用赤小豆搗末雞子清調塗其性甚粘乾即難揭入苧根末即不粘。○治痄腮（同前）熱腫用赤小豆芙蓉葉各等分爲末蜜水調塗。○治水氣（蘇氏方）腫脹用赤小豆五合大蒜頭二個生薑五錢商陸根一兩用水三升同煮豆熟去薑蒜商陸空心食豆旋旋啜汁令盡腫自消也。○治水氣從足起入腹則殺人以赤小豆五升水一斗煮極爛取汁四升溫漬足膝以豆日食代飯勿雜食他物自愈。○治水蠱（肘後方）腹大動搖有聲皮膚黑者用赤小豆三升白茅根二兩水煮食豆以消爲度已上四方俱忌鹽味百日。○治小水（修真方）不通并熱淋血淋不拘男婦用赤小豆三合微炒研爲末每用二錢以葱湯調服。○治水穀痢疾用赤小豆二合微炒爲末用黃蠟一兩溶化和丸每空心服二錢白湯過。○治脚氣（蘇氏方）腫痛甚急以赤小豆一升煮湯飲豆渣炒微熱布包熨腿上。○治丹毒（小品方）如火用赤小豆微炒爲末雞子清調塗。○治乳汁（方脉正宗）不通用赤小豆煮汁飲之。○治婦人（產寶方）產難日久氣乏用赤小豆一升以水五升煮汁二升入黃明膠一兩同煎徐徐服服完即產。○治胞衣（救急方）不下用赤小豆男胎七枚女胎二七枚東流水吞服之。

續補集方治中酒（食物本草）嘔逆用赤小豆一升煮汁徐徐飲之。○治腸痔（肘後方）有血用赤小豆二升米醋五升煮熟日乾再浸再晒以醋盡乃止研爲末每服二錢白湯下日二。○治重舌哦口用赤小豆爲末醋和塗之。○治瘟疫（方脉正宗）時氣人人傳染用赤小豆黑大豆各一兩微炒黃爲極細末每服一錢葱頭三個生薑三片煎湯調服

綠豆味甘氣寒無毒可升可降陽中陰也入厥陰陽明經（李氏曰綠豆處處有之三月下種苗高尺許葉小而有毛至秋開小花莢如赤豆莢粒粗而色鮮者為官綠皮薄而粉多粒小而色淡者為油綠皮厚而粉少早種者呼為摘綠可頻摘也遲種者呼為拔綠一拔而已北人用之甚廣可作豆粥豆飯豆酒磨而為麪澄濾作粉可以作餌蒸糕盪皮搓索為食中當用之物以水浸濕生白芽又為菜中佳品真濟世之良穀也）

○綠豆清暑熱靜煩熱潤燥熱解毒熱之藥也潘氏曰綠豆色綠青黃之間色也所以李時珍稱為通厥陰陽明經為肝脾之用藥也開寶方主一切熱毒熱氣燥熱及金石丹火藥毒酒毒煤毒烟毒為病煩熱燥熱口渴脹悶便閉及腹痛頭疼水瀉血痢諸證用此壓熱解毒功必倍之但氣味甘寒能治虛熱故孟詵方言補益元氣和調藏府安養精神去十二經血脉中風燥此專為天行暑熱金石丹火諸毒熱者設也若夫老人元虛氣弱脾胃不實飲食減少大宜溫養者此藥雖良終非所宜多食久食必有泥滯胃腸致生滿脹之患

○集方治暑熱霍亂用綠豆五合煮湯頓冷調六一散三錢服○治用力人勞擾煩熱用綠豆五合人參三錢煮湯一升徐徐飲之○治風燥血熱大便結燥小水赤澀用綠豆一升懷熟地四兩麥門冬五兩水五升煮汁徐徐代茶飲之○治金石丹火藥毒并酒毒煤毒烟毒為病用綠豆一升生搗末豆腐漿二碗調服一時無豆腐漿用糯米泔頻灌亦可○解砒石毒用綠豆五合生搗末取冬青葉一握搗汁調服

○豆芽菜味甘氣寒無毒李氏曰解毒清暑通利三焦潤達二便但受濕熱鬱浥之氣而生故善發瘡動氣與綠豆之性稍有不同而古人未之知也

○豆葉味苦氣寒無毒治疔毒斑疹金石丹火諸毒及霍亂吐下並絞汁和溫湯飲之

（治風癬乾疥用綠豆葉搗爛和米醋少許用舊帛擦之○治痘瘡方用綠豆赤豆黑豆甘草各一兩共微炒為細末用竹筒削去青皮兩頭留節一頭鑿一孔以豆藥末入筒中用杉木塞緊黃蠟封固外以小繩繫之投入臘月糞廁中滿一月取出洗淨風乾每藥一兩配臘月梅花瓣三錢和勻入紙封套內略烘乾兒大者用一錢小者用五分以霜後絲瓜藤上小藤絲煎湯調空心服一月服一次永無痘患廣筆記）

零烏豆（又名馬料豆）味甘苦鹹氣寒無毒（陳氏曰零烏豆即黑豆之形扁者非黑大豆之黑而圓又非穭豆之黑而細也）

○零烏豆解內熱消渴止陰虛盜汗之藥也楊氏曰諸豆皆為腎穀而零烏豆更能補腎緣氣寒甘故煮熟喂養驢馬而善行少疾蓋驢馬性熱而零烏豆氣寒故也人多食又能滑腸動泄脾胃虛乏者忌之盜汗屬陰虛非內熱者用之亦無益也

穭豆味甘氣溫無毒（李氏曰穭豆是野生今收子種之小科細粒霜後乃熟如黑大豆黑而微小此豆黑而細又非馬料豆黑而扁也）

○穭豆活血暖血之藥也陳氏曰此豆主婦人經行血痢產後血虛血寒血脹血痛血滯血淋炒焦浸酒飲之

藊豆味甘。氣溫。無毒。可升可降。可飲可散。入手足太陰氣分。

（李氏曰。藊豆二月下種。延纏籬垣間。葉大如盃。團而有尖。花具紫白二色。狀如小蛾。有翅尾形。莢生花下。凡十餘樣。或長或圓。或如龍爪虎爪。或如猪耳刀鐮。種種不同。皆纍纍成枝。白露後實更繁衍。秋熟。便不多生。故又名京衍豆。俗訛為羊眼豆。亦形相似也。嫩時連莢蒸食。甚美。可充蔬菜茶料。老則收子煮食。子有黑白赤斑四色。一種莢殼厚硬不堪食者。惟豆子麤圓而色白者方可入藥用。）

○白藊豆。從脾清暑。和中益氣之藥也。李氏（時珍）曰。此藥通利三焦。和調五臟。能化清降濁。奠安中宮之病。故蘇氏方止霍亂吐利。消瘴解毒。夏月香薷飲用之。六和湯亦用之。不惟消瘴解毒清暑。而尤能利水實脾。如病水火互攻。變亂揮霍。倉卒暴發之疾。取藊豆生搗。調溫湯飲之。（出[illegible]方）

立定。（方龍潭）此屬脾之穀。得天地沖和之正氣故也。

○集方。治老人脾胃不和。將作溏泄。用白藊豆、白朮、山藥、芡實、茯苓各四兩。砂仁三兩。俱炒燥。研細末。每早服六錢。以糖一撮。滾水調服。○治（[illegible]）霍亂吐利。氣力軟怯。或身熱煩渴。陰陽不分。寒熱交作。或傷食傷酒。或成瘧痢。以六和湯。用白藊豆、厚朴、木瓜、茯苓、藿香各一錢。香薷二錢。砂仁、半夏、杏仁、人參、甘草各五分。加生薑三片。紅棗一枚。水二碗。煎七分。不拘時服。○治傷暑吐瀉。（方脈正宗）身熱煩渴者。用白藊豆六錢。香薷一兩。厚朴四錢。陳皮五錢。木瓜、甘草各八錢。水五大碗。煎二碗。頓冷服。

○陳月坡云。夏月傷暑吐瀉。身熱煩渴。一二三日不愈。吐利愈劇。乃變陰證。四肢厥冷。人多不識。往往錯悞。明智之士。就於香薷飲中。加人參、白朮、附子、乾薑各五錢。併煎。亦可救。似暑非暑之惻。屬陰寒證者。

黃大豆、白大豆、豌豆、蠶豆、豇豆、刀豆、毛青豆。俱詳載食物本草。

○治水腫。不拘大人小子。用藊豆三升。炒黃。磨成粉。每早午晚各食前。（[illegible]）大人用三錢。小兒用一錢。燈心湯調服。

○治傷暑霍亂吐瀉。取藊豆葉搗汁一碗。涼飲立愈。

穀部（造釀類）

淡豆豉味苦酸，氣寒，無毒。可升可降。

李氏曰：外臺秘要造豉法：諸大豆皆可造豉，以黑大豆者入藥良。有鹹豉、淡豉兩種，入藥只宜淡豉。其法：六月內用黑大豆二三斗，水淘淨，浸一宿，瀝乾，蒸熟，取出攤席上，候微溫，即以蒿蓋之，每三日一看，候黃衣上遍，即取曬乾，篩簸極淨，再以水拌，乾濕得所，以汁出指間爲準，即至甕中，築極實，乾桑葉覆蓋厚三寸許，泥封甕口，勿令泄氣。大烈日連甕曬七日，取出曬一時，又以水拌入甕，仍築實，如此曬凡七次，取出曬，上蒸過，攤去氣，仍入甕收之，封築，日久則豉成矣。

○淡豆豉：治天行時疾，疫（宋性給）癘瘟瘴之藥也。王氏（好古）曰：此藥受水濕暑蒸之鬱，積腐泡，醞釀又氣，蒸日曝，周復七轉，轉沉重爲輕浮，發腐臭爲爽，則去陳濁爲新清，開幽閉爲明暢，乃宣鬱之上劑也。凡病一切有形無形，壅脹滿悶

停結不化，不能發越致疾者，無不宜之。故統治陰陽互結，寒熱迭侵，暑濕交感，食飲不運，以致傷寒寒熱頭痛，或汗吐下後，虛煩不得眠，甚則反覆顛倒，心中懊憹，一切時灾瘟瘧，癰痢斑疹，伏痰惡氣，及雜病科，痰飲寒熱頭痛，嘔逆胸結，腹脹逆氣，喘吸蠱毒，腳氣黃疸黃汗，一切沉滯濁氣搏聚胸胃者，咸能治之。（盧氏）但非關氣化寒熱時瘴，而轉屬形藏實熱，而成痞滿燥實堅者，此當卻而謝之也。觀仲景梔子豉湯，則知邪乘表盡將裏之胸，而未成陷入之實，其證曰：虛煩，心中懊憹，反復顛倒不得眠，身熱不去者，主之，則得之矣。

○盧不遠先生曰：豉者，水藏之主穀也。用蒸署微晒之法，使之變水作火，故可從治寒熱溫暑諸疾，原從寒水作始者，莫不驅除。

○集方：治傷寒（肘後方）一二日，初覺發熱頭痛，脈洪緊無汗者，用淡豆豉五合，葱白二十莖，葛根一兩，麻黄五錢，水三碗，煎一碗，服，覆被取汗愈。○治傷寒（傷寒論）汗吐下後，虛煩不得眠，若劇者必反覆顛倒，心中懊憹，用梔子豉湯主之。用淡豆豉四合，大梔子十四枚，以水四碗，先煮梔子二碗半，入豉同煮，取藥汁碗半，去滓，分作二服，溫進一服得吐，止後服。如氣少者，本方加甘草五錢；如嘔逆者，本方加生薑一兩。○治大頭（正宗）瘟，頭痛發熱，胸脹氣急者，用淡豆豉八錢，連翹一兩，薑五片，葱白五莖，水五大碗，

煎三碗半，徐徐服。○治寒熱瘧痢，如瘧於山林溪谷中，四五六月，有病此者，用淡豆豉三錢，檳榔二錢，草豆蔻一錢五分，柴胡、大腹皮各一錢，生薑五片，水二碗，煎一碗服。○治時（肘後方）瘧腹脹寒熱，遍身疼，用淡豆豉五合，檳榔五錢，水二碗，煎一碗，得吐即愈。○治血痢（千氏濟方）久不止，并治臟毒下血，用淡豆豉二兩，大蒜肉一兩五錢，火煨熟，共搗成膏，丸梧子大，每早服百丸，白湯下。○治斑疹傷寒，（方脉正宗）用淡豆豉五合，赤小豆三合，生薑十片，水數碗，煎汁頻飲。○治烏痧惡氣，刺血後仍腹痛未止，（方脉正宗）用淡豆豉五合，蕎麥三合，水三碗，煎汁待冷，頻飲。○治痰飲頭痛寒熱嘔逆，如傷寒相似，用淡豆豉三合，製半夏五錢，茯苓三

錢。生薑十片。水煎服。○治中酒成病（千金方）。用淡豆豉五合。葱白十莖。水二升。煎一升服。○治寒食氣三邪腳結腹脹（肘後）。用淡豆豉五錢。厚朴、枳實、麩水拌炒。各四錢。木香一錢五分。川黃連一錢。水三碗。煎碗半。徐徐服。○治逆氣喘（外臺方）吸。因寒邪食積者。用淡豆豉一兩。杏仁去皮。研八錢。貝紫蘇葉五錢。生薑五片。水二碗。煎一碗服。○治諸般蠱（楊氏方）毒。用淡豆豉五合。膽礬一錢。研末。水三碗。煎二碗。溫飲。隨吐即愈。○治腳氣冷疼、腫脹（肘後方）。用淡豆豉五合。煮汁頻飲。以渣敷足上。○治黃疸（方脈正宗）黃汗。用淡豆豉五合。茵陳葉二兩。生薑皮、豬苓各五錢。水五碗。煎二碗。徐徐服。

續補集方○治小兒偶（全幼心鑑）觸惡氣寒熱昏悶。用淡豆豉搗成膏。團雞子大。以摩顖上。及手足心。六七遍。又摩心胸臍腹六七遍。放地上。即瘥。○治小兒胎毒（聖惠方）。用淡豆豉五錢。濃煎汁一鍾。以小茶匙徐徐與之。十日一製。周歲爲期。○治痰積齁喘（方脈正宗）。用淡豆豉一兩。搗如泥。入砒石末三分。枯白礬末二錢。丸綠豆大。每用冷茶送下七丸。小兒三丸。服時忌食熱湯飲食等物半日。○治妊娠胎動（子母秘錄）。用淡豆豉五錢。當歸身二錢。白朮二錢。水煎服。○治陰莖（藥性論）生瘡。用淡豆豉搗爛如泥。和蚯蚓糞各等分。水調塗。乾落即易。忌酒蒜椒芥。○治毆傷（千金方）有瘀血凝聚。腹中滿悶。用淡豆豉一升。水二升。煮十沸服。

○豆黃。味甘。氣溫。無毒。

李氏曰。造豆黃法。夏月用黑豆一斗。蒸熟。鋪竹席上。以蒿艾覆之。如盦醬法。待上黃衣刮取出。曬乾。搗末用。

○豆黃。補五藏。氣力之藥也。李氏曰。此以豆蒸熟黴照出黃。得腐熟生化之令。故食療本草主開胃氣。壯骨力。潤肌膚。益顏色。填精髓。補虛羸。服此使人能食肥健。搗末以豬脂和丸。每服二百粒。白湯送下。

○治喫食瘟牛、馬、羊、豬肉。生出疔毒者。用豆黃一兩。爲末。取柏油樹葉一觔。搗爛絞汁一二碗。和豆黃末在內。頓服。得大瀉毒氣。乃愈。如冬月無葉。挖取嫩根。研水服之。以利二三次爲度。○治胃脘痛屬火證者。用豆黃三錢。橘紅、黑山梔各二錢。甘草一錢。水煎服。○治胃脘痛屬寒證者。用豆黃三錢。乾薑、砂仁各二錢。甘草一錢。水煎服。○治胃脘痛屬氣滯者。豆黃三錢。香附、烏藥、陳皮、木香各二錢。甘草一錢。水煎服。○治胃脘痛屬血瘀者。豆黃三錢。乾漆、川芎、玄胡索、乳香各二錢。甘草一錢。共爲末。白湯調服三錢。○治胃脘痛屬氣血虛者。用豆黃三錢。人參、白朮、當歸、川芎各二錢。甘草一錢。黑棗十個。生薑三片。水煎服。

蒸餅（即俗名饅頭）味甘。氣平。無毒。

（李氏曰。造蒸餅以小麥麪水調。加以酵水和之。蒸熟成餅。其來最古。凡藥所須。且能治疾。而本草不載。亦缺典也。取蒸餅懸掛風乾百日。其麪已過性。臨用以水浸脹。搗爛入藥用。如裹葷素油鹽葱韭諸物作餅者。不堪入藥。）

○蒸餅。消食化滯。養脾胃。利三焦。通水道之藥也。（時今）（鹿江）鄭氏曰。小麥之氣。多濕熱而性頗沉滯。今作餅。已受酵氣蒸發。再加日受風日之氣。濕熱沉滯之體。已轉化輕虛鬆燥之物矣。故李氏方治宿食不消。腹脹滿悶。脾胃不和。為膈。為噎。為噦。為淋。凡屬脾胃二藏。虛羸壅閉成疾者。服此。虛者能補。寒者能溫。滯者能通。脹滿者能消散矣。

（本草發明）按李時珍述王愛竹談藪云。宋寧宗為郡王時。忽病淋閉不通。數日後愈甚。日夜凡三百起。國醫罔措。或舉民醫孫昌琳治之。琳用大蒜肉。淡豆豉。蒸餅三物各等分。搗爛。水和為丸。梧子大。以溫湯吞百丸。曰。今日進三服。病當減三之一。明日亦然。三日病除。已而果然。賜以千緡。或問其方。琳曰。小孩兒何緣有淋。只是水道不利故也。三物皆能通利故爾。若琳者。其可與語醫矣。又戴元禮以此三物如法作丸。治膈噎病。臌脹病。小便淋閉不通病。皆得獲效。見戴氏類方。予亦依法修合。試用屢效。特表而書之。

麴味甘。氣溫。無毒。

（李氏曰。麴有米麥豆三麴。皆為酒醴所須。敢齊云。若作酒醴。惟麴蘖是矣。造大小麥麴法。用大麥或小麥。用井水帶皮淘淨曬乾。六月六日磨為末。水和成塊。用楮葉包扎。懸當風處。七十日可用矣。造麵麴法。三伏時用綠豆五升。以辣蓼草汁煮爛。又取辣蓼葉為末五兩。杏仁為末十兩。小麥麵五斤。和踏成餅。用楮葉包懸當風處。五十日生黃衣成矣。造白麴法。用小麥麵五斤。糯米粉一斗。和勻水拌濕。踏餅。用楮葉包懸當風處。五十日成矣。造米麴法。用糯米粉一斗。取辣蓼草搗汁和作圓丸。楮葉包懸當風處。七十日成矣。已上諸麴。俱要好日色曬乾。再收藏當風無雨濕處藏之。聽用入酒入藥俱可。又他處造麴。有用諸味辛烈草藥拌入者。皆有毒。僅可造酒。不可入藥。姚氏曰。凡諸造麴。三伏中作者良。入藥必須陳久者方妙。）

○小麥麴。消穀食。止痢疾。利胸膈。化痰逆。調中開胃。止河魚腹疾之藥也。

○大麥麴。消穀食。止痢疾。利胸膈。化痰逆。調中開胃。下胎氣。脹滿之藥也。

○麪麴。米麴。俱消食積。酒積之藥也。二麴主治。俱健脾消積。利痰開胃。功用相同。稍有分別。亦不甚相遠。如有辣蓼草并有他辛烈有毒藥者。惟胎前諸病不宜用也。

○神麴。味甘辛。氣溫。無毒。

（李氏曰。按葉氏水雲錄云。凡五月五日。六月六日。或三伏日。用白麪百斤。青蒿汁。蒼耳汁。野蓼汁各三升。赤小豆末。杏仁泥各三升。用汁和麪豆杏末作餅。麻葉楮葉包罨。如造醬黃法。布帛罨發。候冷黃衣上。取出日曬。以陳久者良。）

○神麴。健脾消食之藥也。方氏曰。此藥將小麥麪為之。麥得木火之先機。佐以五色。五香。五味以和之。鬱之成麴。溫之性。實鼓中土之生陽。發未萌之宿滯。今被五穀之

第七七？冊　續修四庫全書　第

所傷者，用麴入前，能化糟粕，行大腸，鬱悒伸舒，氣消磨運者也。故元素方，治病脾胃虛乏，不能消化水穀，以致胸膈痞悶，腹脅膨脹，經年累月，嗜臥食減，口中無味，及老弱久瀉，虛人久瀉，產後食少作瀉，小兒疳積泄瀉等病，並宜用之。此消運之物，而又能開胃進食，有補益之妙也。

○集方：治脾虛不能磨食（廣脈正宗），用神麴四兩，白朮三兩，人參一兩，俱炒，枳實麩拌炒五錢，砂仁炒四錢，共爲末，飴糖爲丸，梧子大，每早晚各服三錢，白湯下。○治脾腎俱虛不（和劑方）能消化水穀，胸膈痞悶，腹脅膨脹，經年累月，嗜臥食減，口中無味，用神麴六兩，大麥蘖五兩，乾薑三兩，俱炒，用

大烏梅肉二十個，滾湯泡去核，搗爛爲丸，梧子大，每早晚各食前服三錢，砂仁湯下。○治暴泄不止，用神麴二兩，吳茱萸湯泡六錢，甘艸四錢，俱炒燥，研爲末，醋調麪糊爲丸，梧子大，每服三錢，烏梅五個泡湯下。

○治產後瘀血不運（婁氏方），肚腹脹悶，漸成癥脹，用陳久神麴一觔，搗碎微炒，磨爲末，每早晚各服三錢，食前砂仁湯調服。亦可治小兒食癥脹。

紅麴：味甘，氣溫，無毒。（李氏曰：紅麴本草不載，法出近世，亦奇術也。其法用白粳米一斗五升，水淘浸一宿，蒸作飯，分作十五處，入麴母五兩，搓揉令勻，併作一處，以帛密覆，熱即去帛攤開，覺溫，不可過冷，急堆起，又密覆。次日午又作三堆，過一時分作五堆，再一時又合作一堆，又過一時又分作十五堆，稍溫又合作一堆，如此數次。第二日用桶盛新汲水，以竹籮盛麴，作五六分蘸濕，完又合作一堆，如前法作一次。第四日如前法，用竹籮又蘸，若麴半浮半沉，再依前法作一次，又蘸，若俱浮則成矣。取出日乾收之。其米透心者謂之生黃，入酒及醋中鮮紅可愛；未透心者不甚佳。入藥以陳久者良。）

○紅麴：燥胃健脾，下水穀，活血氣之藥也。許氏（長如）曰：此藥受濕蒸熱鬱，顆發而成，能入血分，故吳瑞方以此釀酒，飲可破血行瘀，而治打撲傷損；又時珍方以此煎酒，飲療血氣刺痛，而治產後惡血不行。竊觀人受水穀，入於胃

中，得中焦濕熱之氣，薰蒸游溢，化爲赤汁，散布藏府經絡，是爲營血。紅麴以白米作飯，入麴揉勻，密覆，旋分旋合，旋合旋分，令其濕熱鬱蒸，變而爲赤，其色久亦不渝，與人身水穀醞釀，化赤爲血之理相合，乃得造化自然之微妙也。故前人用此化宿食積滯，和脾胃，逆營血之功，得同氣相求之理；消食健脾，與神麴相同，而活血散傷，惟紅麴爲最。故治血痢方，丹溪翁尤爲要藥。

○集方：治停食作吐（經驗方），手足心熱，腹脹胸悶，用紅麴炒五錢，白朮麩炒四錢，甘艸炙一錢，共爲末，大人服二錢，小兒服五分，生薑湯下。○治停食腹痛，用紅麴、香附各等分，炒研爲末，每服三錢，酒調下。此方亦可治婦人產後血

原缺

飴糖味甘。氣溫無毒。入足陽明、太陰經。氣分之藥。（李氏曰飴糖用粟黍穀麥同糯粳諸米煎熬而成柔濡如蜜形怡怡然也故名飴若熬老能牽扯如成白絲者名曰餳糖餳也白而堅硬成塊者作脯麻砂糖茶餅不入藥用）

○飴糖養胃溫中、益氣止泄之藥也。成無己曰、脾欲緩急食甘以緩之。飴糖之甘、以緩中也。如眩暈。如消渴。如消中。如怔忡煩亂。如忍饑五內顛倒、四體欲傾。如產婦失血過多、卒時煩暈。如勞人嘔血盈盆、上逆不止。如老人泄瀉頻仍、中氣陷下。如暴受驚怖、失神喪志。如讀書作文勞心、疼思神氣無主。已上諸證、皆係中焦營氣暴傷之故。急以飴糖之甘。滾水調和飲之、諸證立定、神氣清明、即以甘緩之之驗也。（此一段出易思蘭大乘鈔）如傷寒陽脈濇陰脈弦。法當腹中急痛。以小建中湯。用飴膠之甘溫。爰稼穡之土德、更協甘草大棗之甘平。桂枝薑芍之辛潤。佐土德以培陽、令溫裏氣以和營衛、建中緩急、而腹中急痛自止。如陽脈之濇、陰脈之弦。安有不轉緩滑之狀乎。所以仲景用此、亦取甘以緩之之意也。然此藥用米麥浸蒸煎煉、而成於濕熱、雖能補脾潤肺、而過用之、大發濕中之熱、生痰動火最甚。凡中滿吐逆。酒病牙疼、秘結目赤等疾、咸忌用之。小兒多食損齒生蟲。一切腎家受病。尤不可服。

○集方治傷寒裏氣虛寒。腹中急痛（仲景小建中湯）、用飴糖三錢。桂枝、白（酒炒）芍藥各一錢、甘草七分、生薑五片、大棗五枚○治悞吞

稻芒骨鯁之類、隔拒喉間、用硬餳糖搓成彈丸、吞之即下。○治服藥過劑。悶亂者、用餳糖食數片、即安。

○治胎墜不安。用飴糖五錢。以砂仁泡湯化服。○治大人小兒頓咳不止。用白蘿蔔搗汁一碗。飴糖五錢。蒸化。乘熱緩緩呷之。○治大便乾結不通。用飴糖撚成指頭大。用香油塗拌綠礬末。塞穀道內。即通。

醬、味鹹、氣寒、無毒。

（李氏曰、麪醬有大麥、小麥之殊、豆醬有大豆、小豆、豌豆、赤豆之屬。南北風土、俗性不同、製造。今江浙閩淮皆用黃豆一斗、煑極爛、拌小麥麪十五包、用竹扁鋪勻、用布帛蓋好。三日發蒸、至七八日熱退。取出日下曬、柴、鋪。黃子十觔、入鹽七觔、井水四十觔、攪曬一月、成矣。取面上汁、濾出、名醬油。每油十觔、加飴糖十二兩、入鍋煎百餘沸、收入淨磁罈內。入廚中調諸膳食、甚鮮美。取醬亦入磁罈內封藏一月、取出入廚充用。）

○醬解百藥百蟲百獸諸毒。又祛時行暑熱瘟疫瘴氣之藥也。（海藏）陶氏曰、用醬入藥、當以黃大豆、小麥麪合作者良。善解一切飲食諸毒、故聖人不得其醬不食、亦取其去飲食百味中之毒、可知矣。

○集方、（方脈正宗）治百藥百蟲百獸毒損人者、以豆醬水洗去汁。取豆瓣搗爛、一盞、白湯調服、再取豆瓣搗爛、傅傷損處。○

治天行暑熱瘴癘疫氣。大熱不解。以豆醬瓣、水淘洗去鹹味、取一盞搗爛、白湯調服。○治妊娠大便下血、（千金方）用豆醬瓣洗去鹹味、取一盞、煎湯飲。○治手損掣痛、以豆醬汁、一碗去豆瓣、和蜜半鍾、溫熱浸手指、即愈。

○治人卒中烟火毒、用黃豆醬一塊、調溫湯一碗灌之、即甦。○治人遭火燒身爛垂死者、用臭醬一兩、取水白酒一二甕。將酒頓溫。不可過熱。調醬於中。令患者浸酒中。燒極重不死。天啟甲子秋八月、教場火藥發燒死藥匠數百人。內十餘人遍體赤爛未死者、襄城伯令行此方。浸活如數。

醋味酸辛，氣寒，無毒。（李氏曰：造米醋，以三伏時用倉米一斗，淘淨，蒸飯攤冷，盦黃，曬乾，用水淋過，再以倉米二斗，蒸飯和勻，入甕內，以水淹過，密封暖處，三七日成矣。造糯米醋，用糯米一斗，淘淨蒸飯，用六月六日造成小麥麴和勻，用水二斗，入甕封釀，三七日成矣。造粟米醋，用陳粟米一斗，淘淨浸七日，再蒸熟，入甕密封，日夕用竹篦攪之，七日成矣。造小麥醋，用小麥水浸三日，蒸熟盦黃，入甕水淹，七七日成矣。造大麥醋，用大麥米一斗，水浸蒸飯，盦黃曬乾，水淋過，再以麥米一斗，蒸飯和勻，入甕水淹，封三七日成矣。造餳醋，用餳一斤，水三升煎化，入白麴末二兩，瓶封曬成。已上諸醋俱可入藥，其餘他方有糟糠諸菓作醋，雖堪供食，必不可入藥。）

○醋，解熱毒，消癰腫，化一切魚腥、水菜諸積之藥也。林氏（介）（仲）曰：酸主收，醋得酸味之正也，直入厥陰肝經，散邪斂正。故藏器方治產後血脹、血暈，及一切中惡邪氣卒時昏冒者，以大炭火入熨斗內，以釅米醋沃之，酸氣遍室中，

血行氣通，痰下，而神自清矣。凡諸藥宜入肝者，須以醋拌炒製，應病如神。又仲景金匱要略治黃汗，有黃耆、白芍、桂枝、苦酒湯。譚氏治風痰，有石膽散子，俱用米醋入劑，專取其斂正氣、散一切惡水血痰之效用也。

○集方：治毒熱煩渴不寧，用真烏犀角，磨數分，醋湯調服。

○治癰疽初起，（同前）用生附子，以米醋磨稠汁，圍四畔，一日上十餘次，次日即消。○治癰疽已成不潰，用米醋調麻雀屎如小豆大，敷瘡上，即穿也。○治過食魚腥、生冷、水菜果實成積者，（林氏家抄）以生薑搗爛，和米醋調食之，即化。○治疝氣沖痛，用青皮、小茴香各五錢，以米醋一碗，煮乾，加水二碗，煎八分，溫和服。○治黃汗，身腫發熱，汗出而渴，狀如風水，汗沾衣，色正黃如蘗汁，用黃耆五兩，白芍藥、桂枝各三兩，米醋一升，水七升，共煎取三升，徐徐溫和作三日服。○治白虎風毒，用陳米醋三升，煎熱，切葱頭一觔，入煎數沸，濾出葱渣，以舊布蘸醋乘熱熨之。○治霍亂，（同前）足上筋抽痛，用米醋煎熱，以舊布蘸醋乘熱熨之。○治一切（同前）毒蛇惡蟲物咬傷，以米醋調胡粉敷之。○治魘死（千金方）不省，用米醋少許，以口噙，用細竹管吹入鼻中，即甦。○治胎死不下，（子母秘錄）用黃豆一升，以米醋煮食，即落。○治胞衣不下，腹脹痛，多致殺人，以米醋一碗，和熱湯一碗，噀產婦面上，胞衣立下。

續補方：治鎖喉風，脹悶不通，垂死者，用土牛膝搗汁半碗，加入真米醋半碗，用鵝毛翎尖挑少許入喉中，隨吐涎痰，連挑十餘次，吐痰碗許，即通。

酒味苦甘辛。氣大熱。有毒。通入周身臟府經絡諸處。（說文云酒就也所以就人之善惡也戰國策云帝女儀狄造酒進之於禹說文又云少康造酒然素問亦有酒漿則酒自黃帝始非儀狄矣古方造酒品類極多醇醨不一惟糯米造者入藥乃良又必爲陳久者醇緩無毒爲佳觀陶氏云大寒凝海惟酒不冰明其性熱獨冠群物藥製多用之以藉其勢人飲多則體疲神昏言蹶志亂是其有毒故也食貨志云酒者天之美祿頤養天下享祀所祈扶衰養疾非酒不可故月令仲冬命大酋秫稻必齊麴糵必時湛熾必潔水泉必香陶器必良火齊必得兼用六物大酋監之無有差忒又白孔六帖云凡造酒以糯米爲上樽稷米爲中樽粟米爲下樽本草云葡萄瓜椹枸杞菊苄芭林檎橘柑李楊梅桃杏葱薑椒辛羔鹿脯虎脛熊蛇凡生物果穀草木之易釀者皆可造酒入藥惟秫酒之清者稱爲上品夫祭祀必有酒素養必有酒燕享必有酒是不容一日廢也然其酒有戒酒酒有征沉酒有誓爽酒有誥先王無不致儆于酒也寇氏曰造酒入藥佐使專以糯米蒸飯清水和白麪麴所造爲正古人造酒不加藥味所以氣力醇和今人造酒以藥肆中剩餘雜藥末搗細和麴爲酒藥其藥性酷烈所以飲者多有頭痛口乾之弊。）

○酒能升發陽氣。通行血脈。驅風雪之寒威。禦暑濕之瘴氣。遍行一身之表。至極高之分之藥也。李氏（時珍）曰。夫酒爲神仙美祿。少飲則和血行氣。壯神禦寒。消愁遣興。痛飲則傷神耗血。損胃亡精。生痰動火。有損有益之物也。邵堯夫詩云。美酒飲教微醉後。此得飲酒之妙。所謂醉中趣也。若沉湎無度。醉以爲常者。輕則致疾失體。重則敗行喪家。而殞傷身命。其害可勝言哉。此大禹所以疏儀狄。周公所以著酒誥。爲世範戒也。扁鵲謂過飲則腐腸爛胃。潰髓蒸筋。傷神損壽。王海藏謂古人以小麥麪造麴。以爲發熱有毒。今之醞者又加大熱大毒之藥。增其氣味。豈不傷沖和。耗精神。涸營衛。竭天癸。而夭人壽耶。

朱丹溪謂本草止言性熱有毒。不言其能發濕中之熱。醉後振寒戰慄。可見矣。又性喜升。氣必隨之。痰鬱於上。溺澁於下。恣飲寒凉。其熱內鬱。肺與大腸二經。其始病淺。爲嘔吐。爲自汗。爲瘡疥。爲鼻皶。爲泄利。及心脾痛等病。尚可散而去之。其久病深。爲消渴。爲內疽。爲肺痿。爲臌脹。爲失明。爲哮喘。爲勞瘵。爲癲癇。爲痔漏。爲諸難以名狀之病矣。汪穎謂人戒晨飲而不知戒夜飲。醉後就枕。熱擁傷心。夜氣收斂。酒以發之。擾亂其清明。激薄其營衛。因而致病者多矣。又酒後食芥蒜及諸辣物。緩人筋骨。昏人頭目。醉臥當風成癜風。醉浴冷水成痛痺。好飲之人。多酒而得病者。用藥宜寒。酒生濕熱故也。不

飲之人。强飲而傷脾者。用藥宜溫。溫則酒氣行也。

○燒酒味甘辣。氣大熱。有毒。（李氏曰燒酒非古法也自元時始造之用濃酒和糟入甑蒸上用鍋底受氣下用器具承接取氣露凡敗壞之酒皆可蒸燒近時以糯米或粳米或黍或秫或大麥蒸熟和麴釀甕中七日以甑蒸取其清如水味極濃烈蓋酒露也汪穎曰暹羅酒以燒酒復燒三次入珍寶異香其壇以檀香十數斤燒烟熏令如漆然後入酒蠟封埋土中二三年絕去燒氣取出用之曾有人携至舶閩有積病者飲一二杯即愈且能殺蟲予親見二人飲此酒打下活蟲長二寸許謂之無鱗蠱云如過飲致作悶不醒以濃茶或菉豆湯灌之即解）

○燒酒消冷氣。化積聚。開鬱結。通噎膈。止久瘧。療陰毒腹痛欲死。逐瘟辟瘴。洗赤目腫痛之藥也。

本草彙言卷之十四終

本草彙言卷之十五

錢塘　倪朱謨純宇甫選集
張世臣相如甫校正
男倪洙龍沖之氏藏稿

果部　菓類

杏仁，味甘苦，氣溫，性利，有小毒。氣薄味厚，濁而沉墜，降也，陰也。入手太陰經。

（李氏曰：諸杏葉皆圓而端有尖。二三月開淡紅色花，妖饒艷麗，比桃花尤可愛也。故騷人詠物，與梅並言，則曰梅杏，蓋取其葉之似也；與桃並言，則曰桃杏，蓋取其花之近也。有葉多者、黃花者、千瓣者、單瓣者。結實甘而沙，曰沙杏；黃而酢，曰梅杏；青而黃，曰柰杏；金杏大如梨，黃如橘。西京雜記載蓬萊杏花五色。又按王禎農書云：北方有肉杏，赤大而扁，日金剛拳。有日木杏，熟時色青白。入藥宜山杏，收取仁用。修治，以沸湯浸，去皮尖用。○凡杏、桃、梅諸花皆五出，若六出必雙仁，有毒，不可食。）

○杏仁，溫肺順氣，潤燥化痰之藥也。（日華子）張氏曰（[illegible]）：杏為心果，仁為肺之用藥也。氣溫而潤，散寒結壅閉成疾。蓋肺主氣，若肺氣不利而欬逆喘急，肺受風寒而咳嗽有痰，肺氣鬱逆而大腸燥結，是皆氣滯於肺之證也。用此有理氣順肺、開結潤燥之功焉。然其苦而溫，又善能解肌，開達腠理，故仲景麻黃湯用之，亦取其通皮毛、有發散之効也。繆氏（仲淳）曰：此藥性溫，散肺經風寒滯氣殊効，第陰虛咳嗽，肺家有虛熱、熱痰者忌之。

○前賢東垣老人曰：杏仁下喘治氣，桃仁療狂治血。杏仁、桃仁俱治大腸燥結，如晝則便難，氣病也，宜杏仁、陳皮；夜則便難，血病也，宜桃仁、陳皮。肺與大腸為表裏，賁門主往來，魄門主收閉，俱為氣之通道，故並用陳皮佐之耳。又左慈杏金丹，用杏仁，水浸去皮，晒乾，每日五更細嚼七粒，能潤藏府，去塵滓，驅風明目，治肝腎風燥。夫杏仁性熱降氣，亦非久服之藥，此特咀嚼得法，吞納津液以消積穢耳。

○集方：治肺氣不利（方脉正宗），或受風寒，或有痰滯，鬱逆不通，以致咳嗽喘急。用杏仁湯泡去皮一兩，桑皮一兩，陳皮五錢，甘草二錢五分，分作五劑，每劑加生薑二片，煎服。○治冬月傷寒，太陽經分，頭痛發熱，身疼腰痛，骨節疼痛，惡風無汗而喘者，宜麻黃湯：用杏仁三十粒，去皮，麻黃一兩，去節，桂枝八錢，甘草三錢，以水三升，先煮麻黃減半，

去浮沫，納諸藥，煮取半升，溫和服，覆臥取汗。○治久痢（方脉正宗），大腸燥結不利，用杏仁八兩，桃仁六兩，俱用湯泡去皮，蔞仁十兩，去殼淨，三味總搗如泥；川貝母八兩，陳膽星四兩，經三製者，同貝母研極細，拌入杏、桃、蔞三仁內，神麯四兩，研末，打糊為丸，梧子大，每早服三錢，淡薑湯下。

○續補集方：治風虛頭痛如破，用杏仁八兩，去皮研末，水一斗，研濾汁，煎如腐狀，取和粥食，食完數日後，大汗出，諸風漸減，永不再發。慎風冷、豬、雞、魚、麵及一切發氣食物。○治目上生翳，或努肉，或癢或痛，漸覆瞳人，用杏仁二錢，去皮，真鉛粉五分，研勻，用水調稠，不時點之。

巴旦杏仁，詳載食物本草。

桃仁味苦、微甘、氣溫。無毒。氣薄味厚、沉而降、陰中之陽、入手足厥陰經血分（李氏曰、桃品甚多、華艷稱最、不培而蕃、且早結實、世遂以凡品目之。然有黃色者、絳色者、碧綠者、龍鱗者、餅子者、牡丹者、亦凡中之異卉矣。若漢上林苑之緗核桃、紫紋桃、金城桃、霜桃、山巨核桃、凌霜花灼後暑實貲、是又仙凡迥別、不可得也。又桃譜云、其花有紅紫黃白千葉單葉之殊、其實有紅桃、碧桃、緗桃、白桃、烏桃、金桃、銀桃、胭脂桃、皆以色名者也。有綿桃、御桃、方桃、■桃、偏核桃、皆以形名者也。有五月早桃、十月冬桃、秋桃、霜桃、皆以時名者也。又汴中有油桃、小於衆桃、光如塗油。太原有金桃、色深黃。洛中有崑崙桃、肉紅紫色。又有餅子桃、狀如香餅子。其味皆甘、並可供食。惟山中毛桃、即爾雅所謂褫桃者、小而多毛、其仁充滿多脂、可入藥用。修治以滚湯泡去皮、晒乾用。）

○桃仁、行血活血（華子）之藥也（數）。李氏曰、桃性早花、易植而子繁。長於發生、善行善逐、其仁多油、而直行血分。故前古主

瘀血血閉、血結血聚、積滯不行。或產婦惡露留難、心腹脹痛、或跌撲傷損、心腹瘀滯、或傷寒太陽隨經瘀熱在裏、血蓄成狂、或風暑不調。飲食停結、寒熱為瘧、或婦人經行未盡、偶感寒熱邪氣、熱入血室、譫語見鬼、皆從足厥陰肝經受病、肝為藏血之藏。此藥苦能泄滯血、辛能散結血、甘溫能通行一身血絡。凡一切血敗血阻為病、專主之也。又桃為金木之精、故又能鎮辟不祥、祛除邪魅惡氣。繆氏（仲淳）曰、此劑性善破血。凡血結、血秘、血瘀、血燥、留血、畜血、血痛、血瘕等證、用此立通、剪散而不收、利而無補。如過用之、及用之不得其當、能使血行不止、損傷真陰、為害非細。故凡經閉不通、由於血枯、而不由於血滯者。產後腹痛、由於血虛而不由於留血結塊者。大便不通、由於津液不足、而不由於血燥血閉結者。並忌用之。

○盧子由先生曰、世但知主留者行。不知主行者留。非留行安能好色有子。非行留安能去瘀逐閉。然則色之不好。子之無有。亦即瘀閉之為咎乎。○又云、欲盡物性。先察物情。如杏為心果。心主脉。杏有脉絡。專精於脉矣。桃為肺果。肺主毛。桃有膚毛。專精於毛矣。顧精之所專。即情之所鍾。情之所鍾。即性之所生。人若不知性耳。

○沈孔庭先生曰、杏為心果、而又主肺氣之欬逆。是心藥而而主肺用也。桃為肺果、而又主血脉之瘀閉。是氣藥而

主血用也。宋人龐安常嘗以二藥相兼用、有理也。

○集方治（方脈正宗）產後惡露留難。心腹脹痛、或嘔逆發熱者。用桃仁二錢、搗如泥。當歸、乾薑、川芎、玄胡索、醋炒。各一錢五分。麻黃、細辛各一錢。水煎服。○治（楊氏保命集）跌撲傷損、心腹瘀滯。用桃仁二錢。搗如泥。當歸尾、紅花、蘇木、大黃各一錢五分。白附子一錢。水煎服。○治（仲景方）傷寒太陽隨經瘀熱在裏。血畜成狂。以抵當湯、用桃核仁、去皮三十個。水蛭炒、虻、去翅足炒。各二十個。大黃一兩、酒洗。水二升。煮取一升。去渣溫服、○治（仲景方）太陽外邪已解。熱結膀胱、其人如狂。血自下。下者愈。以桃仁承氣湯、用桃核仁十四個、搗如泥。桂枝、芒硝各五錢。甘草三錢。大黃六錢。水二升。煮取

一升。去渣熱服。得利下。止後服。○治風暑不調。飲食停結。寒熱如瘧。日久不愈。內有畜血。以桃朮湯。用桃仁、三錢。搗如泥。柴胡、半夏、檳榔、鱉甲、乾薑各二錢。白朮、四錢。水煎服。○治婦人（產寶方）經行未盡。或經將行。而偶感寒熱邪氣。熱入血室。譫語見鬼。以柴胡湯。用桃仁、五錢。搗如泥。柴胡、三錢。半夏、黃芩、各二錢。牡丹皮、紅花、當歸、各一錢八分。水煎服。

續補集方。治偏（外臺秘要）風不遂。及癖疾。因瘀血者。用桃核仁、千七百枚。去皮尖及雙仁。以好酒一斗五升。浸二十一日。取出晒乾。杵細。神麴打糊作丸。梧子大。每服五十丸。以原酒吞下。○治瘧疾寒熱。用桃核仁、百枚。湯泡去皮。研

如泥。入黃丹、三錢。米糊和丸。如龍眼核大。每服一丸。白湯送下。○治無（[illegible]方）病人骨蒸夜熱。用桃核仁、三十枚。去皮及雙仁。杵爲膏。平旦白湯調頓服之。間日一服。半月愈。○治尸（肘後方）疰鬼疰。乃五尸之一。其病變動。有數十種。大畧使人寒熱淋瀝。沉沉默默。不知所苦。累年積月。漸至於死。死後復傳他人。急以桃核仁、五十枚。連皮研如泥。煮水一升。取五合。服之取吐。如吐不盡。三四日後再服。○治傳（[illegible]）尸鬼疰。痃癖咳嗽。血氣不通。日漸消瘦。用桃核仁、一百粒。連皮研如泥。煮水二升。取一升。去渣。入白米三合。煮粥飲之。○治人多魘寐。用桃核仁、二十一個。去皮研如泥。以白湯調服。○治卒然心胃痛。用桃核仁七個。去皮研爛。白湯調服。○治風蟲（衛生家寶）牙痛。用桃核仁、鍼刺。燈上燒烟出。吹滅。乘熱安痛牙齒上。咬定。不過五六次愈。

○桃毛。味辛。氣平。無毒。入手足厥陰經。（此係毛桃實上毛也）

桃毛、破婦人血閉。血（產寶）瘕積聚。寒（別錄）熱之藥也。

○桃梟。味苦。氣平。有小毒。入手足厥陰經。（此係桃實在樹乾枯經久不落）

桃梟、破婦人血閉。血（產寶）瘕。心腹血（日華）痛之藥也。

○桃葉。味苦。氣平。無毒。

桃葉、破婦人血閉。血（家寶）瘕。定小兒客忤。寒熱驚邪。鬼氣（日華）去風殺（別錄）蟲之藥也。

○桃膠。味苦。氣平。無毒。（此係桃樹茂盛時以刀割開樹皮久則膠溢出收採以熱湯洗過用）

桃膠、破婦人血閉。血（產寶）瘕。產後下痢赤（[illegible]）白。療男子石淋（[illegible]）

澁之藥也。

○桃花。味苦。氣平。無毒。入手少陰、足厥陰經。

桃花、破婦人血閉。血（產寶）瘕。血風癲狂之藥也。李時珍曰。按蘇氏云。一婦因喪夫悲哀後。遂發狂奔走。閉之室中。夜破窗櫺。登桃樹上。食桃花幾盡。及旦遂愈。此亦屬驚怒傷肝。痰夾瘀血。遂致發狂。偶得桃花利痰飲。散滯血之力。與張仲景治熱瀉以致畜血發狂。用桃仁承氣湯之意相同。

大棗味甘氣溫無毒氣味俱厚可升可降陽也入手少陰太陰經（陶氏曰世傳河東猗氏縣大棗特異今青州出者形大而核細多膏甚甜鬱州互市者亦佳少不及耳江東臨沂金城棗形大而虛但少脂蘇氏曰今近北州郡皆出棗惟青州者特佳木心赤枝間有刺四月生小葉尖澤五月開花色青白作蘭香氣七八月果熟南北皆有不及青州肉厚多脂種類甚多如御棗水菱棗味雖美不堪入藥後齊民要術云凡棗全赤時日撼而收曝則紅皺若半赤收者肉未充滿乾即色黃味亦不佳也食經作乾棗法須用淨地鋪菰箔之類承棗日曝夜露擇去胖爛曝乾收之切而曝乾者爲棗脯煮熟榨出者爲棗膏蒸熟者爲膠棗加以糖蜜拌蒸味更甜搗棗膠曬乾者爲棗油其法取紅軟乾棗入釜以水僅淹平煮百餘沸漉出砂盆研細淨布絞取汁塗磁盤上曬乾其形如油以匙刮爲末收之每以一匙調滚湯一鍾酸甜味如美漿用和麥麪餻粉蒸食止饑渴益脾胃也盧諶祭法云春祀用棗油即此）

○大棗補中益氣壯心神助脾胃養肝血保肺氣調營衛

生津液之藥也沈氏曰此藥得天地沖和之氣甘潤膏凝善補陰陽氣血津液脈絡筋俞骨髓一切虛損無不宜之如龍潭方治驚悸怔忡健忘恍惚志意昏迷精神不守或中氣不和飲食無味四體懶重肌肉羸瘦此屬心脾二藏元神虧損之證必用大棗治之如仲景治奔豚有奔豚湯水飲脇痛有十棗湯傷寒衛受風邪自汗惡風有桂枝湯俱用大棗爲君益土氣而制水和營衛而去風邪也配合生薑主發脾胃升達之氣佐用陳皮調暢中脘虛滯之痰雖能補脾益氣然而味過於甘如中滿者齒痛者痰火者胃疼氣閉者小兒熱疳腹大者蠱結腹痛及一切諸蟲爲病者咸忌之

○王紹隆先生曰味甘氣溫而性平中不足者以溫之之形不足者以甘輔之後天生氣藉此盈溢於內外矣

○集方治心神虛怯（方脈正宗）用大棗三十枚帶核槌碎遠志酸棗仁茯神白朮人參各二錢水四碗煎二碗服○治脾胃虛弱用大棗二十枚帶核槌碎生薑十片人參白朮茯苓陳皮半夏各一錢五分甘草六分水三碗煎一碗服○治肝虛血少用大棗三十枚帶核槌碎當歸白芍藥懷熟地各二錢川芎一錢枸杞子五錢麥門冬三錢石斛一錢五分鱉甲三片湯泡淨水四碗煎二碗溫和服○治肺氣虛耗用大棗二十枚帶核槌碎人參黃耆麥門冬各二錢北五味子五分○治驚悸怔忡健忘恍惚

志意昏迷精神不寧用大棗十枚帶核槌碎人參茯苓白朮當歸身遠志肉黃耆酸棗仁炒各二錢五分木香甘草各五分龍眼肉七個去殼核水煎服一方加製半夏一錢二分○治中氣不和食飲無味四體懶重肌肉羸瘦用大棗二十枚帶核槌碎白朮三錢土拌炒當歸茯苓半夏各二錢陳皮麥芽穀芽人參白芍藥各一錢五分厚朴陳皮各八分水煎服○治小腹奔豚氣上衝（金匱要略）胸腹痛往來寒熱用大棗十二枚帶核槌碎甘草當歸川芎葛根黃芩白芍藥炙柴胡各二錢半夏生薑各五錢甘李根白皮一合共十一味以水二升煮取五合溫和服渣再煎○治傷寒（仲景方）表解裏未和心下痞鞕而滿

脇下痛，乾嘔短氣，用大棗十二枚，帶核搥碎，芫花（炒）、甘遂、大戟三味各二錢，俱搗細，以水一升二合，先煑大棗取八合，取出棗，入三味末子，煑百餘沸。强實人全服，羸弱人半服。得快下後，以稀米湯飲之。○治太陽病頭痛發熱，汗出惡風，鼻鳴乾嘔者，宜桂枝湯。用大棗十二枚，帶核搥碎，桂枝、白芍藥各一兩，甘草二錢五分，生薑一兩。右五味，以水三升，微火煑至一升，徐徐服。（仲景方）○門人羅一經曰：方書用大棗入藥者衆，今特舉歸脾、調中、奔豚、桂枝四湯者，引前人立方用大棗，明其培土制水、去風木之意。（經）讀本草神農經云：大棗安中，和百藥，則藥藥皆可入用，又不獨歸脾等四湯已也。

續補集方：治小腸氣痛，用大棗一枚，去核，以斑毛一個納入棗內，濕紙包煨熟，去斑毛，以棗食之，以肉桂、蓽澄茄各二錢煎湯下。（直指方）○治妊娠腹痛，用大紅棗十四枚，燒焦爲細末，白湯調下。（千金方）○治風沿爛眼，用大黑棗二十個，去核，明礬末五分，和棗肉搗成膏，濕紙包，火內煨二刻，取出去紙，水二碗，將棗膏煎湯，去渣，將湯洗眼。（眼科方）○治卒急心胃痛，用大棗二個，烏梅一個，俱去核，杏仁七粒，去皮，共搗如泥，白湯調服。（摘方）

梨味甘酸，氣寒，無毒。陰也，沉也，降也。（李氏曰：梨樹高二三丈，尖葉光膩，有細齒。二月開白花如雪，六出。上巳日無風則結實必佳，故古語云：上巳有風梨有蠹，中秋無月蚌無胎。梨核每顆有十餘子，種之惟一二子生梨，餘皆生杜，亦一異也。杜即棠梨也。梨品甚多，必須棠梨、桑樹接過，則結子佳。梨有青、黃、紅三色，有雪梨、鵝梨、消梨三種爲上品，可以治病。第一雪梨出蘇州并嘉興。其他青皮、早穀、半斤、沙糜諸梨，皆麤澀不堪，止可蒸煑及切烘爲脯。一種醋梨，極酸，須水煑熟則甜美可食。昔人言梨皆以常山真定、山陽鉅野、梁國睢陽、齊國臨淄、鉅鹿、弘農、京兆、鄴都、洛陽諸處，然好梨多產北土，南方惟宜城者爲勝。凡存梨，北人於樹上包裹，過冬乃摘，尤妙。司馬遷史記云：淮北滎南河濟之閒，千株梨，其家與千戶侯等也。又真定御梨大如拳，甘如蜜，脆如菱，食之可以解煩釋悁。又三秦記云：漢武帝上苑含消梨，大如五升器，墜地則破，須以囊承取之。此又梨之奇品也。入藥惟以雪梨、鵝梨、消梨可用，餘色梨則亦不能治病也。）

○雪梨，潤肺涼心，消痰降火之藥也。（時珍）開寶方治積熱中風不語，解傷寒痰熱，枯燥煩喘不寧，雜證熱結，二便不利，搗汁飲之立驗。如中酒病及丹石煙火、煤火，併一切熱藥作患者，啖之立解。此果中之甘露子，藥中之聖醍醐也。李氏曰：別錄著梨，止言其害，不言其功，蓋古人論病多主風寒，用藥皆是桂附，故爾。（[illegible]）今人痰病火病十居六七，梨能潤肺涼心，消痰降火，大有解熱毒之功，滋益於人，豈淺小哉。陶隱居棄之，竟不入藥，此賢哲之一失也。朱氏曰（東[illegible]）：梨者，利也，其性下行流利也。如產婦、金瘡、痢疾人，切不可食，食之多致危殆。如胃寒腸滑不實者，肺冷寒痰作嗽者，腹中有久病冷積氣塊者，小兒痘後患吐瀉者，法咸忌之。

○集方：治心肺（普濟方）鬱熱消渴飲水。用雪梨五十枚搗汁，慢火熬成膏，以煉白蜜減半收之，貯瓶中，不時以熱湯調服十餘茶匙。○治內熱（方脈正宗）卒中不語。以雪梨汁半盞，和薑汁半盞調灌。○治火鬱（食性本草）咳嗽。用雪梨生喫一二個即止。又不可多食。○治反胃（聖濟總錄）吐食，藥物不下。用大雪梨，以囫圇丁香七粒刺入梨內，濕紙包四五重，火內煨熟，去丁香，只食梨。○治小兒（方脈正宗）內熱痰壅喉間，吐不出，或因驚熱生痰，或因風熱生痰。取雪梨汁時時與之，或加牛黃數釐更妙。○治食梨過傷。以梨葉煎汁飲即解。

玄霜雪梨膏：治咯血、吐血、咳血、嗽血，及勞心動火，勞嗽吐痰，久不愈者。此膏生津止渴，化痰止嗽，清血潤燥。用甜雪梨六十個，去心，味酸者勿用，白蘿蔔五斤，百合、茅根、嫩藕、鮮生地黃各二觔，鮮枇杷葉二百片，刷去毛，白菓肉一百個，共八味，俱入石臼內搗爛，取汁重濾去渣，將清汁入鍋內，慢火煎煉，將稠，十減去七，再入砂鍋慢火熬，十減去九，入煉過白蜜十二兩，飴糖四兩，再慢熬如稀糊，則成膏矣。每日不拘，挑數茶匙，米湯調服。

木瓜：味酸，氣溫，無毒。氣薄味厚，降多於升，陽中陰也。入足太陰、陽明，兼入足厥陰經。

（蘇氏曰：木瓜處處有之。寇氏曰：西洛者，其味甘酸而美，最有功効。宜城者亦佳，味稍淡耳。陶氏曰：今山陰蘭亭尤多。李氏曰：此果可種可接，可就亦可枝壓，木類之易生者。陳氏曰：其枝狀如柰，花作房生子，形似栝樓，火乾甚香。其材極堅。廣志云：枝一尺有百餘節。葉厚而光，春末開花，深紅色，入夏綴實，如小瓜而有鼻，乃花脫處，非蒂也。色黃赤，皮薄如著脂粉，味甘而酸不澀。實中之子，向裏頭鋭而面方者，木瓜也。形圓而小，味不酸澀者，木桃也。大於木桃，似木瓜而無鼻，蒂麤，味苦澀者，木李也。曰木梨，卽榠樝及和圓子也。一種顆小微長，味極[illegible]曰蔓子。一種實中之子如大麻，味絕苦澀者，名木[illegible]食之令人目赤筋痛，不可不辨。蘇氏曰：宣城人種[illegible]謹，始成實時，剪鏃紙花粘貼其上，霜後摘取，花紋[illegible]以充土貢，因有花木瓜之稱焉。修治：以鐵刀削去[illegible]并子，切片曬乾用。李氏曰：按大明會典，宣城歲貢[illegible]蟲蛀木瓜入御藥局，或取陳久無木氣耳。○一[illegible]燒灰散池中，可以毒魚。）

○木瓜，柔筋脈（別錄），健腰膝，斂腎氣，止滑泄之藥也。寇氏曰：木瓜味雖酸濇，得木氣之正，故酸能平木，而有柔養筋脈、健腰膝也。又酸能斂氣，而有收攝津液、除消渴而止滑泄也。所以滑（伯仁）氏方治霍亂轉筋，及濕痹腳氣，此木鬱而筋為病也；腰腎虛弱，臁怯無力，此精衰而筋脈失所養也。觀乎濟陰湯用之以斂腎，苑沾散用之以逐痹，香薷飲用之以解暑而止渴止瀉，禎蘇散用之以治腳氣攻沖而散壅結、治步履也。此藥平木養金，和土濟水，故薛氏方治夏月氣虛內熱，喘喝氣短，嘔吐作瀉，筋骨攣痛等證，以木瓜、白朮各一兩，人參三錢，煎湯代茶飲之。

○繆仲醇先生曰：木瓜味酸氣溫，得春生之氣，稟曲直之

化爲脾、胃、肝、三經之體用藥也。通行互歛。有並行不悖之功。故主諸痺腳氣濕傷於下者。取効甚捷。（已上方俱出方脈正宗）

○集方治血氣兩虛。筋脉不榮轉動以致腰膝堅强作痛。用木瓜五兩。當歸、白朮各三兩。川芎二兩。紅花一兩。甘草五錢。大棗三十個帶核搥碎。分作十劑。水煎服。○治腎氣虛散。不時溏泄。用木瓜十兩。杜仲八兩。茯苓五兩。補骨脂三兩。吳茱萸二兩湯泡過。北五味子一兩。分作十劑。水煎服。○治腎氣虛乏。精元不固。用木瓜五兩。大懷熟地六兩酒煮。北五味子一兩二錢。酸棗仁二兩炒。菟絲子二兩四錢。白芍藥醋炒。杜仲鹽水炒各三兩。黄柏酒炒。一兩。分作十劑水煎服。名濟陰湯。○治風寒濕

三氣合而爲痺。筋骨疼痛。四肢不擧。用木瓜三兩。羌活防風、漢防巳、酸棗仁、川芎各十二兩。附子童便製過一兩。天麻、牛膝、茯苓、白朮、薏仁各二兩。共爲細末。每服三錢早晚白湯調服。名羌活散子。○治感冒時行暑熱。口乾作瀉。四肢無力。用木瓜三兩。藊豆、陳皮、厚朴、各一兩五錢。甘艸一兩。香薷四兩。加生薑、黑棗各一兩。水三十大碗煎減半。取出井中頓冷服。名香薷飲。○治腳氣攻沖頭痛發熱。嘔逆。遍身筋骨作痛。用木瓜十兩。檳榔四兩。真紫蘇葉三兩。牛膝二兩。木通一兩。小茴香八錢。分作四劑水煎服。名檳蘇散。○治暑月寒熱不調。霍亂轉筋。吐瀉。用木瓜五錢。砂仁一錢。杏仁、半夏、茯苓、白藊豆、厚朴、藿香各一錢五分。香薷四錢。甘草五分。生薑二片。水煎冷服。名六和湯。治傷暑霍亂之兼有寒食者。○又方用木瓜六錢。香薷五錢。甘草四錢。黄芩三錢。黄連二錢。滑石一錢五分。白水煎冷服。名香薷芩連湯。治傷暑霍亂之有中熱者。

（已下四方俱出王三陽傳心集）續補集方。治陰寒吐瀉轉筋。用木瓜一兩。白朮土炒五錢。乾薑四錢。人參三錢。附子童便製二錢。肉桂一錢。水煎冷服。○治絞腸痧瘴。腹痛轉筋。用木瓜五錢。蕎麥二兩。滑石四錢。生明礬一錢。葱頭十根。水煎冷服。以鐵針刺足三里出血。或手十指甲邊刺血出愈。○治血虛轉筋。用木瓜一兩。當歸、威靈仙、牛膝、白芍藥、牡丹皮各四錢。川芎三錢。甘草一錢。水煎服。○治濕熱轉筋。用木瓜一

兩。薏苡仁、白朮、茯苓、五加皮、石斛、萆薢、黄柏、蒼朮各五錢。水煎服。○治小兒洞痢。（千金方）用木瓜一兩。煎汁飲之。○治髮稿不澤。（聖惠方）用木瓜浸油梳頭。○治翻花痔瘡。（同前）用木瓜爲細末。以鱔魚身上涎調塗之。以紙護住。

○倪朱謨曰。木瓜養筋藥也。腳氣病方中多用此。腳病多屬筋也。推而論之。如筋病若頭項。若臂腑。若腰膝。偏髀之病。屬筋者咸需之。又不專主腳氣也。故前古本草藥性。俱稱統治筋骨痰痺攣擧作痛。可知不專主在腳也。

山楂，味酸甘，微苦，氣溫，無毒。沉也，降也。入足陽明、太陰二經。（陳氏曰：山楂出南山高原，所在亦有。樹高數尺，古拙可愛。枝有叢刺，葉有五尖。三月開花，五出，碎小色白。綴實似林檎而小，有黃赤二種。霜後乃熟，核似牽牛子，色褐而堅。一種實大而赤，其酸可口，名曰棠毬，唯供食料。修治：曬乾用，或用水潤濕去核，焙燥用。）

○山楂，疏脾氣，消瘀血，化食積之藥也。方氏曰：此藥味酸甘而體質鬆利，氣溫平而性中宜達，故唐本草主化宿滯，一切食積為痞滿，為癥瘕，為下痢。加平胃散中，奏效甚捷。而廖氏方又能消瘀血結血，婦人產後一切聚血，如兒枕作塊，留結不行，或惡露已行，旋止未盡，腹脹痛者，煎汁和沙糖服，即時化結行瘀，立見安定。然性雖化堅逐滯，而味兼甘酸，又能健運胃氣，去陳生新，非若檳青枳朴苦利剝削，專一破氣消克，有倒脾胃生發之氣也。如蔡氏方用山楂去核取肉，大麥肉、白秋米各一觔，微炒，研為粉，每早用一兩，入白糖少許，滾湯調食，大能開胃健脾，化痰進食，通利二便，於老人小兒更有益焉。

○集方：治產後兒枕塊痛，及惡露不行。用山楂五錢，益母草三錢，當歸、澤蘭葉、三稜、川芎各一錢五分，炮薑、玄胡索、五靈脂、牛膝、陳皮各一錢，水煎服。○治男子、婦人、小兒一切諸滯腹痛。以山楂一味，煎湯飲。○治疝瘕偏墜作痛。用山楂、小茴香各一兩，為末。每早服三錢，白湯調服。

柿，味甘澀，氣寒，無毒。沉也，降也。入手太陰、陽明經。（藏氏曰：柿子南北皆有之。李氏曰：樹極高大，亦有小株者，接則易茂，本生者果稀，味濇，唯堪造漆。葉圓光澤，花小，黃白色。五月綴實，八月果熟，生時青綠，熟則丹紅。種類亦多，唯紅柿所在皆有，黃柿出汴洛，朱柿出華山。珍椑柿色青，可生啖。著蓋柿，蒂下別有一重，如覆擁之蓋。虛氏曰：更有鹿心、牛奶、雞卵、猴棗、蒸餅、鐵面、丁香、福孫、多寶、團花及白柿、烏柿、綠柿、朱柿、碧柿、火柿、水柿之別。其蒂有方有圓，有薄有厚，有覆有仰。其核有正有側，有間有脆，有長有短，有軟有堅，有本尖有末銳，有有稜有無稜，有有核有無核。核少者佳，無核者食之至美，而益人者也。初采頭濇，或灰，或米，或溫水養旬日，濇味去，甘滑可口矣。或置木瓜、酥梨、橘葉于中，更易熟而臭香。唯水浸可以久藏，謂之醂柿。乘半熟去皮，先熏後暴，或懸有風透候乾，納器中，久之遍體生霜，均名柿餅。更有柿片、柿心、柿綖，此造製隨人力而賦形，巧事類合璧云。柿來果也，大者如楪，八稜稍匾，其次如拳，如卵，如心。一種小而如折二錢者，謂之猴棗。其根甚固，謂之柿盤。世傳柿有七絕：一多壽，二多陰，三無鳥巢，四無蟲蠹，五霜葉可玩，六嘉實，七落葉肥滑，可以臨書也。）

○柿餅，潤心肺，養血藏之藥也。陳氏曰：此果味甘如蜜，質潤如酥，肉凝如膏，裂之有脂膜脈絡。味本酸澀而化甘，乃脾肺之用藥也。故孟氏方和胃健脾，治火炎土燥，血澀便難，產婦無乳，蒸熟和飯嚼哺兒，能充乳食，且善長養。又日華方潤肺補心，治吐血、咯血、嗽血、咳血，及小便淋血、腸風瀉血、痔熱流血等證。大能益氣涼血，化痰寧嗽，止渴生津。大人虛勞，宜煎膏食之。入兒科方，可代乳术。入虛勞方，可代天麥二門冬、生熟兩地黃也。但味甘性潤而多滯氣，如胃冷有寒痰者，脾冷腸滑泄者，肺寒多冷嗽者，俱忌用之。同蟹食，令人腹痛泄瀉。同酒食，令人易醉。

盧不遠先生曰、厚肉多絡、具經脈之形。味甘性滑、有養竅之利。晚熟稟秋金之化。又云蒂有主義、吸義、降義、轉輸義、順行義、故可對待逆上之氣、呼出不能自主、亦非專主于降。乃能專主于不逆也。

○集方（十問方）、治內熱血燥（普濟方）、大便皆艱。用柿餅不時煮食。○治吐血咯血、嗽血、咳血、及小便淋血、腸風瀉血、痔熱流血等證、用柿餅一觔（青州出者）、去蒂核、枇杷葉刷去毛、白菓肉去衣、懷熟地各四兩、生薑皮一兩、炒焦黑、百部五兩、天門冬、麥門冬、俱去心、各六兩。用水五十碗、熬至十碗、濾出渣、再如法煎、共三次、取汁共三十碗、總和一處、入砂鍋內、慢火熬至五碗、加煉蜜六兩收、貯淨磁瓶內。每早午

晚各服十餘茶匙、白湯調服。○治腸風瀉血（同上）、用柿餅一觔、切碎、生薑切片六兩、同炒焦黑、研爲末、飴糖爲丸梧子大。每早服五錢、米湯下。○治小兒秋痢（食療）、用柿餅和白粳米煮粥食。○解桐油毒（普濟方）、以柿餅食之。

○柿蒂、味苦澀、氣溫、無毒。入手太陰肺經。

盧子由先生曰、柿本澀而熟則甘、蒂則仍含本有之澀。而不遜澀者、酸收之甚耳。宜入太陰經如肺所生病、爲煩心胸滿、上氣欬逆、其不足則病啘噦諸氣、寒則爲丁香使、熱則爲黃連使、兩得其用矣。

沈則施先生曰、按丹溪翁謂人之陰氣、依胃爲養、土傷則木挾相火、直冲清道而作欬逆、宜竹茹黃連柿蒂湯主之。此言熱呃也。濟生論、謂陽竭于下、孤陰獨存、陰氣亦將旋脫、故逆上而作呃、宜丁附人參柿蒂湯主之。此言寒呃也。又按準繩論呃逆之證、有傷寒吐下後、久病產後、陰血大虧、陽氣暴逆、自下逆上而作呃者、非大溫中補中之劑、不能治。又有平人飲食痰氣抑遏而氣自臍下、衝脉直上咽膈而作呃忒蹇逆之聲、用平胃二陳湯加柿蒂、數枚、煎服、亦可止也。觀于柿蒂之苦澀、但可以散逆氣、而因寒、因熱、因虛、因滯者、則佐以丁、薑、茹、連、參、术、平胃、二陳輩、在司業者、當仔細斟酌、毋輕視也。

○柿霜、味甘、微澀、氣平、無毒。入手少陰、太陰經。（李氏曰、取乾柿生霜者。其法用大柿去皮、捻扁、日曬夜露至乾、內磁器中、待生白霜。入舌上、見津唾自化、無滓

者佳。）

柿霜、清上焦虛火之藥也。李氏方主心肺鬱熱、燥熱肺癰、肺痿、吐血、咳血、諸證。蓋寒平滋潤、于虛勞方、止嗽生津、化痰涼血。如病久畏藥味者、用此可作藥中果珍。每日蚤晚白湯調服數錢、甚妙。○治傷酒內熱、人多痰多嗽、多喘、及老人痰火爲患、用柿霜、黃芩、酒炒、天門冬、去心、酒煮、搗膏、橘紅、瓜蔞霜各一兩、海石煅、桔梗、真青黛各五錢、風化硝三錢。除天門冬搗膏外、餘藥俱爲細末、和入天門冬膏、煉蜜丸彈子大。食後噙化一丸、化痰定喘如神。

石榴皮、味酸濇。氣溫。性收歛無毒。

（嵇氏曰、博物志云、石榴木生西域。漢張騫出使外夷于安石國。得種以歸。今中國隨地可植。木不甚高。枝柯作叢。葉如細槐。折其條插土中便生。五月開花。色大紅。或有黃白色者。單瓣者結實。千瓣者不結實。實如瘤。皮色紫黑有斑點。經霜自折開。裏如蜂窠。有黃膜隔之。子形如人齒。色淡紅。如寶石有光。咬之有水。味甘酸。外有味酸若不甘者。係野山榴。石中生。取皮亦可充藥用。）

○石榴皮、澁腸止痢之藥也。李氏方能治久痢虛滑不禁。（朱震亨抄）并婦人血崩帶下諸疾。陳氏方、又安蚘蟲。蓋取酸澁收歛下脫之意。與訶子肉、罌粟殼、同義。

○集方、治赤白下痢。（肘後方）久不止。用石榴皮一兩。切碎。炒焦爲末。緩服一錢。人參湯下。此方兼治血崩并帶下疾。（同上）○治小兒蚘蟲。不時下。或十數百數。急以石榴皮一兩。煎湯

飲之。五日即止。○治脚肚生瘡作痒。（同上）初起如粟。搔之黃水浸淫痒痛潰爛。遂致繞脛而成痼疾。用酸石榴皮、煎湯。日日洗之。一月自愈。

○續補集方治痔瘡腫痛出水。以石榴皮一兩。黃栢五錢。煎湯洗過。以冰片一二釐。紝入痔瘡破爛處。立效。○治凍瘡久爛不愈。用石榴皮、冬瓜皮、甘蔗皮、三味燒灰存性。研末敷上即愈。

橘皮、味甘、辛、酸、苦。氣溫。無毒。味薄氣厚。降多升少。陽中陰也。入手足太陰、足陽明經。

（別錄曰、橘柚生江南。及山南山谷。蘇氏曰、今江浙荆襄湖嶺皆有之。木高一二丈。枝莖間多生刺。其葉兩頭尖。色深綠而背皆光。長寸許。四月開小白花。六七月成實。至冬黃熟。小者爲橘。大者爲柚。李氏曰、夫橘一也而外有柑柚橙枳四者。相類而種不同。橘實小。其瓣甘微酸。其皮薄而紅。味辛而苦。柑大于橘。其瓣味甘。其皮厚而黃。味辛甘而不苦。柚大如橘。其瓣味酸。其皮最厚而黃。味甘而不辛。橙大小皆如橘。其瓣味酸。其皮厚而有痕。味甘辛而不苦。若枳者、即橘種踰淮而北爲枳。其實大如橘。其瓣味酸苦。其皮厚。味酸辛而苦。加此分之。即不誤矣。虞氏曰、橘柚通呼。以本經命名爲正。猶有橙柑圓枳之異。樹有高下小大。有刺無刺。有刻無刻之別。實有圓扁長銳。大小光澀之殊。大都色象深綠。交冬不凋則一也。實皮布竅。色深于皮。皮裏有膜。囊上有絲。囊中毀瓤。瓤內裂汁。只發核也。種數雖多。但以皮肉氣味互爲分析。橘皮苦不可食。肉甘可食。橙皮味甘可食。肉酸不可食。柑皮與肉酸甘皆可食。圓枳、皮肉味苦。不可食。柚則形長。皮肉與橘同味。大段橘之美者。皆接生子

種者。不結實。縱結實、亦形長而味不美。今人指此爲柚子。悞也。柚子不用接生。亦取本有色味。不從人力爲也。廣中柚子極大可食。永嘉呼之爲苞。此又似圓名雖同。柚種則異矣。韓彥直有橘譜。列十有四種。以溫州者稱爲上品。今衢州航埠沿溪三十里。夾岸樹橘。花朝香雪。釀至果熟。金果綴碧。種有巨細。色有紅赭。約二十餘種。唯球橘最美。仁和棲水產蜜橘。凡數十品。名金錢小者。秀色可餐。又不如一種佛肚臍。形小皮薄。甘美如蜜也。霜降後采。取紅足味足者。藏至春。剖皮破囊吮汁。亦可振精醒神。爲得句破疑之助。若欲取皮。用充藥餌。不若廣中者。皮薄辛香。愈陳則愈辛也。○再按橘譜。浙西出湖廣州。粵南出閩廣撫州衢州。皆不如浙西溫州爲上品也。黃橘扁小而多香霧。朱橘圓小而綠膩紅甘可愛。霜後色赤如火。乳橘狀如乳。柑皮堅瓤多味絲甘芳。塌橘形大而扁。外綠心紅。瓣巨多液。經春乃甘美。包橘外薄內盈。其脉瓣隔。皮可數。綿橘微小。極軟香美可愛。而不多結。沙橘細小甘美。油橘皮似油飾中堅外黑。乃橘之下品也。早黃橘秋半已紅。凍橘八月開花冬結春采。穿心橘實大皮光而心虛可貫。綠荔枝橘出橫陽。膚理皺密如荔枝也。俗傳橘下埋鼠。則結實加倍。又相感志云、橘見屍而易繁。涅槃經言、橘見鼠其果實多。周禮言、踰淮而北變爲枳。地氣使然也。寇氏曰、橘皮

（乃六陳之一。醫家日用所需、今市家以乳柑皮亂之、不可不辨也。凡橘皮極苦、柑皮不甚苦、或以皮之緊皺分別、有方土不同、亦互有緊皺也。李氏曰、橘皮紋細色紅而薄、內多筋脈、其味苦辛。柑皮紋粗色黃而厚、內多白膜、其味辛甘。柚皮最厚而虛、紋更粗、色黃、內多膜無筋、其味甘多辛少。以此別之、即不差矣。又按橘皮性溫、柑柚皮性冷。今天下多以廣中橘皮爲勝、蓋因香辛而烈故也。江西者次之、台衢者又次之。若以柑皮柚皮爲陳、則又懸絕矣。）

○橘皮、理氣散寒、寬中行滯、健運腸胃、暢利藏府。（日華子）爲脾胃之聖藥也。顧朽匏曰（方龍潭抄）、此藥總屬理氣之珍。若霍亂嘔吐、氣之逆也。泄瀉下利、氣之寒也。關格中滿、氣之閉也。食積痰涎、氣之滯也。風寒暑濕、氣之搏也。七情六鬱、氣之結也。橘皮統能治之。其去白開痰、留白和脾。蓋味辛善散、故能開氣。味苦善泄、故能行痰。其氣溫平、善于通達、故能止嘔止欬、健胃和脾者也。東垣曰、夫人以脾胃爲主、而治病以調氣爲先。如欲調氣健脾者、橘皮之功居其首焉。然君白术則益脾、單則利脾、佐甘草則和氣、否則損氣。同竹茹、芩、連、治呃逆因熱也。同乾薑、桂、附、治呃逆因寒也。補中用之以益氣、二陳用之以除痰、乾葛用之以清胃解酲、平胃用之以消食去濕。同補劑則補、同瀉藥則瀉、同升藥則升、同降藥則降。脾乃元氣之母、肺乃攝氣之籥、故橘皮爲二經氣分之需、各隨所配而建功也。而（胡）于他（攸）證有不宜用者。如亡液之證不可用、因其辛以散之也。自汗之證不可用、因其辛不能斂也。元虛之人不可用、因其辛不能守也。吐血之證不可用、因其辛散微燥、恐有錯經妄行也。沈則施先生曰、橘皮下氣消痰、橘肉滑氣生痰、一物之性、表裏各異如此。又他藥貴新、惟橘皮貴陳。入和中理胃藥則留白、入下氣消痰藥則去白。

○集方、治胃寒氣滯、胸腹滿脹、飲食少進者。用陳皮、乾薑各二錢、半夏、茯苓各一錢五分、砂仁、厚朴、於白术各一錢、甘草五分、水煎服。○治霍亂嘔吐。用陳皮三錢、藿香二錢。因寒者、配乾薑、砂仁各一錢五分。因熱者、配黃連、黃芩、滑石各一錢五分、水煎服。○治泄瀉下痢。用陳皮三錢、藿香二錢。因虛者、加白术土炒三錢、茯苓二錢、甘草一錢。因實者、加枳實麩炒三錢、厚朴二錢、木香一錢、水煎服。⊙治關隔中滿病、有寒、熱、虛、實四端、治法與前二方加減同。有兼氣證者、加參、术。有兼血證者、加歸、芎。⊙治食積痰涎。用陳皮三錢、配枳實、厚朴、麥芽、穀芽、紅麴、半夏、膽星各一錢。此實證用也。配白术、人參、茯苓、當歸、厚朴、麥芽、穀芽各一錢、甘草五分。此虛證用也。○治風寒外感表證、頭痛發熱。用陳皮二錢、配紫蘇葉、乾葛、防風、杏仁、白芷各一錢、葱頭三箇、生薑三片、水煎服。冬月感寒無汗、諒加桂枝、麻黃數分。○治七情六鬱、中膈不和。用陳皮二錢、配半夏、膽星（痰）、黑山梔、黃芩（火）、香附、枳殼（氣）、山楂、紅麴（食）、當歸、川芎（血）、蒼术、厚朴（濕）各一錢、黑棗三箇、生薑三片。（脾）水煎服。各隨見證加入。（已上七方出范）

（寶顏打抛醫心集）

續補集方，治濕痰停滯胸膈，欬唾稠粘，用陳橘皮八兩，湯泡洗淨，食鹽五錢，水五碗，同煮乾，曬燥，甘草一兩，俱炒燥，研爲末，蒸餅打糊爲丸梧子大，每早晚各服二錢，白湯下。（丹溪方）〇治冷氣客于中脘，壅遏不通，是爲脹滿，用陳橘皮四兩，於白朮二兩，木香一兩，共爲末，酒糊丸梧子大，每食前吞二錢，白湯下，日三。（濟生方）〇治嘈雜吐水，用真陳廣橘皮，去白，二兩，爲末，每日五更取末藥五分，舐之，即睡，三日必効。（奇[illegible]方）〇治諸氣呃噎，用陳橘皮二兩，去白，水一升，煎五合，頓服，加枳殼一兩尤佳。（保十門方）〇治卒然失聲，用陳橘皮五錢，水煎徐啣。（肘後方）〇治胸中有熱，乘停食生痰者，用陳橘皮五錢，炒，水煎代茶飲。（食醫心鏡）〇治脚氣衝心，或心下結硬，腹中虛冷，用陳橘皮一觔，炒杏仁五兩，去皮，俱研爲末，煉蜜和丸如梧子大，每食前米湯下三錢。（食療）〇治風痰死血，手足十指麻木，用陳橘皮一觔，水十大碗，煮爛至二碗，濾出，再用水十碗，煮至一碗，總和，頓服，取吐痰，如不吐，痰加瓜蒂末一錢。〇治脾寒諸瘧，不拘老少孕婦，用陳橘皮三兩，生薑自然汁浸透，再用水二碗，煮乾，曬燥，研末，每服三錢，用黑棗湯調下。（袖珍方）〇治小兒疳瘦，用陳橘皮二兩，炒，川黃連三錢，酒炒，共研末，入麝香二分，研勻，粟米糊和爲丸如綠豆大，每服一錢，米湯下。此藥大能消食和脾氣。（趙氏方）

〇橘紅，味苦辛，氣溫，無毒，入手足太陽、太陰、陽明十二經。

（劉氏曰：橘紅即陳橘皮，刮去白膜，以廣中者更勝。）

橘紅，下氣化痰之藥也。李東垣曰：橘皮留白，調胃和中。（濟南[illegible]天[illegible]抄）橘紅去白，消痰降氣，較之橘皮性稍烈耳。

〇橘核，味苦，氣溫，無毒，入足厥陰肝經氣分。

（李氏曰：橘核修治，須以新瓦焙燥，揀去殼，研碎入藥用。）

橘核，疏肝散逆氣，下寒疝之藥也。此藥外白內青，體具金木，而內含春氣，發陳之用。（顧仲峯稿）味苦而腥，又得降下疏泄之力，故日華子主膀胱浮氣，陰疝腫疼，或囊子冷如冰，硬如石，下墜如數十觔之重，取橘核數兩作末，每早午晚各服一次，每次用藥末一錢，食前酒調下。蓋取象以核而治核之意也。又婦人瘕疝，小腹攻疼，腰胯重滯，氣逆淋帶等疾，以一兩，白水煎服，立定。蓋取苦溫入肝，而疏逆氣之功也。古方有橘核丸，治疝癩，多許見。（[illegible]）

〇橘葉，味苦辛，氣溫，無毒，可升可散，陰中陽也，入足厥陰肝經氣分。

（李氏曰：取橘葉以新嫩無破損完片者佳。）

橘葉，疏肝，散逆氣，定脇痛之藥也。（閻對）按丹溪老人言此藥其味苦澀，其氣辛香，其性溫散，凡病血結氣結，痰逆火逆，病爲脇痛，爲乳癰，爲脚氣，爲腫毒，爲胸膈逆氣等疾，或搗汁飲，或取渣敷貼，無不應手獲效。（沈志府抄）

〇青橘皮，味苦辛，氣溫，無毒，氣味俱厚，沉而降，陰也。入手

足厥陰手足少陽經。（李氏曰：青橘皮乃橘之未黃而外皮青色，肉飄堅實者，曬乾堅硬如石子，其氣芳烈。入藥以湯泡軟，剖開，去瓤，切片，醋拌炒用。今市家多以小柑、小橙、小柚堅實未黃者僞充，不可不辨。）

青橘皮，破滯氣，削堅積之藥也。凡病鬱怒氣逆而脇肋刺痛，或疝氣冲築而小腹牽弦，二者乃肝氣不和之病也。或溫瘧痞悶而寒熱不清，或下痢痛甚而小腹脹滿，或小兒食疳諸積而肚大肢瘦，三者乃脾氣不和之病也。此劑苦能泄，辛能散，芳香能辟邪消瘴，運行水穀，誠專功也。所以東垣云：破滯氣，愈久愈効；去堅積，愈深愈良。徑行直達，立行無阻，製炒以醋，所謂肝欲散，急食辛以散之，苦以降之，酸以泄之也。陳橘皮浮而升，入脾肺

氣分；青橘皮沉而降，入肝膽氣分。一體二性，物理之有不同如此。但有滯氣則破滯氣，有堅積則去堅積；否則大損正氣，善治者當斟酌行之。（已下五方出方脈正宗）

○集方：治肝氣不和，脇肋刺痛，其痛如擊如裂者，用青橘皮八兩，酒炒，白芥子、蘇子各四兩，龍膽草、當歸尾各三兩，共爲末，每早晚各服三錢，韭菜煎湯調下。○治疝氣冲築，小便牽強作痛，用青橘皮八兩，醋炒，胡盧巴二兩，當歸、川芎、小茴香各一兩，俱酒洗炒，研爲末，每早服三錢，白湯調下。○治溫瘧痞悶而寒熱不清，用青橘皮、檳榔、厚朴、草菓、柴胡各一錢五分，知母、半夏、白芍藥、茯苓各一錢，生薑二片，水煎服。○治痢疾痛甚，小腹脹滿用

青橘皮、柴胡、乾葛、當歸、白芍藥、木香、川黃連、枳殼各一錢二分，甘草七分，水煎服。○治小兒食疳諸積，腹大肢瘦，用青橘皮，於白朮、山楂肉、麥芽、穀芽各二兩，半夏、升麻各八錢，俱微炒，研爲末，每早服三錢，白湯調下。

○治心胃久痛不愈，得飲食米湯即痛極者，用青皮五錢，玄胡索三錢，俱醋拌炒，甘草一錢，大棗三個，水煎服。

治黃病有積，用青皮、蒼朮、厚朴、麥芽、穀芽、檳榔、茯苓各二兩，甘草六錢，俱炒燥，研細末，綠礬二兩，火煅紅，研細，共和勻，紅棗煮去皮核，搗爛爲丸梧桐子大，每服一錢，白湯送下，每蚤午晚各食前服一次。○治脚氣久腫不消，或脹墜疼痛，用青皮一二兩，紅棗肉二兩，同煮，每日空心食棗肉十餘枚，漸消。○治婦人無故經水不行，腹脹如臌，非病非孕，飲食如常，精神亦平者，此名氣分，用青皮四兩，白朮六兩，砂仁一兩，共爲末，飴糖爲丸梧桐子大，每早空心服五錢，酒送，服藥完即愈。○治老人停食腹脹，用青皮、生薑、紫蘇各二兩，煎湯，令病者乘熱臥湯中，以帛揉心胃肚腹，脹消食自化。

枇杷葉、味苦微辛、氣溫、無毒。氣薄味厚、陽中之陰。入手太陰、足陽明經。

（蘇氏曰、枇杷出襄漢、吳蜀、閩、浙、江西、湖南諸處。木高丈許。枝肥葉長、形如驢耳。背有黃毛、陰密婆娑可愛。四時不凋。盛冬開白花、至三四月成實。纍結連枝、形如彈丸。生時色青綠、味酸、熟時色黃白、味甘。皮上微有毛、皮肉甚薄、核大如茅栗、色黃黑。修治、四月采葉、刷去毛淨。治胃病、以薑汁塗炙。治肺病、以蜜水塗炙。）

○枇杷葉、安胃氣、潤心肺、養肝腎之藥也。沈孔庭曰、主嘔噦反胃而吐食不止（別錄）（安胃氣也）、或氣逆痰滯而咳嗽靡寧（別錄）（潤肺氣也）、或虛火煩灼而舌乾口燥（了養腎氣也）、或瘟疫暑暍而熱渴不解（清涼心氣也）、此果秋英冬花、春實夏熟、倍歷四氣、能使五藏咸調。六府清暢。他如聖惠方之治衄血不止、本事方之治酒齄赤鼻、諸證總不外潤養氣道、清解熱血之疾也。李時珍又言、此藥下氣之功特異。氣下則火降痰順而逆者不逆、嘔者不嘔、渴者不渴、欬者不欬矣。於勞嗽諸方、可稱專劑。但性禀清肅而涼、如胃寒嘔噦及肺感風寒而咳嗽者、兩皆忌用。

○集方、治雜病嘔噦、吐食不止（已下五方出方脈正宗）。用枇杷葉十片、刷去皮、薑汁塗炙、半夏、陳皮、茯苓各一錢五分、甘艸五分。水煎服。

○治時病卒發嘔噦、因熱者、用枇杷葉十片、刷去毛（製法如前）、黃芩、竹茹、半夏、陳皮各一錢五分、甘艸五分、水煎服。

○治肺氣抑逆、痰滯成咳、咳聲連發、努氣不轉、痰逆不出、俗名頓嗆。用枇杷葉十片、刷去毛（製法如前）、前胡、防風、薄荷、杏仁、桑皮、蔞仁、桔梗各一錢五分、甘艸、升麻各七分、水煎服。○治陰虛內熱、舌乾口燥、用枇杷葉十片、刷去毛、蜜水炙、懷熟地、知母、白芍藥、黃柏、花粉、玄參、白朮、沙參各二錢、水煎服。○治時行熱疫、煩渴躁亂、并中暑中暍、一切火證、用枇杷葉十片、刷去毛（製法如前）、川黃連、麥門冬、天花粉、玄參、黑山梔、黃芩、柴胡、乾葛、連翹、薄荷各二錢、甘艸七分、水煎服。○治衄血不止（聖惠方）、枇杷葉刷去毛、焙燥研末、每服一錢、苦茶調服。○治酒齄鼻赤（本事方）、用枇杷葉三十片、刷去毛、焙燥、山梔子仁二兩、炒黑、共研末、每晚服三錢、白湯調服。

○治痰飲（興寧記）五更咳嗽、喉中有物、咽之不下。用枇杷葉、火上炙去毛、白茯苓、川貝母、半夏麴、廣陳皮各三兩、天花粉、蘇子、泥山查肉、連翹、麥芽、麥門冬去心、薄荷葉各二兩、白豆仁八錢、硼砂七錢、研如飛麪、共爲極細末、以山藥粉糊爲丸、如麻子大、每早晚白湯吞服三四錢。

銀杏味甘微苦澁氣寒平有毒氣薄味厚性濇而收入手太陰太陽經（李氏曰銀杏生江南以宣城者爲勝樹高四五丈葉薄縱理儼如鴨掌形有刻缺面綠背淡二月開花成簇青白色二更開花隨即卸落人罕見之一枝結子百餘枚如楝子經霜乃熟爛去肉取核爲果其核兩頭尖三稜爲雄二稜爲雌其仁嫩時綠色久則色黃須雌雄同種其樹相望乃結實皆多陰陽相感之妙如此其樹耐久肌理白膩術家取刻符印云能召使也）

○銀杏潤肺消痰利小便解淋濁之藥也（日華子）倪九陽曰色白屬金肉柔而多汁液寒滑而潤故李氏方治肺熱燥咳喘悶無痰者或小便淋澁塞閉滯濁者或好飲過多昏醉如死者又生搗爛能浣油膩則其去痰利濁之功可類推矣其花夜開人不得見蓋陰毒之物故多食令人

氣壅臚脹昏頓又相感志言銀杏能醉人而延壽書言銀杏食滿千個者死凶歲有饑者以白果煮熟代飯食飽數日後皆死也

○集方（已下六方詳見方脉正宗）治肺熱燥欬喘悶無痰用銀杏五十個去殼并衣搗汁天麥二冬款冬花各三錢水煎臨服時和銀杏汁○治小便淋澁白帶白濁欲通不通者用銀杏五十個去殼并衣搗汁瞿麥木通滑石車前金沸草各五錢茯苓二錢水煎臨服時和銀杏汁○治酒醉昏悶不醒用銀杏肉百個搗汁和童便少許灌之立甦○治手足皴裂用銀杏肉搗爛夜夜罨之○治下部疳瘡用銀杏肉搗爛罨之○治狗咬成瘡用銀杏肉搗爛罨之

胡桃味甘氣熱性滯無毒（蘇氏曰胡桃其形如桃漢張騫出使西域得種還植之秦中漸及東土故名李氏曰胡桃樹高丈許春初生葉長四五寸微似大青葉兩兩相對頗作惡氣三月開花如栗花穗蒼黃色結實至秋如青桃狀熟時皮肉腐爛取核爲果人多以櫸柳接之出陝倉者皮薄肉多出陰平者大而皮脆急捉則碎汴州雖有而實不佳江表亦時有之）

○胡桃肉潤肺活血暖腎壯精之藥也（李時珍）邢公甫曰此藥質潤多油性味甘澀滯而多熱李氏方稱其補命門益三焦壯精髓潤肺消痰發痘攻瘡凡一切虛寒爲病內藏寒結者服之大有奇功如肺家有痰熱命門有相火一切陰虛吐衄火燥諸證俱服取咎匪淺今據繆氏（仲醇）云前人多言其有害不可食孫思邈云多食動痰飲令人惡

心吐水蘇頌云性熱不可多食馬志云多食動風脫人眉同酒食令人咯血汪穎曰多食生痰動腎火然而近世酒家往往以之佐酒則多食吐水咯血脫眉動火屢見其蒙禍也但性本熱惟虛寒者宜之故李氏有補命門益三焦壯精髓等句云

梅青子曰據御藥院方言胡桃益血補髓強筋壯骨故古方有治寒疝腳氣腰脊脇痛諸疾虛而血冷有寒涎者食之立見功效如佐補骨脂有溫養命門活血氣生精髓之妙久食能明目清心潤肌黑髮延年益壽然止宜少食漸食爲佳如多食頓食未嘗不取發燥動火生痰之咎也

○集方（簡便方）治血寒瘀滯不行、筋骨痠痛。以胡桃肉三十枚浸酒飲之。如不飲酒者、以胡桃肉、蚤晚各食二枚、白湯過下。七日愈。○治老人痰嗽不止（同前）、每臥時嚼胡桃肉二枚、呷白湯過下。七日愈。○治小兒痰喘（同前）、用胡桃肉一個、去殼不去皮、搗碎、煎湯、徐徐以匙挑入口內、半日即止。○治感寒發熱頭痛無汗（談氏方）、用胡桃肉三個、葱白五條、生薑五片、細茶貳錢、共搗爛、水二大鍾、煎八分、熱服、覆衣取汗。○治食物醋心（傳信方）、用胡桃肉三個、嚼爛、以生薑五片泡湯過下。立止。○治食酸齒齼（日華本草）、用胡桃肉三個、細嚼即解。○治血崩不止（趙氏經驗方）、用胡桃肉十五個、燈上燒存性、研作一處、空心白湯調服。○治急心痛（同前）、用胡桃肉一個、黑棗一

枚、去核、濕紙裹、火煨熟、細嚼、以生薑三片泡湯下。永久不發。○治便毒魚口毒（陽氏經驗方）、端午日、取樹上青胡桃陰乾、燒存性、爲末、每服三錢、白酒調下。少行一二次、未成膿即消、有膿自大便出也。三四服即平。

胡桃青皮、味苦澁、氣溫、無毒。（開寶）止水痢之藥也。陳氏化雨曰、此藥色青易黑、味澁性收。聖濟錄染鬚髮而止水痢。其義一耳。

○集方（聖濟總錄）染鬚髮即黑、用胡桃皮、蝌蚪、各等分、共擣如泥、加白糖十分之一。再擣勻、塗鬚、髮即黑如漆。○治水痢不（方脈正宗）止、用青胡桃皮一兩、擣碎、鐵鍋內微炒、再擣細。每早服三錢、白湯下。立止。

橡斗實　味苦、氣溫、無毒。

（李氏曰、橡實、櫟木子也。櫟有二種。一種不結實者、其名曰棫、其木心赤。詩云、瑟彼柞棫、是也。一種結實者、其名曰栩、其實爲橡。二者樹小則叢生、大則偃蹇。其葉如櫧葉、而文理皆斜向、四五月開花、黃色。結實如栗而圓、其蒂有斗、包其半截、其仁如老蓮肉。山人儉歲采肉浸去苦味、擣粉蒸食、可以充饑。豐年亦煮熟、可以肥豬。北人亦種植、其木高二三丈、堅實而重、有斑文點點、大者可以作棟柱、小者可以作薪炭。周禮職方氏、山林宜皁物、柞栗之屬、即此也。霜後收采。其嫩葉泡湯、可以充茶。）

○橡斗實、厚腸胃、止下（蘇恭）痢之藥也。邢元璧曰、此藥味濇而苦、能泄能收。大氏方、烹熟食、能禁久痢久瀉。歉歲又可代糧充饑。故孫思邈亦云、非果非穀、而最益人、服食也。

○集方治水穀下利（集要方）、日夜百餘行者、橡斗實炒二兩、楮葉炙一兩、共爲末、每服二錢、食前烏梅湯下。○治石癰堅（千金方）

硬如石、不作膿、用橡斗實一枚、以米醋于青石上磨汁塗之。乾即易、不過十次即平。○治腸風崩中帶下（方脈正宗）、用橡斗實生搗爲末、炒焦黑、每早服二錢、烏梅湯調服。

○橡斗殼、味苦濇、氣溫、無毒。（鈐方心鑑）

○集方治走馬牙疳、用橡斗殼不拘多少、燒透存性、出火毒、研細末、入麝香少許、以苦茶嗽口、搽之。

治風狗咬方、先用苧麻紮住患處兩頭、以眾人小便洗捻去惡血水、并齒垢患上、用橡斗殼半個、以熱人糞填滿殼內、蓋患處、殼上用艾火灸八九壯。

檳榔味苦辛澁氣溫無毒味厚氣輕沉而降陰中陽也

手太陰陽明足陽明經

（別錄曰檳榔生南海蘇氏曰今交州愛州廣州及崑崙并嶺外州郡皆有李氏曰子狀非凡木亦特異初生似笋漸積老成引莖直上旁無枝柯莖幹頗似桄榔椰子其中虛其外堅皮似青桐節似菌竹大者三圍高者九丈葉生木巔似甘蕉栟櫚葉條分岐破風至則如羽扇掃天之狀三月葉中起房剌若棘蓬自拆裂發穗綴實凡數百枚大如桃李至夏乃熟延坡映野入北者灰煮焙乾否則易于腐敗貢羅山疏云一種山檳榔名蒳子生日南木似栟櫚而小與檳榔同狀一叢十餘幹一幹十餘房一房數百子子長寸許五月採之味近甘苦一種豬檳榔大而味澀核亦大即大腹子也修事用白檳者其形尖長如雞心其中心堅其色如錦文者佳刮去底細切之經火則無力雷公云生用爲良熟使絶無用矣閩廣方草木狀云交廣人凡貴勝族客必先呈此果用無留藤古賁灰相合嚼之吐去紅水一口方滑美不濇言能去瘴也）

○檳榔主治諸氣袪瘴氣破滯氣開鬱氣（蘇恭）下痰氣去積氣

解蠱氣（甄權）消穀氣逐水氣散腳氣殺蟲氣通上氣寬中氣泄下氣之（李珣）藥也方龍潭曰如巔頂至高之氣不消而爲頭痛寒熱下焦後重之氣不利而爲積痢腸澼或胸痛引背兩脇胠滿而喘逆不通或氣痞痰結水穀不運而關格填脹或水壅皮浮肢體腫脹而行動即喘如奔豚腳氣之下而上升如五膈五噎之上而不下或伏尸寸白蟲結於腸胃之中或痃痰癖癩流延於肌膜之外種種病因因於水穀不能以時消化鬱留而致疾者此藥宜行遍達使氣可散血可行食可消痰可流水可化積可解矣如日華子謂檳榔能散胸膈無形之氣能下腸胃有形之物二句盡其用矣然治氣甚效而多用大傷

元氣繆氏曰此藥性能墜諸氣至於下病屬氣虛者腹中有積滯而脾胃素虛者下痢積滯而不後重者心腹痛內無留結及非蟲攻咬者瘧疾非山嵐瘴氣或久病氣血兩虛者凡脹滿非腸胃宿食積滯而關陰陽兩虛中氣不足者俱宜忌用（已下諸方俱出方脈正宗）

○集方治瘧疾寒熱頭痛從山谷中受嵐瘴爲一切病腹脹嘔吐不欲食等證用檳榔如雞心者切片五錢蒼朮三錢厚朴二錢甘草一錢俱薑汁炒蔥頭三個生薑五片水煎服○治心腹結滯氣逆不順飲食不進用檳榔三錢枳殼二錢茯苓一錢甘草五分生薑三片水煎服○治五鬱六結氣脉不舒用檳榔三錢枳殼二錢川芎

黑山梔廣陳皮各一錢甘草五分俱用酒炒水煎服○治食積滿悶成痰涎嘔吐者用檳榔半夏砂仁蘿蔔子麥芽乾薑白朮各二錢水煎服○治脾虛中氣不足强食生冷油膩麵食成諸積聚腹中或脹或痛或瀉用檳榔砂仁枳實白朮各五錢俱用麩皮拌炒山查肉白牽牛厚樸乾薑各四錢甘草三錢俱用薑汁拌炒共爲末紅麴爲末燒酒打糊爲丸綠豆大每空心服二錢生薑泡湯吞下○治蠱毒內攻用檳榔一兩明雄黃五錢共爲極細末茵蔯八兩搗汁打生半夏末五錢作糊爲丸如綠豆大每早服三錢生薑泡湯吞下○治脾胃兩虛水穀不能以時消化腹中爲脹滿痛者用檳榔二兩白

朮三兩、麥芽二兩、砂仁一兩，俱鹽炒爲末，每早服三錢，白湯調服。○治脾肺腎三臟受濕，水氣不化，積爲腫滿，漸成喘急不能偃臥者，用檳榔一錢，白芍藥炒，茯苓、猪苓、澤瀉、車前子各二錢，肉桂一 水煎服，十劑愈。○治脚氣腫痛，或寒熱頭痛，嘔逆胸悶，甚至衝心悶亂不知人事，用檳榔一兩，真紫蘇葉梗、杉、小茴香、吳茱萸各五錢，肉桂八錢，共爲極細末，每服五錢，乾薑泡湯調下。○治伏尸寸白諸蟲攻心咬痛，或嘔吐涎水，湯藥不入者，用檳榔五錢，花椒二錢，烏梅二個，葱頭五莖，水煎服。

續補集方（宣明方）治傷寒陰病下早成痞，按之虛軟而不痛，用檳榔、枳實各二錢，川黃連一錢，共爲末，每服二錢，白湯下。○治心脾作痛（直指方），用檳榔、高良薑各三錢，水煎服。○治膀胱諸氣及瘕疝奔豚諸病（衍義本草），用檳榔十二枚，切片，胡椒十二粒，共爲末，每服二錢，白湯調服。○治遍身癬瘡，用檳榔一個，硫黃一錢，米醋磨塗，三四次愈。

○大腹子，味辛苦澀，氣溫，無毒。李氏曰：主治與檳榔同功，茲不復贅。

○治男婦脚氣累發，漸成水腫不消，用大腹子，滾湯磨汁半盞，食前服，日二次，服一月皆消。

防痘傷目方，用烏雞檳榔各一枚，[illegible]滴水，以翎[illegible]目[illegible]。一方：痘臨將痘見目閉者，以[illegible]銀溫湯潤開，用雞毛蘸檳榔水，搽兩眼角，三四次，共六[illegible]落，永不傷目。[illegible]記

大腹皮，味辛苦，氣溫，無毒，可升可降，入足陽明、太陰經。（繆氏曰：大腹皮，即檳榔之皮也。鴆鳥多棲檳榔樹上，凡用大腹皮，宜先洗去黑水，再以酒洗，晒乾用。）

○大腹皮，寬中利氣之捷藥也。李氏龍潭曰：主一切冷熱之氣上攻心腹，消上下水腫之氣，四體虛浮，下大腸壅滯之氣，二便不利，開關格痰飲之氣，阻塞不通，能疏通下泄，爲暢達藏府之劑。按宋人有安胎之說，然此藥既爲利氣之藥，又何以安其胎乎？如氣勝而胎不安者，使之氣下，則胎自寬矣。又謂此藥有健胃之理，夫既爲下氣之藥，又何以益其胃乎？如有餘之氣壅塞不通，使之氣下，則中氣自寬，食飲可進矣。若損氣爲大腹皮之常性也，元虛氣少者，禁勿施用。

朱正泉曰：大腹皮疏氣之功，大畧與檳榔、大腹子相同。第檳榔、大腹子性烈而下氣最速，大腹皮性稍緩而下氣稍遲，故斗門方配六君子湯治中氣虛滯而成腹脹者，服之即通，則安胎健胃之理，不外是矣。

○集方：按大腹皮同人參、白朮、茯苓各一錢，甘草五分，半夏、陳皮各八分，治逆氣上攻心腹，加木香七分；治水腫氣浮，加車前子一錢；治大腸氣滯，二便不利，加玄胡索一錢；治痰飲關格，阻塞不通，加白芥子、膽星各二錢；治胎脹痛不安，加砂仁殼一錢；治胃口飲食不思，加白荳仁一錢。俱用水煎服。

果部　夷果類

龍眼味甘，氣溫，無毒。入足太陰、手少陰經。（別錄曰：龍眼，別名益志，又名圓眼，以形相似也。生南海山谷。蘇氏曰：今閩、廣、蜀道出荔枝處皆有之。性畏寒，與荔枝並生煖地。俗言荔枝纔過，龍眼即熟。木高一二丈，似荔枝而枝葉微小，凌冬不彫。春末夏初開花細白，似林生枝繁衍。七月果熟，每枝三四十顆，作穗如葡萄。殼青黃，紋如鱗甲，形如彈丸，核若木梡子而不堅，肉白有汁，味甘如蜜。白露采摘，曬焙令乾，黃土拌染，色鮮黃可用也。）

○龍眼肉，補血氣，壯精神之藥也。李時珍曰：食品以荔枝為貴，而藥品則龍眼為良。蓋荔枝性熱，而龍眼性和平也。夫心為君主之官，藏神而主血。此藥甘溫而潤，能補血氣，則君主強而精神壯，精神壯則神明通達。故前古有久服養魂魄、聰明智慧之說。而嚴用和濟生

本草彙言　卷十五　龍眼　長

方以歸脾湯治思慮傷心脾，為驚悸，為怔忡，為健忘，失寐健忘之疾者，屢用獲効，特取甘味歸脾，能安益心智之義耳。但甘溫而潤，恐有滯氣，如胃熱有痰有火者，肺受風熱，咳嗽有痰有血者，又非所宜也。

○集方（濟生方）：治思慮過度，勞傷心脾，為怔忡健忘，虛煩不寐，自汗驚悸。用龍眼肉、酸棗仁炒、黃耆、白朮、茯神各一兩，木香三錢，甘草五錢，分作五劑，每劑加生薑三片，大棗三枚，水煎服。

荔枝核味甘，氣溫，性濇，無毒。入足厥陰經。（蘇氏曰：荔枝出嶺南及巴蜀，今閩之泉、福、漳州、興化，蜀之嘉、渝、涪州，及二廣州郡皆有之。其品以閩中為第一，蜀中次之，嶺南又次之。其木高二三丈，自徑尺至于合抱，類桂木、冬青之屬，綠葉蓬蓬，四時榮茂不彫。其性至堅勁，土人取其根作櫃盒碁局，最耐久用。其花色青白，狀如冠之蕤，綴其子，結實狀如初生松毬，殼有皺紋如羅，從初青漸紅，肉色淡白如肪玉，味甘而多汁。夏至後，其子翕然俱赤，方可食也。其核形如小栗子，其色紫。）

○荔枝核，疎肝鬱，行滯氣之藥也。鍾春吾曰：故時珍方治㿗疝腫痛，及小腸氣痛，婦人血逆氣刺痛等證，以一枚煨存性，為末，酒調服，立効。有謂類象形之義云。

○集方（方脈正宗）：治疝氣，一切堅痛。用荔枝核、牛膝、補骨脂、玄胡索、茴香、木瓜、杜仲、橘核、萆薢、黃栢、肉桂各一兩，俱酒炒，研末。每服二錢，空心白湯調服。

本草彙言　卷十五　荔枝核

橄欖味苦濇，回味轉甘，氣溫，無毒。入手太陰、足陽明經。（李氏曰：橄欖生嶺南閩廣諸郡，及緣海浦嶼間皆有之。樹高丈餘，葉似櫸柳。二月開花，八月成實，狀如長棗，青色，兩頭尖。核亦相似，而有稜。核內有三竅，竅中有仁，可食。實熟時以木釘釘之，或納食鹽少許於皮內，其實一夕自落，同果子食，則甚香美。生食甚佳，蜜漬鹽醃皆可久遠。其木枝狀如黑膠者，土人采取爇之，清烈，謂之欖香。又有綠欖、黑欖，取肉搥碎乾，自生霜，如白鹽，謂之欖醬。黑欖核內有仁，肥大，其文層疊如海螺螄狀，而味甘美，謂之欖仁。又有一種方欖，出廣西兩江峒中。似橄欖而有三角或四角，與波斯欖同類也。）

○橄欖肉消酒毒，解一切諸魚鼈之毒之藥也。繆仲醇曰：此藥味苦濇而回味轉甘，苦能下氣，故消酒性之上升；濇能歛津，故能生津液而止渴；甘能和中，故能解魚鼈毒而并化魚骨作餒也。又按李氏言取其木作舟檝，撥魚着之即浮起，故知物理有相畏如此。

○集方：治食魚骨鯁，用橄欖嚼汁嚥之。如無橄欖，取核磨汁，白湯調服亦効。（方脈正宗）○治手抓碎成瘡，用橄欖磨汁塗之，能去瘢痕。（直指方）○治腸風下血，用橄欖帶核燒存性，研末，每服三錢，米湯調下。（乾坤生意）○治耳足凍瘡，用橄欖核燒，研末，油調塗之。（孫氏集效方）○治酒傷昏悶，用橄欖肉十個，煎湯飲。○治小兒胎毒，用橄欖一個，燒存性，研末，硃砂水飛過五分，生芝麻一錢，俱研爲細末，煉蜜丸如龍眼核大，俟兒落地時，即取此藥噙兒口內，漸漸化下，藥化完，方可與乳食，取下腸胃穢毒，令兒少疾。

○餘甘子味苦濇，回味轉甘，氣寒，無毒。（蘇氏曰：餘甘子，古名菴摩勒，與橄欖一物二種也。生[illegible]南交廣愛等州，今泉州山中亦有之。狀如川楝子，味[illegible]橄欖，亦可蜜漬鹽藏。其木可製器物。樹葉如夜合及槐葉，其枝如柘，其花黃，其子圓大如彈丸，色微黃，有文理。初入口味甚苦濇，良久轉甘，其形較橄欖稍圓。其主治功用與橄欖同，如解金石毒，合鐵粉搗熟，染白鬚髮轉黑，又特異於橄欖也。出寇氏陳氏方。）

桄榔子味苦，氣溫，無毒。（李氏曰：桄榔，二廣交蜀皆有之。木大者四五圍，高五六丈，拱直無旁枝，有節如竹。嶺頂生葉數十，破裂似棕櫚葉。其木肌堅，斫入數寸，得粉黃赤色，可食。開花成穗，綠色。結子如青珠，每條不下百顆，一樹近百餘條，團團懸掛，若傘，極可愛。其木最重，色類花梨而多紋，可作器皿、碁局，番舶用代鐵鎗，鋒甚利。）

○桄榔子，破宿食積血之藥也。丘南暘曰：西人以此藥磨汁，治婦人產後兒枕血瘕諸疾，及心胃寒疼，有驗。桄榔麪作餅炙之，甘美可食。令人不饑，不惟可代穀食，更有補虛羸損乏，最健補腰腳無力者。（出李珣方）

無花果味甘。氣平。無毒。入手足太陰、手陽明經。（李氏曰、無花果、出揚州及雲南。今吳楚閩越閒可折枝扦插亦成。柯枝如枇杷樹。三月發葉如蜀葵花葉。五月內枝丫中不花而實。狀如木饅頭。其內虛軟。采以鹽淹壓扁日乾充果食。熟則紫色軟爛。味甘如柿。而無核也。）

○無花果開胃止洩之藥也。（朱丹溪）

○無花果葉去濕熱解瘡毒之藥也。鍾春吾曰、朱丹溪方主五痔腫痛。取葉煎湯頻頻洗之漸效。

馬檳榔味甘。氣平。無毒。（李氏曰、馬檳榔又名馬金囊。生滇南金齒沅江諸夷地。蔓生結實大如葡萄色紫。味甘。內有核。頗似大楓子而殼稍薄圓長斜扁不等。核內有仁。味亦甘。夏月嚼化過涼水。味甜如蜜。解暑渴。不傷元氣。）

○馬檳榔凉血熱降火鬱之藥也。鍾春吾曰、按汪氏方治產難。臨時以馬檳榔數枚細嚼化。白湯送下。須臾立產。產後再嚼數枚。溫酒送下。惡水瘀穢亦自行也。又李氏方治惡瘡腫毒。頻食數枚。白湯送下。立時熱散毒解。

枳椇子味甘。氣平。無毒。（沈氏曰、枳椇詘之木蜜。以其子甘美如蜜也。小雅所謂南山有枸。楚人稱雞距。巴人稱金鉤。蜀人稱棘枸。滇人稱雞橘子。廣人稱結留子。皆指枳椇也。李氏曰、木高三四丈。葉圓大如桑柘。夏月開花。枝頭結實。如雞爪形。長寸許。紐曲。開作二三岐。儼若雞之足距。嫩時青色。經霜乃黃。嚼之味甘如蜜。每開歧盡處結一二十小子。狀如蔓荊子。內有扁核。赤色如酸棗仁形。飛鳥喜巢其上。故宋玉賦云、枳枸來巢。曲禮云、婦人之贄枳椇榛脯脩。即此也。鹽藏可以備冬儲。）（李時珍）

○枳椇子解酒毒辟蟲積之藥也。張侍峯曰、按東坡集云、眉山揭穎臣病消渴。日飲水數斗。飯亦倍常。小便頻數。服消渴藥逾年。疾日甚。自度必死。予延蜀醫張肱診之。肱取麝香當門子。以酒濡濕。作十許丸。用棘枸子煎湯吞之。遂愈。問其故。肱曰、消渴消中。屬脾弱腎敗。土不制水而成。今診得穎臣脾脈熱極。腎脈不衰。當由果實酒物過度。積熱在脾。所以倍食而多飲水也。水飲既多。溺不得不多也。非消非渴也。麝香能殺酒果花木。棘枸能散酒氣。故以此二物專去酒果之毒也。吁。古人重格物。肱殆庶幾矣。醫云乎哉。

果部（味果類）

秦椒味辛。氣熱有小毒。可升可降。入手足太陰足陽明經。（李氏曰。秦椒花椒也。始產於秦。今處處可種。最易蕃衍。其葉對生。尖而有刺。四月生細花。五月結青實。熟則紅赤大於蜀椒其目不及蜀椒之光亮黑也。）

○椒紅。溫中煖腎。散痹明目（神農）利氣逐寒之藥也（東垣）。葦芷生曰。椒性辛烈香散。故前古通治一切寒閉。一切熱鬱。一切氣滯。一切血凝。一切痰風諸證。用此無不流通。如別錄之治產後老血腹痛。及疝瘕蛔結。孟詵之治上氣咳嗽及齒浮腫痛。甄氏之治經年瘧痢。腹中冷脹。冷痛。及寒濕痞滿等疾。總不外辛香熱散之用也。倘屬內熱血虛陰火欬嗽者。咸宜忌之。

蜀椒味辛。氣熱有毒。入手足太陰及右腎命門氣分。兼入足厥陰血分。（別錄曰。蜀椒出武都山谷。及巴郡。蘇氏曰。近以金州西域者稱最。今江夏及晉康建平者次之。木高五六尺。似茱萸而小。有針刺。葉堅滑無花。結實但生於枝葉間。顆如小豆而圓。實子光黑。宛如人瞳。謂之椒目。八月采實。內肥皮皺。氣味濃厚芳烈也。修治去目。及閉口者。其性能收水銀。有中椒毒者。以涼水麻仁漿解之。）

○椒紅。暖五藏。通三焦。散瘀血。攻冷積。逐留飲。化癥瘕。解蛔結。消宿食。殺魚腥水毒之藥也（甄權）。顧朽匏曰。按李時珍言。椒乃純陽之物。其味辛以麻。其氣溫以熱。禀南方之陽。精受西方之陰氣。故入肺散寒。而治欬嗽。入腎暖水。而治陽衰足冷。入肝通滯。而治疝瘕奔豚。癥痞蟲毒。入脾溫中。而治瀉利水脹。嘔吐痞脹。入心壯氣。而通神明

發陽鬱。開腠理。達九竅也。他如老人目昏膝軟。泄瀉必食。合參耆苓术歸杞輩同用。正取溫陽氣。生陰血。培後天調養之功也。又按吳猛服椒訣云。椒禀五行之氣而生。葉青皮紅。花黃膜白。子黑。其氣馨香。其性下行。能使火熱下達。不致上衝。凡病腎氣上逆。須以蜀椒引之歸經自安。芳草之中。皆不及椒。又按戴元禮云。凡嘔吐服藥不納者。必有蛔在膈間。蛔聞藥氣則動。須於嘔吐藥中加炒川椒二三十粒。蛔見椒則頭伏。此仲景治蛔厥烏梅丸中用蜀椒。正此義也。又按張三丰詩云。椒肉應五行。椒仁通六義。欲知先有功。夜間無夢寐。四時去煩勞。五藏調元氣。目明腰脊健。身輕心竅利。健忘驚悸寧。

黃奇青自秘。回老返嬰童。康強不思睡。九蟲頓消亡。三尸自逃避。若能久餌之。神仙應可冀。竊謂椒紅丸雖云補腎。不扮水火。惟脾胃命門虛寒有濕熱者。相宜。若肺胃素有火熱者。非所宜也。又吳猛方。取蜀椒去目一兩。合口者炒去潤。搗取紅。以生地黃自然汁煎成膏。和椒紅末為丸。空心酒下三十丸。其功不可盡述。○治心腹冷氣。寒冷入腹。呃噫不止。寒濕腳氣。水氣腫滿。食瀉不化。久冷下痢。老幼泄瀉。食茶面黃。腎囊風汗。蛔結上攻等證。

外有蔓椒。崖椒。北椒等。味雖辛而微帶苦。不甚香。僅堪煮雞鴨鵝羊豬魚肉等。殺諸腥氣。不入藥用。

胡椒味辛。氣大熱。有小毒。氣味俱厚。可升可降。陽也。入足太陰、少陰、厥陰經。

（李氏曰。胡椒生南番諸國。及交趾、滇南、海南諸地皆有之。蔓生附樹。及作棚引之。葉如扁豆山藥。二月開黃白花。結椒纍纍。纏藤而生。狀如梧桐子。亦無核。生青熟紅。青者味更辣。四月成實。五月采。曝乾乃皺而黑。碎之內爲白色。今遍中國食品中爲日用必需物也。）

○胡椒溫中下氣。去冷消食。化一切魚腥水菓菜蕈之藥也。（江醫陳拜三抄）朱丹溪曰。胡椒屬火。性燥。稟純陽之氣。食之快膈。其去胃中寒痰。食已即吐水甚驗。故唐本草主去寒痰。止嘔逆。禁久痢。散寒疝水瘕等證。蓋本溫中散寒之君劑也。然走氣助火。能耗真氣。又如脾胃肺大腸有鬱熱者。不宜擅食也。又按李瀕湖云。一人自少嗜此。歲歲病目。

而不疑。及後絕之。目病亦止。後偶食一二粒。即便昏澀。此昔人所未試者。又按張子和云。噎膈之病。或因酒得。或因氣得。或因胃火。前人不察。屢投溫燥之藥。通經快膈。暫開一時。隨後復噎。胡椒未已。豆蔻繼之。丁香未已。蓽茇繼之。雖云和胃。胃本不寒。雖曰補胃。胃本不虛。況三陽既結。食必上潮。止宜溫平潤養湯丸治之。漸有進食之機。急投香燥。未有不速敗者。然他書亦有食入復出。無火之證。又有痰氣鬱結。得辛熱始開之病。則胡椒薑桂豆蔻丁香。用所不廢。在醫者權變用之何如耳。凡治已上諸證。每用胡椒五錢。綠豆五錢。共炒燥。磨末。每用一錢。米湯調服。或用神麯糊丸梧子大。每用一錢二分。米湯送下。

○外有畢澄茄一味。與胡椒一類二種也。主治病證。與胡椒同。茲不再贅。

吳茱萸味辛。氣溫。有小毒。氣味俱厚。陽中陰也。入足太陰經血分。少陰厥陰經氣分。

（蘇氏曰。吳茱萸處處有之。江淮蜀漢尤多。閩中最勝。吳地者亦佳。故名。木高丈許。皮色青綠。枝柔而肥。葉長而皺。似椿葉闊厚。色紫。三月梢頭開紅紫色花。七八月結實。纍纍成簇而無核。嫩時微黃。熟則深紅。一種粒大。一種粒小。小者入藥。雷氏曰。修治以吳茱萸一斛。食鹽一兩。滾湯一盆。泡浸十日。洗去涎。曬乾用。）

○吳茱萸開鬱化滯。逐冷降氣之藥也。方龍潭曰。凡患小腹少腹陰寒之病。或嘔逆惡心而吞酸吐酸。或關格痰聚而膈食膈氣。或脾胃停寒而泄瀉自利。或肝脾鬱結而脹滿逆食。或疝瘕弦氣而攻引小腹。或腳氣沖心而嘔噦酸苦。是皆肝脾腎經之證也。吳茱萸皆可治之。

李時珍曰。蓋此藥純陽之物。辛熱能散能行。苦熱能燥。

能下。爲陰中之陽。善入陰中至陰之分。治寒痛最捷。故古方有云。中脘痛者。非生薑不止。臍腹痛者。非乾薑不除。小腹少腹痛者。非吳茱萸不療。專治寒在肝、脾、腎三經。取其散寒、溫中、燥濕、解鬱而已。倘三經之病。有因火熱爲者。又當斟酌用之。如中病即止。不可多服。多服則走氣動火。發瘡昏目耳。

○集方（方林正宗）治陰毒傷寒。四肢厥冷。臍腹疼痛。嘔逆吐蚘。寒戰呃逆。時嘔冷涎。自汗如水。用吳茱萸鹽湯泡三次五錢。白朮炒、人參焙、附子童便製各六錢。甘草炙二錢。烏梅三箇。花椒三十粒。水三大碗。煎一碗。放冷。徐徐服。○治（長部子集）吞酸吐酸。醋氣攻心。用吳茱萸三錢（製法同前）川黃連五分。

酒洗同炒。水煎服。○治隔食隔氣。飲食不納。因胃寒者。用吳茱萸五錢（製法同前）白朮炒六錢。分作二劑。水煎飲。○治（普濟方）藏寒頻泄。用吳茱萸一兩五錢（製法同前）黃耆、白朮各一兩。北五味、人參、乾薑各五錢。俱炒燥。研末。神麴糊爲丸梧子大。每早服五錢。烏梅湯下。○治（王氏方）寒疝衝心。并脚氣衝心。時作嘔吐。並用吳茱萸五錢（製法如前）生薑一兩。青皮三錢。水煎溫和服。○治（楊氏方）冷氣腹痛。脾元氣痛。腹中痞痛。嘔涎頭痛。四證。俱用吳茱萸六錢（製法同前）玄胡索酒炒五錢。半夏三錢。水煎服。○治（和劑方）赤白下痢。腹痛者。用吳茱萸、川黃連各二兩。炒白芍藥一兩五錢。木香一兩。酒煮大黃六錢。共爲末。煉蜜丸。每早晚各服二錢。白湯下。○治（[illegible]方）口瘡口疳。及咽喉作痛。用吳茱萸一兩。爲末。醋麪糊調塗兩足心。○治（王氏方）齒牙疼痛。不拘風火蟲痛。用吳茱萸一撮。煎湯汨漱。○治（外科[illegible]）癰疽發背及發乳諸毒。用吳茱萸一兩。爲末。熱酒調塗。此方并治骨入肉中。塗之即腐出。治蛇咬。塗之即安。

食茱萸詳載食物本草。

茶茗味苦甘氣寒無毒可升可降陽中陰也入手足厥陰經（蘇氏曰茶茗產浙閩江湖淮南山中皆有然有野生種生種者用子二月下種一坎須百顆乃生一株蓋空殼者多也畏水與日最宜坡地蔭處春生嫩葉采以穀雨前者爲上穀雨後者次之初采爲茶晚采爲茗或言六經無茶字楊升菴謂茶即古荼字詩所云誰謂荼苦其甘如薺是也李氏曰其子大如指頭圓而黑色其仁入口初甘後苦最戟人喉閩人以榨油食用采芽蒸焙修造皆有法詳見茶譜唐人尚茶茶稅始於唐德宗以迄於今且與西番互市易馬以其所食膻肉之擁青稞之熱烟草之火非茶不解而戎得茶不爲我害中國得馬則爲我利以摘山之利操御戎之權此國家之重務也又按陸羽茶經云茶者南方嘉木自一尺二尺至數十尺其巴蜀川峽山谷中有兩人合抱者伐而掇之木如瓜蘆葉如巵子花如白薔薇實如栟櫚蒂如丁香根如胡桃其名一曰茶二曰檟三曰蔎四曰茗五曰荈山南以陝州上襄州荊州次衡州下金州梁州又下淮南以光州上義陽郡舒州次壽州下蘄州黃州又下浙西以湖州上常州次宣州杭州睦州歙州下潤州蘇州又下浙東

以越州上明州婺州次台州下劍南以彭州上綿州蜀州邛州次雅州瀘州下眉州漢州又下黔州生恩州播州費州夷州江南生鄂州袁州吉州嶺南生建州福州韶州象州其思播費夷鄂袁吉建福韶象十一州未詳往往得之其味極佳又一說其上者生爛石中者生櫟壤下者生黃土藝法如種瓜二歲可采又陽崖陰林紫者上綠者次筍者上芽者次葉卷者上舒者次在二三四月之間茶之筍者生于爛石之間長四五寸若薇蕨之始抽凌露采之茶之芽者發於叢薄之上有三枝四枝五枝者選其中枝穎拔者采之采得蒸焙封乾有千類萬狀也如胡人靴者蹙縮然犎牛臆者廉襜然浮雲出山者輪囷然輕飈拂水者涵澹然此皆茶之精好者也有如竹籜者枝幹堅實艱于蒸搗故其形籭簁然有如霜荷者莖葉凋沮易其狀貌故厥狀萎萃然此皆茶之瘠老者也其別類而似茶者有桑芽有楠芽枸杞芽枇杷葉芽又有槐芽柳芽皂莢芽皆上春摘取和茶拌之故冷循入喻官茶往往雜以泉葉芽如山中諸草木葉芽皆可相合楷料左奇惟紫薇竹循松芽之屬不能入和也又湯起云貢茶性冷無茶性溫惟雅州蒙山顛頂者性氣溫平而下治痰不僅）

茶茗解五臟鬱火去痰熱利小便止煩渴之藥也江彪不云按繆氏言茶得木中之清氣兼得春初生發之意爲清肅之用凡病火鬱爲滯痰結食停諸證飲之立清他如傷暑中熱煩渴不寧宜涼飲之即安傷酒傷食煩躁嘔逆悶脹不安宜熱飲之即定又按陸氏茶傳云若熱渴凝悶目澀腦痛四肢煩倦百節不舒聊四五啜與醍醐甘露抗衡也則茶爲清肅之品洵非虛語矣凡種類極多方宜大異要皆以味甘不澀氣芬如蘭採於夏前者爲良蓋生於山谷磽瘠沙土之中不受纖毫穢滓灌養專感雲露之氣以爲滋培故能滌腸胃一切肥膻垢膩寧非木中清貴之品哉昔人多以其苦寒不利脾胃及多食發黃消瘦之說此皆語其粗惡苦澀品類最

下者言之耳昔雅州蒙山茶久服四兩百病皆消豈有味甘氣芬者飲之反致疾耶如他種苦澀草氣葉淺莖枯非道地所產者服之不利心脾使人脂消血敗故不宜飲也留心斯業者當細心審辯可也

本草綱目發明曰汪穎云一人好食炙煿久防其生癰毒後卒不病其人每夜必啜涼茶一碗茶能解炙煿之毒也又陶隱居謂人服茶能輕身換骨壺公言苦茶久食羽化此皆著茶之功者也又唐毋炅茶序云釋滯消壅一日之利暫佳瘠氣指精終身之累斯大福近易知禍遠難見耳又蘇軾茶說云空心飲茶入鹽直入腎經且冷脾胃乃引賊入室也古人呼茶爲酪奴蓋賤之也

李廷飛云久飲茶令人腰脚膀胱冷痛兼患水腫攣痺諸疾陳藏器云久飲消人脂使人少睡飲之宜熱冷則聚痰此皆著茶之害者也夫茶能降火火爲百病火降則上清矣然火有虛實之異若少壯胃健之人心肺脾胃之火多盛則與茶相宜涼飲則火因寒氣而下降熱飲則茶借火氣而升散兼解酒食之毒使人神思闓爽不昏不睡茶洵有功于人矣若氣血虛寒之人飲之既久則脾胃漸弱精血潛虛土不制水成停飲泛溢或爲痞滿嘔惡或爲腹冷洞泄或爲痿痺癱瘓或爲疝瘕脚氣變病種種茶亦豈無害哉在人自當斟酌之耳人有嗜茶成癖者時時咀啜不止久而傷營傷精血不華色

尤可嘆悼惟飲食後濃茶漱口既去煩膩而脾胃不傷且苦能堅齒消蠧最有益而無損又楊士行有茶薑治痢方茶助陰薑助陽並能消暑解酒食毒且一寒一熱平調陰陽不問赤白青黃不問虛實冷熱用之皆良又濃茶能吐風熱痰涎乃酸苦湧泄爲陰之義非其性能升也又治陰證湯藥內入之以去格拒之寒此寒因寒用之理也

○集方（普濟方）治一切下血因食炙煿醇酒烟火熱藥過度者用細茶八兩炒五棓子五錢俱晒存性共爲末煉蜜丸梧子大每早服二錢白湯下○（兵部手集）治久年心胃痛用細茶五錢水一大碗煎四五分和米醋三分飲之良○（摘玄方）治風痰顛疾用細茶巵子各一兩煎濃汁一碗服良久探吐○治（鮑氏方）月水不通以苦茶二碗入沙糖五錢調勻露一夜溫服亦可下胎

皁蘆（一名苦蔘）味苦氣寒無毒

（李氏曰皁蘆出南越龍川縣及新平縣葉大如手掌深黃色味極苦揉碎泡湯飲交廣最重客至設此飲以供乃加以香藥諸品泡之味苦而廻味不甘色濁而氣不清香不及茶茗遠矣）

○皁蘆清上膈鬱火止渴除煩消痰利水之藥也劉連城曰此藥苦寒下泄去暴火鬱熱有功如久服常服大泄胃氣

果部（瓜果類）

甜瓜蒂味苦，氣寒，無毒。可升可降，陽中陰也。入手足陽明經。

（別錄曰：瓜蒂生嵩高平澤。蘇氏曰：今所在皆有。李氏曰：三月下種，延蔓而生，葉大數寸。五六月開花，黃色。六七月瓜熟。有圓有長，有尖有扁。大或徑尺，小或一捻。或有稜或無稜。其色或青或綠，或黃而斑，或糝而斑，或白路或黃路。其瓤或白或紅，其子或黃或赤，或白或黑。又按王禎農書云：瓜品甚多，不可枚舉。以狀得名者，有龍肝、虎掌、兎頭、貍首、羊髓、蜜筒之稱。以色得名者，有烏瓜、白團、黃㼐、白㼐、小青、大斑之別。然其味不出乎濃淡甘香而已。廣志云：以遼東、燉煌、廬江之瓜爲勝。然瓜州之大瓜，陽州之御瓜，西蜀之溫瓜，永嘉之寒瓜，未可以優劣論也。又甘肅甜瓜皮瓤皆甘，甘勝糖蜜。取瓜皮暴乾，猶甘美可口。浙中一種陰瓜，種於陰處，熟則色黃如金，膚皮稍厚，藏至來春，食之如新。此皆種藝之巧，不必拘以土地力也。雷氏曰：修治，切勿用白瓜蒂，取青綠色瓜氣足時，其蒂自落在蔓上者，采得繫屋東角有風處，吹乾用。）

○瓜蒂，吐痰食之藥也。（日華子）經云：高者越之，在上者涌之。（張[illegible]）故古方越以瓜蒂香豉之苦，涌以赤小豆之酸。酸苦涌泄爲陰也。又按綱目發明云：張仲景云：病如桂枝證，頭不痛，項不強，寸脉微浮，胸中痞硬，氣上衝咽喉不得息者，此爲胸中有寒也，當吐之。太陽中暍，身熱疼重而脉微弱，此夏月傷冷水，水行皮中也，當吐之。少陽病頭痛，發寒熱，脉緊小，是膈上有痰也，當吐之。病胸上諸實，鬱鬱而痛，不能食，欲人手按之，而反有濁唾，下利日十餘行，寸口脉微弦者，當吐之。懊憹煩躁不得眠，未經汗下者，謂之實煩，當吐之。宿食在上脘者，當吐之。並宜瓜蒂散主之。惟諸亡血、虛家，不可與瓜蒂散也。又按難經云：下部有脉，上部無脉，其人當吐，不吐者死。此飲食內傷，填塞胸中，食傷太陰，風木生發之氣伏於下，宜瓜蒂散吐之。素問所謂木鬱則達之也。吐去上焦有形之物，則木得舒暢，天地交而萬物通矣。若尺脉絕者，不宜用此，則是瓜蒂之用，專主於吐矣。寇氏謂瓜蒂吐涎，甚不損人，勝石綠、硇砂輩也。朱丹溪謂瓜蒂性急，能損胃氣，胃弱人及病後產後，宜以他藥代之。夫瓜蒂乃陽明經除濕之藥，故能引去胸脘痰涎、頭目濕氣、皮膚水氣、黃疸濕熱諸證。凡胃弱人及病後產後，並不宜吐，何獨瓜蒂耶。

○集方（[illegible]）治已上諸證當吐者，用瓜蒂二錢五分，炒黃赤小豆二錢五分，共爲末。每用一錢，以香豉一合，熱湯七合，煮糜去滓，和服。以指探之，快吐乃止。

○續補集方（[illegible]）治風涎暴作，氣塞倒仆，不能言語，或五般癇證，用瓜蒂研末，每用三分，白湯調灌，即吐涎涌沫。如吐多困甚者，以麝香五釐，白湯一盞，飲之即止。○治急黃（[illegible]）喘息，不能臥，心上堅硬，欲得水飲者，以瓜蒂、赤小豆各一合，研末，白湯調服方寸匕。一炊久即吐，如不吐，再用末吹鼻，出水亦可。○治一切發黃，用瓜蒂爲末，取以半茶匙吹鼻中，輕則半日，重者一日，流取黃水乃愈。○治十種蠱氣（[illegible]），用瓜蒂爲末，棗肉和丸梧子大，每服三十丸，生薑湯下，甚效。○治風眩頭痛不已，用瓜蒂爲末，取二分，嗜入鼻內，口含涼水，取出黃水愈。○治時瘧寒熱，用

瓜蒂二枚，打爛，清水半盞浸一宿，頓服取吐，愈。

○甜瓜肉，詳見食物本草。

西瓜，味甘淡，氣寒，無毒。（李氏曰：按胡嶠征回紇，得此種歸，名曰西瓜，則西瓜自五代時始入中國，今則南北皆有，而北方者味更佳美。二月下種，蔓生，花葉皆如甜瓜，六七月實熟，有圍徑尺者，或有稜，或無稜，其色或青或綠，其瓤或白或紅，紅者味尤勝，其子或黃或紅或黑或白，白者味劣，其味有甘有淡有酸，酸者爲下。）

○西瓜，解暑熱，消煩止渴之藥也。門吉士曰：按本草綱目發明言：西瓜性寒解熱，下氣止渴，有天生白虎湯之名。又按松漠記聞云：有人苦月病，或令以西瓜切片曝乾，日日服之遂愈，因其性冷降火故也。然亦不宜多食，世謂醍醐灌頂，甘露灑心，取一時之快，而不知有傷脾助濕之患也。眞西山云：瓜桃生冷，宜少飧，免致秋冬成瘧痢，是也。

○集方：治陽明熱甚，舌燥煩渴者，或神情昏冒不寐，語言懶出者，用好紅瓤西瓜，剖開取汁一碗，徐徐飲之，即安。

○治牙疼（虞摶祀）神方：用經霜西瓜皮，燒灰，敷患處牙縫內，立效。

沙糖，味甘，氣溫，無毒。（李氏曰：沙糖係甘蔗汁煎煉而成，色紫黑如醬，其法出西域，唐太宗遣人傳其法，以蔗汁過樟木槽，取而煎成，清者爲蔗餳，凝結有沙者爲沙糖，漆甕中造成如石如霜如冰塊者，爲石蜜，爲糖霜，爲冰糖也。糖霜亦可煎化，印成鳥獸果物之狀，以充席獻。今之貨者，又多雜以米餳諸物，不可不知。）

○沙糖，和中煖胃，活血行瘀之藥也。梅青子曰：此係蔗汁煎煉至紫黑色而成，則寒質而轉爲熱體矣。故方氏稱爲和中煖胃，凡嘔泄諸證屬虛寒者，往往與烏梅煎湯飲之，立安。又如產後惡露不盡，瘀滯攻痛，與山查、乾薑煎湯飲之，立止。又如北方多食烟火，有中毒者，與菉豆、燈心煎湯飲之，立消。但甘溫發熱，多食反致動火生痰，小兒多食則病疳損齒，生蟲發脹等害。如西北地高多燥，服此有益；東南地下多濕，食之有助熱也。

甘蔗，味甘微澀，氣寒，性熱，無毒。入足陽明、太陰經。（李氏曰：蔗皆畦種，叢生，最困地力，莖似竹而實，大者圍數寸，長六七尺，根下節密，以漸而疎，抽葉如蘆葉而大，長三四尺，扶疎四垂，八九月收采，莖可過春，充果食。其皮有紫綠白三色。蘇氏曰：江浙閩廣湖南蜀中俱有之。蘆蔗莖細短而節疎，但堪生噉，煎糖稍沸；竹蔗莖粗而長，可搾汁煎沙糖，甚稠。福泉吉廣諸州多作之，鍊特和牛乳猪脂者更佳，蜀中作之。南人販至北地，蘆蔗多，竹蔗少也。凡草皆正生嫡出，惟蔗橫段側生，故從庶也。）

○甘蔗，和中養胃，生津止渴之藥也。陳一齋曰：按李氏發明云：蔗漿之甘也，其漿甘寒，能降火熱，知其氣寒明矣。日華子言能消痰止渴，安煩解酒，此言一時煩熱少安，多食未有不發濕中之火，爲痰脹嘔嗽之疾。詩言飽食不須愁內熱，大官還有蔗漿寒者，此文太樂其甘寒爽口，爲酒後一時止渴之需，作興賦此，時人誇此二句，信爲寒凉之品，不知多食久食，善發濕火，爲病痰脹嘔嗽之疾，可醫者可不察乎。

果部（水果類）

蓮子味甘氣平性濇無毒入手少陰足太陰經（李氏曰蓮子生荊揚豫益諸處湖澤陂池皆有之以蓮子種者生遲以藕芽種者生速其芽穿泥成白蒻即蔤也長者至丈餘五六月嫩時沒水取之可作蔬茹俗呼藕絲菜即此節生二莖一為藕荷其葉貼水其下旁行生藕也一為芰荷其葉出水其旁莖生花也其葉清明後生六七月開花花有紅白粉紅三色花心有黃鬚蕊長寸餘鬚內即蓮也花褪連房成菂菂在房如蜂子在窠之狀六七月采嫩者生食脆美至秋房枯子黑其堅如石謂之石蓮子八九月收之破去黑殼謂之蓮肉冬月至春掘藕食之藕白有孔有絲大者如臂長六七尺凡五六節大抵野生及紅花者蓮多藕劣種植及白花者蓮少藕佳也其花白者香紅者艷千葉者不結子別有臺蓮並頭蓮夜開晝卷蓮外圓又有金蓮碧蓮皆是異種故不多見又相感志云荷梗塞穴鼠自去煎湯洗鑞鐵垢自退物性自然也）

○蓮子補中益氣滋養五藏（元紀）靖君相火邪之藥也（陳廷采）李氏（時珍）曰此藥味甘性濇禀清芳之氣得稼穡之味脾之果也脾者黃宮所以交媾水火會合木金者也土為元氣之母母氣既和津液相成神乃自生故釋氏用為引譬妙理具存醫家取為服食百病可却故大氏方生食補腎澁精治男子赤白淋濁女子帶下崩中又止久痢固脾泄也熟食交心腎止煩渴益氣力令人強健無病耐老延年乃藥中之清品也

○藕涼血散血（方谷）清熱解暑之藥也李氏（時珍）曰此藥生於卑污之中而潔白自若質柔而穿堅居下而有節孔竅玲瓏絲綸內隱可謂靈根矣其所主皆心脾血分之疾如陳氏（藏器）方治熱渴煩悶大氏（日華子）方治產後瘀血孟氏方治霍亂

水泄皆屬熱邪為患者取此清芳寒潔甘淡之味以涼解之如血熱血滯之病悉潛消而默化矣第生食過多不免有動冷氣不無腹痛腸滑之虞耳如煮熟食能養藏府和脾胃凶年亦可代糧食焉

○集方治肺氣煩渴（聖濟方）用生藕擣汁一盞飲之○治傷寒陽（醫安府方）明熱病口乾用生藕擣汁生地黃汁童子小便各一盞和飲○治產後（梅師方）血瘀悶亂血氣上衝口乾腹痛用生藕擣汁二升飲之○治熱極霍亂（方脈正宗）以生藕擣汁一碗飲之○治小便熱淋（簡便方）用生藕生地黃生白蘿蔔各擣汁一碗和勻飲之○治墜馬血瘀（千金方）積在胸腹唾血無數者用生藕節擣爛和酒絞汁飲隨量用○治食蟹中（[illegible]）毒用生藕切碎浸米醋食之

○藕蔤（又名藕絲菜）味甘氣平無毒（陶隱居曰藕蔤係五六月嫩時采為蔬茹老則為藕）藕蔤解煩渴散酒毒下瘀血之藥也（李珣）孟氏曰功用與藕同性也

○藕節味苦澀氣平無毒消瘀血止血妄行之藥也（朱丹溪）邢元璧曰日華子治產後血悶腹脹擣汁和熱童便飲有效蓋止中有行散之意又時珍方治欬血唾血嘔血吐血及便血溺血血淋血崩等證入四生飲調營湯中亦行止互通之妙用也

○蓮薏（即蓮子中青心也）味苦氣寒無毒清心氣止逆血固遺精縮小便之藥也

○蓮蕊鬚味甘澁。氣溫。無毒。入手足少陰經。（李氏曰、蓮蕊鬚係花開時。采取花中黃鬚也。[illegible]其、亦可充果食。此藥本草不收。而三因諸方如固眞丸、巨勝子丸、各補益方中。往往有之。其功大抵與蓮子同也。）

蓮蕊鬚、清心養腎之藥也。陳氏象詮曰、此藥甘澁收歛。能止血。調營。固精。療帶。古方同黃栢、甘草、牡蠣、魚膠、五味子、覆盆子、沙苑蒺藜各等分。合作丸服。治夢遺精滑良。

○蓮蓬殼味苦澁。氣溫。無毒。（江氏曰、宜陳久者良）

蓮蓬殼、止血崩。血痢。脾泄久痢之藥也。薛眉泉曰、此藥味濇。固脫。婦人方中。每用此。止血止淋。亦急則治標之意。

○荷葉味苦。氣平。（蒸熟則溫）無毒。（李氏曰、嫩者。名荷錢。象形也。貼水者。名藕荷。生藕也。出水者。名芰荷。生花也。入藥宜用糕鋪中。甑內蒸米麪者食者。晒乾。用之良。）

荷葉、澁腸止痢之藥也。（陳延采）姚氏曰、按本草發明云、張潔古授東垣老人。枳朮丸方。用荷葉燒飯爲丸。東垣老年味之。始悟其理。夫震者、動也。人感之生少陽甲膽。是屬風木。爲生化萬物之根蒂。人之飲食入胃。營氣上行。即少陽甲膽之氣。與手少陽三焦、元氣同爲生發之氣。素問云、履端于始。序則不愆。荷葉產於淤泥。而不爲泥染。居於水中。而不爲水沒。其色青。其形仰。其中空。象震卦之體。食藥感此氣之化。胃氣豈有不升者乎。更以燒飯和藥。與白朮協力。滋養胃氣。其利廣矣大矣。世之用巴豆牽牛者。豈足語此。李瀕湖曰、震爲雷。荷葉之體仰而上承。乃述類象形之義。故留人規言能升發陽氣。散瘀血。戴元禮又謂單服。可以消陽水浮腫之氣。如濇腸止痢。緣其性味苦澁。以固脫耳。

○集方治卒暴吐血（聖惠方）用藕節、荷葉蒂各七個。俱搗爛。以白蜜半盞。共二物煎滚。再入白水二碗。煎七分服。渣再加水煎。○治衄血不止（同前）用藕節二十一個。搗汁。熱湯內頓服。○治大便下血（全幼心鑑）用藕節。晒乾。每用七個。和白蜜七茶匙。水二碗。煎一碗服。

○集方治勞心吐血（百一方）用蓮子心十四個。麥門冬去心三錢。糯米五十粒。煎湯服。

○集方治血崩不止（濟急方）用陳年蓮蓬殼、荊芥穗各等分。各燒存性。總研末。每服二錢。米湯調服。○治天泡濕瘡（同前）用蓮蓬殼。切細炒焦。爲末。猪膽汁調塗。○治久痢不止（方脉正宗）用陳蓮蓬殼一兩。黑棗三十個。煎湯飲。

○集方治血痢久不止（方脉正宗）用糕甑上蒸爛荷葉。晒乾炒。研末。米湯調服二錢。○治崩中下血（普濟方）用生荷葉晒乾。燒五錢。蒲黃、黃芩俱炒各一兩。共研末。每服三錢。空心白湯調下。○治吐血衄血。陽乘於陰。血熱妄行者。宜服四生丸。用生荷葉、生艾葉、生栢葉、生地黃各五錢。水煎服。○又方用糕甑上蒸爛荷葉。煎湯飲。○治產後心痛（[illegible]良方）因惡血不盡者。用生荷葉炒香。爲末。每服二錢。白湯調下。

芡實味甘、性澀、氣平。無毒。入足太陰、少陰經。（別錄曰、芡實生雷池池澤。今處處亦有。惟杭州者最勝。上人善紀孕實時日、如期采取、則殼柔肉糯、早則殼爛肉未凝、遲則殼堅肉抗老矣。李氏曰、三月生苗、莖在水中、葉貼水面、葉多有芒刺、莖長丈餘者、中必有孔有絲、軟者剝皮可食。葉似荷而大、皺文如縠、面青背紫。五六月作花、紫色、花開向日、結苞外有青刺、如蝟形、如栗毬。花出苞頂、形如雞喙、剝之內有斑駁軟肉裹子、纍纍如珠璣。殼內有白米、狀如魚目。珠根作三稜、煮食如芋。爾雅翼曰、芡食細嚼、能致上池之津、故主益人。猶如馬藕短草、則微悅。與小兒食、不易長大、故主駐年。芡與菱皆水物、而性異。芡花向日、菱花背日、其陰陽向背有不同、則損益陰陽亦異矣。埤雅云、荷花日舒夜斂、芡花晝合宵炕、此亦陰陽之異也。孟氏曰、修治先蒸熟、日中曬裂取仁、亦可舂取粉用。服食家記云、芡實一斗、以防風四兩煎湯浸過、經久不壞。○倪朱謨曰、年荒五穀之不登曰歉、此物能濟荒充食以療儉、故曰芡也）

○芡實、補脾胃、澀精氣之藥也。朱東生曰、按李氏云、芡可濟歉、故謂之芡。繆氏言、此得水土之氣以生、故味甘質糯、和養脾胃、生化營液、稱爲上品。故前古主補中、補腎、利腰脊膝痛、益精氣、強志意、爲脾腎補養之專劑。然質雖柔糯、而性極甘滯、如老人胃弱、小兒脾虛、不善尅化者、宜少與之。故孫升子言、芡本不益人、而俗稱爲水流黃、何也。蓋人食此、必咀嚼之、終日囁嚅、腴而不肥。能使華液流通、轉相灌溉、其功勝于乳汁也。

○集方、治精髓不固、時多滑泄。用芡實搗末、用金櫻子煎膏和丸。每早晚服數錢、專補下元、謂之水陸丹。○治思慮過度、損傷精氣、小便數澀、遺精淋滯。用芡實四兩、蓮肉、茯苓俱炒、各二兩、真秋石一兩、共研細、煮紅棗肉爲丸梧子大。每早服三錢、白湯下。○治老幼脾腎虛熱、用芡實、山藥、茯苓、白朮、蓮肉、薏苡仁、白扁豆各四兩、人參一兩、俱炒燥爲末、白湯調服。治久痢如神。

○山果類有李子、梅子、桃子、栗子、棠梨、木桃、杏子、林檎、石榴子、橘子、柑子、橙子、柿子、香櫞、金橘、枇杷、楊梅、櫻桃、榛子。○夷果類有荔枝、榧子、海松子。○瓜果類有甜瓜、蒲萄、甘蔗、菱實、烏芋、慈姑、不入藥用、詳載食物本草。

○治思慮傷心、心無血養、心中惕然跳動不寧、如人將捕捉之貌、病名怔忡、以養心丸。用芡實一觔、川貝母四兩、酸棗仁、當歸身、人參、黃耆、白朮、茯苓各二兩、川芎、北五味子各一兩、俱酒拌炒、研爲細末。麥門冬、懷熟地各四兩、烏梅肉一兩、俱用酒煮搗膏、共和爲丸、如彈子大。每早晚不拘時乾嚼一二丸、米湯過下。

彙言卷之十六

錢塘　倪朱謨純宇甫選集　男倪洙龍沖之氏𣿬稿
　　　沈公薛定白甫校正

菜部（葷菜類）

韭味辛甘酸氣溫性濇有毒入手少陰足厥陰經血分（李氏曰韭叢生豐本長葉青翠可以根分可以子種其性內生不得外長葉高三寸便剪剪忌日中一歲可五六剪收子者只可一剪八月開花成叢九月收子其子黑色而扁須風處陰乾勿令浥鬱北人至冬移根於土窖中培以馬糞暖則即長高可尺許不見風日其葉黃嫩謂之韭黃豪貴家館皆珍之王氏曰韭者久也剪而復生久而不乏也可生可熟可醃可菹乃菜中最有益也）

○韭菜利氣行血之藥也夏碧潭曰生則辛而行血如丹溪方治吐血唾血嘔血衄血淋血尿血婦人經脈逆行上衝之血傷寒熱蓄於裏內傷營分下行之血打撲跌傷瘀結之血或中惡卒死人事昏迷或胸痺急痛錐刺欲死或脇肋攢痛難以轉側並擣汁飲之熟則甘而補中如藏器方治陽虛腎冷陽道不振或腰膝冷疼遺精夢泄或久痢膿血下腹脹墜或膈噎不通飲食少下或痃癖積飲否塞中宮並宜炒熟食之益人之氣抑鬱者多凡人氣血惟利通和不利阻滯韭性行而能補故可久食而無損也但性本通利而氣味辛烈前古雖稱補益然多食亦令人神昏最爲養性家所忌能善發相火故也用腎胃家有火者勿服瘡毒食之愈增痛癢疔癧食之令病轉劇

○集方治吐（巳下四方俱出分類本草）血唾血嘔血衄血淋血尿血及一切血證用韭菜十觔擣汁生地黃五觔切碎浸韭菜汁內烈日下晒乾以生地黃黑爛韭菜汁乾爲度入石椿內擣數千下如爛膏無渣者爲丸彈子大每早晚各服二丸白蘿蔔煎湯化下○治婦女經脈逆行血室上衝或吐或嘔用韭菜三觔擣汁當歸川芎牡丹皮丹參各二兩玄胡索木香各一兩俱炒大黃四兩酒浸三日晒乾炒焦黑共爲末韭菜汁和丸彈子大每服一丸燈心湯化下○治傷寒邪熱隨經入裏用白茯苓二兩爲末韭菜十兩擣汁和熟印成錠子重三錢人參湯調下○治打撲傷損瘀血內脹用韭菜一觔擣汁和熱酒三分之一徐徐飲之○治中（心鏡）惡卒死人事（食療本草）昏迷并療臥魘不寤用韭菜擣汁一碗徐徐灌之○治胸痺急痛錐刺欲死不得俛仰自汗出或痛徹背胛或脇肋攢痛難以轉側並取生韭菜三觔擣汁飲○治陽（已下五方俱出方脈正宗）虛腎冷陽道不振或腰膝冷疼遺精夢泄用韭菜白八兩和胡桃肉去皮二兩同脂麻油炒熟日食之一月愈○治久痢膿血下腹脹墜用韭菜白八兩和黃牛肉四兩切薄片同脂麻油炒熟日食之一月愈○治膈噎不通飲食不下用韭菜汁一碗和茯苓末四兩作細丸綠豆大每服一錢白湯吞下○治痃癖積飲否塞胸腹用韭菜白八兩和熟犬肉四兩脂麻油同炒熟日食之一月愈○治抑鬱憂悶之人胃

脘有痰飲惡血或脹或痛者用韭菜白一把白滾湯略渲不可過熟和醬油薑醋拌日食之一月愈○治痔瘡（補診）腫痛用韭菜一把泡滾湯中以器盛之留一孔乘熱坐孔上先熏後洗數次愈○治小兒胎毒（四聲本草）初生時以韭菜汁數匙灌之即吐出惡水涎沫永無諸病○治跌撲傷（集簡方）損出血并金瘡出血不止以韭汁和風化石灰日乾每用爲末傅之立止○治風犬咬傷（附後方）用冷水洗淨傷處用韭菜搗汁一碗飲之渣隨傅傷處七日再如法搗汁飲并渣換傅以四十九日共飲汁七碗渣換七次忌食魚豬雞鵝犬肉百日。

○韭子（味辛甘氣溫無毒）通淋濁利小水之藥也（白閒之訣）李氏曰腎主閉

藏肝主疏泄韭乃肝之菜其氣歸腎善疏泄閉藏抑鬱之氣故淋濁可通溺閉可利又遺尿不禁可止按素問曰思想無窮與入房太甚發爲筋痿及爲白淫男隨溲而出女子綿綿而下乃足厥陰肝病也此藥專治遺精漏泄淋濁小便不通不禁女子帶下者能入厥陰甘溫而補肝及命門之不足故專治下焦諸症云

○韭黃乃韭芽之未出土者（味甘辛氣溫有小毒）酒席中以此供饌甚可口官家嘗珍之然食之滯氣發瘡疥以含抑鬱未申之氣故也

葱味辛甘氣溫無毒氣厚味薄可升可降陽也通行手足十二經。（韓氏曰葱有四種南北東西皆有之山谷者曰茖葱陸地者曰胡葱凍葱漢葱漢葱又名大葱其莖麤硬而味淡春時開花作子亦黑味辛而三[illegible]東人名冬葱或名大茖葱其莖柔軟而香不結子分莖栽蒔夏衰冬盛上供多用之胡葱莖葉俱麤大而頭味亦烈茖葱似胡葱而稍細茖葱療病相宜凍葱入食料最美辟腥氣外有一種五爪葱湖楚人多種之其皮微赤每莖上出歧如角角下生根五月摘下種之成叢不結子亦可充食料今浙人亦種盂內云能辟邪）

○葱白發散寒邪疏通逆氣（寧氏承叔）流散血鬱之藥也方龍潭曰味辛應金中空象肺前人主傷寒邪在太陽經寒熱頭痛無汗氣促者又治霍亂轉筋憒悶腹疼者凡陰寒之證惟此可攻如喉痺不通腮頤腫脹或溲便阻閉小腹

急墜或胎孕不安腰腹疼痛或心胃攻疼寒熱蟲積或奔豚疝瘕走痛上下或腳氣內攻腹脹厥逆凡氣閉之證惟此可行凡諸肉食之味用葱調制不但取其香烈辟腥而亦可解百物之毒也生則辛散而發越表裏寒邪熟則甘補而通達上下陽氣氣者血之帥也氣通則血活矣故陳氏勝金用方每製乳香沒藥俱搗葱汁爲之能使氣行血和之意大抵此劑辛烈之性最甚而發散之功最多若多食則昏人頭目損人元氣蓋因走散之力大也分而論之或謂葱白解表葱實補中葱葉去毒葱根止頭痛極有理也

盧子由先生曰葱也白根層理綠莖空中上達橫徧陽

氣前通之象也方之奇方急方劑之宜劑通劑也故力能內開骨節外達毫竅上徹巔頂下及趺踵故主陽氣閉塞致寒氣外併作湯蕩滌之前通陽氣揚液爲汗也其氣開出當入太陰其性通明當入陽明倘陽明闔機不及者投之寧免走泄之失

○集方治傷寒（活人書）頭痛如破發熱無汗氣促者用連根葱白八兩生薑二兩水煮溫服初起一二日用此取汗○治（千金方）傷寒因交接勞復者腹痛卵腫用葱白二兩搗爛和入米醋一鍾白滚湯一碗調和飲之○治霍亂煩（深師方）躁坐臥不安者用葱白二十莖大棗十枚水二升煎一升溫和服○治喉（同前）痺不通腮頤腫脹用桔梗五錢甘草一錢水煎臨服時和入葱汁半盞徐徐飲之○治小便（本事方）閉不通小腹急墜用葱白三觔剉炒用帛盛二個更互熨摸小腹氣透即通也○治胎孕不安腰腹疼痛或胎上逼心坐臥不得用葱白一觔煮濃汁飲之未死即安已死（[illegible]）即出未效再服一方加當歸川芎各三錢同煮○治心（竹堂方）胃攻痛不拘寒熱蟲積甚至牙關緊閉欲絕者以老葱十莖搗爛入滚湯數匙帛裹絞汁半盞再和脂麻油廿餘匙灌入但得下咽即甦少頃蟲積皆化黄水而下永不再發○治奔（方脈正宗）豚瘕疝走痛上下用葱白一兩茯苓生薑各五錢胡盧巴三錢水煎服外再用葱白八兩搗膏炒熱用帛裹熨小腹臍間上下○治小（湯氏寶書）兒盤腸內釣腹痛用葱白一兩煎湯洗兒腹上再以葱白連鬚者三兩搗膏炒微熱貼臍上良久尿出痛自止○治腳（方脈正宗）氣內攻腹脹厥逆用葱白四兩枳殼檳榔牛膝各五錢大黃酒製附子童便製各三錢水煎徐徐灌之

○續補集方治陰（南陽活人書）毒腹痛厥逆唇青卵縮六脉將絕者用葱一大束去根及青取白三寸用線札成墩子烘熱安臍上以熨斗盛火熨之葱壞即止良久熱氣透入手足溫而有汗即瘥乃服四逆理中參附諸湯若熨而手足不溫不可治○治脫（華佗救急方）陽危證凡人大吐大泄之後四肢厥冷不省人事或與婦人交後小腹絞痛外腎收縮冷汗出先以葱白炒熱熨臍上再以葱白三七莖搗爛用酒煮灌之陽氣即回○治大（崔氏方）人小兒無故卒然死絕名爲中惡急取葱白心一二段刺入鼻孔中男左女右鼻中血出即甦○治水（聖濟錄）腫用葱白一把煮水二碗徐徐服當下水出病已甚困者取葱搗爛坐之○治諸（千金方）般癰毒疔毒以葱汁煎稠和煉熟蜜少許乘熱不時塗之○治腦（[illegible]）（談方）破骨折用葱白搗膏和生蜜少許再加小麥粉和勻厚封傷處效

薤白味辛苦，氣溫，性滑，無毒。可升可降，陽也。入手陽明經。（李氏曰：薤又名火葱，又名菜芝。生魯山平澤，今所在亦有。八月栽根，九月分蒔，宜肥壤之地。種法，一本率七八支，支多者科輒圓大，故以七八爲率也。狀似韭，但韭葉中實而扁，有劍脊；薤葉中空而稍圓，有稜線，似如葱。三月作花，細碎紫白色，不結實。爾雅翼云：薤似韭而無實也，亦不甚葷。古禮脂用葱，膏用薤，犬豕之屬脂，羊牛麋鹿之類膏，蓋物各有所宜，故薤與牛肉同啖，令人癥瘕是矣。蓋雖葷物，亦能去腥葷，很食之迷，虎啖之遺，鼠吞之毛落，狗嚼之反胃，獨與獸不相宜也。今圃人種薤者，每用大蒜置碗黃其中，久則種分爲薤。薤有赤白二種：赤者苦無味；白者肥且美，可供食餌，充藥用。閩人日作素蔬，飯僧供佛，交天祀神，非此不稱敬。別有一種水晶葱，蒜根葱葉，與薤相似，其臭不臭，亦其類也。按王禎農書云：野薤俗名天蒜，生麥原中，似薤而小，味益辛，亦可供食，但不多有。爾雅所謂山韭者是矣。綱目）

○薤白，溫陽煖胃，行滯氣，禁洩痢之藥也。（王好古）邵起寰曰：按李時珍言道家以薤爲五葷之一，其性溫補，服食家皆須之。又按杜氏詩云：束比青芻色，圓如玉箸頭，衰年關膈冷，味煖併無憂。又按王禎農書云：生則辛竦，能引涕唾；熟則溫補，能利陽道。蘊之不羸，嚼之有益，老者怡之，少者懷之，學道人資之，疾病人賴之。如孟氏本草云：服之可通神明，安魂魄，益中氣，續筋力。據此諸說，則薤之一物，補陽煖胃，非虛語矣。但溫辛性熱，如陰虛發熱病，不宜食也。

○集方：治赤白久痢，用薤白和白米煮粥，食之。（食醫心鏡）此方又治產後諸痢、小兒疳痢同法。○治痢腹刺痛、喘息欬嗽短氣者，（衛生方）用薤白八兩，枳實一枚，水二升，煮半升服。一方加半夏、生薑、枳實各五錢。（肘後方）○治卒中惡死，用薤白搗汁，灌入鼻中即省。○治產後諸痢，（[illegible]方）用薤白一把，同羊腎炒食。○治妊娠胎動腹痛，（古今錄驗）用薤白一兩，當歸五錢，水煎服。○治咽喉腫痛，（聖惠方）用薤根搗爛，熱醋調塗腫處。○治血向口鼻中出，如湧泉，諸藥止之不效者，用生薤白、生韭白、生薑各五錢，生地黃、生荷葉、生藕節、生茅根各一兩，俱搗汁冷飲之。○薤白湯：治一切腹痛之總司。腹痛有寒、熱、食、血、濕、痰、蟲、實、虛九般之別。用薤白三錢，香附、川芎、白芷、茯苓、黑山梔、陳皮、乾薑各一錢五分，水煎服。○腹痛綿綿，無增減者，寒也。本方加吳茱、木香、砂仁、肉桂。腹痛作痛乍止，口渴而小便澀者，火也。加黃連、黃芩、白芍、天花粉。腹痛而瀉，瀉而痛減者，食積也。加山查、枳實、蘿蔔子、厚朴。腹痛着一處不移者，是死血也。加桃仁、歸尾、玄胡索、川芎、肉桂、紅花。腹痛而小便不利者，是濕痰也。加蒼朮、豬苓、澤瀉、半夏。腹痛而鈞引脇下有聲者，是痰飲也。加蒼朮、南星、烏藥、木香、半夏、厚朴。腹痛而時止時作，而口唇紅者，是蟲積也。加烏梅、花椒、檳榔、苦楝子、牽牛頭。腹痛以手按之，腹軟而痛止者，虛也。加人參、白朮、當歸、黃耆、白芍、醇熟地黃。腹痛手不可按者，是實痛也。加枳實、檳榔、瓜蔞仁、大黃。

白芥子、味辛、氣溫、無毒。

（李氏曰、白芥生太原河東、但處處可種。今人如蒔芥法、以八九月下種、冬生苗、菜可食、至春深莖高二三尺、其葉花而有丫、如花芥葉、青白色、莖易起而中空、性脆、最畏狂風大雪、須用竹枝護設、乃免折損。三月開黃花、香郁、結角如芥角、其子大如粱米、黃白色。又有一種莖大而中實者、尤高、其子亦大、此菜雖是芥類、迥然別種也。入藥勝於芥辣子。）

○白芥子、化痰消痞之藥也。（孫思邈）沈孔庭曰、按李氏方云、辛能利氣、溫能發散、故其功用專於豁痰平逆氣、推爲上劑。如痰在膜膈關節之間、胸脇臟府之內、非此不能通達。古方控涎丹用此、正此義也。又按韓氏醫通云、凡老人苦於痰氣喘嗽、胸滿懶食、不可妄投燥利之藥、宜三子養親湯治之、隨手獲効。蓋白芥子主痰、而下氣寬中、紫蘇子主氣、而定喘止嗽、蘿蔔子主食、而消滯降氣、各微炒。研末、每劑不過三四錢、煮湯飲之。如大便素實者、入白蜜一二三匙、冬月加薑一二片、尤良。如陰虛勞瘵、血虛生痰之證、禁用之。

○集方、治胸膈痰飲。（摘玄方）用白芥子五錢、白朮一兩、爲末、棗肉和搗爲丸梧子大、每淸晨白湯下百丸。○治風濕涎痰（[illegible]）結成痞塊、外用白芥子爲末、醋調敷患上、內用白芥子爲末、神麴打糊丸梧子大、每服三錢、淸晨參棗湯下。○治痰火頑運、（普濟方）用白芥子、黑芥子、大戟、甘遂、芒硝、硃砂、各等分、爲極細末、神麴打糊爲丸、如梧子大、每食後服一錢、生薑湯下。○治冷痰痞滿、（日）用白芥子、黑芥子、大戟、甘遂、胡椒、肉桂、各等分、爲末、神麴打糊丸梧子大、每服一錢、生薑湯下。○治腫毒初起、（[illegible]集驗方）用白芥子、研末、醋調塗之。

治氣膈臌脹、名五子散、用白芥子、山查子、香附子、紫蘇子、白蘿蔔子、各五錢、微炒、共研爲細末、每早晚各食前服三錢、白湯調下。

治肺癰吐膿血、咳嗽面腫、用陳年芥菜滷久埋地中者、每日取十數匙、溫湯頓熱飲之、立愈。眞仙方也。

萊菔子，味辛甘，氣平，無毒。可升可降，陰中陽也。入手足太陰經。

蘇氏曰：萊菔南北皆有，北土尤多。有大小二種，小者肉堅，宜蒸食；大者肉脆，宜生啖。河朔有極大者，而江南安州、洪州、信陽者極大，重至五六觔，亦一時種蒔之力也。李氏曰：性喜燒土，隨地可植，夏末布種，秋末刈苗，冬末采根。春末抽薹，高五六尺，開細花紫碧色，夏初結角，其子如大麻子，紫赤色，圓長不等。其葉有大者如蕪菁，細者如花芥，皆有細柔毛。其根色白，其狀有大小長短圓扁。麤滑，上銳下尖，細腰巨腹，或尾又頭，有鬚無鬚之別。大抵生沙壤者，脆而甘淡；生肥土者，堅而辛辣，可生可熟，可菹可醬，可豉可醋，可糖可臘，可飯可羹，乃蔬中之最有利益者，與地黃同食，令人髮白。

○萊菔子，消食化痰，下氣定喘之藥也。（李時珍）陸平林贊曰：萊菔味辛性劣，有薑之操，有芥之烈，散血消食，下氣降痰，功劾甚捷。其子味更辛利，故日華方研汁飲，吐風痰，利大

小便，解積痢後重，又醋調敷，消腫毒，去脹滿，散跌撲損傷瘀血內結諸證，皆利氣之劾也。丹溪方謂蘿蔔子治痰有推牆倒壁之功，然其治痰，蓋本於利氣矣。如元虛氣弱之人，有痰喘氣閉者，當與補養藥同用，庶幾乎。

○集方：治老人痰氣喘嗽，用萊菔子合白芥子、蘇子，名三子養親湯，方見前白芥子韓氏方中。（勝金方）○治一切痰嗽喘急，用萊菔子一兩，爲極細末，甘草三錢，爲細末，煉蜜丸彈子大，黃昏或五更時，噙口內徐徐嚥之，痰自消，食自化矣。○治氣脹氣蠱，用萊菔子四兩，研，水絞汁，浸砂仁二兩，浸一夜，（衛生易簡方）炒燥，再浸炒，凡三四次，爲末，用一錢，米湯調服。○治瘡疹欲出不出，用萊菔子，生研末，米湯調服

一二錢。○治風痰壅閉，（已下六方方脉正宗）脹滿昏塞，用萊菔子二兩，生研末，白湯調和，絞汁飲，一切痰結立時湧出。○治大小二便不通，用萊菔子二兩，煎湯立通。○治痢疾有積，後重不通，用萊菔子五錢，白芍藥三錢，大黃一錢，木香五分，水煎服。○治腫毒疼痛不消，用萊菔子一兩，生研爛，和米醋調敷，消腫減毒氣。○治痰蠱食臌，用萊菔子一兩，生研爛，和米醋調敷臍腹上，漸消。○治跌打損傷，瘀血脹痛，用萊菔子二兩，生研爛，熱酒調敷，漸消。

治痢疾久不止，用萊菔子二兩，白酒一鍾，浸一宿，取起搗汁，和酒濾出，加蜜一鍾，同煎滾，調勻溫服，立止。

六聖膏，治一切痞塊積氣，癖疾肚大青筋，氣喘上壅，或發熱咳嗽，吐血衄血。用萊菔子、大黃、肥皂肉、生薑、生葱、大蒜頭，去衣，各八兩，右共搗爛，用水百碗，煎將乾，濾去渣，再熬汁成膏，黑色爲度，乘熱攤絹帛上，貼患上。

治小兒臍風撮口。用萊菔子、生薑、葱白、田螺肉各等分，共搗爛，搭臍四旁一指厚，炮住，一時，有屁下泄而愈。

論臍風多因斷臍之時，被風濕所侵，視按其臍必硬直，定有臍風，必自臍發出一道青筋，却分兩岔行至心必死。于青筋初發，急燈草蘸油燃青筋頭，并兩岔行盡處燎之，使截住不致攻心，更以外灸中脘三壯，內服萬億丸一二粒，以泄其胎毒也。

論撮口由胎氣挾風熱之邪入臍，毒流心脾，故令舌強唇青，聚口啼哭不得，當視其齒根之上，有小泡子，如粟米狀，急以針挑破，即開口便安。或用牛黃五釐，將白湯調滴入口即愈。

生薑，味辛甘。氣溫。無毒。氣味俱厚。浮而升，陽也。入肺脾腸胃諸經。

（李氏曰：薑，生漢溫池州、江西、浙江諸處，宜原隰沙地。四月取母薑種之。五月生苗，如初生嫩蘆，又似竹葉而稍闊，兩兩葉對生，葉亦辛香。無花實。性惡濕洳而又畏日，如秋熱則無薑。設一莖稍黴則根病矣。秋社前後新芽頓長，如列指狀。一種可生百指，皆分岐而上。仲宜取出母薑，否則子母俱敗。秋分采芽，脆嫩可口，霜降後則生筋而老矣。日乾即為乾薑。又春秋運斗樞云：璇璣下散而為薑。）（張元素　鄧起宸稿）

○薑能通神明，去穢惡，散風寒，和脾胃之藥也。蓋生用發散，乾則溫中。凡中風、中暑、中氣、中毒、乾嘔、霍亂，一切卒暴之證，用薑汁與童便和服，立可解散。然薑能開痰下氣，童便能降火也。又生薑性散，能驅肌表之風寒；乾薑性守，能攻腸胃之寒濕。生薑止嘔，而治泄瀉自利；乾薑止痛，而治臍腹攻疼。生薑佐大棗而厚腸胃，乾薑君黃連而瀉陰火。生薑配二陳而治痰尤捷，乾薑配歸、芎而治痢最良。然而血證不可用熱藥，以其血熱則行也。又於吐血、下血及崩漏，迫血妄行，反用炒黑乾薑以佐之，可以止血，其故何也？蓋物極則反，血去多而陰不復，使陽無所附，得炒薑之溫，助陽之生，則陰復而歸於陽矣，豈血有不止之理乎？又生薑為治寒之藥，而治火尤佳，若芩連之劑，以薑汁炒，使苦寒之劑因其從而治其熱也。何薑之不可用乎？大抵薑之一劑，從其性而用之可也。設使血證而遂用炒薑，必有悞投熱證而妄用生薑，必有悞治。而且病痔之人兼酒，立發癰瘍之證，多食則一生惡肉。豈曰薑能通神明，去穢惡，而槩用之乎。

○沈則施先生曰：按前賢成無己云：薑、棗味辛甘，專行脾之津液而和營衛，藥中用此，亦可逐邪出汗而解。而李時珍謂去邪辟惡，生啖熟食，醋醬糟鹽，糖蜜浸製，無所不宜，可蔬可茶，可果可藥，其用博矣。凡早行山行，宜嚼一片，不犯霧露清濕之邪，及山嵐不正之氣也。

金靈昭先生曰：按前賢朱丹溪云：薑本辛熱，炒黑則苦而平矣。能由陽入陰，由陰出陽，所以引氣藥入血分而補血，引血藥入血分而止血。如血虛發熱，產後大熱，必須用之。止血痢腸紅，及唾血、吐血、嘔血、下血，血脫面色白而夭不澤，六脉濡弱，有陰無陽者，大宜加之。如古方有用四君子，配當歸、熟地，加炒黑乾薑，而治氣虛血脫者；有用四物湯，配人參、黃耆，加炒黑乾薑，而治血虛氣弱者，有陽生陰長、陰和陽合之義云。

倪朱謨曰：生薑、乾薑，統治百病，不拘寒熱虛實，乃外感內傷，及不內外因諸證，寒則為桂附使，熱則為芩連使，虛則為參耆歸芍使，實則為枳樸檳陳使，從芒硝、大黃則攻下而行，從熟地、石斛則凝斂而止，從燥藥則燥，從潤藥則潤，應外用者，或擣汁塗，或擣渣熨，治病萬種，應變無方，顧人用之何如耳。惟癰瘍痔血之證，宜禁用之。

○集方（已下凡二方出方脈正宗）治中風痰迷，人事不清，用生薑一兩，半夏、人參、白朮各五錢，水煎服。○治中暑熱極煩渴，用生薑二片，黃

逆一錢，知母、石膏各五錢，甘草五分。水煎，臨服時，加童便一盞。○治中氣昏厥，亦有痰閉者，用生薑五錢，半夏、陳皮、木香各一錢五分，甘草八分。水煎，臨服時，加童便一盞。○治中一切禽獸蟲魚草木諸毒，用生薑汁半盞，和糞清半盞，微溫服。○治霍亂轉筋，不吐不瀉，用生薑汁半盞，和童便半盞，食鹽五分，調勻，冷服。○治感冒風寒，用生薑五片，紫蘇葉一兩，水煎服。○治泄瀉自利，用生薑一兩，烏梅五箇，煎湯調沙糖五錢，飲之。○治臍腹冷疼，用乾薑一兩，吳萸、砂仁各三錢，水煎服。○治吐血逆湧盈盆，用炒薑炭一兩，懷熟地、白芍藥各五錢，茯苓、羚羊角屑各二錢，甘草一錢，水煎服。如四肢厥冷，脉細欲脫者，加製附子、人參各五錢。○治嘔吐久不止，用炒薑炭、白朮各一兩，水煎服。○治時行寒瘧，用生薑四兩，白朮二兩，草果一兩，水五大碗，煎二碗，于未發時早飲。○治冷痰嗽，用生薑二兩，餳糖一兩，水三碗，煎至碗半，溫和徐徐飲。

續補集方，治暴（寇氏方）逆氣上，用生薑三片，嚼之立定。○治心（千金方）下痞脹兼嘔噦者，用生薑四兩，半夏二兩，水十碗，煮二碗，徐徐服。○治霍（外臺方）亂轉筋，入腹欲死，用生薑三兩，擣細，入白酒內煮滚，徐徐飲，以薑渣乘熱敷痛處。○治胸脇（陶氏傷寒心書）滿痛結實硬脹者，以生薑一觔，擣細，炒熱，布包，于患處欵欵熨之，冷再易。○治大（外臺方）便不通，用生薑醬內淹一日，削成尖條，納入穀道中。○治濕熱發黃（[illegible]），用生薑周身時時擦之，漸退。○治暴（寇氏方）赤腫眼，用古銅錢刮薑取汁，于錢上點之，次日即愈。○治諸（陶氏方）病舌上生胎，以生薑片蘸鹽湯擦之，自去。○治滿（[illegible]）口爛瘡，用生薑擣汁，頻頻汨漱，甚良。○治齒（普濟方）牙疼痛，用老生薑切成碎米，用枯礬等分，拌勻，時時擦之。○治刀（扶壽方）斧金瘡，用生薑擣極爛，敷上，扎定，次日即生肉。○治閃（[illegible]）肭手足，并跌撲內傷，用生薑和葱白擣爛，和麪炒熱，盦之。○治腫（[illegible]）毒初起，用老薑一塊，磨汁時時塗之，漸消。○治一（千金方）切禽獸百蟲咬人中毒，用生薑擣汁，外敷內服，自解。○治中（[illegible]）一切草藥食毒，用生薑擣汁半盞，徐徐飲之，即解。○治血（同上）痢不止，用乾薑炒成炭末五錢，眞阿膠、麥麪拌炒成珠六錢，甘草、川黃連各三錢，共爲末，和勻，每服一錢，米湯調服。

○薑皮味辛而散，去表寒，消浮腫，化痞滿腹脹之藥也。（李時珍）煎湯代茶飲，其效立見。

○薑葉味辛而溫，散水結，殺魚膾生冷諸積之藥也。（宗奭）擣汁和酒飲，其驗如神。

治陰毒傷寒，惡寒無熱，嘔吐泄瀉，呃逆吐蚘，口鼻冷氣，水漿不入，甚至大小便不禁，語言無聲，目睛凝定，四肢厥逆，身冷如冰，先用葱搗爛炒，乘熱熨臍上，如冷再炒換熨。內服加味理中湯：乾薑、大附子炮、人參、白朮、肉桂各一兩，甘草五錢，水煎，溫和徐徐灌之。

蒝荽、味辛、氣溫、無毒。可升可降、陽中陰也。入手少陰、足太陰、厥陰經。

（李氏曰、蒝荽南北處處有之。八月下種。初生柔莖圓葉、有花歧。根軟而白。冬春采之、香美可食。亦可作葅。立夏後開細花、淡紫色、如芹菜花。五月收子、如大麻子、亦辛香。於蔬菜中、子葉俱可用。生熟俱可食。宜肥地種之。）

○蒝荽、通心氣、辟惡氣、發痘疹之藥也。吳養元曰、此藥辛溫香竄、內通心脾、外達肢體。能辟一切不正之邪、能發一切鬱逆之氣。故痘瘡沙瘄發出不快透者、以此煎飲。又將根莖數枝、臥床上下左右懸掛、聞此香氣、即百邪可袪、百病可出。和胃散風、開鬱導閉。設有胡臭汗氣、天癸穢血之氣、用此大能辟除。若天令陰寒、兒體虛弱、用此最妙也。

○集方（袁氏方）治痘瘄出不快。用蒝荽三錢、煎湯飲之。如再不透、再用蒝荽二兩、切碎入礶內、以酒一壺煎滚沃之。以物蓋定、勿令洩氣。候冷去渣、微微含噴、從項背至足令遍、勿噴頭面。○治產後無乳（經驗方）用蒝荽煎湯飲之。○治小便（聖濟總錄）不通、用蒝荽煎湯飲之。○治中蠱毒（必效方）用蒝荽根擣汁半升、和酒服、立解。○治腸風（普濟方）下血、或赤白痢、用蒝荽五錢、甘草二錢、煎湯頓飲。未效再用。

○治小兒盤腸氣痛、則腰曲乾啼、頭上出汗者是也。此是感受風冷所致。急用蒝荽一把、葱白二十莖、煎湯熨洗其腹。良久尿自湧出、其痛自止。

芹菜、味甘、氣寒、無毒。沉也、降也。

（李氏曰、芹有水旱二種。水芹生江湖陂澤之涯。旱芹生陸地。又有赤白二種。二月生苗、其葉對節而生、似芎藭。莖有稜而中空。其氣芬芳。五月開細白花、如蛇牀花。楚人采以濟饑、其利溥哉。詩云、觱沸檻泉、言采其芹。）

○芹菜、解酒熱、丹石藥毒、烟火煤火之毒之藥也。黃正暘曰、日華子治五種熱疸黃病、婦人血熱暴崩、天行時火、煩渴諸證。蓋凉而清利之物也。調鹽醋食、可充蔬菜。如脾胃虛弱、中氣寒乏者、禁食之。二八月宜少食、恐蜥蜴虺蛇之精嘗伏其中、誤食多有病瘕者。

○集方、治已上諸病、俱用芹菜鹽醋調和食之、不配他藥兼用者。如治五種疸黃病、僅用米醋一味調食。鹽味鹹、又不可加入也。

蘹香、即茴香。味辛甘平。氣溫。臭香。無毒。可升可降。陽也。入手足太陰、少陰經。

（李氏曰，蘹香，深冬宿根發苗，叢生，似蒿，高三四尺，細葉纖緣似藻，五六月開花，花頭如傘蓋，又似蛇床花而色黃，結子似麥粒，有細稜而輕浮，俗呼小茴香，所在皆有，惟寧夏者稱第一。番舶來者，子大如柏實，裂成八瓣，一瓣一核，核似豆，黃褐色，臭更芳香，味更甜蜜，俗呼八角茴香，廣西左右江峒中亦有之，形與中原者迥別，第氣味相同，北人得之，咀嚼薦酒，入藥最良。修治者，焙燥研細用，八角者去梗及子。）

○蘹香，溫中快氣之藥也。方龍潭曰：此藥辛香發散，甘平和胃，故唐本草善主一切諸氣，如心腹冷氣、暴疼心氣、嘔逆胃氣、腰腎虛氣、寒濕脚氣、小腹弦氣、膀胱水氣、陰㿗疝氣、陰汗濕氣、陰子冷氣、陰腫木氣、陰脹滯氣。其溫中散寒，立行諸氣，乃小腹少腹至陰之分之要品也。倘

胃腎多火，得熱即嘔，得熱即痛，得熱即脹，諸證與陽道數舉，精滑夢遺者，宜斟酌用也。

○集方，治一切諸氣爲病，用小茴香一兩，炒，研爲末。每服三錢，不拘時，隨證用藥湯導引。○治心腹冷氣，用木香、吳茱萸。○治暴疼心氣，用玄胡索、香附。○治嘔逆胃氣，用砂仁、白朮、乾薑。○治腰腎虛氣，用杜仲、補骨脂。○治寒濕脚氣，用蒼朮、獨活。○治小腹弦氣，用荔枝核、橘核、川椒。○治膀胱水氣，用猪苓、澤瀉、木通、乾薑。○治陰㿗疝氣，用荔枝核、橘核、吳茱萸。○治陰汗濕氣，用蒼朮、蘄艾、木香。○治陰子冷氣，用肉桂、吳茱萸、製附子。○治陰腫木氣，用紅花、桃仁、肉桂、玄胡索。○治陰脹滯氣，用牛膝、木香、肉桂、龍膽草。○治卵核大，痾欲死，厥陰冷寒之氣，用肉桂、乾薑、木香、製附子。已上俱用小茴香爲主，隨證配藥一二錢，煎湯調服。出方脉正宗。

○治痔瘡痔漏方，痔者成癰未破也，宜服開鬱火、淸大腸藥；漏者潰出膿血也，宜服解毒淸火、調理氣血藥。（痔有五條，曰牡，曰牝，曰脉，曰腸，曰氣也。牡痔者，肛門邊發露肉珠，狀如鼠奶，時時滴潰膿血也。牝痔者，肛門邊生瘡腫突，一見膿潰即散也。脉痔者，腸口顆顆發瘟，且痛且癢，血出淋瀝也。腸痔者，肛門內結核，有血，寒熱往來，登圊脫肛也。氣痔者，遇七情怒氣即發，肛門腫痛，氣散即消也。又有酒痔，每遇醉酒即發，即腫痛流血。血痔者，遇大便則血出不止。諸痔若久不愈，必至穿穴爲漏矣。）許玄應口傳治痔煎藥方：用小茴香一錢，槐角子、玄參、黃柏、荊芥、苦參、白芍藥、當歸、生地、甘草、地榆、連翹各三錢，金銀花五錢，水二碗，煎一碗，

食前服。○又方，治痔瘡膿血內潰者，用小茴香末一錢，黑白牽牛子取頭末三錢，用獖猪腰子一個，剖開入藥末在內，線扎，紙裹，水濕，灰火內煨熟，去紙，空心嚼吃。忌飲食半日，至巳時腹中打下，先膿後血，毒氣出盡，永不再發。○內托丸，用小茴香五錢，黃耆、白朮、當歸、白芍、茯苓、熟地黃、川芎各一兩，人參、肉桂各五錢，煉蜜丸，空心服。外有熏洗方、斂生肌散，俱見馬齒莧下。藥線方，見草烏下。治痔漏只有一孔者，用此藥不過十日全愈。用小茴香一兩，白芷三兩，白礬一兩，三味共爲細末，鐵杓內鎔成餅，再炭火煅令烟盡，取出，去火毒，爲細末，用麪糊和爲錠，成條，插入漏內。（直透裏痛少止，每日用三次，七日爲止，餘日結痂而愈。）

羅勒、味辛。氣溫。微毒。可升可降。陽也。入手足太陰。手足陽明經。

（劉氏曰。羅勒。又名蘭香。菜。南北處處有之。有三種。一種似紫蘇葉。一種似生菜葉。一種葉大者極香。三種俱於三月種之。乃生。否則不生。嘗以魚腥水。米泔水。澆灌則香而茂。但不宜糞水也。宜畜旁水側濱極之。饑年亦可濟用。其子褐色。如蚕。七月收之。）

○羅勒、調中和胃。消食去惡氣之藥也。（劉禹錫）按吳瑞本草云。能辟飛尸。鬼疰。蠱毒。而李東垣、治牙疼口臭。神功丸。用此。但取其去惡氣而已。故飲膳正要云。與諸菜同食。味辛香。能辟腥氣。皆此意也。

○其子去目中翳障極驗。用羅勒子、洗晒。每納一粒。入眥內。閉目少頃。連膜而出。李瀕湖謂取子試之水中。亦脹大。蓋此子得濕即脹。故能染惹膜障浮膜爾。然目中不可着一塵。而此子可納三五顆。亦不妨礙。此一異也。

集方治汗出染衣。黃如栢汁。此名黃汗。其證發熱汗出而渴。身體浮腫。此因出汗時。受風冷水寒之氣。入于汗孔得之。宜服四仙散。用羅勒二錢。桂枝三錢。黃耆。白芍藥、各五錢。水酒各一碗煎服。

菜部（柔滑類）

薺菜、味甘。氣溫。無毒。

（吳氏曰。薺生野中。處處有之。其類有大小二種。小者莖扁。花葉亦小。味美。其最細者名沙薺也。大者根莖皆大而味稍苦。詩云。誰謂荼苦。其甘如薺者是也。冬至後生苗。正二月起莖。五六寸。開細白花。整整如一。結莢如小萍。而有三角。莢內細子。如葶藶子。四月收之。李氏曰。釋家取花莖作挑燈杖。可辟蚊蛾。謂之護生草。）

○薺菜、和中。利五藏之藥也。蔡心吾曰。甄氏方、取根葉燒灰。白湯調服二三錢。治赤白久痢極效。作羹食。亦利腸胃解酒積。去滯。而又能收斂浮氣也。花葉對生。整齊如一。故名薺。而又止齊一身之氣。故治痢去積滯。不行者可通。久痢多行者可止。蓋取此齊之之義云。

蒲公英、味甘。氣寒。無毒。沉也。降也。入足少陰經。

（李氏曰。蒲公英。江之南北平澤地上。他處亦有。嶺南絕無也。小科布地。四散而生。一莖直上。莖端開花。色黃如金。形如單菊而大。莖長三四寸。斷之有白汁。嫩苗可充蔬食。二月采花。三月采根。有紫花者。名大丁草。又一種相類而無花者。名地膽草。治疳各別。三種俱能制汞伏砒。）

○蒲公英、化熱毒。解疔腫癰瘍之藥也。（關北和抄）蘇氏方、治婦人乳癰結核。惡腫疔毒。同忍冬藤。用生酒煎服。一匝即安。貞仙方也。

○集方、治乳癰（蘇氏方）并一切惡毒。未成。一服即消。用蒲公英一兩。金銀花八錢。當歸三錢。瓜蔞、一箇連皮搗爛。乳香。沒藥、各一錢五分。甘草二錢。酒水各二大碗。煎碗半。徐徐服。（方脈正宗）○治牙齒不堅固。取蒲公英晒乾燒灰。擦牙妙。

莧菜、味甘，氣寒，性滑，無毒。

（李氏曰：莧有數種，有赤、白、大、小、家種、野生之不同。並以三月發苗，四月刈其嫩葉，作羹食。如六月以後，老則味苦，不堪食也。開細花成穗，穗中細子，扁而光黑，與青葙子、雞冠子各別。八九月收之。莖老者長四五尺。子生者，北人呼為糠莧，菜莖細葉，味比家莧更勝。水煮曬乾，亦可療饑。）

○莧菜，滑腸利結之藥也。陸平林曰：雲林方善治老人血枯氣結，大便不行，取金華醃豬肉，和莧菜煮食，即潤澤可通。又婦人胎前食此，可令易產。產後大便閉澀不通，食此亦可潤腸胃。如胃腸不實，大便溏泄者勿食。有蟲積脹滿病者勿食。又不可與鼈肉同食，食之生鼈瘕。取鼈肉切豆大，以莧菜封裹，埋土內一宿，盡變成小鼈也。

馬齒莧、味甘酸，氣寒，無毒。

（李氏曰：馬齒莧處處園野生之。柔莖布地，細葉對生。六七月開細黃花，結小尖莢，莢中細子，如葶藶子。初夏采其苗，煮曬乾，可為蔬食。似莧而實非莧。今以莧名者，因其形類、氣味與莧同也。又名五行草，其葉青，梗赤，花黃，根白，子黑也。韓氏曰：此有二種，葉大者不堪用，葉小者節間有水銀，每十觔有八兩至十兩者，故方士采取，別有法度，伏硃砂，結汞，煮丹砂，伏硫黃，死雄黃，制雌黃。又種水馬齒莧，生水中，形狀相似，亦可汋食。）

○馬齒莧，療三十六種風毒，又散血消腫，解毒，利大腸，滑胎氣，通淋結之藥也。（朱正泉）味本甘酸而性頗滑利，故孟氏方去風涼血，解毒利痰，通淋蠱，本於氣寒而性利也。如脾胃虛寒，與大便溏滑者，勿用可也。

○集方：（海上方）治三十六種風毒結瘡，用馬齒莧百觔，水二百觔，煮爛取汁，熬膏，不時塗之。○（永類方）治小便腫痛，用馬齒莧擣爛傅之。○（杜寶方）治產後血痢，小便不通，臍腹痛，用生馬齒莧四兩，擣汁三合，煎熬減半，和白蜜十餘匙，再煎百沸，每早晚隔湯頓服。○（鄧氏方）治痔瘡初起，用馬齒莧，水煮，和油醬食之，以湯熏洗，一月即愈。○治老人虛人、產後婦人大便閉澀不通，用馬齒莧煮熟，和油醬味食之。○（[illegible]）治小便熱淋，用馬齒莧擣汁一碗，空心溫和服。○（[illegible]方）治中蠱欲死，用馬齒莧擣汁一升，飲。○（孟氏方）治腹中有蟲，用馬齒莧一觔，水煮熟，調醋醬味食之，少頃白蟲盡出也。○治小兒臍爛不瘥，用馬齒莧燒灰，研細傅之。并治牙疳臭爛。○（千金方）治諸瘡久不瘥，用馬齒莧曬乾，燒灰，摻之。○（外臺方）治毛蟲蜂蠆螫人，赤痛不止，用馬齒莧擣爛塗之，妙。○（海上方）治筋骨疼痛不拘風濕寒氣，及楊梅毒，并婦人月信病，用馬齒莧二觔，五加皮半觔，蒼朮四兩，俱擣爛，以水煎湯洗澡，畢，隨用葱頭十個，生薑一兩，擣爛，泡湯二碗，服之，用綿被蓋取汗，立時痛止。○（食醫心鏡）治脚氣浮腫，心腹脹滿，小便澀少，用馬齒莧煮粥食之。

洗痔漏神方：用馬齒莧、茄根、葱頭各十餘莖，艾葉、五棓子、皮硝各二錢，花椒五十粒，右剉，水煎，先熏後洗，嘗時痛止。○治痔瘡潰爛，敗藥可止爛與濕，用馬齒莧曬乾燒灰一兩，輕粉二錢，寒水石煅、海螵蛸，水煮過，各五錢，共為極細末，敷摻患處，外用單油粉膏藥貼蓋，可收口。

薯蕷（又名山藥）味甘。氣溫平。無毒。入手足太陰經。（別錄曰。薯蕷生嵩山山谷。吳氏曰。今臨朐、鍾山、南康、蜀道、北都、四明、山東、江南、懷慶諸處。春取苗根。以黃土和牛糞作畦種之。苗長以竹稍作引。高一二尺。夏月頻灌之。李氏曰。入藥。野生者為勝。供饌。家種者為良。春生苗蔓延籬落。葉莖綠葉。葉有三尖。似白牽牛葉。更厚而光澤。五六月開花成穗。淡紅色。結莢成簇。三稜合成。堅而無仁。其子別結葉旁。狀似雷丸。大小不一。皮色土黃。內肉清白。煮食甘滑。春冬采根。生時鋤地如粉。乾則內實不虛。其色紫白如玉。青黑者不堪入藥。種植甚易。截作割片者亦生。醫所拵之簍而隊之也。南中一種。生山中。根細如指。極緊實。刮磨入湯煮之。作羹不散。味更甘美。食之尤益於人。勝於家種者。江浙閩中一種。根如薑芋。皮紫。極大者重數觔。煮食饌美。但氣寒於北地者。修治勿用平田生二三紀者。須要山中生經十紀者。其皮赤。四面有鬚者良。采得以銅刀刮去赤皮。洗去涎。再蒸過。曬乾用。）

○薯蕷養脾胃。益心肺。滋腎陰之藥也。按方龍潭（邵起寰抄）言。甘能和脾。甘能補肝。甘能除大熱。甘能益陰氣。如六味丸所以用此以滋陰也。如脾弱泄瀉。久痢腸滑。（養脾胃）如驚悸怔忡。健忘恍惚。（益心氣）如皮膚憔悴。乾咳無痰。（益肺氣）如夢泄遺精。腰膝痿弱。（滋腎陰）必須此藥治之。甘涼而補。為中正和平之用也。如東垣老人。君參朮以補脾。君參麥以補肺。君參歸以補心。君參地以補肝。君參杞以補腎。無毒可以嘗服。使之乳製尤妙。婁全善曰。肺為腎之上源。源既有滋。流豈無益。如八味丸所以用此以強陰而養陽也。又藥性論言能補五勞七傷。作粉調食尤佳。（已下方係自方係王宇）

○集方治脾弱泄瀉及久痢腸滑不禁。用山藥四兩。人參、白朮各二兩。三味用淨土一錢研細拌炒。北五味子、一兩。訶子肉二兩。俱炒燥研末。每服五錢。空心米湯調下。

○治驚悸怔忡。健忘恍惚。用山藥四兩。人參、一兩。當歸身三兩。酸棗仁五兩。俱炒燥研末。煉蜜丸梧子大。每服五錢。白湯送下。○治皮膚憔悴。乾咳無痰。用山藥四兩。人參、一兩。麥門冬、八兩。去心。知母、三兩。鱉甲二兩。湯泡洗淨。火燒醋淬。蓮子百粒。不去心。分作十劑。水煎服。○治夢泄遺精。腰膝痿弱。用山藥四兩。人參、一兩。枸杞六兩。懷生地、牛膝、木瓜、杜仲、破故紙各三兩。俱炒燥。牡蠣二兩。火燒。共（簡便單方）研末。煉蜜丸梧子大。每服四錢。白湯下。

○續補集方治膀胱骨瘍。用山藥、沙糖各等分。同擣。塗上即消。先以乾麪水調塗四圍。乃上此藥。○治項後結核（急救良方）或赤腫硬痛。用山藥二兩。萆麻子肉十個。同研傅貼。即消。○治手足凍瘡（儒門事親）用山藥一兩。研末。以豬肉湯調塗。

治肺癰膿血。頻唾咽乾。口渴面皮虛浮。用山藥、百合、薏苡仁、杏仁、川貝母、桑白皮、地骨皮、黃耆各三錢。枳殼、瓜蔞仁、當歸、桔梗、甘草各一錢。水煎服。喘急加蘇子。

百合、味甘苦。氣平。無毒。入手足太陰。手足厥陰。手足陽明經。

（別錄曰、百合生荆州山谷者良。今近道處處亦有之。李氏曰、二月生苗。一幹直起。葉如竹葉而短。衆葉環列。無旁枝。莖端開花。長四五寸。有二種。一丹黃色。闊紫黑斑點。初開內拱如桷。大旱翻列如毬。而不結子。別者紫帶間赤碧如月。根微苦。質亦轉甜。一純白如扈。連莖傾側。花瓣六出。夜間發香。清藹葉帶間。不着子。根肥而其形如胡蒜。重疊上餘瓣。二月八月采根。陰乾用。）

〇百合、養肺氣。潤脾燥之藥也。張仰垣曰、此藥根色純白屬金。根形疊瓣似肺。故元素方、治肺熱咳嗽。吐膿血。骨蒸寒熱。別錄方、治脾火燥結。大腸乾澀。四肢浮腫。胸腹臚脹。仲景方、治五藏神氣內亂。驚駭顛狂。傷寒熱邪。百合、行住坐臥不寧。大氏方、治心下急脹。脚氣癰腫。相火

暴發諸疾。已上衆病。悉屬氣虛。而火邪病藏之證。百合力能安定。倘如中虛胃寒。泄瀉不食。爲脹爲咳。爲陰躁陽潰。神散顛亂。諸證。此藥無與力也。

〇集方、（楊氏家珍）治肺熱咳嗽。吐膿血。兼骨蒸寒熱者。用新鮮百合八兩。配知母。川貝母。天門冬。麥門冬。懷生地。薏苡仁。北沙參各四兩。熬膏。煉蜜收。每早晚各服十餘匙。人參湯調服。〇（脈正宗）治脾熱便閉。火燥乾結。大小俱不利者。用新鮮百合、水煮爛。頻食妙。〇（金匱方）治脾熱氣滯。四肢浮腫。胸腹臚脹。大小不通利者。方同上法。〇治五藏神氣內亂。驚駭顛狂。及傷寒熱邪。百合。行住坐臥不寧。有四方。一方、百合知母湯。治傷寒百合病。行住坐臥不定。如有鬼附狀。已發汗者。用百合七枚。知母三兩。水八碗。煮取二碗服。一方百合雞子湯。治百合病已經吐後者。用百合七枚。水五碗。煮取三碗。入雞子一箇。青黃皆投入。煮數沸服。一方、百合代赭石湯。治百合病已經下後者。用百合七枚。代赭石一兩。滑石三兩。水五碗。煎取二碗服。一方、百合地黃湯。治百合病未經汗吐下者。用百合七枚。懷生地黃八兩。水八碗。煮取三碗服。〇（陳延之小品方）治傷寒百合病。或變渴。或變熱。或變腹滿。俱用百合四兩。煎湯頻頻飲。〇（方脈正宗）治相火暴發。心下急脹。或脚氣腫痛。或癰疽腫痛。用新鮮百合四兩。搗汁。和生白酒少許。溫和服。取渣可傅腫痛處。〇（外科方）治瘍毒腫脹不穿。用百合搗爛。和食鹽少許傅之。

良。〇（李氏家秘方）治天泡濕瘡。用新鮮百合搗爛塗之。一二日即安。

〇治諸燥結。大便不通。用百合一兩。當歸、生地黃。火麻仁去殼。各五錢。桃仁。杏仁。俱去皮。各三錢。枳殼。厚朴。黃芩各二錢。甘草八分。水煎早晨服。

（身熱煩渴。大便不通者。是熱閉也。本方酒煮大黃一錢。久病元虛。大便不通者。是虛閉也。加熟地黃、人參各二錢。羊肉二兩。因汗出過多。大便不通者。是津液枯竭而閉也。加麥門冬一兩。人參二錢。風證大便不通者。是風閉也。加防風二錢。蒺藜。天麻。枸杞子。郁李仁各五錢。老人大便不通者。是血氣枯燥而閉也。加熟地。枸杞子。各五錢。調服和人乳。或牛乳一鍾。虛弱人。并產婦。及失血。大便不通者。是血虛而閉也。加熟地黃一兩。多食辛酒炙煿辛熱之物。大便不通者。是實熱火閉也。加黃連。天花粉各二錢。菉豆二合。）

菜部（蓏菜類）

苦壺盧。味苦。氣寒。有毒。（李氏曰、苦壺盧、即苦匏也。南北處處有之。詩云、匏有苦葉。國語云、苦匏不材。於人共濟而已。皆指苦壺盧而言也。風俗通云、燒穰可以殺匏。或云、畜匏之家。不燒穰。畜瓜之家。不焚漆。物性相畏也。孫氏言服苦匏過分、吐利不止者、以黍穰灰汁解之。凡用苦匏、須細理瑩淨無黶翳者乃佳。不爾有毒。）

○苦壺盧、行水之劫劑也（宗奭）。張龍泉曰、前古治大水漬肌肉中。面目四肢浮腫。以此煎水飲。立消。故時賢諸方書。用治黃疸脚氣。及水脹不行之證。捷如桴鼓。如胃家實而能食者投之。却當。倘胃虛不能食。脾元虧損。而成水脹者。久病脾陽不運。而成腫滿者。誤服立見危敗。

○集方治大水脹滿（聖惠方）。頭面四肢腫大。用瑩淨好苦匏白瓤

捻如豆粒。以麪裹湯煮數沸。空心服七枚。至午即出水一斗。二日水出盡。大瘦乃瘥。須忌鹹味二年。○治通身（千金方）水腫。用苦匏膜二兩。苦葶藶一兩。俱炒燥。研為末。棗肉丸。如小豆大。每服五丸。白湯下。日二次。水下止後服。○治黃疸（必效方）腫滿。用苦匏瓤。如大棗許。以童子小便一合。浸一時許。取兩棗核大。納兩鼻中。深吸氣。待黃水出愈。○治胬（劉松石方）肉血翳遮睛。用小苦壺盧。陰乾。於緊小處鋸斷。內挖一小孔。如眼孔大。遇有此病。將眼皮上下。用手掙開。將壺盧孔合定。初雖甚痛苦。然胬肉血翳。皆漸下。亦不傷睛。○治九（千金方）瘻有孔。用苦匏四枚。大如盞者。各穿一孔如指大。湯煮十數沸。取一竹筒長五寸。一頭插匏孔中。一頭注瘡孔上。冷即易之。用數遍乃止。○治卒中蠱毒（肘後方）或吐血。或下血。如爛肝者。用苦匏一枚。水二升。煮一升服。立吐即愈。

○敗舊瓢。味苦。氣寒。平。無毒。（李氏曰、瓢乃壺匏破開作器用之。以苦瓢為佳。年久尤妙。）

○集方治中滿臌脹（方脈正宗）。用三五年舊陳壺盧瓢一個。盛酒於炭火上炙熱。浸之。如此炙浸半日。傾出酒。將瓢燒存性。研末。每服二錢。仍將瓢內原酒調下。○治腋下瘤癭（李救消方）用陳舊壺盧瓢一個。燒存性。研細末。未破者。茶蜜水調塗。即漸消去。已破爛者。乾摻上。即出水盡而愈。

絲瓜、味甘、氣寒。性冷。無毒。沉也。降也。（李氏曰、絲瓜南北皆有。二月下種。生苗引蔓棚架。其葉大如蜀葵。而多尖丫。有細毛刺。取汁可染綠色。其莖有稜。六七月開黃花。五出。其結瓜長三寸許。或有長二三尺者。有稜路。深綠色。有皺點。瓜頭如鱉首。嫩時去皮。可充蔬。老則大如杵。筋絡纏紐。如織經霜乃枯。惟可潔靴履。滌釜器。內有子。狀如栝樓子。黑色而扁。）

○絲瓜、凉血解熱。利大小二便之藥也。陳羽陵曰、色綠象水。味甘入脾。質柔入腎。性滑入大腸。故本草諸方、善止血痢。出癍疹。消熱痰。通利二便。亦取其質性冷滑。而下氣降火耳。如脾胃寒弱之人。中年腎陽衰怯。命門無火之證。須禁食之。

○集方、治腸風血痢。（許叔微方）并一切下血危篤不可救者。用霜後絲瓜燒存性、爲細末。槐花、一錢。炒人參八分。煎湯調服。

○治酒痢下血、腹痛。如魚腦、或五色者。（經驗良方）用絲瓜一箇燒存性。研末。空心白湯調服。○治痘瘡出不快。或初出或未出。（直指方）多者令少。少者令稀。用老絲瓜近蒂三寸。連皮燒存性。研細末。淡砂糖湯調服。（方脉正宗）○治風熱痰嗽。用老絲瓜一箇。煎湯頻頻飲之。○治大小二便熱結不通。（方脉正宗）用老絲瓜一箇。甘草二錢。木通三錢。煎湯頻頻飲之。

○續補集方、治坐板瘡。（衞生方）用老絲瓜擣爲末。燒酒調搽。○治天泡濕瘡。（同上）用絲瓜搗汁。調眞鉛粉搽之。○治手足凍瘡用老絲瓜擣末。臘猪油調搽。○治乳汁不通。（同前方）用絲瓜連子燒存性。研末。熱酒調服三錢。被覆取汗即通。○治小（劉）腸氣痛。遶臍衝心者。（松石方）用老絲瓜連蒂燒存性。研末。每三錢。熱酒調下。甚者不過三服即消。○治癬瘡。（普濟方）用絲瓜葉毛面擦之。○治牙宣露痛。（李氏方）用絲瓜藤一把。川椒五十粒。燈心百根。水煎濃汁。汨漱。其痛立止。○治腰痛不止（邵氏方）用絲瓜根擣爛。五錢。酒煎服立止。

葷辛類外。有蒜頭、蕓薹、菘菜、芥菜、蕪菁、蒔蘿、白花菜。○滑菜類外。有菠薐、蕹菜、生菜、萵苣、蕨菜、水蕨、薇芋、甘露子、竹筍。○蓏菜類外。有冬瓜、南瓜、菜瓜、黃瓜、苦瓜。○水菜類外。有紫菜、石蓴、石花菜、鹿角菜、龍鬚菜。○芝菜類外。有木耳、杉菌、香蕈、葛花菜、磨菰蕈、雞㙡、地耳、石耳共三十六種。俱詳載食物本草中。

本草彙言卷之十七

錢塘　倪朱謨純宇甫選集　男倪洙龍沖之氏藏稿
沈公棐定白甫校正　內姪沈九穀克全氏參閱

蟲部　卵生類

蜂蜜　味甘。氣寒。性潤。無毒。沈也。降也。入手足太陰陽明經。

按類書云。蜜蜂一名蜜蠭。爾雅翼云。蜜蠭似蠭而小。工作蜜也。山海經云。穀城之上足蜂蜜之廬。今土木之蠭亦各有蜜。北方地燥。多在土中。故多土蜜。南方地濕。多在木中。故多木蜜。又如杭之於潛縣。及金陵懷安諸處。山巖石壁中有巖蜜。亦蜜也。今人家所畜之蜂。小而微黃。大率腹相銜如繩縋也。喜事者以斵木容數斛。置蜂其中養之。開一小孔。纔容出入。宋嘉記云。七八月中嘗有蜜蜂羣過。有一二小蜂先飛覓止泊處。人知輒置一大桶。以蜜塗桶內。飛者聞蜜臭。便集。羣悉至矣。盧氏曰。今人家養蜂。或羣逐以百千萬數。中有大者為王。羣蜂聚之。從其所往。人收養之。多在穀雨春分時也。蜂采取百花。醞釀造蜜。其房謂之蜜脾。王之所居。疊積如臺。

蜂無王則盡死。君臣之體。生死不移也。一日兩出而聚鳴。春號為兩衙。其出采花者。取花鬚上粉置兩髀。惟甘月芍藥蘭蕙之粉。或負於背。或戴於首。如采無所得者。經宿花間。一不敢歸。或螫傷人。蜂亦尋死。故古稱蜂蠆有毒。近其房。則羣起攻人。冬無花采。蟄房內。即以蜜為食。春暖花朝。復出花采矣。蘇氏曰。宛陵有黃連蜜。色黃而味小苦。雍維間有梨花蜜。色如凝脂。亳州太清宮有檜花蜜。色小赤。柘城縣有何首烏蜜。色更赤。各隨所采花色。性之溫涼。亦相近也。蜜脾之底為蠟。埤雅云。蠟生于蜜。而天下之味莫甘于蜜。莫淡于蠟。蓋厚于此者必薄于彼。理之固然也。西方之書曰。味如嚼蠟。舊說蜂之化蜜。必取匽豬之水注之蠟房。而後蜜成。故蠟為蜜之蹠也。方言云。其大而蜜謂之壺蜂。即今黑蜂也。然亦釀蜜。楚詞所謂赤蟻若象。玄蜂若壺者是也。李氏曰。試蜜真偽。以燒紅火筯挿入蜜中。提出起氣者為真。起烟者為偽。修治。每沙蜜一觔。用水四兩。入銀石器內。桑柴火慢煑。掠去浮沫。至滴水成珠不散。乃用。又法。以器盛。置重湯中煑一日。候滴水不散。取用方佳。且不傷火也。孫思邈曰。七月勿食生蜜。令人暴下霍亂。味酸色青赤者。食之心煩。不可共葱及萵苣同食。令人下利。食蜜飽後。不可食鮓。令人暴泄。○沈氏曰。四方之蜜。氣味當以閩廣少霜雪。花多熱。蜜性則熱。川蜜性溫。西蜜性涼也。

○蜂蜜潤藏府。和營衛。通三焦燥火之藥也。（李時珍）陸平林曰。蜜。蜂采百花精英。醞釀而成。得草木雨露清陰之氣。故味甘。氣寒。性潤。質柔而利。久藏不壞。草木之華。水之精也。如前古主心腹邪結。及驚癇煩悶。甄氏主赤白痢疾。濇滯不通。日華子主腎陰虛燥。二便不行。諸證。（繆仲淳）凡和百藥。治燥病之因風因火因燥結者。用之甚佳。雖稱甘平補益之劑。但寒滑潤下之勢居多。如胃寒食少者。脾寒作泄者。大腸氣虛完穀不化者。嘔吐涎痰及中滿腹脹者。俱不宜用。生者有毒。尤不宜食。與生葱萵苣同食。令人利下。亦能損人。

○集方。（仲景方）治傷寒陽明病。自汗。小便反利。大便硬者。津液內燥也。以蜜煎導之。用生蜜二合。銅器中微火煎之。候凝如飴狀。入水內。乘熱捻作挺。令頭銳。大如指頭。長寸半許。候硬。納入穀道中。少頃即通也。○治心腹邪結及胃脘作痛者。（方脈正宗）用蜂蜜熬熟半盞。薑湯沖服。○治心虛內熱。（海上）以致驚癇煩悶者。用生蜂蜜滾湯調服五錢。○治赤白痢疾。（方脈正宗）脹滯不通。用白芍藥、川黃連、甘草、大黃各一錢五分。白蜜十匙。水煎服。○治產後口渴。（海上方）用蜂蜜煉熟。白湯調服三錢。○治橫生逆產。用川蜂蜜、麻油各半碗。煎滾。白湯和服。立下。○治一切惡毒疔腫。（秘驗[illegible]方）用生蜜少許。同葱白擣膏。塗患上。一時許。則疔出。後以醋湯洗去。

蜜蠟（俗名黃蠟）味甘淡，氣溫，無毒。氣味俱薄，陽也。入（手足）陽明經。（陶隱居曰：蠟生蜜中，故謂蜜蠟。蜂先以此爲蜜蹠，取蜜時得之。煉過，濾入水中，候凝取之。初時極香軟而白，久則轉黃色矣。如烊化內水中十餘遍，亦轉白色。外有一種白蠟，係小蟲延樹吐脂凝結成，與此蜂蠟不同也。）

○蜜蠟，濇腸止痢，托毒收膿之藥也。李氏曰：蠟，蜜之凝結於底者也。與蜜同出一源，而萬物之至味，莫甘於蜜，莫淡於蠟。蜜之氣味俱厚，屬乎陰也，故入脾；蠟之氣味俱薄，屬乎陽也，故入腸胃。蜜性緩而質柔，故潤藏府而利大便；蠟性嗇而質堅，故吸膿解毒而止洩痢。一類二物，有各異如此。古人僉歲以此度饑，但合大棗咀嚼，即易爛也。仲景方治痢有調氣飲，千金方治痢有調血湯，其效甚捷，但性本收濇，治虛寒久痢者宜之。倘暴痢火積不清者，不宜用也。

○集方：治赤白痢，小腹痛不可忍，下重，或面青，手足俱變者。（金匱調氣飲）用黃蠟、阿膠各三錢，同溶化，入黃連末一錢，和熱湯一盞，攪勻，分三次服，立驗。○治熱痢及婦人產後下痢。（千金調血湯）用黃蠟、阿膠各三錢，同溶化，入當歸末二錢，和熱湯一盞，攪勻，分三次服，立驗。○治諸瘡毒久爛，膿血泄而瘡口不斂。（外科方）用黃蠟一兩，溶化，將凝，入枯礬細末三錢，熬熱香油數匙，攪勻，捋成細小丸子。每服二錢，毒在上，食後服；在下，食前服；俱用熱酒送下。○治陰蝕瘡。（同上）用黃蠟、豬油各一兩，同溶化，加鉛粉、眞珠、冰片、蛀竹屑，俱研細末，葱白搗爛化，各三錢，同調入蠟油內，用鵝羽蘸漿搽之。○治內外臁瘡。用黃蠟一兩，豬油五錢，同溶化，入孩兒茶、鉛粉、龍骨、粉霜，共研極細末，調入蠟油內，作夾紙膏貼之。○治腳上凍瘡，風裂疼痛。（兆氏方）用黃蠟溶化，塗入裂中。○治犬咬瘡發。（蘭氏方）用黃蠟溶化，灌入瘡中。○治妊娠胎漏下血。（醫林集要）用黃蠟五錢，溶化，熱湯一碗，沖入，即服立止。

○蜂子，味甘，氣平，微有毒。（周子曰：乃蜜蜂子也。食之者，須用冬瓜、生薑、紫蘇，制其毒。○按蜜蜂有土、石、木三種，俱能釀蜜，其子皆可食，以充饌用。外有胡蜂，較蜜蜂稍大，其色有黃黑二種，於人家屋角上結房，小者如孔，大者如斗；結山林大樹間者，有大如巨鐘，其房孔數百層。土人采時，着草衣蔽身，以捍其攢螫，復以烟火薰散蜂母，飛去，斷其蒂，持歸入甑，蒸熱，取出蜂子，計五六斗或一石者。取出形如蠶蛹，瑩白者，以薄鹽微淹，暴乾，京洛以爲方物。如翅足具者，不堪食矣。然胡蜂子皆可食，大抵治病功能，以蜜蜂子性味亦不相遠也。外有一種七里蜂，黑頭鐵嘴，其窠如鵝卵，皮厚，蒼黃色，只有一個蜂，大如小燕子，其毒最猛，人馬被螫立死也。又一種蛒蜂，出巴中，在蛇穴內，其毒倍常，中人手足輒斷，中人心胸即圯裂而死，非藥可療。故元稹詩云：巴蛇蟠窟穴，穴下有巢蜂，近樹禽垂翅，依山獸絕蹤，微遭斷手足，厚毒裂心胸，昔有招魂客，應憐蜂螫碎，逢此胡蜂之毒如此。）

○蜂子，去大風癘疾之藥也。聖濟總錄方治大風癩疾，用諸攻毒藥，兼用蜂子，蓋亦足陽明太陰引經之劑。古人充饌品以進賓客，而本經別錄言能補虛羸傷中，諸證

○集方：治大風癘疾，鬚眉墮落，指節開裂，皮肉已爛成瘡者。用蜜蜂子五錢，炒，白花蛇、烏稍蛇俱酒浸，去皮骨，炙乾，全蝎、殭蠶、地龍去土，蠍虎、赤足蜈蚣各十五枚，俱炒，硃砂五錢，雄黃三錢，俱研極細末，冰片五分，共研勻。每服一錢，蜜湯調下，日二次。

露蜂房味甘苦鹹。性平。有毒。（蘇氏曰。露蜂房。懸山林大樹上。得風露者。其蜂黃黑色。一長寸許。螫人及牛馬皆至死。非人家屋下小蜂房也。小若如甕。如斗。大者如巨鐘。色淡黃。有層疊重頭斑紋。其竅有數百。及千眼者。修治。剪碎。酒浸一宿。火上炙用。）

○露蜂房。驅風攻毒。散疔腫惡毒之藥也。梁心如曰。蜂性有毒。螫人則痛極欲死。以其得火氣之甚也。故蜂房係胡蜂吐沫結成。亦非良物。如別錄方治風痺腫痛。及附骨惡疽。內癰疔腫。根在臟府。及歷節風疼。痛如虎咬。蓋取其以毒治毒之義云。若病屬氣血兩虛。無風毒外邪者。與癰疽潰後。元氣虛乏者。皆不宜服。

○集方。治風痺（宣明秘要）手足腫痛。用蜂房一兩。炒焦為末。蒜肉五錢。切片。醋浸七日。取出。同蜂房擣傅患上。○治風蟲牙（袖珍方）痛。用蜂房一塊。細辛一錢。煎湯漱之。○治重舌腫痛。（聖惠方）用蜂房、白殭蠶各等分。俱炒燥為末。酒調傅。○治疔腫惡（[illegible]）毒。用蜂房。半枝蓮各等分。煎湯飲。○治附骨（同上）惡疽及歷節風痛。用蜂房數兩。炒。搗末。酒調厚傅患上。○治小兒（楊氏）頭上軟癤頻作。用蜂房二兩。切碎。搗末。巴豆肉二十粒。香油內煎滾。俟豆枯浮。濾出清油。調蜂房末敷之。○治頭上癩瘡（聖惠方）用蜂房搗末。臘豬油和塗之。立効。○治乳癰（外科方）內結腫硬。不散不潰。用蜂房五錢。炒。水煎服。三四次愈

白殭蠶味甘鹹辛。氣平。無毒。氣味俱薄。浮而升。陽也。入足厥陰。手太陰。少陽經。（李氏曰。蠶蟲。屬陽。喜燥惡濕。食而不飲。三眠三起。二十七日而老。自卵出而為妙。自妙脫而為蠶。蠶而繭。繭而蛹。蛹而蛾。蛾而卵。卵而復妙。亦神蟲也。其種來南。居多西方。罕少。北方則無矣。蠶病風死。其體直殭。其色自白。死且不朽也。今市肆多用中濕死蠶。或用石灰末拌令白。服之為害最深。不可不愼也。雷氏曰。修治。用米泔浸一日。俟桑涎出。浮水上者。即掠去之。洗淨。後火焙乾。淨布拭去黃皮毛。并黑口甲。搗細用。）

○白殭蠶。驅風痰。散風毒。解瘡腫之藥也。夏碧潭曰。殭蠶。蠶之病風者也。挺直屬木。色白屬金。得金木堅清之化。故善治一切風痰相火之疾。如前古之治小兒驚癇搐搦。恍惚夜啼。李氏方之治大人中風。痰閉悶絕。人事不省。或喉痺腫塞。水穀不通。或頭風齒痛。腮頰硬脹。或皮膚風癢。斑疹疙瘩。或天行痘瘡。起發不透。或麻疹錯逆。隱約不紅。或痰瘧癥塊。寒熱併作。凡諸風痰。氣火風毒。熱毒濁逆。結滯不清之病。投之無有不應。蓋假其風氣相感而用之也。繆氏（仲醇）曰。此藥性本清散。其功長於祛風化痰。攻走經絡。散有餘之邪。凡大人中風失音。小兒驚癇夜啼。由於心虛神怯不寧。血虛經絡勁急所致。而無外邪為病者。忌之。

盧子繇先生曰。蠶。見蟲也。食而不飲。三十日乃化。三眠三起。起如衛氣之出行陽道。眠如衛氣之入行陰道。三十日大眠。則衛氣已周。周則變而化。此絲為經矣。不化者風。白為殭。故象形從治。內逆而為驚癇夜啼。伏匿而

爲痰風喉閉、齒痛頰硬、外顯痘疹之不明、及皮膚風癢之欲蛻者。此皆不能從蒸而變、順之使出以從化也。淮南子云、蟬飲不食。蠶食不飲。飲滋經氣、食益經隧。成從任督。四布經絡。變化相同。功能亦一也。

○集方治一切風痰喘嗽。用白殭蠶七箇直白者。薑汁調服。○治小兒驚風搐搦。并臍風口噤。氣促而聲不出者。用白殭蠶、蠍稍、天雄尖、附子尖各一錢。微炒。爲末。每服三分或五分。以生薑湯調灌。○治小兒夜啼。用白殭蠶一錢。微炒。爲末。每服三分。濃煎燈心湯化下。○治大人中風痰閉悶絕。人事不省。用白殭蠶一兩。人參五錢。俱微炒。研細末。生薑十片。搗爛。泡湯調服。○治喉痺腫塞。

水穀不通。用白殭蠶五錢。膽星一錢五分。共研極細末。每服三分。薑汁和白湯少許。調灌。○治頭風齒痛、頭頰硬脹。用白殭蠶一兩。薄荷葉、生半夏薑湯泡三次、荊芥、白芷、甘草各五錢。北細辛一錢五分。共研末。白湯調服三錢。○治皮膚風癢、斑沙疙瘩。用白殭蠶一兩。連翹、薄荷、荊芥、川芎各五錢。白芷、羌活、黄柏各三錢。共研末。每服三錢。燈心湯調服。○治天行痘瘡起發不透。用白殭蠶、蟬退、頂、頂薄荷、各二錢。紅花八分。水煎服。○治麻疹錯逆。隱約不紅。用白殭蠶、蟬退各一錢。連翹、桔梗、黄芩、薄荷、天花粉、玄參、石膏、甘草各七分。水煎服。○治痰痞瘀塊不散。漸成寒熱往來者。用白殭蠶、貝母、紫蘇葉各四兩。炒生半夏二兩。切片。薑汁拌炒。玄胡索、木香各一兩六錢。共研細末。真阿膠五錢。酒化成糊。拌入藥內。再加煮紅棗肉。爲丸梧子大。每服二錢。酒下。○治項上瘰癧。用白殭蠶二兩。炒研末。每服一錢。白湯調服。日二次。○治小兒蛔病。胸腹凸硬如碑。用白殭蠶四兩。炒研末。用白馬尿一碗。和拌曬燥。再用半夏麴一兩。研末。打糊爲丸梧子大。每服一錢。白湯化下。○治小兒鱗體、皮膚如蛇皮鱗甲之狀。由氣血否澁。亦屬胎毒。用白殭蠶一觔。蛇蛻四兩。共爲末。夏月每日取一撮。煎湯浴之。

○晩蠶沙味甘。氣溫無毒。可升可降。可行可散。入手少陽足太陰經。

（蘇氏曰、蠶沙、即蠶屎也。以晩蠶者良。李氏曰。須曬燥用、清水淘淨。再曬燥可久收不壞。）

○晩蠶沙祛風暖血之藥也。陸杏園曰、藏器方治緩風皮膚麻木。手足不隨。腰脚痿軟。兼治婦人血閉不通。或瘀結腹痛。以此浸酒飲極効。又按陶隱居云、蠶屬火。其性陽。能勝風去濕。故蠶沙主療風濕痺證。能活血舒筋。去瘀行滯。不但去風濕而已也。繆氏曰、如癱緩筋骨不隨。由於血虚不能榮養經絡。而無風濕外邪侵犯者。不服。

○東鄉老人曰、蠶神蟲也。卵育紙上。過冬用食鹽淹拌。蠶紙一層。鋪鹽一層。置露屋上。一月收藏。而春後始能發生。亦奇物矣。蠶蛾性淫。出繭即媾。至於枯敗乃已。別錄方言強陽道、益精氣。煖水臟。蓋本於此意。

○集方治緩風皮膚麻木，手足不隨，腰脚痿軟。又治婦人血閉，經脉不通，或癥瘕血結腹痛。用晚蠶沙一斛，炒黃，浸酒十壺，每日早、午、晚隨量飲數杯。其渣濾乾，再炒燥，用布包熨摸痛處，應効甚捷。（[illegible][illegible]蔡方）

九香蟲，味甘鹹，氣溫，無毒。

李氏曰：九香蟲產貴州永寧衛赤水河中，大如小指頭，身青黑色。至冬伏石下，取之。至驚蟄後即飛出，不可用。

○九香蟲，補脾腎，壯元陽，通膈脘滯氣之藥也。陸杏園曰：按攝生方烏龍丸，治上件諸證，久服益人，妙在此蟲之力也。

五倍子，味苦酸，性燥澀，氣平，無毒。氣薄味厚，斂也，降也。入手太陰、足陽明經。

馬氏曰：五倍子，在處有之。蘇氏曰：蜀中為勝。李氏曰：樹名膚木，生叢林中，木才僅高六七尺，有小蟲如蟻，食其樹汁，老則遺種，結小毬于葉間，正如蛅蟖之作雀甕、蠟蟲之作蠟子也。初起甚小，漸長如菱，或大如拳，形狀圓長不等。嫩時青綠，老則黃褐色，綴于枝葉間。宛若結成其殼，中空，堅而且脆，內有細蟲如蠛蠓。土人霜降前采取，蒸過貨之。否則蟲必穿破，而殼薄且腐矣。皮工造為百藥煎，以染皂色，大為時用。他樹亦有此蟲毬，不入藥用，木性殊也。

○五倍子，澀津收液，斂氣止血之藥也。（方龍潭）周憶齋曰：此藥結毬葉底，小則如黍，如粟，大則如菱，如栗，故名五倍子也。似蟲卵而不屬蟲卵，似果實而不屬果實，此屬假木氣以賦形者矣。如開寶方治齒宜疳䘌，口舌生瘡，是斂而去浮腐之氣也。治濕癬瘡癢，膿水淫潰，是斂而去濕熱之氣也。時珍方去赤眼濕爛，水淚膠膜，是斂而去火鬱之氣也。治頑痰留滯，咳嗽頻發，是斂而升其清，降其濁也。如寇氏方之治五痔下血，摻之即愈。藏器方之治腸虛泄利，投之即止。又如日華子之開喉痺，止自汗，化酒積，收脫肛，止欬嗽，生津液者，亦斂而收之，斂而降之，斂而止之，斂而聚之之意也。然而味之酸澀，質之堅脆，性之燥嗇，如咳嗽由於風寒外感，宜散不宜斂也。咳嗽由於肺火壅閉，宜清不宜斂也。瀉利由於食積停滯，宜導不宜斂也。瀉利由於濕熱痞滿，宜通不宜斂也。若悞服之，反致壅塞喘脹，以其酸斂太驟，火氣無從發越故也。

如勞損陰虛、咳嗽動血之證、亦不宜用、謂其性燥、能爍肺系故也。觀藥家作皂色、必需此用。然絲布服之、未久必致碎裂、可見。

○集方、（集簡方）治齒牙宜露、疳䘌作臭爛者、或小兒走馬牙疳者。用五倍子、炒焦、一兩、枯白礬、銅青、各一錢、爲極細末、先以髮箒、用米泔溫水漱淨、摻之。○治濕癬瘡癠、膿水淫漬、（同上）用五倍子、炒焦、枯白礬、各等分、研細末、猪油調搽。○治赤眼濕爛、（濟急方）水淚多眵、或有努肉翻出、用五倍子、二錢、打碎、銅青、三分、研碎、川黄連、五分、同滚湯泡出藥味、以軟帛蘸洗、一日二次。○治頑痰留滯、（方脉正宗）咳嗽頻發者、用五倍子、三錢、川貝母、二錢五分、五味子、一錢、共研細末、煉蜜丸、彈子大、夜臥噙口中含化。○治五痔及臟風下血、（集簡方）用五倍子、一兩、枯白礬、三錢、共研極細末、煉蜜丸、每早服二錢、白湯下。如五痔下血、外用此藥傅上、或煎湯薰洗、亦可。○治腸虛泄利、（方脉正宗）久不止、用五倍子、五味子、各一兩、白朮、補骨脂、骨碎補、各二兩、丁香、五錢、俱炒燥、爲末、飴糖丸、梧子大、每早服三錢、米湯下。○治喉痺腫塞不通、（同上）用五倍子、三錢、杏仁霜、二錢、硼砂、膽礬、各一錢、共爲細末、吹入喉間、吐痰即通。○治自汗盜汗不止、（方脉正宗）用五倍子、研末、米湯調塡臍中、縛定、一夜即止。○治酒積作痛作泄、（同上）多在食後發者、用五倍子、甘草、陳皮、各一兩、共爲末、每早服二錢、用海蟄頭一塊、煎湯調服。○治肛脫不收、（同上）用五倍子、煎湯溫浸、用軟帛輕輕托上、即收。虛人用人參一錢、煎湯服。○治行路作勞之人、（同上）口渴少津、用五倍子、五味子、人參、各三錢、爲極細末、煉蜜和丸、彈子大、隨時噙口內、即生聚津液。

○續補集方、治暑月水泄、（宗氏方）用五倍子、研末、飯丸黄豆大、每服三十丸、荷葉煎湯送下。○治孕婦漏胎、（朱氏方）用五倍子、炒、研末、酒服二錢、立効。○治耳瘡腫痛、（[illegible]上方）用五倍子、炒黄、研末、冷水調塗、濕則乾摻。○治牙縫出血不止、（衛生方）用五倍子、炒焦、研末傅之。○治天行口瘡、（良[illegible]方）用五倍子、黄柏、各等分、研末摻之。○治魚口便毒初起、（赤水玄珠）未成膿者、用五倍子、炒黄、研末、以米醋調塗患處、一日夜即消。○治頭上熱瘡、（衛生方）及風濕諸毒、用五倍子、白芷、各等分、炒黄研末、摻之、膿水即乾、如乾者、以香油調塗。○治諸瘡久不收口、（同上）用五倍子、焙燥、研末、以米醋調塗瘡口四圍、離瘡數分。○治烏鬚髮、用五倍子、製方見金石部紅銅條下。

○百藥煎、味酸鹹甘、氣平、無毒。（陳氏曰：用五倍子、鮮者十觔、搗細、如乾者亦可。配真茶葉一觔、甘草、桔梗、各八兩、俱焙燥、研爲細末、和入五倍子末內、再搗勻、入真酵水五觔、和勻、裝入缸內、用石壓實、七日後取出、再搗再壓、計搗壓共七次、計四十九日、捏作餅、曬乾用。）

○百藥煎、治病功能與五倍子同、但經釀造、其體輕虛、其性浮收、且味帶甘、專治上焦心肺痰嗽熱渴諸病、較之五倍子、更精妙。煉蜜和丸、入口含化、數分更善。

桑螵蛸、味甘。氣平。無毒。氣薄味厚。陰也。入足少陰、太陽經。（陶隱居曰、桑螵蛸、螳螂子也。李氏曰、螳螂馬首。脩長頸大腹。二手。四足。兩臂如斧。善緣而捷。以鬚代鼻。喜食人髮。能翳桑捕蟬。深秋乳子作房。粘着枝上。房名螵蛸者。狀輕驅如綿也。內重重有隔。房每房有子。如蛆卵。至芒種節後。一齊俱出。故月令有云。仲夏螳螂生也。螳螂逆樹便產。以桑上爲好。兼得桑皮之津氣也。）

○桑螵蛸、通血閉。利五淋。行小便。止遺溺之藥也。張盛吾曰、此藥得秋金之陰氣而產。兼得桑木之津氣而成。又遇芒種火令當時而生。故前古主通血閉。經阻腰痛。若五淋便閉。遺溺。若疝瘕遺精。白濁。凡屬肝腎胞絡相火鬱逆。血氣不和諸證。用之立應。

○集方、（方脈正宗）治婦人血閉腰痛。用桑螵蛸、三十枚。炒。研末。酒調服。○治五淋澀痛不通。用桑螵蛸、炒黃。三十枚。研末。車前子、煎湯服。○（方氏）治小便不通。用桑螵蛸、三十枚。炒黃。研末。黃芩湯調服。○（全嬰）治婦人遺尿。用桑螵蛸。酒洗。炒黃。龍骨各三錢。共爲末。每服二錢。牡蠣、煎湯調服。如妊娠遺尿、用米湯調服。如產後遺尿。用益母草。煎湯調服。○（聖惠方）治男婦疝瘕作痛。用桑螵蛸、一兩。小茴香、一兩二錢。共研末。每服二錢。花椒湯調服。○（方脈正宗）治遺精或白濁。用桑螵蛸、一兩。炒黃。研末。每服二錢。空心白湯調服。

蟲白蠟、味甘。氣溫。無毒。（李氏曰、蟲白蠟、產四川、湖廣、滇南、閩嶺、吳越、東南諸郡皆有之。以川、滇、衡、永產者爲勝。其樹枝葉狀類冬青。四時不凋。五月開白花成叢。結實纍纍。大如蔓荊子。生青熟紫。若冬青樹子則紅色少異也。其蟲大如蟣蝨。芒種後則延緣樹枝。食汁吐涎。粘着樹之嫩莖。化爲白脂。乃結成蠟。狀如凝霜。處暑後即剝取之。謂之蠟渣。過白露即粘實難剝矣。其渣煉化濾淨。或甑中蒸化。瀝下器中。待凝成塊。即爲蠟也。其蟲嫩時白色。吐涎作蠟。老則赤黑色。乃結苞於樹枝。初若黍米大。入春漸長。大如雞頭子。紫赤色。纍纍抱枝。宛若樹之結實也。蓋蟲將遺卵作房。正如雀甕螵蛸之類。俗呼爲蠟子。白如細蟣。一包數百。次年立夏日摘下。以箬葉包之。分繫各樹。芒種後苞折卵化。蟲延出葉底。復上樹吐蠟也。樹下要潔淨。最防蟻蟲食其蠟蟲。又有水蠟樹。葉微似榆。亦可放蟲生蠟。又有甜樹。亦可產蠟。又按類書云。唐宋以前澆燭入藥。所用皆蜜蜂蠟也。此蟲白蠟自元時人始制造用之。今則爲日用物矣。）

○蟲白蠟、止血生肌肉之藥也。朱丹溪曰、此藥色白屬金。稟受收斂堅凝之質。爲外科要藥。與合歡皮同入膏藥料中。爲止痛生肌長肉斂口之要劑。古方入丸散用。能殺瘵蟲。

○集方杖丹長肉方。用白蠟、黃蠟各二兩。黃連、一兩。以豬油一觔。熬黃連轉黑色。浮起去渣。入二蠟收之。每遇是患。用軟帛攤貼。紮緊自愈。

雀甕，味甘，氣平，有毒。

（陶隱居曰：雀甕爲楊樹子，大小如蠶，身背上有五色斑，狀如碑礫，文可愛也。通身四面皆有毛，能刺螫人。老者口中吐白汁，凝聚漸硬，結殼形如巴豆，在樹上，惟石榴樹上尤多。殼中成蛹，如蠶之在繭也。夏月羽化而出放子。如螫人，以毛刺人肉內，癢痛，用新絲綿搭之，毛刺即出。）

○雀甕子，治小兒急慢驚風，并臍風撮口之藥也。

○集方（聖惠方）：治小兒急慢驚風，口眼喎斜，搐搦痰盛。用雀甕殼三枚，去殼取汁，全蠍五枚，硃砂研細一錢，再共研勻，飯丸粟米大，每服三四丸，薑湯下。○治小兒臍風口噤。用雀甕子五枚，取汁，蜈蚣一條，燒存性，取汁和勻，每服二分，乳汁調服。一方加真鉛粉一分。

樗雞（又名紅娘子），味苦辛，氣平，有小毒。入足厥陰經。

（蘇氏曰：紅娘子出岐州，今汴洛尤多，形類蠶蛾。李氏曰：樗即臭椿也。此物初生，頭方而扁，尖喙向下，六足重翼，黑色。及長則能飛，外翼灰黄，有斑點，內翅五色相間。各樗樹上布置成行，秋深生子，六七月收曝乾用。）

○紅娘子，通血閉，行瘀血，破胎孕之藥也。陶隱居曰：此藥性味猛厲，爲蟲類之最酷者，方藥稀用，惟通經墮胎。草澤醫往往以此私利。戴氏曰：近世用治瘰癧結核，及風狗咬傷，并一切穢污淫毒，用此見效，與芫青、斑蝥同用，亦是活血散結之義也。何前人集神農本經，謂爲益精強志，生子補中之說，欺世害民，莫此爲甚，豈仁人濟世之書哉。

○集方（[illegible]方）：治瘰癧結核。用紅娘子十四枚，乳香一錢，黄丹一錢，砒霜、硇砂各六分，糯米粥和作餅，貼之，不過一月，其核自脫下，外貼長肉膏藥。○治風狗咬傷（[illegible]氏方），用紅娘子三箇，斑蝥五箇，並去翅足，乳香、沉香、桔梗各五分，共爲末。十歲者作四服，十五歲作三服，二十歲作二服，三十歲作一服，用豆腐漿食前調下。○治橫痃便毒。用紅娘子六箇，去翅足，取雞子一箇，開小孔，入紅娘子於內，飯鍋上蒸熟，去紅娘子，只食雞子，以酒過下，小便淋瀝出膿血即愈。

斑蝥味辛氣平有毒

（韓氏曰。斑蝥所在皆有之。聞氏曰。此一蟲有四變。二三月在芫花上。呼爲芫青。四五六月在葛花上。呼爲葛上亭長。七八九月在豆花上。呼爲斑蝥。十月十一月復遁地蟄。呼爲地膽。按芫青嘴尖。身青綠色。背上有一畫黃。葛上亭長頭赤身黑。額上有一點大紅色。斑蝥形如巴豆。背上有一畫黃。一畫黑。又有黃黑斑點。嘴尖。尖處有一小赤點。地膽冬月入蟄。在地中或墻石內。狀如大螞蟻。頭黑尾赤者。四蟲乃是一類。但隨時隨寓變狀耳。且治療亦相同也。而以地界分之。芫青處處皆有。惟寧州者上。葛上亭長處處皆有。出雍州者良。斑蝥處處皆有。出河東河內山谷者妙。地膽處處皆有。出文山校梁州者佳。）

斑蝥化瘰癧。托鼠瘻。爛疥癬。墮胎娠。通淋閉。潰死肌。解狂犬咬。以毒攻毒之藥也。李氏（瀕湖）曰。此藥專主走泄下竅而潰化筋膜死肌。故瘰癧、鼠瘻、癬瘡、淋結不通諸證用之。且瘰癧有根。使之拔出。瘡癬使之攻潰。淋結使之直至精溺之處。或如魚睛出。或如粉片出。或如腎膜出。或如血塊出。或如爛肉出。或如膠膿出。皆其驗也。但毒之在小便。必澀痛不可忍。當以木通、滑石、燈心、甘草、川黃連煎湯導之。倘用之不善。如潰傷肌肉。攻害藏府。崩敗血氣。爲禍有不可勝言者。宜詳慎用之可也。

○集方治瘰癧連串。用斑蝥一百箇。去翅足。巴豆肉三顆。去殼研去油。蜜陀僧一兩。火燒。郁李仁肉三兩。共研極細末。麪糊爲丸。如粟米大。每大人三分。童子二分。俱食後白湯吞下。日二次。未潰即消。已潰即收斂矣。治多年瘻瘡。服法同。○治多年頑癬。用斑蝥十個。微炒。爲末。蜜調敷一次即退。○治經閉有娠。不欲生育者。用斑蝥三個。微炒。研末。粥飲爲丸。清晨白湯吞下。即下。○治積毒內脹。小便淋閉不通。用斑蝥三個。去翅足。微炒。研末。白湯調服。○治癰毒內潰。外不破。或破而內膿不出。用斑蝥爲末。以蒜肉一片搗膏。拌和如豆許。貼毒上。少頃膿出即去藥。○治便毒（同上）不拘已成未成。用斑蝥三個。去翅足。炒。滑石三錢。同研。分作三服。空心白湯下之。一服毒從小便出。即消散。如小便痛澀者。以車前、木通、澤瀉、甘草各二錢。水煎服。○治風狗（衛生易簡方）咬傷垂死者。用斑蝥三七箇。去翅足。用糯米一勺。拌斑蝥七個。略炒微黃。去斑蝥。再以七個如前拌炒。復去之。再以七個如前拌炒。炒至米焦。青烟起爲度。去斑蝥。只以焦米研細。用冷水調入清油五六匙。攪勻服之。以小便利下毒物爲度。如不利。再如法製炒服。如利後肚疼者。用冷水調靛青一塊服。即解其毒。或煎川黃連一錢。冷服亦解。否則有傷人。一晝夜不宜飲一切熱湯酒也。

全蠍味辛甘，氣平，有毒。入足厥陰經。

（馬氏曰：蠍出青州、諸北路。山石中及人家室舍板壁牆堵處，南地絕無。形如䗪蝎，兩嵌有六足，尾長有節，其色青。生子已白，如稻粒，多負于背。全用謂之全蠍，用尾謂之蠍[illegible]。[illegible]蠍者，以木[illegible]合之即消。）

○全蠍，攻風痰風[illegible]也。陸平林曰：此物產於東方，色青尾長，乃肝木之屬，爲厥陰之用。故開寶方主小兒驚風搐搦，痰涎壅盛；或牛、馬、豬、羊、雞五般癇證；或大人中風口眼喎斜，或頭風眩痛，耳鳴耳聾；或便毒橫痃，風毒癰瘍；或遍身風癩，皮膚如鱗甲雲斑諸證，咸宜用之。乃辛烈攻走之性，爲能祛風逐邪，兼引諸風藥入達病所。如氣血兩虛，似中風證，及小兒慢驚慢脾風病，咸忌之。

○集方：治小兒初生斷臍，洗浴（全幼心鑑）風入臍，以致唇青口撮，

出白沫，不乳者，名曰臍風。用全蠍三個，微炒研末，入麝香一釐，生薑湯調服一分。○治小兒驚風，或胎驚天釣，（同上）或五般癇證，用全蠍二十個，以石榴剜空，納蠍于中，以頂蓋紙糊，微火炙燒存性，取中間焦者，入硃砂五分，麝香、冰片各五釐，研勻。每遇發者，取一二分，或乳汁調，或生薑湯調服。如大人中風口眼喎斜，或頭風眩痛，耳鳴暴聾，皆可醫治，可用五分。○治便毒橫痃，（外科方）或風毒癰瘍，或遍身風癩，皮膚如鱗甲雲斑，風癬諸證，用全蠍百枚，甘草五錢，俱微炒研末，每服七分，溫酒調服，服半月即愈。（方脈正宗）○治小腸疝氣，用全蠍十四枚，胡盧巴五錢，俱微炒，研末，每服一錢，溫酒調服。○治偏正頭風痛不可忍，（衛生寶鑑）用

全蠍二十一個，白頸蚯蚓六條，蜈蚣五個，俱焙爛，五倍子五錢，爲末，酒調貼痛處。○治久瘧經年不愈，用全蠍四十九個，白朮二兩，俱微炒，好黃土三錢，炒紅，共研末，飯丸梧子大，每服二錢，清晨生薑湯送下。

續補方：治男婦老幼腹中蟲積，（[illegible]和尚傳）歲時常發。用全蠍二十一枚，炒燥研末，配白牽牛末五錢，遇發時每服一錢，苦濃溫茶調下。○治小兒吐瀉不止，（同上）作慢驚風，疲困昏沉，默默不食。用全蠍二個，白附子、殭蠶、天麻、木香各五分，甘草、白茯苓、白芍藥各一錢，人參、白朮、黃耆各二錢，生薑三片，黑棗五個，炒黃米三錢，水煎服。○治小兒卒中惡毒，心腹刺痛，悶亂欲死，并驚風天弔。全蠍三錢，天麻、鈎藤、犀角屑、羚羊角屑、甘草、降眞香、沉香、鬼臼、茯苓各五錢，雄黃三錢，麝香五分，共爲細末，煉蜜丸，芡實大，每服一丸，生薑湯化下。

水蛭。味鹹苦，氣平，有毒。入足厥陰經。（陶氏曰：水蛭生河池中及溪澗陰濕之處，名螞蟥，色黃褐，間黑紋數道，腹微黃，背高，腹平，腰潤，兩頭尖節，有嘴吻者，可伸可縮，兩頭咂人及牛馬脛股，不遂其欲不易落也。雖熱湯烈火煅研成末，入水變生，育還子種於腹中者，嚙咬腸胃血氣，漸至腹痛黃瘦不食，速以田中泥一塊和水研化，飲一升，蛭隨必盡下也。蓋種類有三，曰山蛭、草蛭，入藥宜水蛭也。修治：五六月采取，用水浸一宿，暴乾，江豬脂同煎令焦黃用。）

水蛭，逐惡血瘀血之藥也。方龍潭曰：按藥性論言此藥行畜血、血癥積聚，善治女子月閉無子而成乾血勞者。此皆血留而滯，任脈不通，月事不以時下而無子。月事不以時下，而爲壅爲瘀，漸成爲熱，爲咳，爲黃，爲瘦，斯乾血勞病成矣。蓋此物係濕污濕物挾土化生，喜吮人血肉，故逐惡血血瘀、血癥血積之證，畜而無子，畜而成勞者，謂其衝任閼而成娠，血通而勞去矣。故仲景方入大黃䗪蟲丸而治乾血骨蒸，皮膚甲錯，咳嗽成勞者；入鱉甲煎丸而治久瘧瘧母，寒熱面黃，腹脹而似勞者；入抵當湯丸而治傷寒小腹硬滿，小便自利，發狂而屬畜血證者。前人立方固妙，後人引古示今，實遵先賢意也。○此治血瘀爲病之惡藥，且煅煉成灰，見水尚存生性，而復變爲水蛭，能嚙人腸胃血肉，爲害匪細也。繆氏（仲醇）曰：破瘀消血之藥儘多，足以選用，奚必用此難制之毒物而求効哉？如犯之，以淨黃泥三錢爲末，作丸，白湯吞之，必與泥同而出。

（集方（繆氏）烏髭鬚方：用水蛭十條，真錫粉一兩，爲末，拌之，再取白烏骨雞血一碗，入瓶中，納水蛭錫粉在內，封固，埋土內兩月取出，化成黑水，以豬膀胱皮包指蘸擦鬚髮中間根稍上下，皆黑矣。）

蟲部（化生類）

蠐螬。味鹹微甘，氣溫，有毒。可升可降。入足厥陰肝經。（別錄曰：蠐螬生人家堆積糞土腐草朽木中，大如趾，身短節促，背有毛，筋足長有毛，以背滾行，更捷如足。係濕熱之氣熏蒸而化，所謂蠑濕相育，不母而生是也。從夏入秋，蛻而爲蟬，飛空飲露，鳴聲高潔，此氣極則變也。）

○蠐螬，治惡血瘀血、血閉不通之藥也。湯濟菴曰：前古治血瘀痺氣，如仲景方之大黃䗪蟲丸，用此取其去脅下堅滿而痛；本事方之養血地黃丸，用此取其活血痺不通；如藥性論之取汁滴目中，而開翳障之復明；滴喉間而通喉痺之壅閉；又如齊嗣伯之取蠐螬，搗其脊背，銜口中，吐出涎水，用抹諸潰瘡成破傷風，以致垂死者，覺身麻汗出，無不生活；又同豬蹄作羹食之，通血道而下乳汁。蓋此藥能行血分，散結行滯，即活血瘀痺氣之意，如已上諸證，非關血瘀血痺不通爲病者，勿與也。

○集方（湯濟菴方）治惡血血瘀痺氣，脅下堅滿而痛，以大黃䗪蟲湯：用蠐螬、䗪蟲、虻蟲各一兩，俱微炒，水蛭十枚，油煎燥，乾漆、甘草各一兩二錢，俱微炒，桃仁、杏仁各二兩，俱去皮研，生地黃、白芍藥各三兩，黃芩、大黃各一兩二錢，俱酒洗炒，共爲末，煉蜜丸梧子大，每服七丸，早晚溫酒下。○（本事方）治血痺不通，爲月閉不行，爲癱瘓，爲攣掣，爲脚氣，爲鶴膝風，以養血地黃丸：用蠐螬焙、狗脊、地膚子、白朮、乾漆、車前子、川萆薢、山藥、澤瀉、牛膝、蔓荆子、山茱萸各一兩二錢，俱酒洗炒。天雄、懷熟地黃各一兩，俱切碎，童便和

酒煮爛。搗成膏。和前藥再加煉蜜少許。為丸梧子大。每早晚各服三錢。溫酒下。○治諸惡獸傷人成瘡。用蟾蜍不拘多少。搗爛塗之。

蚱蟬、味甘鹹。氣寒。無毒。可升可降。入手太陰、足厥陰經。

（李氏曰：蟬、諸蜩總名。夏月始生。自蠐螬腹育。轉相變化。昏夜出土中。拆裂殼背而出。亦有蜣蜋轉丸化生者。俱形大而黑。方首廣額。兩翼六足。五月始鳴。其鳴以脇。吸風飲露。溺而不糞。三十日而死也。古人多食之。夜以火取。謂之耀蟬。入藥。古人用身。今人用蛻。大抵藏府經絡宜用身。皮膚瘡瘍宜用蛻。各從其類也。又按陶隱居曰：按禮記云：仲夏蟬始鳴。即此蚱蟬是也。蚱蟬多息楊柳樹上。蚱者，蟬聲也。蟬者，變化相禪也。其類甚多。惟蚱蟬一物。入藥用。其外有蟪蛄、寒螿、蛁蟟、馬蜩、寒螿之名。如形小而色青紫。七八月鳴者，蟪蛄也。九十月鳴而聲甚淒急者，寒螿也。二月中鳴，似寒螿而形更小者，蝭母也。俱不入藥用。）

蟬蛻、祛肝經風熱。風毒之藥也。門吉士曰：蟬稟水土之

濁氣。化而成形。又得風露之清氣。動而飛鳴。所主所用。純乎厥陰肝木之應兆。故藥性論專主小兒驚癎夜啼。壯熱風搐。或天弔口噤。瘄疹不起。兼主大人頭風眩運。目昏翳障。或皮膚瘡疥。癮疹痛癢。已上餘證。皆屬風火風痰為眚者。必假此清空輕達之劑。以解而散之。發之出之也。別錄方又治婦人生子不下。或胎下而胞衣不落。藉此清虛善脫之物。而治胎產血穢未離之疾。蓋以已脫而治未脫之義也。

繆仲醇先生曰：蚱蟬稟水土之精。風露之氣。其鳴清響。能發音聲。其體輕浮。能出瘄疹。其味鹹寒。能解風熱。其性善脫。能脫翳障及女子胎胞不下也。

○集方治小兒驚癎夜啼。用蚱蟬蛻四十九個。去前截。用後截。微炒。為細末。每服五分。鈎藤一錢。煎湯調下。如壯熱發搐。薄荷一錢。煎湯調下。天釣口噤。全蠍一錢。煎湯調下。瘄疹不起。葱頭、麻黃一錢。煎湯調下。○治大人頭風眩暈。用蚱蟬蛻一百二十個。去後截。用前截。微炒。為細末。每服一錢二分。防風二錢。煎湯調下。目翳昏障。木賊一錢。煎湯調下。皮膚瘡疥。癮疹痛癢。用蚱蟬蛻前後截通用。微炒。為細末。每服一錢二分。金銀花三錢。煎湯調下。如婦人胎胞不下。用乳香、沒藥、川芎、當歸、益母草。各二錢。煎湯調下。

○續補集方治破傷風。用蚱蟬蛻一兩。炒研為細末。每早

晚各服一錢。白酒調下。外用葱數株。研爛取涎。調蟬蛻末。塗破傷處。即時出惡水。立効。○治疔瘡作癢。取蚱蟬蛻上身癢用上截。下身癢用下截。遍身癢遍身用。和甘草等分。微炒為細末。取梅樹嫩葉。煎湯調搽。○治痘後目翳。用蚱蟬蛻。遍身用。二錢。和羊肝煮熟。取羊肝食之。○治小兒無故陰腫。用蚱蟬蛻五錢。取下半截。煎水洗。或微炒為細末。白酒調搽。○治大人目盲翳障。用蚱蟬蛻上截一兩。密蒙花、白蒺藜、草決明、穀精草、甘菊花、懷生地、女貞實各一兩五錢。俱用酒洗炒。研為末。每服二錢。臨臥他壯。用熟羊肝蘸食。○治小兒風熱卒時急驚癎病。取蚱蟬蛻遍身用一兩。全蠍、伏神、殭蠶、鈎藤各七

錢。俱微炒。研爲細末。配硃砂、天竺黃、犀角、琥珀。各三錢。俱研極細末。眞牛黃三分。同前藥末總研勻。再用膽星二兩。研末。打糊爲丸。如龍眼核大。眞金箔爲衣。每服一丸。燈心、生薑泡湯調下。○治痘瘡血熱出不快。（保嬰家秘）取蚱蟬蛻、通身用。三錢。犀角、生地黃、紫草、連翹、金銀花、各二錢。甘草一錢。水煎服。○治小兒痧疹出不透。（同上）取蚱蟬蛻、通身用。三錢。石膏、鼠黏子、西河柳、薄荷葉、玄參、甘草、乾葛、桔梗、前胡、各二錢。水煎服。

蟬花味甘，氣寒，無毒。即蚱蟬之頭上有一角。如花冠狀。入藥較之蛻更奇。禮記所謂蟬而有緌者是也。緌冠纓也。蘇氏曰。蟬花出蜀中。

○治一切耳痛。用蟬脫、石菖蒲、各三錢。水煎服。○耳者腎之竅。心氣亦相通也。腎虛則耳鳴。耳聾。加生熟地黃、當歸、白朮、酸棗仁、石菖蒲、耳暴聾者。肝熱氣閉也。加當歸、白芍、石菖蒲、龍膽草、柴胡。耳聾而頭眩目花者。色慾動相火也。加生熟地黃、枸杞子、黃柏、知母、山藥。兩耳腫痛者。肝腎有風熱也。加荊芥、防風、連翹、柴胡、白芷、黃芩。兩耳潰膿不乾者。肝腎有火鬱也。加黑山梔、白芍藥、黃柏、白芷。久潰不斂。加桂枝、黃耆、白芍藥。外用吹耳散。治兩耳濕爛。方見龍骨條下。

螻蛄。味鹹，氣寒，有小毒。（李氏曰。螻蛄、處處有之。穴地居糞壤濕土而生。有短翅四足。立夏後。至夜則鳴。聲如蚯蚓。月令四月螻蟈鳴。即此也。雄者善鳴而飛。雌者腹大羽小。不善飛翔。吸風食土。喜就燈火。或云。火燒地赤。置螻蛄於上。任其跳死。覆者雄。仰者雌也。入藥用雌。更炒去翅足。）

○螻蛄行水道。利大小便之藥也。（集雲林）顧汝琳曰。此得濕土穢濁化生。性善鑽利。故本草專主水藏壅逆。水道不通。二便閉脹欲死。或水氣泛溢。致成水腫脹滿。腹大如鼓。面浮喘急。不得臥者。服此停水大行。脹消喘定。但此物攻利甚急。虛人忌用。必不得已用此中病。即止。水行之後。宜大劑補養藥投之。庶無後患也。

○集方。治十種水病。（聖惠方）腹脹喘促不得臥。以螻蛄五枚。焙乾

爲末。食前白湯服一錢。小便利爲效。楊氏、（楊氏家藏）加甘遂末一錢。商陸汁一匙。取下水爲效。忌鹽一百日。○治喘鼻消水。面浮甚者。用螻蛄一個。輕粉二分半。爲末。每嗅少許。入鼻內。黃水出盡爲妙。○治小便不通。（葛洪方）用大螻蛄二枚。取小體者。搗爛。以白湯一盞。調飲。須臾即通。○治大小（普濟方）便閉。經月欲死者。用螻蛄五枚。瓦上焙焦。爲末。以白湯調飲一服神效。○治胞衣不下。（延年方）困極腹脹則殺人。用螻蛄三枚。水煮二十沸。灌下。咽即出也。

血周歲不行。用螻蛄二個。搗爛。綿子裹。塞陰戶內。一日即通

蜣螂。味鹹。氣寒。有毒。沉也。陰也。入手足陽明。足厥陰經。（別錄曰。蜣螂生長沙池澤。其類有三四種。以大而鼻頭高者。目深。背有玄甲者爲眞。李氏曰。以土包糞。轉而成丸。雄曳雌推。置於坎中。覆之而去。數日後。小蜣螂孚乳于中也。腹翼下有小黃子。附母而飛。晝伏夜出。見燈光則來。狐喜食之。宜入藥用。小者身黑而暗。晝飛夜伏者不堪用。修治。以五月五日收之良。臨用去足。火炙乾用。）

○蜣螂。去奔豚瘕積之藥也。深心如曰。此物稟水濕陰垢糞土之氣而生。吐唾推弄成丸。化生之物也。故農皇主奔豚瘕積。緣血氣留據而成病者。假此氣化爲形之物。而治氣化搏結者。投之立解。如別錄方之塞下部。引出痔蟲。日華方之傅惡瘡。拔呼疔毒。藏器方之行血墮胎。李時珍方之化鼻中息肉。小兒重舌諸證。皆取其鹹能軟堅。毒能攻毒。化生以成形。而治化生以成病者。如奔豚瘕積。痔蟲疔毒。息肉重舌。自消解矣。繆氏（仲淳）曰。此藥外用易臻厥功。內服非虛人所宜。有毒故也。非不得已勿輕試。

○集方（方脈正宗）治奔豚瘕積。舉發不常者。用蜣螂。三枚。去翅足。火炙乾爲末。酒調服。○治五痔（同上）有蟲者。用蜣螂。搗爛。塞穀道痔旁。引蟲盡出。痔永瘥。○治一切（廣利方）惡瘡疔毒。忽得人不識者。用蜣螂。搗汁塗之。○治疔（劉氏方）瘡欲死。用蜣螂心。貼半日。再換貼。血散疔自出。即愈。蜣螂心在腹下。度取之。其肉稍白是也。○治鼻中（同上）息肉。并小兒重舌。用蜣螂。三箇。炙乾。爲末。入冰片五厘。研細。傅之。即消。○治腸漏（小橘方）出水。用蜣螂。十枚。陰乾。入冰片少許。研細末。用紙撚蘸末。入孔內。漸漸生肉。藥自退出。即愈。不拘蜂瘻。鼠瘻。亦可用此。○治轉胞（千金方）大小不通欲死。用蜣螂。炙乾。爲末。白湯調服立通。

（萬病回春）治氣膈噎脹。并翻胃噎食。用土裹一個。即蜣螂所滾之彈丸。凡糞土之下。皆有。用彈中有白蟲者。如指大。如蠐螬一樣。將彈丸少破一點。仍蓋住。用火煅過。大黃色存性。不要燒焦。再配孩兒茶。二分。金絲黃礬。三分。麝香。一分。朱砂。四分。將土彈共四味藥一併總研爲極細末。燒酒調。空心服。如覺饑。用稀爛薄米粥。漸漸少進。一日二三次。不可多吃。一日徐徐進一二碗足矣。俟五七日。漸漸加進粥食。忌生冷煎炒。葱蒜酒麫。炙煿厚味。肥甘之物。及氣惱。五十歲後。二服即效。

䗪蟲、味鹹。氣寒。有毒。（陶隱居曰、䗪蟲又名地鼈。因形扁如鼈、故名。生人家墻壁下土中濕處。無甲而有鱗。八足。鼠如甚云。）

○䗪蟲、破血積癥瘕、行血閉、寒熱之藥也。深心如曰、此物得濕土之陰。受幽暗之氣。故其性有小毒。以刀斷之中有白汁如漿。湊接半日。即復聯續而能行動。故今人以之治跌撲損傷、續筋骨、有奇効也。張仲景治雜病方、及久病積結、有大黃䗪蟲丸。治瘧疾久發成瘧母、有鼈甲丸。並用此。以其有破堅下血之功也。又接骨科治折傷筋骨、先以手整定骨節原位。次用好酒研爛。調服二三枚。即完固。亦不痛矣。如無瘀血留積者。不宜用。

○集方、治產後腹痛、有乾血癥瘕者。（張仲景）用䗪蟲二十枚、去足、炒。桃仁二十枚、去皮研。大黃一兩、酒煮、搗爛成膏、（張仲景）和為丸如彈子大、每早服一丸、酒下。○治久瘧成瘧癖、䗪蟲、蜣螂、蜂窠、俱炒各二兩。桃仁、白芍藥、牡丹皮、厚樸各三兩。桂枝、大黃、紫葳、乾薑、人參、瞿麥、半夏、俱炒各一兩。赤硝一兩五錢、共為末。以鼈甲二觔、酒一斗、煮乾、以鼈甲桑爛如膠、和丸梧子大、每日空心服百丸、米湯下。（張仲景方）

○治折傷筋骨、用䗪蟲焙燥為末、每服三錢、酒下。立効。一方用生者、和酒研汁服、亦可。

蜚虻、味苦。氣微寒。有毒。沉也。降也。入足厥陰血分（別錄曰、蜚虻生江夏川谷。凡牛馬所在、都有之。寇氏曰、形類蜜蜂。腹凹褊、黃而微綠色。嘴銳而利、若鋒鑽然。春半後、秋半前出。暑月繁多。腹飽有血者良。入藥去翅、炙乾用。）

○蜚虻、破逐瘀血之藥也。程君安曰、按此物性善嚙牛馬及諸畜血。而用以治血瘀、血閉、血脹、除賊血在胸腹五藏者、因其性而為用也。故別錄方治女子月水不通、積聚而成癥瘕痞塊、寒熱疼痛、投此立除。又傷寒畜血發狂、仲景用抵當湯丸、及乾血勞證、用大黃䗪蟲丸。二方中咸入之、以其散藏府宿血結積、有神効也。又按繆氏（仲淳）曰、蜚虻其用大畧與䗪蟲相似、眞毒物也。又按仲景云、如傷寒發黃、脈沉結、小腹鞕如、小便不利者、為無血、非畜血也、不宜用也。瘀血未畜的確者、不宜用也。女子月水不通、由於脾胃薄弱、肝血枯竭、而非血結閉塞者、不宜用也。腹中有癥瘕積聚、而兼有妊娠者、不宜用也。凡久病氣血虛甚、形質瘦損者、不宜用也。

○集方、治傷寒太陽病、身黃、脈沉結、少腹鞕、小便自利、其人如狂者、用抵當湯丸。○治血瘀閉、乾血虛勞、羸瘦、肌膚甲錯、兩目黯黑者、用大黃䗪蟲丸。二方俱見䗪蟲條下。

蟲部（濕生類）

蟾酥。味辛苦，烈氣熱，有毒。可升可降，通行十二經絡、臟腑、膜原、谿谷、關節諸處。（李氏曰：蟾蜍，鍰頭大腹，促眉濁聲，皮上多痱癗，生江湖陂澤及人家園囿陰濕處。五月五日取得，用繩縛倒懸，乾死，剉碎用。○古人取蟾酥，以油單紙裹蟾眉擠之，酥在紙上，陰乾用。今人取蟾酥，用蒜肉及胡椒末納蟾口內，則蟾身白汁出，以竹篦刮下，麪和成塊，乾之，亦可用。其汁不可入目，令人赤腫盲。）

○蟾酥，療疳積，消臟脹，解疔毒之藥也。湯濟菴曰：按李時珍言，蟾蜍，土之精也。上應月魄而性靈異，穴土食蟲，辟伏山精，故能化解一切瘀鬱壅滯諸疾，如積毒、積塊、積脹、內疔、癰腫之證，有攻毒拔毒之功也。然味辛辣而麻，入口舌即癩，不有毒之物耳，不可多用。

○集方：治疳積（全幼方），骨瘦面黃，腹大肢細，或好食泥土。用真蟾酥一錢，酒二三匙浸化，硃砂一錢，麝香五分，俱研細，和入蟾酥，研爲丸，如麻子大。空心服一丸，白湯吞下。三十（今方）丸全愈。○治一切臟脹。方見本部蜒蚰條下。○治一切（醫鑑）疔毒垂死。用蟾酥一錢，取酒二三匙浸化，硃砂、銅青、乳香、沒藥各一錢二分，研極細，取大蜒蚰二十個，共研，丸如麻子大。每遇此患，服五七丸，葱頭湯吞下。

蝌蚪。（李氏曰：蝌蚪，蝦蟇青蛙之子也。二三月蟇鼃曳子于水際草上，纏纏如索，有黑點，漸至春水時，鳴以聒之，則蝌蚪皆出，大如豆，背狀如河豚，頭圓身黑，始出有尾無足，稍大則足生尾退。）

○蝌蚪，染鬚髮之藥也。趙天民曰：按草氏方，取蝌蚪子和青胡桃皮，入磁罐研細和搗如泥，染鬚髮即黑，百日不變。又方：取蝌蚪黑者，搗汁，和勻入磁罐內，密封埋土，百日化泥，取塗鬚髮，即黑如漆也。

蜈蚣。味辛，氣溫，有毒。入手足厥陰經。（李氏曰：蜈蚣生南方，處處有之，生土石間及人家屋壁中，形如馬陸而光黑，綠色，足赤，腹黃，雙鬚岐尾，節節有足。春出冬蟄。南方山谷中，有極大長尺者，能制毒蛇。性畏蜘蛛，蛛遇之即死。修治：火炙去頭足用。外有千足蟲，真相似，只是頭上有白肉，面并嘴尖，把着腥臭入頂，誤用能致人死。）

○蜈蚣，治小兒驚癇風搐、臍風口噤之藥也。金自恒曰：此藥性烈有毒，能驅風攻毒。蓋行而疾者，惟風與蛇，蜈蚣能制蛇，故亦能截風。如楊士行方治風痰風毒，若瘰癧便癰，小兒風癇痰厥，并臍風口噤等疾，咸需用之。別錄又治心腹惡血積聚，血癥血癖，寒熱面黃，又能去瘀血也。已上諸證，惟風氣暴烈，血瘀血毒，爲患者可以當之。如屬血虛生風，血熱成毒者，宜斟酌投之。

聖濟錄云：嶺南蠻烟瘴雨之鄉，多毒蛇氣，人有觸之，頭腫連喉，水漿不利，寒熱頭脹。用赤足蜈蚣一條，研細，白湯調服即愈。據此則蜈蚣之治蛇蠱、蛇毒、蛇瘕、蛇傷諸病，皆此意也。

○集方：治小（直指方）兒急驚風癇，臍風天弔，眼反白睛，角弓反張，聲不出者。用蜈蚣一條，炙乾爲末，硃砂、輕粉各一錢，麝香五分，共研勻，用乳汁調灌一分，再取一分，吹兩鼻孔。

○治瘰（救急方）癧潰爛不收。用蜈蚣一條，炙乾爲細末，每日用少許傅之。

○治便（濟生秘覽）毒初起。用蜈蚣一條，炙乾爲末，酒調空心服。

○治腹（衛生方）內有惡血積聚，血瘕血癖，面黃，寒熱，腹脹不食。用蜈蚣三條，炙乾爲末，酒調，空心作三次服。○

治腹內蛇瘕（肘上）是悞食菜中蛇精。或食蛇肉成瘕。腹內常饑食物即吐。（治人心鏡）以蜈蚣三條、炙乾、研末。酒調空心作三次服。○治無故腹大如箕、用蜈蚣、三條、炙乾、爲末。入雞子內攪勻。封固。蒸熟食之。

蚯蚓、味鹹、氣寒、有毒。

（李氏曰。蚯蚓、處處墾地多有之。孟夏始出。仲冬蟄結。雨則先出。晴則夜鳴。入藥以白頸者良。或搗爛或曬乾用。）

○蚯蚓、療傷寒陽明伏熱狂謬之藥也。須四可曰。此藥得土中陰水之氣。性大寒。善降而下行。善治一切風痰熱痰諸疾。陳藏器治大人天行熱狂。小兒熱病癲癇急驚風搐。等證。大抵攻病用有毒之劑。中病即當止。勿過服也。性有小毒。如被其毒者。以鹽水飲之即解。

○集方、（肘後方）治傷寒陽明熱結。六七日。狂亂見鬼。以大白頸蚯蚓、二兩。搗爛。童便、一碗。調和。絞汁飲。○（普濟方）治小兒急驚。癲癇風搐。用大白頸蚯蚓、三條。搗爛。薄荷一兩。煎湯。調和。絞汁飲。○（千金方）治小便不通。不拘老人、大人、小兒。用大白頸蚯蚓、數條。搗爛。白湯調和。絞汁一碗服。立通。

蜒蚰（蝸牛）又名　味鹹，氣寒，有毒。（蘇氏曰：蜒蚰生人家墻垣石砌間，春夏間陰雨則生。形如蝸，頭有兩角，背黑有花斑點，肚白，身多涎，涎能制蜈蚣，見鹽即化爲水。）

○蜒蚰，解一切熱毒之藥也。蔡心吾曰：此物稟地中陰濕之氣而生，水土之精也。善治一切風熱火燥爲害、一切風熱火痰爲病。如本經治賊風喎僻，筋攣腸結；甄氏治丹毒疔癰，喉痺爛毒；李氏治溲秘消渴，痰脹蠱脹。研爛入諸丸藥，效驗甚速。然其氣大寒，非眞有風熱火燥者不宜服。

○集方：治腸火躁擾（方脈正宗），陰血虧竭，賊風乘虛入中經絡，至成口喎身僻，四肢攣縮者。用五加皮六兩、當歸身四兩，共

酒炒，研細末；蜒蚰百枚，研爛爲丸梧子大。每服五錢，人參湯下。○治一切丹毒（[illegible]）、癰毒、疔腫、喉痺。用生明礬二錢，研細末，以蜒蚰十枚研和爲丸，如芡實大，白湯吞下。○治小便秘（簡易方）脹不通。用蜒蚰五個搗爛，加麝香五釐，貼臍上立通。○治消渴（衛生易簡方）引飲。用蜒蚰十四粒，以溫湯吞之。○治一切（方脈正宗）臌脹蠱脹。用蜒蚰五十枚，草麻子肉四兩，巴豆肉一錢，俱研去油；生半夏一兩，研細；蟾酥三錢，眞牛黃二錢，用酒半鍾浸化，和入草麻、巴豆、半夏末內拌勻，隨將蜒蚰、蟾酥、牛黃和勻，總研成膏，爲丸如麻子大。每早午晚各服十丸，以津唾嚥下。

本草彙言卷之十八

錢塘　倪朱謨純宇甫選集　男洙龍冲之氏藏稿

張世臣相如甫校正

禽部　水禽類

鴨血　味鹹，氣寒，無毒。（陳氏曰：野鴨爲鳧，家鴨爲鶩。不能飛翔，如庶人守耕稼而已。又按周禮，庶人執鶩，取其性質木而無他心，故庶人以爲贄。其鳴呷呷，以名自呼。又按格物論云：雄鴨綠頭文翅，雌鴨頭黃斑色。其身毛又有純白純黑者。）

○鴨血，解諸毒之藥也。趙天民曰：鴨血寒凝而復能行散，故李時珍方取血乘熱飲，善解一切金、銀、丹、石、砒霜諸毒，及一切毒蟲、毒草，如野葛、射工、百蟲惡毒垂死者，灌入喉，即能生活。

○鴨肉，（味甘，氣寒，無毒。）補虛羸勞熱骨蒸之藥也。（[illegible]）金山臺曰：以五味調和作羹食更佳，以白羽者絕効。如病痢疾人食之，病轉劇，切戒。

鵞膽。味苦。氣寒。無毒。（李氏曰。鵞淮以南多畜之。有蒼白二色。綠眼黃喙紅掌。夜鳴應更。性能啖蛇及蚓。能制射工。養之能辟一切毒蟲毒虺。性喜食米。糯穀菜諸物。因禁頸。凡諸器物中。其鵞飛跡隨器方圓長短。）

○鵞膽。解熱毒。消痔瘡之藥也。江喬陶曰。按李時珍方。治痔瘡有核。以鵞膽汁一個。入冰片五釐。研勻。磁器密封。臨用以指蘸搽立効。

○掌上黃皮。解濕毒爛瘡之藥也（李時珍）。王大生曰。按譚埜翁方。治脚指縫濕爛。以鵞掌黃皮燒研成細灰。臨用。濕者乾糝。足指縫中。并治凍瘡。

禽部　原禽類

諸雞

（李氏曰。雞類甚多。五方所產。大小形色。往往亦異。其在卦屬巽。在星應昴。無外腎而虧小腸。其鳴也知時刻。其棲也知陰晴。鄭人畜雞無雄。以雞卵告竈而伏出之。太清外術言。蓄蠱之家。雞輒飛去。萬畢術言。其羽焚之。可以致風。古人言雞能辟邪。則雞亦靈禽也。不獨充庖廚而已。）

○雞冠血（味鹹。氣平。無毒）。發痘點。解百蟲。定驚癇客忤之藥也（李珣）。祝多士曰。按李氏方云。雞爲陽禽。冠爲陽分。冠血乃諸陽所聚。大能祛風活血。使陽氣充溢。反陰爲陽。從裏出表。凡風中血脉而口角偏喎。或中惡卒死而驚癇客忤。或痘瘡初發而閉逆不出。或毒蟲咬傷而疼痛不止。此乃鹹能走血。以血治血。如風邪火邪。驚氣毒氣。壅遏營道而不清者。冠頂之血。至清至高。使風可散。痘可拔。中惡驚忤可回。毒蟲傷痛可定。或取之敷塗。或和之酒飲。奏効頗奇捷也。如天行痘子。虛寒者用此可資起發。倘因血熱而乾枯焦黑者。用之亦無驗也。

○雞肝（味甘。微苦。氣溫。無毒）。補腎安胎（王銑）。消疳明目之藥也（時珍）。王嘉生曰。目乃肝竅。疳本肝疾。小兒肝熱致虛。故成疳疾目暗者。以雞肝和藥服。取其導引入肝。氣類相感之用也。婦人胎妊雖繫胞中。而實厥陰肝藏主之。今胎妊有不安而欲墮者。以雞肝入養榮諸丸。取其保固胞蒂。養肝以安藏血之藏也。

○集方。治小兒一切疳疾（錢氏方）。以致目生障翳者。用雞肝二十

個。生搗爛成膏。蕪荑、草果仁、山查肉、使君子肉、穀精草、枳實、白朮、各四錢，白丑三錢，共微炒。研爲細末，以雞肝爲丸，如彈子大，每早晚各服一丸，米湯化下。○治妊婦（方脉正宗）胎氣不安，欲小產者。用雞肝四十個，煮熟搗爛成膏，川芎、一兩，當歸、白芍藥、生地黃、杜仲、白朮、各二兩，俱酒拌炒，研爲末，雞肝爲丸梧子大，每早晚各服五錢，白湯下。（時珍集驗方）

○雞屎白（味苦，氣寒，無毒。臘月收之，白雞烏骨者更佳。）消臌脹，通石淋，散風痺之藥也。周志含曰：雞屬風木，陽禽也。屎出爲白，又得陰金之化耳。故素問方，主臌脹，旦食不能暮食。別錄方，治石淋，閉塞澁痛，溲道欲通不通。藏器方，治賊風偏痺，如咬如鑽，如剜如裂，疼痛不已。俱用雞屎白治之。此三證皆風木內甚，水穀不運，氣不宣流，故令中滿如臌；或溲道淋塞閉痛；或肢體偏痛不仁等證。蓋此藥能下氣消積，通利膀胱，驅風活血也。故前人治此三證，且大有殊功。

○集方治臌脹（醫學正傳）取臘月雞屎白、半觔，炒焦，浸酒一日，每日取木香、檳榔、各一錢，爲末，以酒調服。○治石淋澁痛難（古今錄驗）恐，用雞屎白一兩，炒焦爲末，每用一錢，以白蘿蔔、搗汁，一碗調服。○治四肢偏痺，風痰疼痛，不能舉動，幷治白（范汪方）虎歷節風痛，用雞屎白、一兩，浸好酒、一壺，煮熟，每日熏洗痛處。

○雞卵（味甘，氣平，無毒。）益氣養血（[illegible]），清火解熱毒之藥也。邢元璧曰、

按李氏發明云：雞子稟生化最初之氣，如混沌未分之形。白象天，其氣清，其性寒；黃象地，其氣渾，其性溫。白能清氣，故大氏方治咽痛欬逆、瘡腫、盜汗諸疾。黃能補血，故陳氏方治產後諸虛，力衰眩暈，久痢腸脫，府積瘰癧諸疾。兼黃白並用之，則調氣生血，而與阿膠同功也。但性質凝滯，雖稱補養之物，如胃中有冷痰積飲者，脾藏冷滑，常泄瀉者，胸中有宿食積滯未清者，俱勿宜用。

○集方治傷寒少陰病（[illegible]方）咽中生瘡，痛不能語言，聲不出者。用生半夏十枚，雞子一個，去黃，內入半夏、苦酒，令滿，置刀環中，安火上，令三沸，去半夏，少少含嚥之，三作即効。

○治氣虛欬逆，用雞子三個，去黃取白，以酒微煮，溫和食之。○治癰疽發背（千金方）一切腫毒初作，或經十日以上，腫赤焮熱，日夜疼痛，百藥不効者，用雞子五枚，傾出黃白在砂鍋內，以箸打勻，取新狗屎四兩，入雞子黃白內攪勻，微火熬，以雞子熟爲度，待溫和，取敷腫頭上，以帛包扎，時時看視，熱即易，一宿後，如日多者，一日一易，至瘥乃止。此方穢惡，不可施之貴人。一切諸方皆不能及。但宜備擇而已。○治陰虛盜汗夜熱者（方脉正宗），用雞子五枚，微擊碎，入童便內浸一日，煮食。○治產後諸虛（同上），用雞子三個，白酒內浸一日，隨用酒煮食。○治久痢腸脫不止（同上），用雞子十個，去黃，取清，和薑汁、醬油各一茶匙，攪勻，蒸熟食之。○治瘰癧延生（同），消長不已，用雞子一個，用箸頭將

黃白攪勻。取斑猫二箇，去翅，裝入雞子內，飯鍋蒸熟，去斑猫，取雞子食，間日食一箇，食三十箇全愈。○治痞積。用雞子一箇，用藥製法見木鱉子集方中。○治少陰病（張仲景方）得之二三日以上，心中煩，不得臥者，用黃連、黃芩、白芍藥各二錢，煎汁一碗，去渣，入阿膠一錢五分，洋盡，再加雞子清黃一箇，攪勻服。○治產後血暈（寇氏方）發痓，身強直，目向上，四肢牽急，不知人，用雞子清五箇，取荆芥焙研細末二錢，取雞子清調服即安。

○䏙胵裏黃皮（味甘，氣溫，無毒）治小兒諸疳，又止久痢之藥也。葉振華曰：雞䏙胵，雞之脾也，乃消化穀食之所。雞所食諸蟲百物及砂石土屑，入此無不消化，其色黃，其質燥，其

體堅而厚。如錢氏小兒方中用此爲消食積化疳結也。如竇氏外科方中，用此作摻藥入癰疽瘡口內，去膿長肌肉也。又安氏方治走馬牙疳方中，用此止臭爛頰提也。此三病，蓋取其堅而能消，溫而能長之義。

○集方　治小兒一切疳積并傷食作瀉（錢仲陽方）用雞䏙胵黃皮五箇，水洗淨，晒乾，於白朮二兩，枳實一兩，砂仁一兩，俱炒燥，研爲末，每服一錢，米湯調服。○治一切癰疽潰爛久（竇氏外科方）不收口，用雞䏙胵黃皮三箇，水洗淨，晒乾，蘆甘石五錢，真鉛粉三錢，共研極細，加冰片二分，再研勻，入磁罐收貯，密封，每早晚用溫湯洗患處，用少許摻之。○治走馬牙疳用（雞䏙胵黃皮二個，水洗淨，乾研細末，銅青二錢，鉛粉一錢，共研勻，水片三分，再研極細，入磁罐收貯，密封，每遇是患，先用凝帝蘸鹽洗淨牙根，用小匙挑藥摻）

鴿肉味甘鹹，氣平，無毒。（李氏曰：鴿處處人家畜之，有家鴿，亦有野鴿，名品雖多，其毛羽不過青、白、皂、綠、紫、花斑數色，其眼目亦有大小，黃、赤、綠、花斑等色。凡諸禽皆雄乘雌，此獨雌乘雄，又與鵓爲匹偶，其性淫而易合，故名。其飛翔可遠數十里，能呼引他處來集者。）

○鴿肉補虛羸，益精氣（孟詵），解諸藥毒（蕭炳）之藥也。（出繆氏方）陳月坡曰：諸禽鳥屬火者多，此獨稟金水之氣，其肉柔嫩鮮甘，其味美於諸禽之肉，故賈似道取充庖用，以食美女，使之悅顏色、調血氣也。又嘉祐本草：療久患疥癬，日取一隻，調五味食之，半月立愈。又濬江方：預辟痘毒，用白鴿卵一對，入竹筒封，置廁中，半月取出，以辰砂三錢，研細，和卵白丸菉豆大，每服三十丸，黑豆湯送下，毒從大小便出也。

又嘉祐方：治人馬疥癬，及小兒頭瘡，用鴿糞炒，研，醋調敷之。又劉氏方：治心氣痛，用鴿糞三錢，炒焦，研末，白湯調服立止。又張子和方：治項上瘰癧，用鴿糞二兩，炒焦，研末，飯丸梧桐子大，每服百丸，米飲下，一月全消。

夜明砂（節蝙蝠屎。）味辛、氣寒。無毒。沉也。降也。入足厥陰經。

（李氏曰、蝙蝠形似鼠、灰黑色、有薄肉翅、連合四足及尾。夏出冬蟄、晝伏夜飛、食蚊蚋、自能生育、生石穴者甚大、棲息古廟高屋梁間、常自倒懸、此物善伏氣。故能壽其屎名夜明砂。陶氏曰、方家不用者、世俗不識也。修治凡采取、以水淘去灰土惡氣。取細砂晒乾、焙用。其砂乃蚊蚋眼也。）

○夜明砂、消疳明目之藥也。方吉人曰。蝙蝠、晝伏夜出。喜食蚊蚋。屎中淘出細砂、乃未化蚊蚋眼也。專入肝經血分。故前古主破積聚。除寒熱、消瘰癧。又唐氏方、治小兒無辜疳疾、及大人血瘀氣滯、肝逆而成翳障目盲之證。此物堅寒明肅。能活瘀消積。故所治積聚瘰癧、驚疳盲障。等疾、皆足厥陰血分病也。今方用甚鮮。因淘取不多得也。

○集方（方脉正宗）治腹中諸積聚。寒熱。用夜明砂、三錢。阿魏四錢。花椒五錢。紅麴六錢。俱研細末。每服二錢。清晨白湯調下。

○治瘰癧延纏（同上）用夜明砂、三錢。白蛤殼五錢。火煅。共研細末。米飯為丸。如菉豆大。每晚服二錢。白湯下。○治一（全）切疳疾。用夜明砂五錢。入砂礶內。以精猪肉、三兩、切片。入礶內。水煮熟。取肉與兒食。飲其汁。取下腹中胎毒即效。○治大人小兒（直指方）內外翳障。及青盲雀目。用夜明砂、二錢研化。同猪肝煮熟食肝。并飲汁。盡三次全效。○治五（聖）瘧（惠方）不止。用夜明砂、一錢。生薑、三片。細茶、一撮。煎湯調服。即效。

五靈脂、味甘酸。氣平。無毒。氣味俱厚。陰中之陰。降也。入足厥陰、手少陰經。

（蘇氏曰、五靈脂、乃寒號蟲之糞也。出北地極寒處、今河東州郡皆有之。說文云、有足之謂蟲、躶毛羽鱗介之總稱。故曰五靈脂、則以形似也。又名鶡鴠、五臺山最多、狀似小雞、肉翅四足、夏月毛羽五采、自鳴曰、鳳凰不如我。初冬毛羽脫落、躶形如雛、忍冬而號、夜鳴曰、來朝造個窠。旦鳴曰、得過且過、日出暖和、故月令之仲冬、鶡鴠不鳴、冬至陽生漸暖故也。餐以柏實、先冬儲集、穴居南向、食已而遺、遺已而食、遺屎色黑如鐵、形凝如脂、氣甚膻惡。修治、用水和、撚去砂石、再用酒淺飛、去砂土。晒乾收用。）

○五靈脂、散血行瘀。止痛化積。為婦科產後百證之要藥（李時珍）也。沈孔庭曰、此蟲畏寒喜煖。性專散血行瘀。故開寶方、治婦人血閉脹悶。血瘀脹痛。血逆作嘔。血痺成勞。或血滯作寒熱等證。繆氏（仲醇）言此藥。其功長於破血行瘀。如果屬產後瘀血停滯作痛。產後少腹兒枕作痛。產後惡血攻心。血暈作痛。婦人經閉結滯心胃腹間作痛。氣鬱脉滯、經血不行。攻刺作痛。瘀血挾痰結成窠囊、瞳子不明。或瘀血凝結牙齦之間。而成齒痛等證。在所必需用也。倘有血衰經閉。血虛腹痛。產後去血過多。心虛發暈而痛。病屬血虛無瘀滯者。皆所當忌用也。又按前賢寇氏曰、蓋諸痛皆屬於肝。諸蟲皆生於風。此藥散血行血。和血止血。而定諸痛。所主諸證。皆肝經血分之病也。凡男婦老幼。一切心腹脇肋少腹痛。疝瘕痛。并胎前產後血氣攻痛。俱能奏功。又古方謂五靈脂治崩中。實非止血之藥。乃去風之劑。風動物也。衝任經虛。被風傷襲營血。

以致崩中暴下。與荊芥、防風治崩義同。此說是矣。而猶未盡也。又肝血虛滯。亦自生風。能使血動而崩。又不待外風傷襲也。如陳士良方、用參耆熟地、炮薑少和五靈脂、而治血崩。蓋謂肝虛生風而血脫也。善斯業者。當悟古人識見如此。不可執一論也。

○集方（方脉正宗）治產後一切瘀血為患。為脹。為痛。為嘔。為寒熱。或兒枕痛。或血暈痛。或卒暴心胃作痛。或男婦癥瘕酒積作痛。或小兒疳積蟲痛。俱能治之。用五靈脂一觔。水浸淘去砂石。再用酒飛曬乾。取六兩。澤蘭葉、益母葉、牡丹皮、當歸稍、延胡索、白芍藥、白朮、川芎、俱酒洗炒。木香、肉桂、焙、各二兩。共研為細末。配五靈脂末。以米醋打紅麴

末。作糊丸菉豆大。每服三錢。婦人產後諸疾。酒下。疝氣瘕氣痛。茴香湯下。酒積痛。陳皮湯下。卒暴心胃痛。淡鹽湯下。小兒疳積蟲痛。花椒白明礬湯下。○治胎衣不下。（同上）并惡血冲心。用五靈脂水飛過。四錢。溫酒下。○治經血（經驗方）不止。用五靈脂去砂土。炒燒盡。二錢。當歸身、一錢。水煎服。○治傷食成疳。（普濟方）用五靈脂、水飛過。一兩。木香、五錢。巴豆肉、四顆。去殼煨熟。去油。共為末。米糊丸菉豆大。每服五丸。白湯下。○治小兒五疳潮熱。（全幼心鑑）用五靈脂、水飛過一兩。胡黃連、五錢。於白朮。八錢。俱炒燥。為末。飴糖為丸彈子大。每服一丸。米湯化下。○治酒積黃腫。（出粹方）用五靈脂水飛過。一兩。入麝香、二分。稀糊丸小豆大。每服十丸。米湯

下。○治瘀血目翳。（方脉正宗）用五靈脂、水飛過。一兩。桃仁、去皮。一兩五錢。共研勻。飯搗為丸梧子大。每食後服五十丸。一月全愈。○治瘀血齒痛。（直指方）用五靈脂、水飛過。三錢。米醋一碗煎滾。候溫和。含汩。

治小兒蟲咬心痛欲絕。用五靈脂末、二錢。枯礬、五分。共為細末。每服二錢。白湯調。不拘時服。當吐出蟲即愈。

獸部　畜類

豬膽汁，味苦，氣寒，無毒，沉也，降也。入手足陽明經。（李氏曰：豬，水畜也。土地生產，各有不同。生青兗徐淮者耳大；生江南者耳小；生燕冀者皮厚；生梁雍者足短；生遼東者頭白；生豫州者耳短；生嶺南者白而極肥。孕四月而生。在畜屬亥，在卦屬坎，在畜應室星。其體骨重而少筋，性趨下，俯首喜卑穢，天將雨則進涉水中。牝曰豝曰彘，牡曰豭曰猳。皮、膚、血、肉、筋、骨、髓、腦、臟、腑、膏、膜、頭、蹄、胻、卵、懸蹄、耳垢、屎、溺、毛、膠，咸歸藥用。如豭豬其力尊勝，故牡豬之膽、乔蹄，皆倍大於牝者。）

〇豬膽汁，主傷寒裏熱燥渴，潤大便火結之藥也。白尙之曰：按《經》曰：熱淫於內，寒以勝之，苦以泄之。故仲景方以葦筒納穀道二寸，以豬膽汁和醋少許，灌之，治傷寒裏熱枯燥，大便不通。蓋取苦酸寒滑而潤燥通結也。又治少陰下利不止，厥逆無脈，乾嘔煩者，以白通湯加豬膽汁，以調寒熱之逆者也。取人尿、豬膽鹹苦之物，於熱劑之中，使其氣相從而無拒格之患矣。又治霍亂病，吐下已斷，汗出而厥，脈微欲絕者，以通脈四逆湯加豬膽汁數匙主之者，蓋陽氣大虛，陰氣獨勝，純與陽藥，恐陰氣拒格不得入，故加豬膽汁之苦寒，入心以通脈，和肝，亦使其氣相從，不致拒格也。此寒因熱用，熱因寒用之義耳。

〇集方：仲景治少陰下利不止，厥逆無脈，乾嘔煩者，以白通湯，用葱白四莖、乾薑一兩、生附子一枚，水三升，煮一升，入童尿三合、豭豬膽汁半合，調服。〇仲景治少陰病，下利清穀，裏寒外熱，手足厥逆，脈微欲絕，身反不惡寒，

其人面色赤，或腹痛，或乾嘔，或咽痛，或利止脈不出者，以通脈四逆湯主之。用甘草二兩、生附子一枚、葱白七莖、乾薑二兩，以水三升，煮取一升，去渣，加豭豬膽汁五匙，調服。如腹中痛甚者，加酒炒白芍藥二兩。嘔者，加生薑二兩。咽痛，加桔梗一兩。利止脈不出者，加人參二兩。〇治喉風閉塞。（邵真人方）冬至日，取豭豬膽五六枚，用川黃連、薄荷、殭蠶、白礬、朴硝各五錢，研極細末，拌勻，分裝膽內，將地掘深一尺，以竹幹橫懸此膽，以無隙缸蓋定，至立春日取出，待風吹乾，瓷收。每取少許，吹入喉間，立效。〇治熱病䘌蝕上下。（梅師方）用豭豬膽汁一枚，醋一合，頓溫服，蟲立死。

豬膚，味甘，氣平，無毒。（吳氏曰：豬膚，係燖豬時刮下毛裏白膚是也。）

〇豬膚，仲景治足少陰下利，咽痛，胸滿心煩者，有豬膚湯。用豬膚八兩，水五升，煮二升，取汁，入白蜜五合、粳米粉三合，總熬令香，分作三服。盧氏（子繇）曰：膚，革外薄皮也。又曰：膚淺也。足少陰下利，猶釜底抽薪而烹飪廢，致水穀失濟，失泌之所致也。蓋少陰腎主水，已屬從流而下矣。復心煩胸滿咽痛者，轉類奔豚之為疾，氣從少腹上衝心，令人若死狀者。腎屬水藏，豬屬水畜，為能充其類焉。取其淪膚殆盡而氣微衰，迺得自外而內，以從上而下也。則下利止而咽痛胸滿心煩自愈矣。又成氏言加白蜜以潤燥，潤燥則煩除；加粳粉以益氣，益氣則利止。於義

亦通。

豬心血（味甘鹹氣平無毒）治驚癇癲疾。及中惡卒死之藥也。翟秉元曰、驚癇顛疾心氣閉而有痰也。中惡卒死心氣閉而有邪也。四證均屬心君失令。血不歸元而然。用此藥以心歸心。以血導血也。如沈存中用豬尾血。以治痘瘡黑陷。取半盞和好酒調服。須臾紅活。亦取生血回元之義。

豬大腸（味甘氣寒有微毒）潤腸治燥。止血痢藏毒之藥也。（李時珍）○集方治腸風藏毒（良方）。因熱者。用豬大腸一條。去油垢淨。酒煮極爛。搗膏。以白芍藥四兩。川黃連五錢。俱炒研末。和爲丸梧子大。每服二錢。白湯下。○治藏寒泄瀉（同上）。體倦食減。用豬大腸。如前法製。以於白朮四兩。吳茱萸一兩。俱

炒研末。和爲丸梧子大。每服三錢。白湯下。

豬脬（味甘鹹氣平無毒）治老幼男婦夢中遺溺不愈。并疝氣陰囊濕癢。玉莖生瘡。諸病之藥也。以五味調作羹食之。陸平林曰。豬脬即尿胞也。吳人俗呼小肚。所治皆下焦病。亦以類從爾。按羅氏衛生方。治蘄州一婦人。病轉脬。小便不通。腹脹如鼓。二旬垂死。一醫用豬脬。吹脹。以翎管安上。插入其孔。捻脬氣。即吹入。即大尿而愈。此法知者頗少。亦機巧妙術也。

按邵眞人延壽箋曰、豬爲食味中常用之物。藏府腸胃。咸無棄焉。然其一身除肚腎外。餘皆有毒。發病。人習之而不察也。壯實者。或暫食無害。有疾者。不可不知其忌。特列其害于後。○肉、多食。令人虛肥生痰。大病後食之。復發。與薑同食。即發大風病。○頭肉、有病者食之。生風發疾。○腦、食之損男子陽道。絕生育。酒後尤不可食。○血、能敗血。而耗心氣。○肝、食之必傷人。豬臨宰。驚氣入心。絕氣歸肝故也。合諸魚食。生癰疽。○脾、一生莫食之。○肺、不可與白花菜合食。令人氣滯。發霍亂。○腎、食之。傷腎少子。冬月尤不可食。損人眞氣。○脂、男子食之損陽。○腸、食之動冷氣。發宿疾。○鼻唇、食之動風。○舌、食之損心氣。

羊肉，味甘，氣熱，有毒。入手足陽明經。（自死者有大毒，莫食，發惡疾，立死。）

（蘇氏曰：羊，四方皆有，種類極多，其色有黑、白、斑，不同。其毛有長、短、剛、柔之別。李氏曰：生江南者為吳羊，頭身相等，而毛短。生秦晉者為夏羊，頭小身大，而毛長。土人二歲而剪其毛，以為氊物，謂之綿羊。廣南英州一種乳羊，食仙茅，極肥，食之甚補人。諸羊皆孕四月而生，其目無神，其腸薄而縈曲。在畜屬火，故性熱而易繁也。在卦屬兌，故外柔而內剛也。其性惡濕喜燥，食鉤吻而肥，食仙茅而肪，食仙靈脾而淫，食躑躅而死，物理之宜忌，不可測也。胡人以骨占灼，謂之羊卜，亦有一靈耶。其皮極薄，南番以代紙書字，吳人以代紙畫彩為燈，甚鮮明。）

○羊肉，補中益氣，療中風虛汗，治產後陰陽兩虧之藥也。魏景山曰：按東垣云，補可去弱，人參、羊肉之屬是也。凡一切諸病，形氣瘦弱，脾胃虛羸不足者，宜之。古方入補湯劑，有大羊肉湯，金匱方治寒勞虛羸及產後心腹疝痛，四肢厥逆，用肥羊肉一觔，水一斗，煮汁七升，入當歸、生薑各三兩，黃耆五兩，煮取二升，分四服。然味甘性熱，如天行熱病後，溫瘧積痢後，食之必致發熱難療，又癰腫瘡瘍，消渴吐血，臌脹腫滿，腳氣黃疸等疾，咸不宜服。

○羊肝，（味苦，微甘，氣寒，無毒。）補肝明目，治風淫目睛（蘇恭）之藥也。許日聞曰：羊肝補肝，以類相從也。肝開竅于目，肝熱則目赤，肝虛則目昏，或生翳障。羊肝苦寒甘補，肝病目病，藥中搗和為丸服，明目諸方，無出於此。（羊膽點目疾，見蟲部卵生類蜂蜜集方下。）

○羊腎，（味甘，氣溫，無毒。）益精髓，補腎氣，却虛勞之藥也。陳象先曰：按千金、外臺、深師諸方，治腎虛勞損，消渴腳氣等疾，有腎瀝湯方，有羊腎煮湯煎藥，蓋用為引嚮，各從其類也。（腎瀝湯方見[illegible]部[illegible]類集方下。）

黃牛肉，味甘，氣溫，無毒。入手足陽明經。（自死者有大毒，莫食，發疔毒惡疾。）

（蘇氏曰：牛之壯者曰牯，曰特，曰犅，曰犄；牝者曰牸，曰犊。南牛曰犑，北牛曰㹀。純色曰犧，黑色曰犏，白色曰犨，赤色曰犉，駁色曰犁。去勢曰犍。牛子一歲曰犢。李氏曰：牛有㹀牛、水牛二種。㹀牛小而水牛大。㹀牛有黃、黑、赤、白、駁、雜數色。水牛有青、蒼、灰、黃、純白數色，大腹銳頭，其狀類豬，角若擔弓，能與虎鬥。又廣南有稷牛，形最卑小，爾雅謂之犤牛。牛齒有下無上，察其齒而知其年，三歲二齒，四歲四齒，五歲六齒，六歲以後，每年接脊骨一節也。牛耳聾，其聽以鼻。牛瞳豎而不橫。其聲曰牟。在畜屬土，在卦屬坤，土緩而和，其性順也。造化權輿曰：乾陽為馬，坤陰為牛，故馬蹄圓，牛蹄坼。馬病則臥，陰勝也；牛病則立，陽勝也。馬起前足先，臥則後足先，從陽也；牛起後足先，臥則前足先，從陰也。）

○牛肉，養脾胃，益中氣（別錄），健筋骨（陳藏器）之藥也。王少宇曰：牛，土畜也，黃土色。經曰：中央黃色，入通于脾，故別錄稱為養脾胃、益中氣之要藥。於老人小子脾胃薄弱者，調五味作羹食，甚美。昔丹溪翁有倒倉法，王綸言牛肉本補脾胃之物，非吐下藥也，特飲之既滿，或上湧下泄爾。此蓋借其補以為瀉，故積聚去而腸胃得所養，亦神法也。如病非關腸胃有積滯者，似難施之耳。

按倒倉論曰：腸胃為積穀之室，倒者，推陳以致新也。胃屬土，受物而不能自運，七情五味，有傷中宮，停痰積血，互相糾纏，發為癱瘓，為勞瘵，為臌脹，成形成質，為窠為臼，以生百病，而中宮愆和，非丸藥所能去也。此方出自西域異人，其法用黃牯牛肉二十觔，長流水煮成糜，去渣濾出稠液，再熬至琥珀色，收之。連飲至數十鍾，寒月溫飲。病在上，則急飲令吐；病在下，則緩飲令利；在中則

令吐而利，吐利後口渴者，即飲自溺小便一二碗，蕩滌餘垢。睡二日，乃食稀粥，養半月，精神強健，沉疴悉去也。須忌牛肉五年。蓋牛，坤土也；黃，土色也。熟而爲液，成無形之物也。故能由腸胃而透肌膚毛竅爪甲，無所不到。在表者，因吐而得汗；在清道者，自吐而去；在濁道者，自利而除。有如洪水泛漲，陳垢順流而去，盎然渙然，潤澤枯槁，而有精爽之樂也。

韓飛霞曰：治一切諸虛病，用小牛犢兒未交感者一隻，臘月殺之，去血，燖毛洗淨，并藏府不遺分寸，大鐵鍋煮之。用黃耆一觔，人參八兩，茯苓、陳皮、甘草、蜀椒、食鹽各三兩，官桂、良薑各二兩，醇好酒二斗，同煮，水以八分爲

率，文火煮爛，取出骨，搥碎，同煮至爛如泥，濾取稠汁，再用絹再濾清汁，待冷，以淨磁甕盛之，埋土內七日。每用酒調，早晚任意食之。或用白湯調服亦可。如用肥黃犬及鹿，皆可依此法作之。

○牛乳（味甘，氣寒，無毒。）補虛羸，養心肺，（別錄）潤燥結，解熱毒（日華）之藥也。顧汝琳曰：牛，力強氣健，乳亦稟氣血之精陰。人食之，潤枯燥，養血氣，降虛火。較之人乳更妙，非若人乳有飲食之毒、七情之火也。如脾胃虛冷作泄，并膈中有冷痰積飲者，忌之。

○集方：治痢久不効，（李時珍方）用牛乳八兩，蓽茇三錢，同煎減半，空腹頓服。

○牛血（味鹹，氣平，無毒。）解毒利腸，治金瘡，下水蛭，并治血痢便血之藥也。李東璧曰：元史布智兒從太祖征回回，身中數矢，血流滿體，悶仆幾絕。太祖命取一牛，剖其腹，納之牛腹中，浸熱血中，移時遂甦。又李庭從伯顏攻郢州，砲傷左脇，矢貫於胸，幾絕。伯顏命剖水牛腹，納其中，良久而甦。何孟春在職方，問各邊將，無知此術者。非讀元史，那知也。

○集方：治誤吞水蛭腹痛，（肘後方）用黃瘦牛血，熱飲二三升，次早化豬脂一升飲之，即下出也。○治血痢便血，（李時珍方）煮牛血，拌醋食之。

牛膽（味苦，氣大寒，無毒。）除心腹熱，益目精之藥也。用臘月黃牛

或青牛者，釀南星末，治驚風有奇功；釀槐子服，明目，治痔漏。

○集方：治穀疸食黃，（千金方）用牛膽汁一枚，苦參三兩，龍胆草一兩，爲末，和少蜜丸梧子大，每薑湯下五十丸。○治痔瘻出水，（經驗方）用牛胆、蝟胆各一枚，膩粉五十文，麝香二十文，以三味和勻，入牛膽中，懸四十九日，取出爲丸，大麥大，以紙撚送入瘡內，有惡物流出爲驗也。

○牛角䚡（味苦，氣溫，無毒。）入少陰血分。（即角尖中堅骨也。水牛黃牛者可用，餘皆不及。久在糞土中爛白者亦佳。燒灰用。）

○牛角䚡燒之則性澁，故止血痢，及婦人帶下血崩諸病。

○集方：治大腸冷痢，水牛角䚡燒灰，飲服二錢，日二次。

治小兒滯下。（千金方）并牛角䚡燒灰。水服方寸匕。○治大便下（近效方）血。黃牛角䚡一具。煅末。煮豉汁服二錢。日三。神效。○治（孫用和方）赤白帶下。牛角䚡燒令煙斷。附子以鹽水浸七次。去皮。等分為末。每空心酒服二錢匕。

牛黃 味苦。氣涼。有小毒。入手少陰、足厥陰二經。

（陶隱君曰。生隴西及晉地。特牛膽中得之。即陰乾百日使燥。無令見日月光。○蘇頌曰。今出登萊州。凡牛有黃者。身上夜有光。眼如血色。時復鳴吼。恐懼人。又好照水。人以盆水承之。伺其吐出。乃喝迫。即墮下水中。取得如雞子黃大。重疊可揭折。輕虛而氣香者佳。試法。但揩摩手甲上。透甲黃者為真。○雷斅曰。牛黃有四種。喝迫而得者名生黃。殺死在角中得者名角黃。牛病死後。心中剝得者名心黃。初在心中如黃漿汁。取得便投水中。沾水乃硬。如碎蒺藜。肝膽中得者。多肝黃。皆不及生黃為勝。○寇宗奭曰。西戎有犛牛黃。堅而不香。又駱駝黃。極易得。亦能相亂。不可不審。○凡用。單搗細研如塵。絹裹定。以黃嫩牛皮裹懸井中一宿。去水三四尺。明早取之。）

牛黃驅風化痰。清熱解毒之藥也。主神志不守。顛狂妄動。或驚癇搐搦。忽作昏迷。或中風中惡。失音不語。或魂魄飛揚。觸事喪志。或寒熱交作。乍見神鬼。此是心虛不寧。痰迷心竅之症。不拘大人小兒。牛黃皆可治之。但牛黃為治心之藥。必酌佐使得宜而後可。故得丹砂而有寧鎮之功。得參苓而有補養之妙。得菖蒲、山藥而有開達心孔之能。得棗仁、遠志而有和平臟腑之理。得歸、地而有涼血之功。得金箔而有安神之美。凡諸心疾。皆牛黃所宜也。如小兒病傷乳傷食。作瀉。或脾胃虛寒者。亦非所宜也。（方脉正宗）

○集方治大人小兒痰熱失音。或中風中熱。中氣。小兒心熱生驚。急驚搐搦。諸證。用牛黃一錢。另研細。配膽星、天竺黃各五錢。白朮、天麻各三錢。俱研細。薑汁為丸。如黃豆大。大人服三丸。薑湯化下。小兒服一丸。燈心湯化下。（同上）

○治小兒驚癇百病。用牛黃一錢。膽星、鈎藤、天竺黃、茯神各五錢。丹砂三錢。真珠、犀角、琥珀各一錢五分。俱設法研細。加冰片五分。薑汁打神麯糊為丸。如菉豆大。一歲兒一丸。大兒五丸。為率。俱用薑湯調服。（揚州方）

○治楊梅結毒。用牛黃二錢。鍾乳石、火燒丹砂各五錢。真珠微炒二

錢。共研極細末。每服五分。土茯苓湯下。（王氏方）○治痘瘡黑陷。用牛黃五釐。丹砂六分。同研細末。紫草泡湯調服。○并搽痘疵。○治一切臟脹。用牛黃四錢。蟾酥六錢。俱用酒潤化。生半夏五錢。研細末。巴豆肉去油取霜二分。草麻子肉去油取霜五錢。冰片五分。共研極細。和勻。調入牛黃、蟾酥。拌勻。用蜒蚰五十個。共搗勻。為丸。如粟米大。每早服四丸。放舌上。取津唾嚥下。

阿膠。味甘微苦。氣平。無毒。氣味俱薄。浮而升。陽中陰也。入手少陰足少陰厥陰經。

（別錄曰。阿膠出東平郡東阿縣。有官舍禁之。鄭氏水經註云。其井大如輪。深六七丈。歲常煮膠以貢天府。其井乃濟水所注。取井水煮膠。用攪濁水則清。性下趨。質清且重。煮法必取烏驢皮。或烏牛皮。洗刮淨去毛。急流水中浸七日。入大鍋內。漸增阿井水。煮三日夜。則皮化。濾清再煮稠。貯磁盆中。乃成。冬月易乾。其色深綠且明亮。輕燥而脆。味甘而淡。乃佳。亦須陳久。方堪入藥。古方取烏牛皮。浸洗淨。亦可煎膠。凡造阿膠。自十月至二月間。用烏驢皮。或犛牛水牛皮。爲上。修治凡用須用小麥麩拌炒成珠。或以蛤粉拌炒成珠。或以酒頓化。或以滚湯頓化。各從其製便也。但貴烏驢皮者。取烏色屬水。以制熱則生風之義。盧氏曰。或云濟水所注。盖濟爲瀆。隱則伏流。顯則涌出。與阿水質之清重。性之下趨。似不相符。靜考其所從來矣。驢力在膚。膚腠前也。顧力在膚。色專者墨。精等者。此註）

○阿膠益金。養肺。滋木。養肝。濟水。養腎。平火。養心。潤土養

脾。培養五藏陰分不足之藥也。（葉氏本草）李秋江曰。此得水氣之陰。其補精之質。得甘平之味。故陳氏本草主衄血、吐血、咯血、唾血、溺血、便血、腸風糞血。崩中下血。經漏脫血、淋瀝不止。或胎動不安。血虛腹痛。或兩目昏眩。血虛頭旋。或虛火喘促。咳嗽血痰。而成肺痿。肺癰。或熱傷營絡。下痢純紅。而腹痛不止。惟此藥補血益陰。調榮養液。故能療如上諸證也。然其氣味雖居和平。而性質粘膩。如胃弱嘔吐。有寒痰留飲者。脾寒飲食不消運者。又當忌之。盧子繇先生曰。緣水性之下趨。故潤膈疎痰。降淤濁。及上逆之血也。協皮革之外衛。故治內損脫血。崩淋血痢[illegible]也。藉火力之煎熬。爲膠以成土化。如藏之五勞。形之六極。以及四肢經隧。或涸或秘。爲痿爲痛。如胎孕不固之下墜。等證咸需用之。獲効實無量也。

（以下十三方俱出方脈正宗）

○集方。治肺損嘔血。用眞阿膠三錢。滚湯泡化。麥門冬五錢。煎湯調和服。○治肝虛脇痛。目昏筋脉痿弱。用眞阿膠三錢。炙甘草一兩。白芍藥五錢。敗龜板七錢。水煎服。○治腎虛腰脊痿軟。遺精盜汗。用眞阿膠三錢。人參一錢。北五味七分。枸杞子。麥門冬各五錢。懷熟地四錢。水煎服。○治心虛火盛。煩渴不寧。用眞阿膠三錢。懷生地五錢。人參。棗仁。麥門冬。各二錢。北五味七分。蓮子四錢。水煎服。○治脾虛血燥。大便秘結。用眞阿膠三錢。懷生地。麥門冬。肉蓯蓉。各五錢。知母。四錢。水煎服。○治吐血衄

血。咯血。唾血。用眞阿膠三錢。生蒲黃。懷生地。各五錢。黃芩三錢。燈心五十根。水煎服。○治溺中血。用眞阿膠三錢。茜草。懷生地。白芍藥。地骨皮。各二錢五分。車前子一錢。水煎服。○治糞前糞後便血。或腸風瀉血。用眞阿膠三錢。蒼朮米泔浸炒。赤石脂。炮薑灰。各五錢。北五味子一錢。水煎服。○治婦人崩中下血。或經漏脫血。淋瀝不止。用眞阿膠四兩。川續斷。牡丹皮。丹參。當歸身。懷生地。各三兩。白朮二兩。熬膏煉蜜收。每早午晚各服五錢。人參湯調服。○治血虛腹痛。或胎動不止。用眞阿膠三錢。當歸四錢。白芍藥。懷熟地。各五錢。砂仁殼。丹參。白朮。黃芩。各二錢。川芎一錢。水煎服。○治血虛頭旋。兩目昏眩

用眞阿膠二兩、蛤粉拌炒成珠。天麻、當歸、白朮、黃芩、密蒙花各二兩五錢、川芎、牡丹皮各一兩。俱用酒拌炒研爲末。煉蜜丸梧子大。每服三錢、臨睡菊花湯送下。○治虛火喘促、咳嗽血痰、將成肺痿肺癰。用眞阿膠三錢、桑白皮、懷生地、川貝母、紫菀、百部、百合、廣陳皮、薏苡仁、牛膝、茯苓各二錢。水煎服。○治熱傷營絡、下痢純紅、腹痛不止。用眞阿膠三錢、白芍藥、川黃連、懷生地各二錢、甘草、炮薑灰各一錢、茯苓一錢五分。水煎服。○治妊娠下血、或痢血、或瘧疾、或久咳嗽、或衂血、吐血。用眞阿膠三錢、黃芩一錢五分、茯苓、甘草各一錢。水煎服。○治小兒驚風後瞳人不正者。以眞阿膠、人參各二錢。水煎服。

治虛勞咳怯之人、患痢痰膿、痛下赤白者。用眞阿膠二錢、白芍藥三錢、甘草、白茯苓、桑皮各一錢、桔梗五分。水煎服。積毒甚者、加川黃連八分、黃芩一錢。腹痛下重不行者、加枳殼一錢、炙煉大黃八分。○治虛勞咳怯之人下純血痢。用眞阿膠三錢、懷生地五錢、白芍藥四錢、白茯苓二錢、當歸身一錢、川黃連八分。水煎服。○治吐血先吐痰而後吐血者。是積熱也。用阿膠、生地、白芍、桑皮、黃芩、天麥二冬、紫菀、玄參、知母各二錢、甘草七分。水煎服。○治吐血、先吐血而後吐痰者。是陰虛也。用阿膠、黃柏、生熟二地、天麥二冬、白芍藥、知母、黃芩、沙參、山藥、玉竹各二錢、甘草七分。水煎服

黃明膠、味甘、氣平、無毒。可升可降。入手陽明、太陰經。（李氏曰、黃明膠、即牛皮膠也。乃牛皮煮化、濾去渣、煎熬結者、其色黃明。今工作木器中、用以代漆、甚堅。入藥功用、與阿膠彷彿。阿膠古方亦用牛皮煎煉、但水係阿井所汲耳。）

○牛皮膠、止諸般失血之藥也。梁心如曰、其性粘膩、其味甘澀。入服食藥中、固氣斂脫、大有神功。故普濟諸方、用治吐血、衂血、崩淋痢血、於久患不愈之疾、與阿膠彷彿通用。但其性味平補、宜於虛熱者也。如散癰腫、調膿止痛、護膜生肌、則黃明膠、又遜於阿膠一籌也。善是業者、當留意於斯焉。

○集方、治吐血、衂血、咯血、唾血、嘔血、崩血、淋血、痢疾下血諸證。用牛皮膠一兩、剪碎、麥麩拌炒成珠、研細末、配黑

蒲黃、黑薑炭各五錢。俱研極細末。每服三錢、溫米湯調下。○治癰疽（外科精義）未成已成、用牛皮膠一兩、酒溶化、厚敷毒上、未成即消、已成即出膿、膿後再敷、即長肉生肌。每日再用一兩、酒溶化、毒在上、食後服、在下、食前服。

獸部（野獸類）

虎骨　味甘辛，微熱，無毒。可升可降。入手少陰、足厥陰經。（蘇氏曰：虎者北東西四方皆生，深山窮谷者多有之，爲山獸之長也。狀如貓而大如牛，色有黃白黑，或有斑駁雜花諸色。其聲吼如雷，其牙如鋸，其爪如鉤，其鬚健而有尖，其舌大而如掌，生倒刺，項短鼻齆，夜視一目放光，一目看物。從風而行，百獸震恐。易卦通驗云：立秋虎始嘯，仲冬虎始交。又云：月暈時虎交。又云：虎孕七月而生，不再交。又云：虎嚙物，隨月旬上下而嚙其首尾。其搏物三躍不中則捨之。食狗則醉，聞羊角烟則走，吞螂蛆則死。見獅子、騶虞、渠搜則底而伏，見水牛則鬪，而力有怯有健者。又有海魚變虎、老人變虎、虎變老人之異。）

○虎骨，去骨節風毒之藥也。蔡心吾曰：虎乃西方之獸，毛蟲之長也。屬金而氣最猛，性最有力。語云：風從虎者，（木屬也；虎，金也。木受金制，焉得不從？）故虎嘯而風生，自然之道也。故甄氏本草治一切風病，筋骨攣急，屈伸不便，走注疼痛，及心風驚癎癲疾等證。然虎之一身，氣力皆出前足，強悍皆賴於脛，故入藥以脛骨爲勝。而楊士行言：總而論之，虎骨驅風徧體，是可通用。今析而分之，凡辟邪惡，治驚癎癲疾及頭風等病，當用頭骨；治腰背諸風，當用脊骨；治手足諸風，脚膝無力，當用脛骨。各從其類也。雖稱治風之劑，倘屬血虛不能養筋而生風者，氣虛不能攝涎而生風者，又當君以參、耆、歸、朮、芍、地輩同劑，方獲全効。

○集方治一切風毒疼痛，腰脚無力，筋骨拘攣，痿弱不能步履。用虎骨四兩，白芍藥、懷生地、荆芥、藁、川萆薢、枸杞子、皂茄根、油松節、黃耆、蒼朮、白朮、秦艽、當歸、牛膝、木瓜、甘草各二兩，乳香、沒藥各一兩，好酒三十壺浸蒸，每早晚隨量飲。○治中邪惡鬼疰，及小兒驚癎，大人癲疾。用虎骨磨汁半盞，牛黃三分，天竺黃、膽星各一兩五錢，俱研極細末，每晚服五分，用虎骨汁調服。○治休息痢疾經歲不愈，取虎骨四兩，酒炙脆，研末，每服三錢，米湯服。

象牙　味甘，氣寒，無毒。（李氏曰：象出交廣、雲南及西域諸國。野象多至成羣。番人皆畜以負重，酋長出入乘之。有灰白二色，形體擁腫，面目醜陋。大者身長丈餘，高八九尺，肉倍數朱，目羅若豕。四足如柱，無指而有爪甲。行則先移左足，臥則以臂着地。其頭不能俯，其頸不能回。其耳大如箕，其鼻大如臂，下垂至地。鼻端甚深，可以開合，中有小肉爪，能拾針芥。食物飲水，皆以鼻卷入口。一身之力皆在於鼻，故傷之則死。耳後有穴，皮內甚薄，刺之亦死。口內有食齒，兩吻出兩牙夾鼻，雄者長六七尺，雌者僅尺餘耳。其膽隨四時，春在前左足，夏在前右足，秋在後左足，冬在後右足。牡牝相交則在水中，以胸相貼，與諸獸不同。許氏言三年一乳，五歲始產，六十年形體骨力方足。其性能久識，嗜芻豆、甘蔗、茶酒，而畏烟火、獅子、巴蛇。殺野象多設機穽以陷之，或埋象鞋於路以貫其足。捕生象則以雌象爲媒而誘獲之，飼而狎之，久則漸解人言，使象奴牧之，制之以鉤，左右前脚，罔不如命也。其肉甚肥，堪作炙，惟鼻肉炙食、糟食更美，彼土人捕得爭食也。其皮可作甲，鞔鼓，濕時切條，可貫器物。西域最重其牙，用飾床椅。中國貴之，取爲朝笏。每脫牙自埋藏之，南番諸國人潛以白木作牙易取焉。又真臘風土記云：用象牙殺取者上，）

（也；自死者次之；蛻於山中多年者下矣。）

○象牙，治驚癎迷惑之藥也。陳赤葵曰：象性勇猛，而牙善脫。雖屬獸類，而機巧神焉，靈慧若人。如開寶方以牙屑主驚癎驚搐、一切精物邪魅者，以神悟應之也。又敷諸鐵器及雜物入肉者，以脫而治皮肉間有形之物也。又外科方以牙屑治惡瘡，拔毒生肌，去漏管，亦同此義。

○集方治驚癎驚搐，或風癎迷惑，人事昏瞶，及一切精物邪魅作祟者。用象牙屑一兩，天竺黃、雄黃、丹砂各五錢，俱爲極細末，牛黃七分，麝香五分，總研勻，每服七分，白湯調服。○治金銀銅鐵錫一切器物及雜樣物入肉者，以象牙末雞子清調敷，立出。○治通腸漏病，能去管者，

以象牙屑、一兩。枯礬、金頭蜈蚣、各五錢。俱為極細末。黃蠟二兩、熔化。入香油二錢、待滾、即入前藥末攪勻。捻成丸梧子大。每早晚各食前服三錢。白湯下。○治小便不通脹急者。以象牙屑、五錢、生煎服。○治小便過多。用象牙屑、五錢燒灰。米飲調服。

○象膽、（味苦、微甘。氣寒。無毒。其膽陰乾。皮上光膩。有青竹紋斑。不與他膽同類也。）治疳明目之（日華子）藥也。蘇水門曰、諸膽皆附肝生。獨象膽隨四時。運行四足。可稱神物矣。第苦寒明肅之性。故日華子言明目去翳障。與熊膽同功。淨下疳瘡爛。一切熱毒諸證。

○集方、（方脈正宗）治目疾翳障。用象膽、分許。水潤化。點兩目眥內。○（日上）治下疳瘡破爛不收。用象膽、一塊。泡湯頻洗。腐穢自去。

肌肉生長矣。

○象皮、（味甘、氣溫。無毒。）暖肌肉。治金瘡不合之藥也。葛風寰曰、象皮堅實。以斧刃刺之。半日即合。因象體氣壯力弘。皮堅肉暖。今內府有象皮膏。治一切刀斧傷瘡。及經年瘡毒。氣冷血凝。潰水不收者。以膏藥、一塊。入瘡口內。外以厚軟油綿紙攤膏貼之。數日即收完。誠良法也。

犀角　味苦酸鹹。氣寒。無毒。氣薄味厚。陽中之陰。降也。入手太陰。少陰。足厥陰。少陰經。

（陶隱居曰犀出流南山谷及武陵交州寧州京海西番南番諸處海南者為上黔蜀者次之花紋通透者為上花紋隱混者次之李氏曰犀有山犀水犀兕犀三種山犀水犀並有二角又有毛犀似之山犀居山林間人多得之水犀出水中最為難得海南者為上狀似牛豬首大腹卑腳三蹄前腳直而無膝依木為息木倒則仆不易起也舌有刺喜啖竹木棘及毒物飲濁水不欲自見其影皮孔三毛如豕有一角二角三角者一在頂上一在額上一在鼻上鼻上者小而不墮頂額者每歲一落自埋山中土人作木角潛易之再三不離其處若直一取之以後退落必藏他處矣二角者鼻角長而額角短一角者有鼻無額有額無鼻角者胡帽犀額角者兕犀也兕犀牝犀也毛色青皮堅可以為鎧又有毛犀二角所謂犛犀也又有水犀出入水中最為難得皮中有珠甲山犀無之按異物志云東海水中有犀牛樂聞絲竹之音彼人動樂則出而聽之因而采之然犀角優劣觀犀紋[illegible]細通察以為差等紋如魚子形者謂之粟紋中有眼者謂之粟眼黑中有黃花者謂之正透黃中有紋

黑花者謂之倒透花中復有花者謂之重透並名通犀乃上品也又紋有倒插者一半以下通紋有正插者一半以上通紋有腰股插者中段不通亦名通犀又角上有一白縷直上至端夜露不濡謂之通天犀漢書有駭雞犀置米飼雞驚駭不敢喙置屋上烏鳥不敢集犀角有最大者一枝重七八觔名墮羅犀云是牯犀額中之角又有花紋多如撒豆斑色夜視有光者曰夜明犀通神分水犀獸見之皆驚乃絕品也又有理文盤結作百物形者亦為上品又有花如撒豆斑色者次之烏犀純黑無花紋者為下兕角理紋細膩斑白分明不混者不可入藥如奴犀牸犀病水犀攣子犀無潤犀俱不可用惟取肌皺折裂光潤者剉屑以薄紙裹置懷中蒸燥乘熱搗之應手成粉故歸田錄云翡翠銷金人氣粉犀此亦異也○陳氏曰又山海經有白犀開元遺事交趾所貢有辟寒犀色如金冬月暖氣襲人白孔六帖有辟暑犀色如玉夏月藏室中涼氣襲人又嶺表錄有辟塵犀為簪梳帶用塵不近身又杜陽編有蠲忿犀佩之令人蠲去忿怒皆希世之奇珍也又淮南子云犀角置狐穴中狐不敢出入如溫嶠過武昌牛渚磯下多水怪嶠燃犀角照之而水怪見形則犀角之精靈猶可見矣○牯犀紋大牝犀紋細又用犀南犀紋細烏犀有紋顯露黃犀紋絕少皆不及西番者紋高兩腳顯也既云通犀

（必須紋頭顯著，黃黑分明。有雨脚潤滑者爲第一。）

○犀角，涼心鎮肝，散瘀血，解熱毒之藥也。與養元同。犀食百草之毒，及衆木之棘，故能解毒。角乃犀之精靈所聚，胃爲水穀之海，食飲藥物，必先受之。風邪熱毒，必先干之。故前古解一切百毒蠱證，痺熱邪惡，或傷寒瘟疫，邪熱譫妄，或中風痰熱，迷惑失音，或熱極失血，吐衂上逆，或驚癇熱痰，搐搦轉加，或痘瘡熱極，稠密黑陷，或瘄疹熱極，內悶不清，或肝熱生翳，目睛蒙混不明等證，犀角並皆治之。此乃安心定志，涼血清神之劑。凡入蠱毒之鄉，飲食以此攪之，有毒即生白沫，無毒則否。如痘瘡氣虛乾枯黑陷者，傷寒陽虛陰極發躁者，陰寒在內，浮陽

在外，發熱口渴，上衝咽嗌，面赤煩嘔，喜飲涼物，食下良久即復吐出，六脈數細，躁亂不寐者，此屬陰寒之證，犀角慎勿投也。

○集方（方脉正宗）解一切百毒蠱證，用上好真烏犀角，白湯磨汁半碗，調真紫金錠二錢服，立解。○治痺熱中惡，用真烏犀角磨汁半盞，和燈心湯調服。○治傷寒瘟疫，語邪譫妄，因於熱者，用真烏犀角磨汁半盞，和白虎湯調服。○治中風痰熱，迷惑失音，（張心仲方）用真烏犀角磨汁半盞，用防風、天麻、白朮、羌活、當歸、半夏各二錢，細辛八分，人參一錢五分，甘草七分，水煎半碗，和服。○治熱極失血，吐衂不止，用真烏犀角磨汁半盞，童便半盞，用生地黃、牡丹皮，用黃連炮薑炭、白芍藥各二錢，甘草七分，水煎和服。○治小兒驚癇熱痰，搐搦不定，用真烏犀角磨汁半盞，用天竺黃、鈎藤、膽星、茯苓各二錢，牛黃五釐，共研極細，分服五分，犀角汁調服。○治痘瘡熱極，（小兒方）稠密黑陷，用真烏犀角磨汁半盞，用升麻、乾葛、紫草茸、桔梗、甘草各一錢，水煎汁半盞，和服。○治瘄疹熱極，內悶不出，用真烏犀角磨汁半盞，用西河柳五錢，牛蒡子二錢，桔梗、玄參、薄荷、升麻、甘草各一錢，水煎汁，和服。○治肝腎虛熱，目瘴不明，用真烏犀角磨汁十餘匙，每晚食後燈心湯化服。

續補方，治痘瘡血熱，初見點紅艷，壯熱口渴，煩燥狂語，用真烏犀角磨汁十餘匙，用生地黃、紅花子、麥門冬、紫

草、牛蒡子、黃芩各三錢，甘草一錢，水煎半盞，和服。○治小兒恍惚驚悸，痰涎壅塞，或嚼舌仰目，用真烏犀角磨汁半餘匙，調抱龍丸服。○治中風不語，（和劑局方）或中惡氣絕，一切神魂恍惚，癲狂擾亂，用真烏犀角磨汁一盞，用天竺黃、丹砂、雄黃、天南星各一兩，玳瑁屑、琥珀各一兩二錢，人參八錢，焙，俱研極細末，再加冰片、麝香、牛黃各一錢五分，金箔、銀箔各三十張，亦總研勻，以犀角汁和入，再加煉白蜜少許和丸，如梧子大。大人服五丸或七丸，小兒服三丸或一丸，俱用生薑泡湯化下。○治中毒藥箭，以真烏犀角末，抹瘡中，立愈。○治下痢鮮血，用真烏犀角一兩，鎊屑、地榆、槐、生地各三兩，（共爲末，煉蜜丸，梧子大，每服三錢，白湯下。）

羚羊角、味淡。氣寒。無毒。氣薄味厚。陽中之陰。降也。入手太陰。少陰。足厥陰經。

（別錄曰、羚羊出石城、及華陰山谷。今出建平、宜都諸蠻山中、及西域。形似羊。毛青而麁。夜宿獨棲。掛角樹上。兩角者多。一角者更佳。其角白亮如玉。長七八寸、細如人指。有節。蹙蹙圓繞。灣而深銳緊小。有掛痕者。爲眞。其節亦密。內有天生木胎者。別有山羊、山馬角。頗相似。不可不審。但山羊、山馬角、大而節疎。僅一邊有節也。修治以鐵錯剉細。更研萬轉搗。篩極細入藥用。免刮人腸。）

○羚羊角、安神志。治驚惕。却鬼魅不祥之藥也。（甄權）白尚之曰。羚羊、獸之至靈。而筋骨之精。所注在角。其質至堅。其性至神。又角內有木胎。乃厥陰風木之劑焉。故前人治肝虛內熱。驚惕夢魘。爲狂怒。爲搐搦。如大人中風。小兒驚風。是所必需者也。又如傷寒時氣。溫風注毒。留在肌膚。（此四句出○繆仲淳）邪熱厥氣。伏在骨髓。或心驚狂動。煩亂不寧。或譫語無倫。人情顛倒。悉屬厥陰風木爲眚。投此即定。有以類相感之効也。已上諸病。若心肝二經。虛而有熱者。宜之。倘虛而無熱者。勿用也。

本草發明曰、羊、火畜也。而羚羊則屬木。故其角入厥陰肝經。同氣相求也。肝主木。開竅于目。其發病爲障翳目暗。而羚羊角能清之。肝主風。在合爲筋。其發病爲小兒驚癇。婦人子癇。大人中風搐搦。及筋脉攣急。歷節掣痛。而羚羊角能舒之。魂者。肝之神也。其發病爲驚駭恐怖。狂越僻謬。魘寐卒死。而羚羊角能安之。血者。肝之藏也。其發病爲産後血氣瘀滯。下注毒痢。積熱痧疹。餘毒而羚羊角能散之。又相火寄于肝膽。在氣爲怒。病則煩懣氣逆。食噎不通。及時氣寒熱。傷寒伏熱。熱蒸肌骨。時愈時發。而羚羊角能降之。羚之性靈。而筋骨之精在角。故又能辟邪惡而解諸毒。碎金剛石。而燒烟走蛇虺也。農皇本經。與陶氏別錄。兩著其功。而近俗罕能發揚。惜哉。

（李時珍摘）

○集方、（方脉正宗）治肝虛內熱。時驚惕。時夢魘。時狂怒。時搐搦。或大人中風。小兒驚風。及五癇癲癡。人事狐惑。一切心神失靈。肝神昏亂諸證。用眞羚羊角、白湯磨汁半盞。以半夏、當歸、防風、天麻、茯苓、棗仁、人參、白朮、鈎藤、各三錢。水煎一鍾。和角汁服。立安。小兒減十分之七。○治傷寒時氣寒熱伏熱。汗吐下後。餘熱不退。或心驚狂動。煩亂不寧。或譫語無倫。人情顛倒。脉仍數急。遷延不愈。用羚羊角、磨汁半盞。以甘草、燈心、各一錢。煎湯和服。○（醫方要）治肝經風熱內盛。目昏翳障。用羚羊角、磨汁半盞。以草決明、黑山梔、薄荷葉、防風、黃芩、蒺藜、甘菊花、各二錢。煎湯和服。○（同上）治血虛筋脉攣急。或歷節掣痛。用羚羊角、磨汁半盞。以金銀花、一兩五錢。煎湯一碗。和服。○（濟陰全書）治産後血氣不和。或失血過多。形神憔悴。或淋瀝不淨。時止時來。用羚羊角、磨汁半盞。以當歸、三錢。懷熟地、二錢。白芍藥、一錢五分。川芎、一錢。煎湯和服。○治時行毒痢。下血不止。用羚羊角、磨汁半盞。以阿膠、二錢。白芍藥、一錢五分。川黃連、

一錢甘草五分煎湯和服○治痘（張抑）後餘毒未淸隨處癰腫用羚羊角磨汁半盞以黃耆金銀花各二兩煎湯和服○治肝（傅壹）熱復爲鬱怒所觸漸致食噎不通用羚羊角磨汁半盞和白湯半盞薑汁三茶匙徐徐服

山羊血味甘氣溫性熱無毒通行藏府一十五經絡三百六十五關節諸處（陶氏曰山羊出羌夷及西夏廣西其形似大有角其性善鬭雖力盡不死李氏曰有二種一種角大盤環體重百觔者一種稍小而角細者出則二三羣行發力如箭莫可色視捕者張夾網羅之取血凝成色如乾漆）

○山羊血行血活血省暖週身血脉之靈藥也倪朱謨曰此獸中最猛健而力善攫者其血大能活血散血如人苦受杖打血凝垂死跌撲內損血脹垂絕或內傷藏府

筋骨脫絡外損血脉破裂皮肉色變氣將絕者用一二釐溫酒調化灌入喉中卽生市者多以他物僞充售受者惟以見効方眞戊午闈中一儒懷挾受杖氣絕服二釐鄉家一僕主命掃屋失腳墮地跌傷頭腦血出不止先用古石灰敷蓋傷處血雖止人事昏暈一日不甦服一釐一鄉人偶觸營卒衆卒攢打垂死服二釐俱用溫酒調化下嚥卽活此三人朱自試用見効特紀以聞其肉大補虛勞脫力內傷筋骨痺弱又治男子精寒髓乏陽事不振或婦人積年淋帶腰脊痠軟血冷不育等證用酒煮爛和椒鹽作脯食甚佳

鹿茸味甘氣溫無毒氣薄味厚陰中之陽也入手足少陰厥陰經（抱朴子曰深山多鹿每一牡遊牝十數至春瘦夏惟食菖蒲卽肥當解角之時其茸甚痛獵人得之以索繫住取落茸然後斃鹿血氣未散蓋其力盡在茸中故也色如紫茄其實難得取時不可太嫩又不可太老惟長二三寸形如馬鞍分岐茸端似瑪瑙紅玉色破之肌如朽木者最善今殺鹿後取茸連頂骨者力稍不及[illegible]）

○鹿茸峻補元陽充實血氣生長精髓健利筋骨溫養腎命之藥也茹日江曰按沈存中筆談云凡含血之物肉易長筋次之骨最難長故人自胚胎以至成人二十年骨髓方堅惟麋鹿之角自生至堅無兩月之久大者至二十餘觔計一日夜卽生數兩凡骨之生無速於此此所以能補骨血堅陽道益精髓也况頭爲諸陽之會鹿

之精血上鍾于茸角豈可與凡物比哉故治療虛損之功遒于參耆附桂之上較之鹿之角膠而茸更十倍之力也如龍潭藥性云治男子勞傷不足眞陽頓損手足寒麻腳膝無力或遺精夢泄小便不禁治婦人久崩漏下眞陰日虧頭眩欲仆腰脊冷疼或夢與鬼交白帶時下治小兒痘瘡虛白漿水不充或大便泄瀉寒戰咬牙治老人脾腎衰寒命門無火或飲食減常大便溏滑諸證

○集方治已上諸證與鹿角膠配用諸藥同惟小兒痘瘡漿淸不濃作瀉而寒戰者用鹿茸配入異攻散○治老人脾腎衰寒食少大便泄者用鹿茸配入桂附八味丸

麝臍香、味辛。氣溫。性散。無毒。氣味俱厚。可升可降。入足太陰、手少陰經。

蘇氏曰。麝多生陜西、河東、益州、秦州、文州等處。諸蠻夷中尤多。新州、光州或時亦有。陶氏曰。形似麞麋而小。色黑褐。嘗食柏葉。夏月多噉蛇蟲。至冬香精。人春滿甚。便自剔去。香生陰莖前。皮內別有膜袋盛之。性多忌。所遺糞溺皆就一處。雖遠逐。必還走之。不敢遺迹他所。處爲人獲。人反以是求得。必驚群而獲之。釋獸云。虎豹之文來田。麝之香來射。則其皮與臍之爲累也。凡用須辨眞僞。生香心結。難不易得。但取香臍中之當門子。擲之如血線。揭之如桃花瓣。膜甚者始眞。纏膜囊完固尤多爲上。分三種。第一名生香。即自剔出之遺香也。但不易得。香聚之處。草木不生。帶過園林。瓜果皆敗。是其驗也。其次名臍香。即捕得殺取者。其三名心結香。即麝遇山獸捕逐。驚畏失心。狂走墜死者。人得之。破心見血流出脾上。作乾血塊者。不堪入藥。又一種。名水麝香。臍中惟水。即取其藏錫器中。不走香氣。滴一點于斗水中。用酒衣服。經年香氣不散。此物性惟愛臍。爲人所急逐。即投巖舉爪剔裂其香。就縶而死。猶拱四足。保其臍也。酉陽雜俎云。唐天寶初。虞人獻活麝。養於囿中。以針刺其臍。

取香。捻以雄黃末。則臍復合。其香倍于肉麝。又有靈貓似麝。生南海山谷。如貓身。亦曰靈貍。其臍香亦可充麝。（其毛可以爲筆。寫書不鈍。修治。向日開之。配他藥。微研用。）李時珍

○麝臍香。開經絡。通諸竅。透肌骨。辟蛇蟲諸毒之藥也。方益明曰。此藥辛香走竄。能自內達外。凡毫毛肌肉骨節諸竅。凡有風、寒、火、氣、痰、涎、血、食。鬱滯不通者。以此立開。故農皇本經主辟惡氣。化蟲積。散蠱毒。殺鬼精物（血瘕鬼胎）之類。如聖惠方入瘍科用。徹膿血。去死肌。入眼科用。退翳障。散瘀血。入婦人科用。下難產。落胎孕。入嬰兒科用。定驚癇。吐風痰。入方脈科用。通關竅。活痰結。解瓜果食積。[illegible]積。消塊。癥瘕諸證。蓋取此辛香芳烈。借其氣以達于[illegible]推陳而致新也。方氏曰。雖爲清氣散邪之藥。如中

惡邪氣。心腹暴病。痛脹痞急。痰閉氣滯諸疾。一時暫以開通。開通之後。不可復用。凡氣血兩虛。似中風證。小兒慢脾驚風。與夫陰陽虛竭。發熱吐血。氣虛眩暈。氣虛痰結。血虛痿痺。血虛目翳。心虛驚悸。肝虛癇痓。脾虛氣厥。產後血暈。中虛痞脹諸證。或癰疽膿血已泄。新肉將長之時。麝香藥勿輕用。

○集方見諸證條下。此不復贅。

腽肭臍，味鹹。氣熱。無毒。可升可降，陽也。入足太陰、少陰經。

又名海狗腎。

（寇氏曰：腽肭臍出突厥、新羅，又云及三佛齊國。今遼西營州及登萊州時或有之。毛色似狐，以鹿頭似狗，足似犬，尾似魚而長。入藥用外腎，而曰臍者，連臍取之也。試其臍，於凍月衝風處置水盆中浸之，不冰者爲真。或置睡犬頭上，其犬忽驚跳狂走者，亦真也。雷氏曰：修治取外腎并臍，切碎，酒浸一伏，凡烘乾搗細用。）

○腽肭臍，興陽補腎，壯精助房力之藥也。陳赤葵曰：性熱壯陽，如腎氣衰弱，精寒髓冷，陽絕莖痿者，服此立振而起。如藏器方治積年心腹冷痛，或宿血結塊，或痃癖羸寒，或四肢冷麻無力，或腰脊肩背久疼等證，蓋因陽氣不充，血液衰少，故諸邪纏結爲病也。此藥壯助元陽，暖血生精，溫潤筋骨。近世滋補丸料多用此者，精不足，補之以味也。他如陰虛火熾，陽強不倒，或陽事易舉，及骨蒸夜熱，勞嗽吐痰等候，咸在所忌。

刺蝟皮，味苦，氣平。無毒。

（別錄曰：刺蝟生吳楚山谷，狀如貒，大者如豚，小者如瓜。毛刺蹙縮，形又如栗房，其頭嘴似鼠，刺毛似豪豬，腳短尾長，色蒼白，或灰色。乾蝟皮，并刺作刷，治紕帛絕佳。土人有畜養者。）

○刺蝟皮，止五痔，下血，陰蝕，瘻瘡，血汁涓涓之藥也。朱正泉曰：此物伸屈不時，千毛萬刺，力通百絡，攻透孔竅，故前古治五痔蝕瘻延生，以此酒浸，火炙乾，研末，空心白湯調服三錢，七個全愈。

鹿角膠，味甘，氣溫，無毒。氣薄味厚，陰中之陽，入手足少陰、厥陰經。

（繆氏曰：鹿者仙獸，自能樂性，遊處山林，從事雲泉，志無忌，性警防，善接其類，與麋爲友。有角無齒者牡，曰麚；無角有齒者牝，曰麀。無齒謂無齦齒，若下齶則牝牡咸有，與禽鳥之輿角無齒似同而實異也。李氏曰：隨處山中有之。馬身羊尾，頭側而長，腳高而行速。牝小于牡，毛雜黃白；牡大于牝，毛間黃白，故云牡質斑斑，斑斑，點點如星星也。行則同旅，食則相呼，性喜食龜，能別良草，不食諸毒。分背而食，在野則羣，長因頭相望，伏衆龜長乃食。羣小互爲衛視矣。集居必環角外向，臥眠必口接尾閭。性善決，緊故其跡遮而不瓜。詩云：町疃鹿場。言町畦村疃無人爲，故鹿以爲場也。物類考云：鹿好羣而相比，陽類也。故夏至感陰氣而角解，從陽退之象爾。麋則冬至感陽氣而角解，從陰退之象爾。麋孕子于仲春，而生于秋。鹿孕子于仲秋，而生于春。其子曰麂。子生徉兩或水，乃行地耳。格物論云：鹿千年者色蒼，又五百年者色白，再五百年者色玄。玄之又玄，仙化登乎天矣。埤雅云：鹿六十年懷瓊于角下者，角有斑痕，紫色如點，行或有涎出于口，不復能急走也。故曰：鹿戴玉而角斑，魚懷珠而鱗紫。故有諸中，未有不形諸外矣。陶隱居云：今荊楚之地，其鹿大，絕似馬，當解角時，望之無辨，土人謂之馬鹿。以是知趙高指鹿爲馬，蓋因似以作誑爾。角解之後，嫩生之角曰茸，色如茄紫者爲上。修製鹿角膠法：用鹿角五十斤，寸截，用淨水浸二日，入大鍋內，煎以水二大担，煎十去其七，濾出汁。其渣再用淨水煎，如前法，其角酥爛，即成鹿角霜矣。其汁合初次汁，入砂鍋內，慢火煎熬，以桃柳枝不住手攪，以凝爲度，即成膠矣。用淨銅杓兜入盆內，冷凝，以刀劃成塊。每早晚用好酒一鍾，頓膠三錢，溶化服。李時珍）

○鹿角膠，壯元陽，補血氣，生精髓，暖筋骨之藥也。陳月坡曰：鹿，陽獸也。臥則口接尾閭，以通督脈。性喜食龜，以交任脈。夏至其角自解者，有陽足陰生之象。然一身皮肉筋骨、腸胃，皆能養人之陽，而角又陽質陰精之銳氣在是焉。故前古主傷中勞絕，腰痛羸瘦，補血氣精髓筋骨腸胃，虛者補之，損者培之，絕者續之，怯者強之，寒者暖之。此係血屬之精，較之草木無情，更增一籌之力矣。如薛氏方主婦人血冷阻閉，子宮不育，或血潰崩流，淋瀝作痛，又安胎元，止半產，腸虛多汗，陰虛遺精，血寒脫血諸證，能峻補腎命，通調營衛，功無匹矣。如腸胃有鬱火者，陽有餘陰不足者，諸病因血熱者，俱忌用之。苟非精寒血冷，陽衰命門無火者，不可槩用。

○集方（方脉正宗）治五藏陽虛，氣弱精血，內損傷中，勞絕，頭眩目暈，耳鳴耳聾，四肢無力，腰脊痠疼，腳膝痿軟，或小便下墜欲遺，或精水不時溢出，或久痢久瘧，遷延不休，或久漏癰瘍，膿水不滑，或男子陽絕無子，婦人陰痿不育，或經歲久崩淋瀝不斷，或頻年白帶下脫不痊，或胃腸久虛溏瀉不實。凡一切虛寒痼冷久頑不愈之證，並皆治之。用鹿角膠一斤，剪碎，麥麪拌炒，人參八兩，白朮、當歸、白芍藥、枸杞子、石斛、杜仲、茯苓、山藥、補骨脂、女貞實、覆盆子、黃耆各四兩，肉桂、木香、砂仁各二兩，俱酒拌炒，共研爲極細末，煉蜜丸彈子大，每服二丸，早晚米湯化下。○一方用鹿角膠二錢，龜板膠一錢，酒一盞浸過夜，清晨隔湯溶化，日日服之，悅顏色，養精神，補腎命，於老人爲延年養生，卻病良藥。

○生鹿角（味鹹，氣溫，有毒）散熱行血，消腫辟毒之藥也。以刀刮屑，（譚氏時小）（集）白酒調服二三錢。○鹿角霜（味濇，氣溫，無毒）收濕止痢，去婦人白帶之良方。每早晚白湯調服三錢。

鱗部（龍類）

龍骨味甘澀，氣平，無毒。可升可降，陽中之陰，入手足少陰、厥陰經。

別錄曰：龍骨出晉地。雷氏曰：太山、剡州、滄州、太原山巖水岸土穴中，此龍化蛻脫之處仰有也。其骨細、其文廣者雌，其骨粗、其文狹者雄。五色具者上，白黃色者中，純黑者下矣。蘇氏曰：各隨五色，合五藏，如五芝、五石脂、五石英之入五藏也。爾雅翼云：鱗蟲三百六十，而龍爲之長。說文云：龍春分登天，秋分潛淵，陰中之陽，故夏月龍舉而雲興，物之至靈者也。盧氏曰：按淮南子云：羽毛鱗介皆祖于龍。羽嘉生飛龍，飛龍生鳳凰，而後鸞鶴庶鳥，凡羽族者以次生焉；毛犢生應龍，應龍生建馬，而後麒麟庶獸，凡毛族者以次生焉；鱗介生蛟龍，蛟龍生鯤鯁，而後建邪庶魚，凡鱗族者以次生焉；介潭生先龍，先龍生玄黿，而後靈龜庶龜，凡介族者以次生焉。埤雅云：龍鱗八十有一，具九九之數，陽之極也，故爲長而司水。鯉鱗三十有六，具六六之數，陰之極也，故變陽而化龍。又云：龍卵生思抱，雄鳴上風，雌鳴下風，因風而化。廣雅云：有鱗曰蛟龍，有翼曰應龍，有角曰虬龍，無角曰蟠龍。

朱升天曰：蟠龍玉符稱世俗畫龍之狀，馬首蛇尾。又有三停九似之說，謂自首至膊、膊至腰、腰至尾，皆相停也。九似者，角似鹿，頭似駝，眼似鬼，項似蛇，腹似蜃，鱗似魚，爪似鷹，掌似虎，耳似牛也。或曰龍無耳，故以角聽。又云驪龍之眸，見千里纖芥。論衡云：龍頭上有骨，如博山形，名曰尺木，無尺木者不能昇天。其爲性粗猛，而畏鐵，愛玉及空青，而嗜燕，故食燕人不可渡海。又曰蛟龍畏楝葉及五色線，故漢以來祭屈原者，以五色線合楝葉裹糯米，縛而擲之，則蛟龍不敢吞。故古之豢龍氏、御龍氏以知其好惡而飾制之。將雨則吟，其聲如戛銅盤。其涎能發眾香，其噓氣能成雲，因雲以藏其身，故其形不能全見。今江湖間將有見其爪與尾者，歲時云五月後龍乃分方，各有區域，故雨咸之間，雨陽異焉。又多暴雨，說者曰：細潤者天雨，猛驟者龍雨也。又龍火與人火相反，得濕即焰，遇水而燔，以火逐之則息而滅矣。服食者所當知其如此。江氏曰：如修治龍骨，用火煨三時辰，研萬匝極細用。

方龍潭

○龍骨，安心神，定魂魄，斂虛汗，收脫泄之藥也。周士和曰：龍，東方之神也，稟陽氣以生，爲神靈之物也。其骨雖係脫化之餘，其體堅重，其質粘着，其性收澀，故本草主精物鬼魅爲患，小兒驚癇，大人顛狂，神志浮越不寧之證，以此神以寧之，堅重以鎮之，所以能安心神，定魂魄，而驚癇狂亂之證宜其專用之也。如日華子言能斂虛汗，止泄瀉，滲水氣者，總因收攝斂澀以固脫之義。如別錄文治遺精淋濁、崩漏帶下、滑脫諸病者，亦歸斂閉精氣、收攝神藏之極功也。已上諸病，倘因血熱積滯爲患者，法當通利疏泄，不可便用此止濇之劑，恐積滯瘀血未清，反能爲害也。惟久病虛脫者不在所忌。

（已下集方有方蘇正宗）

○集方：治大人小兒一切癲狂驚癇、風癇，神志不寧等疾。用龍骨三兩，火煅研極細末，犀角、丹砂、琥珀、天竺黃各

五錢，俱研極細末，鉤藤、懷生地、茯苓各一兩五錢，俱微○炒燥爲極細末，蘇合香三錢，牛黃三錢，俱用酒溶化，共末共總和一處，用膽星八錢研細末，竹瀝一碗，打糊爲丸，如梧子大。大人服十丸，小兒服二三丸，俱用生薑湯調灌。○治心虛盜汗。用龍骨五錢，火煅，茯苓一兩，人參八錢，蓮肉五兩，俱微炒，共研爲末，麥門冬去心四兩，酒煮搗爛成膏，爲丸梧子大。每早晚各服三錢，白湯下。○治泄瀉不止。用龍骨、赤石脂各等分，俱火煅，研極細末，飯丸梧子大。大人用三錢，小兒用五分，用木瓜湯下。亦治休息久痢。○治遺精淋濁，血崩漏下，白帶久痢諸疾。用龍骨三兩，火煅，當歸身酒炒，酸棗仁各二兩，炒白朮

三兩。土拌炒車前子一兩五錢。炒。共爲末。煉蜜丸梧子大。每早服四錢。烏梅湯下。○治小兒臍濕生瘡。兩胯濕爛成瘡。用龍骨。研極細末。摻之卽愈。

倪朱謨曰：龍骨一品。本經謂死龍之骨。陶氏謂蛻化之骨。後之臆度者。辯訟紛紛。總之未嘗親見。此韓退之所以有獲麟解也。竊以龍爲神物。或飛或潛。或大或小。靈奇變化。莫可色相。是必無死理。卽曰肉血生養。終須尸蛻。然外有爪、牙、鱗、鬣、鬚、角之形。內有筋骨、府藏、吞吐之具。其骨雖經蛻化。寧非血肉所滋。自當有髓、有節、有竅、有絡。一經火燒酒淬。中之津氣油液。當必滲退。雖積久土化。性或常存。今火燒則頑硬無烟。口嚼則冷淡無味。搗研則堅銳不靡。輾萬匝方細。纔以齒叩之。仍磣磣如石之屑。號曰龍骨。朱甚惑之。間嘗過晉蜀山谷。爲訪所産龍骨之處。岩石稜峭。谿徑墳衍。則有礧礧如龍鱗隱起如爪牙者。隨地掘之。盡皆龍骨。豈眞龍之骨。有若此之多。而又皆盡積於梁、益諸山也。要皆石燕、石蟹之倫。氣成形。石化而非龍化耳。朱實有見於此。不敢不爲辯。

稱集方：治兩耳濕爛。久不收斂。用龍骨、赤石脂俱火海螵蛸。水煮過。各三錢。共研細末。先用綿紙條拭乾水。後吹末藥。

蛤蚧、味鹹。氣平。有小毒。可升可降。入手太陰、厥陰經。（馬氏曰：蛤蚧生嶺南山谷。及城牆。或大樹間。形如守宮而大。首如蝦蟇。背綠色。有細鱗如蠶子。身長四五寸。尾與身等。雌雄相隨。旦暮則鳴。近日廣南及陝西。亦有之。其狀稍小。滋力一般。土人采之。剖腹去腸肚。以竹條張開。曝乾用。雷氏曰：雄爲蛤。雌爲蚧。雄者皮粗。口大身小尾粗。雌者皮細。口尖。身大。尾小。其聲最大。多居木竅間。顧氏曰：廣西橫州甚多。雄雌上下相呼累日。情洽乃交。兩相抱負。自墮于地。人往捕之。亦不知覺。以手分劈。雖死不開。雷氏曰：去頭足。鱗鬣。雌雄俱用。以酒炙。研細用。試法：口含少許。奔走不喘方眞。）

○蛤蚧、清肺熱。補肺虛。定咳嗽。止傳尸之藥也。陸平林曰：此物居不獨處。出必雙行。鳴則牝牡相呼。得陰陽相合之義。故海藏本草。療肺痿肺癰。咯血咳血。欬逆息急而喘者。投此立定。按十劑云：補可去弱。人參、羊肉之屬。蛤蚧補肺定喘。生津退熱。功並人參。益陰血。扶羸弱。止傳尸。功同羊肉。凡氣液衰。陰血竭者。宜加用之。（楊氏傳山集）

○集方：治一切陰虛勞損。吐血咳嗽。及骨蒸夜熱盜汗諸證。用蛤蚧一對。酒潤。火上炙黃。研細末。配諸補劑丸散膏丹。隨方加入。

鯪鯉（又名穿山甲）味鹹、氣寒。有毒。可升可降。陽中之陰。入足太陰、厥陰經。（蘇氏曰、鯪鯉生湖廣、嶺南、及金商、均、房諸州、深山大谷中。陶氏曰、形似鼉而小、背似鯉而濶、首似鼠而大、腹有毛、口中無齒、尖喙長舌、四足五爪、尾與身等、府藏俱全、其胃獨厚、穴陵而居、以蟻為食、日中張甲若死狀、滿氣最腥。開甲誘蟻入其中、即閉甲入水、蟻浮水面、吸而啖之。肉裹美好、閩人用此供饌。李氏曰、修治或炒或燒、或炙以酥、以醋、以酒、以童便、或煎以油、或炒以土、各隨方製。取用尾甲三稜、力勝他）

○穿山甲去風痰、推膿毒、直穿經絡、入達營分之藥也。程君安曰、此物穿山而居、寓水而食、出陰入陽、能攻穿經絡、入達病所、故時珍方主癰疽發背、疔毒乳癰、便毒腸肚內發陰疽、一切瘍毒等證、形勢已成、潰膿未出、用山甲之穿利、透膿解毒、定痛消腫、則無內陷之患矣。日華方又能散諸風、一身筋骨肢節不利、或頸項強痛、或臂脇攻痛、或足膝痺痛、或久瘧寒熱無時、延月不愈、或婦人乳汁不行、乳房腫痛、蓋此藥性能攻達走竄、故能加是取効也。凡病非關風濕、風毒、及癰瘍之證、不必用。

○集方、治一切癰疽發背、疔毒乳癰、便癰腸肚內發癰疽、未潰可散、已潰排膿出毒、用十五味活命飲、用穿山甲為君。方見木部乳香集方內。（已下三方見方脈正宗）○治諸風一身筋骨肢節不利、或頸項強痛、或臂脇攻痛、或足膝痺痛、用穿山甲二兩、炒焦、當歸、川芎俱酒炒、乳香、沒藥焙、川烏、童便製、黃栢鹽水炒、薑黃炒、各一兩、蘄蛇一條、焙燥、俱為極細末、每早晚各服三錢、白湯下。○治久瘧不愈、用穿山甲、牛膝、當歸、川芎各六錢、白朮土拌炒、何首烏、和黑豆蒸煮、各一兩二錢、肉桂三錢、分作三劑服。○治婦人乳汁不行、乳旁腫痛者、用穿山甲六錢、王不留行九錢、乳香、沒藥、麻黃、天花粉各四錢五分、蒲公英一兩二錢、分作三劑服。

守宮、（又名蝎虎）味鹹。氣寒。有小毒。

（李氏曰，蝎虎生人家牆壁間，狀如蛇醫，灰黑色扁首長頸，細鱗四足，長者五六寸，亦不聞噬人。南方有十二時蟲，即蝎虎之狀，但黃褐青赤四色，十二時中更變易身亦狀守宮。○李氏曰，生山石間，曰石龍子，即蜥蜴似蛇，有四足，頭扁尾長，形細，大者長尺，小者五六七八寸，有細鱗，金碧色。生草澤間者，曰蛇醫，頭大尾短，形粗，其色青黃，亦有白色者，又能入水與魚合，不入藥用。生原野間者，曰守宮，即蝎虎也，似蛇醫而短小，身褐色，尾亦短。三種並不螫人。又按夷堅志云，劉子見山中有蜥蜴百枚，長二三尺，色金碧，光燦如腈，吐雹如彈丸者數十枚。行未數里，俄頃風雷雨雹大作。今道家取此祈雨，蓋取此義。珍）

○守宮，治風癇急驚瘰癧流注之藥也。沈孔庭曰：守宮善食蝎蠆蝎蟲，乃治風要藥。故李氏方言守宮所治風痓驚癇諸病，亦猶蜈蝎之性，能透經絡，化痰涎也。且入血分，如瘰癧流注，及疳積食痞，亦屬血分凝結於經絡。故

延生不已，用此攻散凝結之血，所以兼主之也。倘病屬血虛氣弱，非關風痰風毒所感者，宜斟酌用之。

○集方：治小兒臍風，用蝎虎後半截，焙為末，用人乳汁調勻，入雄雞矢一分，搽舌根及牙關，再以熱手輕摩病兒胸腹背間，取汗出甚妙。（[illegible]方）○治久年風癇，用蝎虎一箇，剪去四足及尾，研爛，珍珠二分，和豆腐煮研細，麝香冰片各三分，共研勻，大人服三分，小兒服一分，用薄荷湯送。（許幼良方）○治瘰癧初起，用蝎虎一二枚，焙燥研末，每日食後服五釐，酒調下，或乘活搗爛敷，癧漸消。（[illegible]）○治男婦大小人血積成塊，用蝎虎一二枚，研爛，白乾麪五錢和丸，梧子大，每早服三錢，白湯下，當下血塊，不過一二次即愈。○治小

兒疳積羸瘦，面黃腹大，及無辜猢疳，用蝎虎一個，微炙乾，蝸牛殼三個，靛青二錢，雄黃一錢，俱研細，麝香冰片各一分，再總研勻，米醋打神麯糊為丸，黍米大，每服五丸，白湯化下，早晚各一服。（方脈正宗）○治歷節風痛不可忍，用蝎虎三個，白頸蚯蚓五條，俱生研爛，螃蟹蟲三個，紙包煨研爛，草烏三個，酒煮一時辰，木香五錢，乳香出汗，沒藥出汗各二錢，麝香冰片各五分，俱研細，再總研勻，酒打麥麪作糊為丸，梧子大，每早晚各服二十丸，漸効。（聖濟錄）○治大麻風成癩，用蝎虎五個，生搗爛成膏，生半夏二兩，研細末，和入蝎虎膏內，丸梧子大，每服五十丸，濃煎蘗豆湯吞下。（衛生寶鑑）○治癰瘡大痛，用蝎虎焙乾研末，脂麻油調傅

即止痛。（[illegible]）

○斷蝎（味鹹氣寒有小毒）　利水道，通小便，下瘀血，破胎娠之藥也。（別錄）

翟秉元曰：按冦李二氏方云，蜥蜴能聚雹致雨，故能治癃淋，利水道，下瘀血，其功長於利水。故千金方治血瘀癥結，血閉水腫，尸疰留飲諸疾。

治翻胃方：用蝎虎二五個，取公雞一隻，籠住餓二日，只與水吃，或頻灌水數十匙，揁淨肚腸，將蝎虎切碎，與雞食之，取糞焙乾為末，每服一錢，燒酒送下。○又方只用活蝎虎一個，燒酒半壺，入蝎虎浸七日，將酒頓熱，去蝎虎只飲酒即愈。治蠱亦同。（萬病回春）

蛇蛻味鹹甘，氣平，無毒。可升可降，陰中陽也。通行十二經。（蔺氏曰：蛇出東南諸郡。在禽爲翼火，在卦爲巽風，在神爲玄武，在物爲毒蟲。有水、火、草、木、土五種，青、黃、赤、白、黑、金、翠、斑、花諸色。毒蟲也，而有無毒者；鱗蟲也，而有生毛者；卵生也，而有胎產者；腹行也，而有四足者；又有冠角者、翼者、飛者、獸首者、人面者、兩首者、兩身者、岐尾者、鈎尾者、鱗尾者、穗形者、杵形者；又有青蝰白蛇蒼雁文、蒸白頸、黑甲、赤目、黃口之類。其出以春，其蟄以冬。其舌雙，其耳聾，其聽以目，其蟠向壬，其毒在涎，其珠在口。其行也紆，其食也吞。皮數解蛻，性處方藥。蛇交蛇則雄入雌腹，蛇交雉則生蜃及蟂。蛇以龜爲雌，又與鱧、鱓通氣。入水交石斑魚，入山與孔雀匹。竹化蛇，蛇化雉燹鰆蛇。蛇榛風，水蛇化鱓。螣蛇化龍，螣蛇聽孕。蚦蛇目圓。巴蛇吞象，蚺蛇吞鹿，玄蛇吞小麈。蛇吞鼠，而有齧蛇之鼠；蛇吞蛙，而有制蛇之川父。蛇令豹止，而有食蛇之貘。蠍蛇同氣，而有啣蛇之蠍。玄鼉食蟒，蝍蛆食蛇，鸛步則蛇出，鴨鳴則蛇結。鸛、鶴、鷹、鷙皆鳥之食蛇者也；虎、猴、鼬、犬皆獸之食蛇者也。蛇所食之蟲，則蛙、鼠、燕、雀、蝙蝠、鳥、鵲；所食之草，則芹、茄、石楠、茱萸、蛇粟；所憎之物，則蘘荷、菴藺、蛇芮草、鶴糞；所畏之藥，則雄黃、雌黃、羖羊角、蜈蚣。誤觸萵菜，則目不見物；炙以桑薪，則足可立出。蛇蟠人足，淋以熱尿，或沃以熱湯，則自解。蛇入人竅，灸以艾炷，或辣以椒末，則自出。內解蛇毒之藥，則雄黃、貝母、大蒜、薤白、蒼耳；外治蛇螫之藥，則大青、鶴蝨、苦苣、堇菜、射罔、薑黃、乾薑、白礬、黑豆葉、黃荊葉、蛇含草、犬糞、鵝糞、蔡苴、雞糞是也。雷氏曰：凡用蛇脫，只用白色如銀者。於人家牆壁屋角間脊退出，如青、黃、蒼色者，勿用。修治，刀切寸斷，以醋浸一宿，火焙乾用。時珍。）（瀕湖）

○蛇脫散風毒，解癰瘍，開喉痺之藥也。李秋江曰：蛇蛻統一身之衣，從口退出。龍則脫骨，蛇則脫皮也。蛇以腹行而速，其性上竄。蛻則自裏出表，退脫而解毒，治風動爲病。故前古主小兒百二十種風邪驚癇癲疾，四肢瘈瘲，搖頭弄舌，寒熱等證，皆屬厥陰肝經爲病也。如日華方治大人喉痺不通，小兒重舌重齶，及目翳膜障，丁腫癰毒，亦取此屬風性竄攻而善散，蛻而善解之義。須五月

蛻之爲佳。

○集方（已下五方俱出方脈正宗）：治遍身一切風癬、風癩、風核、風毒、風麻、風痛、風疵、風癢、風痰、流痛諸疾。用蛇脫一條，去頭尾，酒浸炙黃，爲末。每早晚各服五分，和雄黃末二分，白湯調服。○治一切疔腫癰毒垂危者。用蛇脫二條，去頭尾，（製法同前）俱研末，一條作五丸，用真糞清一盞調服，一條用新鮮人糞調塗患處，四圍毒勢漸減。○治喉痺腫痛。用蛇蛻一條，去頭尾，（製法同前）每服一錢，白湯調服。小兒減半。又一方用蛇蛻燒烟，竹筒吸入喉間，即通。○治小兒百種風邪驚癇癲疾，或四肢瘈瘲，或搖頭弄舌，寒熱往來諸證。用蛇蛻一條，去頭尾，（製法同前）研細末，配雄黃、膽星、天竺黃、黃連、

甘草各三錢，俱研極細末，總和勻。每遇此患，服三分，薄荷湯調服。○治小兒木舌、重舌、重齶。（聖惠方）用蛇蛻，（製法同前）研細末，米醋調敷。○治小兒口緊，不能開合飲食，不出聲者，（千金方）即死。用蛇蛻燒灰傅之。○治目中卒生翳膜，或小兒痘（聖惠方）後目翳。用蛇蛻一條，去頭尾，（製法同前）研細末，以大羊肝二個夾藥縛定，米泔水煮熟，羊肝食之得効。（千金方）○治横生逆產，胞衣不下。用蛇蛻一條，去頭尾，（製法同前）研細末，酒調服三錢，即順。

蚺蛇膽，味苦微甘，氣寒，有小毒。氣薄味厚，陰也，降也。入手少陰、足厥陰、陽明經。（劉氏曰：蚺蛇長十丈，小者四五丈，行而紆徐，冉冉然，非若諸蛇行疾而速也。其蛇身有斑文，如故錦纈。春夏于

深山中，伺鹿吞之，蛇遂羸瘦，待鹿消盡，乃復肥壯。或言一年食一鹿。鹿消盡，乃逸出，則腹中之骨，穿鱗而出。又按王氏曰：黃州山中，多蚺蛇，大者長十餘丈，周圍一丈，食麞鹿。及山獸，骨角隨腐而出。土人采葛藤塞入穴中，蛇嗅之，即靡，乃命多人發穴取之。肉極腴美，皮可冒鼓，及飾刀劍樂器，甚精巧。又虞衡志云：寨兵捕蚺蛇，滿頭插花，蛇即注視不動，或以婦人衣投之，則蟠而不起，乃逼而斷其首，待其騰擲力竭乃斃，舁歸食之，可供官僚。陶氏蚺蛇膽，如鴨子大，狹長通黑，皮膜極薄，舐之味苦，眞徵甜，剔取粟許，着清水中，浮游水上，回旋行走者爲眞，如徑沉而不走者，諸色膽也。然亦勿多着，多着亦沉也。市人以豬牛虎膽僞充，入水亦走散，但遲而不速耳。其膽上旬在頭，中旬在心，下旬在尾。

○蚺蛇膽，退目翳，定癇疾，治小兒疳積成勞之藥也。魏景山曰：蚺蛇稟火土之氣，其膽爲甲乙風木之化，故別錄主目赤腫痛，翳障昏蒙，或五癇陡發，暴仆痰迷，或疳積久困，黃瘠成勞，或跌撲杖打，血悶垂死，或癘風瘡癩，血潰肉敗，關節傾敗，腐穢臭爛等證，用蚺蛇膽二三分，入口即安。功能化痰活血，護心止痛，受杖人服此，能使惡血流通，不上薄心，眞救急之神丹也。

○集方：治目赤目腫，目障目昏不明，用蚺蛇膽半豆許，水化點些須于兩目眥內，立效。（下五方出碩抄驗醫集）○治五癇痰厥，昏迷卒仆，用蚺蛇膽一二分，酒化灌服立甦。每日服一次，連服五次，癇疾永不復發。○治小兒疳積成勞，用蚺蛇膽一錢，每日用一二分，胡黃連二分，煎湯調服，服十次全愈。○治杖打血脹垂危，并跌撲極重者，用蚺蛇膽五錢，血竭、乳香、沒藥、狗頭骨、鱉蝨、天靈蓋、麻皮灰、象牙末各一錢五分，共爲末，煉蜜丸彈子大，每丸重三錢，臨杖服一丸，護心止痛。○治癘風癩瘡，皮肉崩潰者，用蚺蛇膽，每日服二分，白湯化服，一月全安。（醫方摘要）○治痔瘡腫痛，用蚺蛇膽研爛，菜油調塗立效。

○蚺蛇肉，（味甘，氣溫，有小毒。四月勿食。）治癘風，殺三蟲，辟瘟瘴之藥也。（張景林）本草發明曰：按柳子厚云：嶺南永州山野多產異蛇，黑質白章，觸草木盡死，無禦之者。其肉腊之爲餌，可已大風、攣踠、瘻癘、諸瘡，去死肌，殺三蟲。又泉州盧元欽患癘風遍身，惡癩惟鼻未損，五月五日取蚺蛇肉煮食，三五日頓可，百日平復。又集簡方治諸風癱瘓，筋攣骨痛，痿痺麻木，及皮肉瘡疥，膿癩疥癬惡瘡，用蚺蛇肉炙，十兩，皂角刺三兩，好酒十五壺，浸蒸一日，每日隨量飲

白花蛇、味甘鹹。氣溫。有毒。

李氏曰、白花蛇原出南地。及蜀郡諸山中。今惟蘄蛇擅名。即蘄地亦不多得。市肆與官司所取。多以江南興國州者僞充之。蘄產者。龍頭虎口。黑質白花。脅有二十四方勝。腹有十點念珠子。口有四長牙。尾上有一小指甲。腸形如連珠。脊中有兩臂。冠氏曰、諸蛇鼻向下。此獨鼻向上。惟烏蛇性善不噬物。白花者噬人有大毒。元稹云。白花蛇毒人。毛髮豎立。飲于溪澗則泥沙盡沸。惟蘄州白花蛇性少善。故入藥取蘄產者爲貴。又按蛇戶云。白花蛇喜嗜石楠花葉。嘗從藤上獲之。先撒沙土一把。則蟠曲不動。以鐵叉釵定其首。以繩繫其首懸掛。劙刀彼其腹。去腸肚。下置水一盂。則反尾自滌其腹。蓋護創耳。乃以竹條臨其蟠曲。簽定蟠蒸。火上焙乾。爾雅翼云。諸蛇死目皆閉。惟蘄州者目開如生。舒蘄兩界者則一開一閉。此理之不可曉者。又云。欲識眞僞。懸蛇于竈上。或缸上注酒數斗。酒即冉冉而動。如沸者若磁石之吸鐵。琥珀之拾芥然。否則形色雖備。亦無力也。土人僅飲此酒。亦獲大益。得此眞蘄蛇入藥用。功力大倍。雷氏曰、修治去首尾。春秋酒浸三宿。夏一宿。冬五宿。炭火焙燥去骨取肉研末用。

○白花蛇。去風濕。利筋骨。掃瘡疥。活血脉之藥也。（蘇頌）許日聞曰。此蛇生于深山土穴陰霾之處。稟幽暗毒厲之氣。經言風爲百病之長。善行而數變。蛇性走竄。亦善行而數變。又喜食石楠枝葉。所以能透骨搜風。散瘡消疥。舒筋利脉。爲風痺要藥。取其內通藏府。外徹皮膚。無處不到也。而開寶方。治中風濕痺。不仁半身不遂。筋脉拘急。口面喎斜。骨節疼麻。脚弱不能久立。及癘毒延疰。眉髮脫落。一切疥癬瘡癩。風毒痛癢諸疾。取蛇一條。和歸芎、耆朮。牛膝。木瓜。人參各二兩。俱焙燥。好酒十壺浸蒸。早晚各隨量飲之。一切風疾癱瘓瘡疥諸疾。一月奏平。此李瀕湖集簡方之良劑也。如風痺係陰虛血少。內熱而發。非關風濕者。非所宜也。

附隨病加減法。如頭風頭痛。本方加天麻、甘菊、如耳鳴目昏。加蒼耳子、蜜蒙花、如舌本木強。語言蹇澁。加製半夏、膽南星、如臂膊痠疼。不能舉握。加薑黃、海桐皮、如遍身牽引疼痛。不能展動。加虎骨、萆薢、（已上加用諸藥俱各用一兩。）

烏稍蛇、味甘。氣平。有小毒。

蘇氏曰、烏稍蛇。生蘄州、黃州、山中。今商洛諸山。亦有之。背有三稜。色黑如漆。頭圓尾尖。身黑而光。眼有赤色。至枯死。眼不陷。性善不噬生命。亦毒蟲之類。得者多在蘆叢中。吸風及花氣。嘗于蘆叢上得之。小者身細長能穿銅錢一百餘文。活時稱之。重七八錢至一兩者。爲上。重十兩至一鎰者。爲中。如粗大重一二觔者。爲下矣。市肆僞作者。用他蛇熏黑。亦能亂眞。但眼不光。而又陷耳。雷氏曰、凡用此蛇。須辯雌雄。今鄆州烏蛇。頭上有逆毛一寸。一路頭尾相對。腹下有白帶子一條。長一寸者。雄也。捕得去頭及皮鱗帶子。剉斷。苦酒浸一宿。漉出。微火炙

乾用。只重一二兩者。彼處珍重。得此多以進貢。

○烏稍蛇。主治功用。與白花蛇同。茲不贅。

本草彙言卷之十八終

本草彙言卷之十九

錢塘倪朱謨純宇甫選集　男洙龍冲之氏藏稿
南贛劉廷瑞連城甫校正

鱗部（魚類）

鯉魚、味甘。氣平。無毒。

（蘇氏曰、鯉魚處處有之。其色紅。從頭至尾、其三十六鱗、每鱗有黑小點。爲諸魚之長。形既可愛。又能飛昇神變。）

○鯉魚、治水腫。消脚氣。散胎脹之藥也。夏碧潭曰、鯉鱗三十有六。具六六之數。陰之極而陽生。陽生。故能行水消脹。安胎妊而消脚氣也。其功長于利小便。故別錄方又能消黃疸。利濕熱。俱宜煮湯飲之。李氏曰、按丹溪翁言諸魚在水。無一息之停。體質雖寒。能滑腸胃。性又能動風發火。久食發濕中熱。諸魚皆然。不獨鯉也。

○集方治水腫水脹。用大鯉魚一尾。去鱗翅腸肚。用赤小豆五合。水一斗。煮鯉食。飲汁頓盡。利水即差。○又方用大鯉一尾。去鱗翅腸肚。水五升。煮乾。加釀醋少許。蘸食。一日一作。五日愈○治妊娠胎動不安。用大鯉一尾。去鱗翅腸肚。煮熟。和醬油調羹湯飲之。如胎中兼患水腫者。煮鯉飲湯。不可加鹽味○治婦人傷胎下血。及胎動不安。用大鯉一尾。治淨。用糯米二合。黑棗十枚。水二升。煮熟和葱薑醬油調和食之○治積年骨疽有蟲者。用飴糖敷一夜。次早以溫湯洗淨。用生鯉魚肉。切薄片貼之。小頃蟲出。取去。再如法貼之。蟲盡瘡愈。

○鯉魚膽、（味苦。氣寒。無毒）主目熱赤痛。青盲翳障之藥也。聖濟總錄方治目病生翳。及赤脈飛血纏睛。用鯉魚膽汁滴銅鏡上。陰乾。竹刀刮下。每點少許于目眥內。

青魚、味甘。氣平。微有毒。沉也。降也。入足厥陰陽明經。

（蘇氏曰、青魚生江湖閒。南方獨多。北地時或有之。色正青。其頭中骨蒸熟曝乾。狀如琥珀。荊楚人作酒器甚佳。）

○青魚、利濕痺。散脚氣之藥也。釋醫冷菴曰、此魚色青應東方木。入通肝膽。故開寶方治濕痺脚氣者。蓋取此東方青色入通肝膽之義。而膽汁乾收。點一切目赤翳障。三上即効。而頭中骨治心腹卒痛欲死。以白湯磨服。

白魚、味甘。氣平。無毒。

（劉氏曰、白魚生江湖中。大者長六七尺。色白。形窄。腹扁。鱗細。肉有細刺。頭尾俱昂而向上。武王白魚入舟。即此。）

○白魚、開胃下氣。調五藏。令人肥健之藥也。樓淥泉曰、按盧氏曰、白者金色。金者水之母。故仲景方治水亡澤上而消渴。水亡潤下而小便不利。開寶非貴開胃。開胃者。開發上焦。熏膚充身澤毛。若霧露之溉。令人潤身而肥健。氣無不下。水無不去矣。

大氏曰、此魚多食。能使熱中發瘡。故患瘡瘍人不可食。食之發膿。炎瘡不發者。作脯食之良。

石首魚鯗、（又名白鯗）味甘。氣平。無毒。入手足太陰經。

（李氏曰、石首魚生東南海中。其形如白魚，扁身弱骨，細鱗黃色。首有石二枚，瑩潔如玉。腹中白鰾可作膠用。每歲四月，從來自海洋，聯孳延連數里，能鳴，其聲如雷。海人以竹筒探水聞聲，乃下網，截流取之。潑以淡水，皆圉圉無力。初水來者最佳，二水三水來者，形漸小而味漸減矣。羅氏曰：諸魚日暴乾，皆可爲鯗，其味美不及石首。以白色者爲佳，故俗呼白鯗。宜暴極燥，或貯竹節中，以稻草蓋裹，不露風者爲妙。若露風，則變紅色，失味也。）

○石首魚鯗，健養腸胃，清理積痢，消化瓜菓之藥也。陳五占曰：石首魚色黃，成鯗色白，得土金清和之化，有養脾理肺之功。故開寶方治久病胃虛，食減不能進厚味者，以此鯗白水煮爛食之。其性不熱不寒，不燥不膩，能消故滯，能補新清，健利腸胃。爲腸虛胃弱人必需用之，誠藥食中之良品也。如生鮮者，用葱、蒜、香葷和鹽搗拌，壓

實一時，入鍋蒸熟食之，味極鮮美，爲食中佳餚。不免有動風發氣，起痰助毒，有病人不宜食之。

○石首骨（味鹹，氣溫，性燥）研極細，能止久年腦漏。（每晚臨睡時，服一錢，酒調下。）

魚膠　味甘鹹，氣平，無毒。

（李氏曰：魚膠即石首魚之白脬，雖者有之，中空如泡，故諸名曰鰾。可熬爲膠，粘物甚固。此乃工匠日用之物也。）

○魚膠，暖子臟，益精道之藥也。周士和曰：魚膠係石首魚之鰾，甘鹹而寒，乘夏令而出，得水土和平之氣，甘能養脾，鹹能歸腎，故方書用之，善種子安胎，生精補腎，治婦人臨產艱澀不下，及產後一切血崩潰亂，血暈風搐，剪碎和麥麵炒焦，研細末，白湯調服三錢。入十全大補丸料，大補陰陽兩虛，血虛精少。

鯽魚　味甘。氣溫。無毒。

（韓氏曰、鯽魚所在池澤俱有之。形似小鯉，色黑而體促，肚大而脊隆。惟食泥土，不食雜物。其性善竄，遇暴雨急流，此物逆流竄躍，能越池塘。大者有重至一二觔者。冬月肉厚子多，其味尤美。如江南之洞庭湖、蘄州之青林湖，皆產大鯽，長二尺，食之肥美，皆充上供。觀此則鯽爲佳品。藥食[illegible]鯽。附古蘭咲。）

○鯽魚、合五味葱椒煮食，補虛羸，和中下氣，潤腸胃，止熱痢之藥也。江春野曰：按丹溪翁言：諸魚屬火，獨鯽魚屬土，有調胃養五臟之功。入食品中，亦稱佳味。如配合他藥治療疾苦，奏驗又非一端也。謹選諸家集方於左，以便臨證取用。

○集方：（王氏方）治胃弱不食，并臟府不和，或痢疾不止。用鯽魚，和醬醋葱椒調和食之。○治卒病水腫。（肘後方）用大鯽魚一尾，去

腸肚留鱗，以商陸、赤小豆各二兩，填滿札定，水二升，煮極爛，去魚、陸，僅食豆，飲汁。二日一作，不過三次令。○治小兒齁喘。（集簡方）用活鯽魚二個，養糞缸內半日，取出，清水養半日，淡水煮熟食之。○治腫毒結核不散。（蘇氏方）用鯽魚一個，以赤小豆一合，水浸爽，和鯽魚同搗爛，敷一二次，即散。

○治諸瘡十年不瘥。以鯽魚連腸肚，用滋泥裹，遍赤，去泥，取鯽魚研細末，日日摻之，一月平復。

中便毒，用鯽魚一個，連腸肚搗爛，再和山[illegible]敷之即消。

鱓魚血味鹹甘。氣平。無毒。入足厥陰、少陰經。

（韓氏曰：鱓魚生南北水岸泥窟也。李氏曰：黃質黑章，體多涎沫，似鰻鱺而細，似蛇而無鱗。大者長二三尺，夏出冬蟄。一種蛇變者，名蛇鱓，有毒害人。南方鱓肆中，以缸貯水畜數百頭，夜以燈照之，其蛇化者，必項下有白點，通身浮水上，即棄之。）

○鱓魚血，去風活血，治血燥筋攣之藥也。（[illegible]）李仁甫曰：按李（時珍）氏方，療口眼喎斜，用血半盞，研麝香二三釐調勻，左喎塗右，右喎塗左，正即用熱湯洗去。風中血脉，則口眼喎斜，用血治之，從其類也。

蝦味甘鮮。氣溫。有小毒。

（李氏曰：蝦出江湖者，大而色白；出溪池者，小而色青。鬚直爪長，背有斷節，尾有硬鱗，多足而好躍，其腸近腦，其子在腹外。有米蝦、糠蝦，以精粗名也；青蝦、白蝦，以色名也；梅蝦，以梅雨時名也；泥蝦、海蝦，以出產名也。嶺南有蝨，大如蟻，秋後羣聚水中，化為蝦，名曰天蝦。凡蝦之大者，蒸曝去殼，謂之蝦米，以薑醋拌食，極鮮。）

○蝦肉生搗汁，和白湯飲，宣吐風痰。煮湯食之，托痘瘡下（李時珍）乳汁。乘活搗膏，塗癰疽將潰，速出膿頭。（[illegible]）

烏賊魚骨（一名海螵蛸）味鹹。氣溫。無毒。

（別錄曰：烏賊魚生東海池澤。今近海州郡皆有之。蘇氏曰：形若革囊，口在腹下，八足聚于口旁，無鱗，有鬚兩根如帶。黑皮白肉，背上有骨，厚三四分，狀如舟形，輕虛而白，重重有紋。腹中血及膽黑如墨，可書字，但逾年則滅跡，惟存空紙爾。南越志云：其性嗜烏，每自浮水上，飛烏見之，以為死物而啄之，乃卷烏入水而食之，故名烏賊。能吸波噀墨，水令水溷黑，自衛以防人害。爾雅翼云：九月寒烏入水，化為此魚，故又名烏鰂，不知果否。雷氏曰：凡使勿用沙魚骨，其形真似，但以文順者是真，橫者非也。水煮一伏時用。外有一種柔魚骨，與烏賊相似，但無骨爾。越人食饌多用之。）

○烏賊魚骨，散血瘕，通血閉，（[illegible]）止赤白漏下之藥也。（農皇本經）張少懷曰：此藥味鹹走血，色黑歸腎，體輕屬肺，氣臊入肝，實為厥陰之劑。故李氏方主血瘕血閉，赤白帶下，乃厥陰本病也；寒熱瘧疾，陰中痛，疝瘕痛，乃厥陰經病也；目熱流淚，翳障攀睛，乃厥陰竅病也。厥陰屬肝，肝藏血，故諸血病皆宜用之。又吳瑞方治老人痰閉哮喘，呼吸不寧；婦人房事違理，水戶腫痛；小兒重舌蛾口，及牙疳走馬；或痘瘡濕爛不收，如痰與氣傷之病，風濕膿血之病，亦宜用之。經驗方言烏賊魚骨專主血閉，然血閉有有餘不足二證，有餘者血滯，不足者肝傷。此藥所主血閉肝傷不足之病也，正與素問相合。入藥宜煮去鹹味用。

○集方：烏賊魚骨，研極細末，治已上諸病。入服食方，每用二錢，白湯調服；如重舌蛾口、牙疳口臭、痘瘡濕爛諸證，俱宜作末摻搽。惟宜單行，不雜他藥更妙。

○腹中墨（[illegible]）味甘酸，治血刺心[illegible]作痛，醋磨服之。

鰻鱺魚味甘氣平有毒（李氏曰鰻鱺魚隨處有之其狀如蛇背有肉鬣色青黃其身連尾無鱗有舌腹白大者長數尺脂膏最多背有黃脉者名黃絲鰻鱺此魚善穿深穴如蛟蜃之屬善攻江岸常與水蛇同穴人能畏之孟氏曰歙州溪潭中出一種背有五色文者頭似蝮蛇入藥最勝江河中難得五色文者腹下有黑斑背上有白點者毒甚不可食）

○鰻鱺魚消疳治瘵殺諸蟲止傳尸勞疰之藥也方益明曰此物其形類蛇無鱗有舌常與水蛇同穴其性有毒可知矣別錄言性本殺諸蟲故日華方用治傳尸蟲勞骨蒸夜熱往往推驗又如癧瘍瘻痔及風濕脚氣痺痛人常食之漸漸獲効性雖有毒以五味葱荳椒韭烹製得宜食之又能補腎藏壯虛羸謂其味甘而性稟水土之陰氣故也

本草發明云鰻鱺所主諸病其功專在殺蟲去風耳金山有人病瘵相傳死者數人延及女子家人棄于江濱漁人引歸安置漁舍中日以鰻鱺魚食之其病遂愈又取骨燒烟薰蚊令化爲水熏氊毧及屋舍竹木斷蛀蟲置骨于衣箱斷諸蠹觀此則別錄謂殺諸蟲之說益可證矣

倪朱謨曰鰻鱺魚昔名蛇魚其形似蛇頭似蝮身與尾連無鱗有舌穿土穴居又與水蛇共處其屬蛇類而非魚類也因本草原附鱗部魚類中朱不敢外此另立他部又因功能殺蟲治勞瘵故不敢棄今附魚類之末以俟後之好生者採擇焉

介部（甲蟲類）

龜版味鹹甘氣平無毒氣味俱陰入足少陰經（別錄曰龜甲生南海池澤及江湖中韓氏曰今取江州浙州交州者骨白而厚其色分明供卜入藥最良論衡云春秋冬蟄食丁清而遊于蜀龜也爾雅翼云甲蟲三百六十龜爲之長廣雅云神龜者玄文五色神靈之精也說苑云靈龜千二百歲文五色似金似玉背陽向陰上隆象天下平象地槃衍象山四足轉運應四時文著象二十八宿蛇頭龍翅左睛象日右睛象月博議云廣肩巨腰內肉外骨雌雄尾交卵生而思抱轉旋任歷呼吸以耳周人云凡取龜用秋時攻龜用春時類考云蔡國君之守龜蔡氏因以爲名尺尺有二寸三正記云天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸龜陰故數偶也陰之老也以火灼之何以陽動陰也龜書云春占後右寅卯木兆也夏占前右巳午火兆也秋占前左申酉金兆也冬占後左亥子水兆也或云繩附鐵華則伏乘油抹眼則入水不沉老桑煮之則易爛蘇氏曰頭方脚短殼圓版白者陽龜也頭尖脚長殼長版黃者陰龜也陰人用陽陽人用陰又云龜甲勿令中濕陶氏言厴可供卜殼可入藥古者上下甲皆通用日華僅用其）

（版後世遂主之矣李氏曰按陶氏用生龜炙取日華用灼過者皆以其有生氣神靈也曰敗者謂鑽灼陳久如敗也吳氏以自死枯敗之殼取版用反謂灼者失性謬甚矣齋氏曰修治取版鋸去四邊石上磨淨或酥炙酒炙醋炙猪脂炙只黃色爲度如得神龜當於心透明如琥珀色者最佳凡入丸散須炙透研極細用不然澄滓留滯腸胃能致癥瘕腹精腸膿內潰諸疾入煎劑無妨）

○龜版補腎滋陰之藥也程君安曰龜性神靈體靜息伏能變化吉凶延年多壽故古方於陰虛有火之證專主之如別錄方治虛勞骨蒸發熱惡寒或痎瘧久纏陰氣衰乏或淋帶赤白漏下不收或痢疾裏速滯痛不止皆陰虛而邪熱爲病者用龜版外剛內柔之具借其氣以相通且得水火既濟之義而陰虛瘧痢淋帶諸病自少矣

方、治虛勞骨蒸、發熱惡寒。用龜版、童便浸炙、配沙參、知母、地骨皮、牡丹皮、銀柴胡、懷熟地、白芍藥。○治痎瘧久纏、陰氣衰乏、熱多寒少。用龜版醋浸炙、配白朮、半夏、牛膝、當歸、何首烏、枸杞子。○治血淋白帶、滲漏不止、用龜版酒浸炙、配當歸、川芎、白朮、茯苓、續斷、杜仲、牡丹皮、

○治痢疾晝夜不止。下後而積滯轉生、疼痛轉加。延久不愈者、用龜版醋浸炙、配川黃連、吳茱萸、白芍藥、木香、甘草、枳實、陳皮、當歸。（已上集程松谷家乘）

○龜膠滋陰助水之藥也。程君安曰、龜稟金水之氣而生。得陰土之氣而養、感北方玄武之精而成、乃陰中至陰之物也。大有補陰補血之功。如古方主陰虛不足而發熱口乾、或咳咯血痰、而骨蒸勞熱、或腰膝痿弱、而筋骨痠疼、或寒熱久發而瘧疾不已、或婦人崩帶淋漏而赤白頻來。凡一切陰虛血虛之證。並皆治之。又按李氏方云、龜鹿皆靈而有壽、龜首常藏向腹。能通任脈、故取其版煎膠。以補心、補腎、補血、用以養陰也。鹿鼻常反向尾、能通督脈。故取其角煎膠。以補命、補精、補氣、用以養陽也。觀龜甲所主諸病。皆屬陰虛血弱成勞之證。自可心解矣。

○集方、治已上諸虛不足之證。如陰虛不足。發熱口乾、或咳咯血痰。骨蒸勞熱。或腰脊痿弱。筋骨痠疼等證。用龜膠四兩。切碎。麥麩一兩。拌炒。北沙參、麥門冬、懷熟地。銀柴胡、地骨皮、牛膝。木瓜、薏苡仁、知母、貝母、桑皮、各二兩。分作二十帖。煎服。○治寒熱久發。瘧疾不止。用龜膠、一兩。肉桂、五錢。於白朮土拌炒二兩。分作五帖服。○治婦人淋帶赤白不止。用龜膠三錢。酒溶化。每日清晨調服、

○如病人陰虛者。用龜膠。陽虛者。用鹿膠。陰陽兩虛者。龜鹿二膠合用。每蚤各用二錢。切碎。酒溶化服。不飲酒者。白湯調服。

治產後瘧疾主方。用龜板、鼈甲、俱用酒炙、各五錢。當歸、柴胡、茯苓、陳皮、生薑皮、炮薑、各二錢。白朮、白芍藥、各三錢。牛膝一兩、水二碗。煎八分。五更服。如口渴。加麥門冬、竹葉各五錢。渴甚。加知母、天花粉各三錢。痰多。加川貝母、製半夏各二錢五分。元虛氣弱。加人參五錢。或至一兩。肺熱。去人參。加沙參、桑皮各二錢。汗多。加黃耆二錢。北五味八分。寒甚。加桂枝、乾薑各一錢。熱甚。加青蒿四錢。惡露未盡。加桂枝、桃仁、玄胡索各一錢五分。○治三陰瘧三日一發者。用龜板、鼈甲、俱酒炙、各五錢。白朮一兩。肉桂三錢。當歸二錢。附子童便製一錢。烏梅三個。水二碗。煎一碗。五更溫和服。渣再煎。天明服。

瑇瑁甲味甘。氣寒。無毒。入手少陰。足厥陰經。

陳氏曰。瑇瑁生嶺南海畔山水間。今海洋深處多有之。李氏曰。其首嘴如鸚鵡。其身似龜鼉而殼稍長。背有甲十數片。黑白紅紋斑文。相錯而成。明亮可愛。其羣邊有花缺如鋸齒。無足而有四鬣。前長後短。皆有細鱗斑文。海人養以鹹水。飼以小魚。大者如盤。小者如碗碟。大者難得。小者嘗有之。但老者甲厚而色明。小者甲薄而色暗。取時必倒懸。用滚醋潑之。則甲逐片應手自落。入藥須用生剝者乃靈。若經湯煮。力即減少。與犀角義同。雌雄不交。相望而卵。其功解蠱化毒甚靈。毒物之所媢嫉者。故名。

○瑇瑁解嶺南百蠱百藥諸毒。安神定驚。解熱化痰之藥（陳士良）也。翟秉元曰。瑇瑁龜類也。得水中至陰之氣。寒而無毒。善解一切百蠱百藥熱毒。及傷寒熱煩狂言。小兒驚風客忤。胎毒痘毒乾枯火疔。諸證其功力與犀角相等。繆仲淳先生曰。此物其性最靈。凡遇飲食有蠱毒者。必

自搖動。須用生者乃靈。死者則不能矣。嶺南人善以諸毒藥造成蠱。人中之則昏憒悶亂。九竅流血而死。惟用活瑇瑁刺其血飲。或用生甲磨濃汁服之。可解。其性稟純陰。氣味至寒。如諸病虛寒無火毒者。勿用。

○集方（聖惠方）解一切蠱毒。用生瑇瑁磨濃汁服一盞。即消。○（楊氏方）預解痘毒。遇時行痘疹。服此。未發者內消。已發者稀少。用生瑇瑁。生犀角。合磨濃汁一盞。和勻。作三四次。溫和服。○治痘瘡黑陷。乃心熱血凝也。（聞人規方）方同上。加入猪心血。紫草汁各五匙。溫服。

鱉甲味鹹。氣平。無毒。沉也。降也。入足厥陰。少陰經。

別錄曰。鱉甲生池澤。今處處有之。以岳州沅江者。甲有九肋者勝。李氏曰。鱉。甲蟲也。水居陸生。穹脊連脇。與龜同類。四緣有肉裙。故曰龜甲裹肉。鱉肉裹甲。無耳以目爲聽。純雌無雄。以蛇及黿爲匹。夏月孚乳。其抱以影。陸氏曰。魚滿三百六十。則蛟龍引之而飛。納鱉守之則免。故一名守神。性畏蚊。過蚊叮即死。又熏蚊者。復用鱉甲燒烟。蚊即遁跡。物理相報復如此。修治以滚湯泡洗。去油垢蟲蟻淨。用醋炙。酒炙。童便炙。隨病置宜可也。

○鱉甲。除陰虛熱瘧。解勞熱骨蒸之藥也。魏景山曰。鱉甲蟲也。與龜同類而異種。亦稟至陰之性。色青入肝。統主厥陰血分爲病。如農皇之治心腹癥瘕堅積寒熱。別錄之治老瘧瘧母。寒熱痞積。甄權之治骨蒸勞瘦。骨節煩熱。蘋湖之治婦人血閉。淋瀝。經脈不通。或五色漏下。或產難不順。產後寒熱。癥瘕惡血諸證。悉屬厥陰血閉邪

結。漸至寒熱。爲癥瘕。爲痞脹。爲瘧疾。爲淋瀝。爲骨蒸者。咸得主之。倘陽虛胃弱。食飲不消。嘔惡泄瀉者。陰虛胃弱。吞嚥不下。欬逆短氣。升降不足息者。用此無益也。

○集方（甄氏家乘）治心腹癥瘕血積。用鱉甲一兩。湯泡洗淨。米醋浸一宿。火上炙乾。再淬再炙。以甲酥爲度。琥珀三錢。俱研極細末。大黃五錢。酒拌炒。共研細作散。每早服二錢。白湯調下。○治老瘧瘧母。（肘後方）將成瘧勞。用鱉甲二兩。醋淬火炙。同前。白朮一兩。土拌炒。明雄黃五錢。共研極細末。每早晚各服二錢。白湯調下。○（方脈正宗）治骨蒸夜熱勞瘦。骨節煩熱。或咳嗽有血者。用鱉甲一觔。滚湯泡洗。去油垢淨。沙參四兩。懷熟地。麥門冬。天門冬各六兩。白茯苓三兩

陳廣皮一兩，水五十碗，煎十碗，渣再煎，濾出清汁，微火熬膏，煉蜜四兩收，每蚤晚各服數匙，白湯調下。○治婦（產寶方）人血閉不通，或淋瀝不淨，或臨產艱難不順，或產後惡血不行，留結成癥瘕痞積，漸發寒熱，幾成勞者，臨產須豫服此，可免產後一切血患。用鼈甲一觔，製法同前，乳香、沒藥各二兩，俱用瓦上焙出汗，白朮、當歸、川芎、白芍藥、乾薑、肉桂、川黃連、牡丹皮、玄胡索、木香、甘草各一兩，俱用酒拌晒乾，微炒，共十四味，俱研極細末，煉蜜丸彈子大，重三錢。妊娠九月隨宜服之，臨產產後俱可服，俱用白湯調下。

○續補集方治卒（肘後方）得腰痛，不可俛仰，用鼈甲二兩，製法同前研末，早晚各服二錢，白湯調下。○治婦（婦師方）人五色淋帶。用鼈甲二兩，製法同前，每早服二錢，白湯調下。○治一切癰疽，或腸癰內毒，用鼈甲一觔，製法同前，研細末，再重羅篩過，再研極細，潄口，日摻少許，但不可多。內服二錢，白湯調。毒在上，食後服；在下，食前服。

治脇痛，和肝飲加減方：用鼈甲、柴胡、當歸、川芎、半夏、白芍藥、枳殼各二錢，水煎服。（○左脇痛者，怒傷血滯也，加青皮、桃仁；右脇痛者，氣逆挾痰也，加桔梗、白芥子；左右脇俱痛者，肝火盛而痰氣結也，加龍膽草、香附、貝母、白芥子；兩脇走注痛而有聲者，是痰飲也，加蒼术、白芥子、膽星、瓜蔞仁；痛延日久作塊不移者，是死血留痰，[illegible]咳嗽氣急而失治，必成脇癰；外有肝氣極虛，真陰損乏，成脇痛者，宜十全大補湯加鱉甲、牛膝。）

牡蠣味鹹，氣寒，無毒。氣薄味厚，陰也，降也。入足少陰、厥陰、少陽經。

（別錄曰：牡蠣生東海池澤，及南海閩廣間，今永嘉海旁皆有之。蘇氏曰：初生時，假水沫、傍石砂，向日色漸結成形。純雄無雌，故得牡名。大如拳，而四面漸長，至數尺。塊塊相連如房，房中有肉，大者如馬蹄，小者如人指，名曰蠣黃。每潮來房開，潮去房闔，時吸小蟲以充腹。海人取者，皆以烈火逼之，鑿房挑取其肉，食之味美。以房壘疊，可以砌牆，燒灰水和，可以粉壁。雷氏曰：一種形圓如龜殼，大小皆夾砂石，男子服之，令無鬚也。温氏曰：修治以童便浸七日，取出米醋浸一月，以黃泥固濟，火煅紅，研極細用。）

○牡蠣澁精氣，止崩帶之藥也。顧汝琳曰：此得海水浮沫，附石結成，乃濕生也。本以水凝為質，應潮開闔，體類堅金，生則味鹹。鹹能軟堅，別錄所以化積去痞，消瘦散瘰癧也；煅則味澁，澁能止泄，農皇所以止婦人赤白帶下。

孟詵所以止男子遺精夢泄也。大抵此海水所化之物，實無情而致有情也。遺精淋帶，感無情之氣，致損有形之質也。如失精與失血者，投此旋定。但味鹹氣寒，凡病虛而有熱者宜用，虛而有寒者忌之。腎虛無火，精寒自出者，亦非宜矣。

（本草發明云：和杜仲服，可止盜汗；和黃耆服，可止自汗；和乾薑服，可止陰汗；和麻黃根服，可止頭汗；柴胡引之，能去脇下痞硬；茗茶引之，能消項上結核；大黃引之，能去股間腫痛；歸、朮、白茯引之，能止血淋、白帶，又通淋止濁；車前、猪苓為使，可也；澁腸止瀉，防風、柏子、牡蠣佐，可也。）

○集方：治久年痞積及癥瘕堅塊。用牡蠣八兩，生搗極細，重羅篩過，配乾薑十兩，於白朮一觔，俱用酒拌炒，共研極細末，飴糖為丸梧子大，每食前早晚各服二錢，好酒

呑下。○治瘰癧瘿核（濟世方），不拘已破未破，用牡蠣四兩，甘草一兩，研極細。每早飯後用一錢，茶湯調服。○治婦人赤（方脈正宗）白帶下。男子遺精夢泄，用牡蠣、龍骨各二兩，俱火煅通紅，研極細末，配芡實、白朮各五兩，俱酒拌炒，研細末，總和勻，飴糖爲丸梧子大。每早飯前用二錢，米湯呑下。

○治心虛自汗盜汗，經月不止，用牡蠣火煅五錢，麥門冬、黄耆、白朮、石斛各三錢，半夏、陳皮各二錢，甘草、北五味各一錢，水二碗，煎八分，侵晨一服，臨睡一服，半月即愈。（同上）○治痢疾窘急脹痛，用牡蠣生搗一兩，大黄酒煮五錢，枳殼麩炒一兩，三味共爲極細末，紅麴打糊爲丸如黍米，每服一錢，白湯下，三四服即止。按牡蠣火煅即澁而止積，生搗即行而消積，不可不知。○治陽虛自汗（方脈正宗），用牡蠣火煅五錢，人參三錢，麥門冬五錢，北五味二錢，煎湯飲，立止。外再用牡蠣火煅數兩，搗細粉，布包撲身上，亦可斂汗。

殼粉，味鹹，氣寒，無毒。沉也，降也。入手太陰、足陽明經。（李氏曰：蚌類繁多，今處處江湖間有之，惟洞庭、漢沔獨多。與蛤同類而異形，長者通曰蚌，圓者通曰蛤，故蚌從丰，蛤從合，皆象形也。後世蚌蛤渾稱者非。蚌大者長七寸，狀如牡蠣，小者長三四寸，狀如石決明。其肉可食，老者內有眞珠，其殼可爲粉，湖沔人水和印成錠子，市貨謂之蚌粉。用以飾墻壁，闔墓壙，堪堅固。）

○蚌殼粉化痰積，定咳嗽，解濕熱，止白濁、白帶之藥也。釋醫論水曰：蚌，水產也，殼研爲粉，其體沉墜，其性寒潤而滑。治病之要，只在行濕、清熱、化痰而已。如宋醫李防禦治濕痰咳嗽，肺氣壅閉，面浮臉腫者，而日華子治膀胱濕熱不清，爲淋，爲癃，爲濁，爲帶，或小兒脾熱疳積，爲痢爲脹諸證，膀胱爲水府，此藥味鹹，水化氣類相從，故兼用之。但性惟寒降，諸病屬脾肺虛寒而無火者，須禁用之。

○集方：治濕痰發嗽，終夕不寐，喘促面浮腫如盤，用蚌殼粉研極細，一兩，眞青黛三錢，共研勻，每蚤晚各食前服一錢五分，白湯調服。○治男婦小便淋瀝痛澁，或白濁（方脈正宗）白帶，用蚌殼粉研極細，一兩，車前子六錢，炒黄，同研細，每早晚各食前服二錢，燈心湯調下。

○續補方：治痰涎積聚結于胸膈心腹，作疼日夜不止，或乾嘔噦食者，用蚌殼細粉一兩，巴豆仁十粒，同炒，豆焦黑，去豆不用，以紅麴六錢，作末，醋打糊丸梧子大，每服三十丸，薑酒下。○治湯泡火燒，疼痛，用蚌殼細粉（方脈正宗），不拘多少，用香油調塗患上，不痛不疾而愈。

眞珠味鹹氣寒無毒可升可降入手少陰足厥陰經

沈氏曰珠出海上池澤按嶺表錄異云廉州北海生珠母乃老蚌也海旁有州島島上有大珠池每歲刺史親監珠戶入池採老蚌取珠以充貢池雖在海上而池水味淡亦一異也即採小蚌肉作脯食亦得細珠如米則此池之蚌大小皆有珠也其他海旁亦有珠蚌人取珠不甚光瑩皆不及南海北海池中之珠多而且奇也但清水急流處其色光白若濁水及緩流處其色多暗也又按廉州志云合浦縣海中有梅青嬰三處池池水亦不甚鹹蜑人每以長繩繫腰攜籃節入水取蚌得一二枚即振繩令舟人急挈起設有一條血色浮水上則人葬魚腹矣又按格古論云南珠色微紅西洋珠色純白北海珠色微青各隨方色也南番珠色白圓耀爲上廣西者次之北海珠色微青者爲上粉白油黃者下也西番馬價珠色青如翠爲上其老色夾石粉青油煙者下也又龍珠在頷蛇珠在目魚珠在眼鮫珠在皮鼈珠在足蚌珠在腹也凡蚌聞雷則瘦其生珠如懷孕故謂之珠胎中秋無月則蚌無胎矣如入藥用以新珠未經鑽綴者以人乳浸三日再入豆腐腹中煮一生香和柔心草研如粉以二萬碾方細堪入服食如婦人作首飾過者或在死尸中者皆不可入藥

○眞珠鎮心定志安魂養魄解結毒化惡瘡收內潰破爛（集雲林）之藥也黃正暘曰珠生于蚌而得中秋明月映之乃孕得中天太陰之精水土至陰之清氣也故寇氏方用此治驚悸怔忡癲狂恍惚神志不寧魂魄散亂及小兒血氣未定精神不足皆多驚恐以此神光寶足之物而驚亂可鎮神明自安矣甄氏方用此治一切諸毒疽瘡穿筋潰絡爛肌損骨破逼關節膿血淋漓潰久不收之證以此清明瑩潔之物而惡毒自解潰膿自收肌肉自長矣又若目生翳障研末點之即消瞳仁反背研漿點之即正以此目受水精月華之氣含光內媚之物而目可明矣但體質堅硬入藥須裹豆腐煮熟拌燈草研如飛粉方堪服食敷點倘研製不細用之能傷人藏府攻蝕生肉爲害匪輕（方脉正宗）

○集方治大人驚悸怔忡癲狂恍惚神志不寧魂魄散亂小兒血氣未定遇觸即驚或急慢驚風癇痓搐搦等證用眞珠一錢以豆腐裹煮一時許拌燈草同研如飛麪極細末配丹砂琥珀犀角瑇瑁天竺黃各五錢以鐵碾研極細末再加茯苓鈎藤半夏麯各一兩甘草人參各六錢同炒黃研極細末三末總和勻煉蜜丸龍眼核大每服一丸生薑湯化下（王氏[illegible]傳）○治一切諸毒疽瘡穿筋潰絡爛肌損骨破逼關節膿血淋漓潰久不收之證方名油蠟膏用眞珠一錢製法同前研極細末頭生兒胞衣

一具以銀簪穿孔數十清水滌洗惡血淨火烘乾燥不可焦研極細末如不細再烘再研務宜細如飛麪者佳如內有筋皮堅韌研不細者去之白蠟一兩猪脂油一兩火上共熔化和入胞衣末并眞珠末調勻磁器收貯遇是患以猪蹄湯淋洗毒瘡淨將蠟油藥以軟抿子脚挑取輕輕敷上再以鉛粉麻油膏藥貼之○治目生翳（孫春宇）障用眞珠三分製法同前研極細末爐甘石白硼砂各一錢人手指甲五分三味共研極細和入眞珠末內小磁瓶封貯每日點栖許于兩眥內閉眼半時許點三四次翳障自退（牛柳史方）○治痘瘡有疔或紫黑而大或黑爛而臭或中有紫血線此證十死八九用眞珠一錢製法同前

研極細末。豌豆四十九粒燒存性。頭髮灰三分。再取好油臙脂二錢同搗成膏。先以銀簪挑破疔毒。咂去惡血。以少許點之。即時變紅活色。眞奇方也

治痘後翻瘢不拘上下部分。壓爛淋漓者。俱効。用眞珠末、象牙末、孩兒茶各三錢。白僵蠶二錢。總和爲極細末以濟寧胭脂調敷毒水。如注漸漸收口。○治下疳蛀梗用珍珠生研、細象牙末。牛黃、冰片各一錢。牙皂二錢。滴乳石一兩。研極細如飛麪。共再研。每服一分。土茯苓湯調下（廣筆記）

石决明。味鹹。氣平。無毒。沉也。降也。入足厥陰肝經。

（陶氏曰。石决明是鰒魚甲。附石生。狀如蛤。惟一片無對七孔者良。今嶺南州郡及登萊州海邊皆有之。李氏曰形長如小蚌而扁。外皮甚粗。有細孔如粟泡。內有光耀如鏡之青紅綠色。背側一行有孔如鑽成者。生于石崖之上。海人泅水。乘其不意。即易得之。否則緊粘難脫也陶言是鰒魚甲。與石决明一種二類。功用兩相通用。）

○石决明去目翳赤障之藥也。葛小溪曰。此藥氣味鹹寒。得水石淸陰之氣而生。凝着石上。單片無偶。合又得一陽淸貞之化。故別錄、日華、李珣三家皆言專療肝肺風熱治目疾。膚翳障。內服外點。無不相宜。須研極細。水飛過方可入藥用。

○集方治風熱傷血成翳障靑盲。（方脈正宗）川石决明火燒通赤。研極細。水飛過三錢。羚羊角、人指甲切碎微炒。各二錢。甘

菊花、生地黃、木賊草、穀精草、蟬蛻、密蒙花、决明子。俱微炒。各一兩。研爲細末。共十味。總和勻。用生羊肝七個。搗爛成膏。（李時珍）和爲丸梧子大。每早晚食後各服三錢。白湯下。

○治目生翳障。用石决明火燒通赤。研細。水飛過。晒乾。再碾千匝。磁罐收貯。點兩目眥。

○治鎖喉風。用石决明火燒。醋淬三次。研細末。用米醋調鵝羽蘸搽喉內。即吐痰立愈。（汪彥通傳）

海蛤味苦鹹，氣寒，無毒。沉也，降也。入手足太陽、陽明經。

（李氏曰：海蛤生登萊滄州，海沙湍處皆有。大者如棋子，小者如麻菽。其色黃白，或帶赤色。乃諸蛤之殼，爲海水礲礪，日久光瑩，明潔。其殼至多，巨細不能分別，故通謂之海蛤。修治：用漿水煮一伏時，研細成粉，水飛過用。）

○海蛤粉，化痰飲，下逆氣，定喘（[illegible]）腫，消胸脇滿脹之藥也。馬繼高曰：此屬海水沙沫結而成形，又隨海水奔聚沙磧，日暴而肉消，僅存空殼也。其體堅潔，日隨湍水奔蕩不已，故本草專主積痰留飲，停滯經絡臟府胸臆之間，遏逆氣道不行，而爲腫爲喘，爲脹滿，爲大小不通。假此堅潔潤下，汩蕩通流之物，而治閉逆不通之證，則熱可清，痰可化，濕可利矣。病因熱邪痰結氣閉者宜之。若氣虛有寒，中陽不運而爲此證者，切勿輕投。

○集方：治痰（聖濟錄）飲停滯中焦，逆氣不下，喘促成腫，以致胸脇滿脹，甚則大小不通，坐臥不寧等證：用海蛤粉、漢防己、葶藶子各七錢，赤茯苓、桑白皮各一兩，陳廣皮、郁李仁各六錢，共爲末，紅麴蒸汁打糊丸，梧子大。每早晚各服二錢，米湯下。○治血痢（傳信方）因內熱者：用海蛤粉，早晚各用二錢，蜜湯調服。○治傷寒（朱肱活人書）血結胸脹痛手不可近：用海蛤粉、滑石各七錢，甘草三錢，芒硝五錢，共爲末。每服三錢，白湯調服。蓋膻中血聚則小腸壅，小腸壅則血愈不行。服此則小腸通，血脉流行，而胸脇利矣。

文蛤味鹹，氣平，無毒。

（韓氏曰：文蛤生登萊閩浙海濱。大者圓二三寸，小者五七分。形如海蛤，有斑文。修治：用漿水煮一時，取熟，研細用。）

○文蛤粉，止欬逆，消胸痹，化痰軟堅之藥也。吳養元曰：按成無己云：文蛤之鹹，走腎以勝水氣。凡病水濕痰飲膠結不化，致成中宮否隔，升降失調，滯于氣而爲欬逆，滯於血而爲胸痹者，以此鹹寒潤下軟堅之物，如氣之逆而不下，痹而不通者，可迎刃而解矣。又如仲景書論傷寒病在陽，當以汗解，反以冷水噀之，或灌之，其熱被卻不得出，彌更益煩，皮上粟起，意欲飲水，反不渴者，以文蛤散主之。此藥生聚海濱急流處，研成散，用沸湯調服數錢，能分利水濕之邪，壅遏陽道。昔仲景用之，爲因寒鬱熱，假此分利表間水氣故耳。則知此爲消熱消飲之輕劑，凡必于欲飲水，反不渴者用之，則知能泄僞鬱之熱，而不能勝實結之熱矣。

○集方：治痰（方脉正宗）飲膠結不化，爲欬逆，爲胸痹者：以文蛤一兩，燒存性，研極細末，配薑製半夏、膽星、厚朴、廣陳皮、白芥子、於白朮、枳實各一兩，俱同麩皮拌炒，研爲末。每晨晚各服一錢，食後白湯調服。

蛤蜊粉味鹹氣寒無毒沉也降也入足少陰血分。（汪氏曰蛤蜊生東南海中白殼紫唇大二三寸閩浙人以其肉充海錯亦可作醬醢此蛤蜊粉係海中蚶蛤之粉以別江湖中之蛤蜊粉也大抵海中蚌蛤蜊蠣之類性味鹹寒不甚相遠功能大同小異專化痰而軟堅也若江湖蚌蛤粉無鹹水浸漬專能清熱利濕而已脩治火煅作粉用。）

○蛤蜊粉主熱痰濕痰老痰頑痰之藥也蔡心吾曰此藥生成海濱味鹹氣寒體燥性潤按丹溪翁言此藥治頑痰能降能消能耎能燥寒制火而鹹潤下故能降焉寒散熱而鹹走血故能消焉堅者耎之以鹹取其屬水而性潤也濕者燥之以滲取其經火煅而消水腫利小便也如陰虛火勝肺燥葉傷而成欬嗽痰涎者勿用。

○集方（丁氏家藏）治一切頑痰老痰如綿絮如梅核如桃膠如蜆肉

形者其為病狀為咳嘔為痞塞為脹滿為疼痛用海上蛤蜊火燒赤研極細粉每早用指頭蘸數分擦牙用白湯汩口隨嚥下如此用半月全愈能日日用之終身無痰患能延壽（古方）○治遺精白濁用海上蛤蜊一觔火燒赤研極細粉川黄栢十兩鹽水炒研細末和勻用米糊丸梧子大每早服三錢空心溫酒送下（書[illegible]方）○治氣虛水腫垂危者用海上蛤蜊三兩火燒赤研極細粉用大蒜肉火煨熟去衣淨搗爛為丸如梧子大每早晚各食前服百丸白湯下。

車螯殼味甘鹹氣寒無毒沉而降陰中陰也入足三陰經血分。（李氏曰車螯其殼色紫璀璨如玉斑點如花海人以火炙之則殼開取肉食之似蛤蜊而堅硬羅氏曰其殼可飾器物燒灰可封塘壁羅細粉可飾面蘇氏曰南海北海皆有之陳氏曰車螯是海中大蛤即蜃類也殼廣數尺有徑丈者亦或生珠亦能吐氣為樓臺春夏依約蜃蛤漱常有此景。）

○車螯殼解癰毒化酒積之藥也蔡心吾曰按日華方治癰癤腫毒用此燒赤米醋淬二次研極細粉米醋調敷可止痛減毒又治酒積癖塊以車螯粉每早用二錢白湯調服。

淡菜味甘氣寒無毒沉也降也入足陽明太陽經。（陳氏曰生東南海中似珠母一頭小中銜細毛雖形狀不典然味甘美頗能益人曬乾收藏食時以滚湯泡軟去鬚用按阮氏云淡菜生海藻上故治癭氣與海藻同功。）

○淡菜補虛養腎之藥也蔡心吾曰此物本屬介類原其氣味甘美而淡性本清涼故藏器方善治腎虛有熱及熱鬱吐血痢血便血及血鬱成癭留結筋脈諸疾惟堪和冬瓜茭白白蘿蔔同煮調油醬葱韭食之足以療已上諸疾不和藥料同用。

田螺肉、味微君。氣大寒。無毒。（陶氏曰：螺生水田中及湖瀆岸側。狀類蝸牛而尖長，較蝸牛稍大。其色青黃，其文左旋。）

○田螺肉，去腹中結熱，利大小腸之藥也。吳養元曰：按李時珍云：螺，蚌屬也。其殼文旋左，其肉靨隨月盈虧。月盈則肉靨滿，月虧則肉靨陷。純乎得太陰至陰之清氣也。故諸家本草統治一切熱疾。如目痛腫赤，大便結閉，小便不通，禁口痢疾，黃疸濕熱，水氣浮腫，消渴熱中，丹石毒發，痔瘡痛脹等證。或內服食，或外掩貼，一用即平。如病非關火閉氣結者，勿用。

○集方　治時行風火暴發赤眼，痛澀難忍。用大田螺七枚，洗淨，新汲水養去泥穢，再換水養，先取一箇于淨碗內，

着少鹽花於靨內，承取自然汁，點目。逐個用了，隨放水中。如治爛弦風眼，本方再加銅綠末數釐，和鹽花內。○治老人大便秘結不通，以田螺數枚，水煮熟，去殼，以京湯少許，調和葱椒油醬食之。○治小便不通，腹脹如臌。用田螺一枚，連殼搗爛，和食鹽三分，麝香五釐，烘熱，敷臍下一寸，即通。此法兼治禁口痢疾，能使積毒下行，即思食矣。○治黃疸濕熱，用田螺二枚，水養一日，去泥，取出連殼生搗，入好酒一鍾，布帛濾過，將汁飲之。三服效。○治水氣浮腫，用田螺二個，大蒜肉一個，去衣，芥辣子二錢，三味同搗勻，隔帛貼臍上一寸。一周時，水從小便旋旋而下。○治上消渴飲不厭，用田螺十個，和糯米作粥，去螺，食粥盡，吐涎沫，乃收。飲之立效。○治丹石發毒，用田螺十個，和綠豆五合，煮食，并汁盡作五製，即解。○治痔瘡腫痛，用田螺[illegible]個，挑開靨，入冰片五釐，取水塗痔，即消。

治大小便不通，用田螺三枚，搗爛，入青鹽三分，攤成膏，貼在臍下一寸，即愈。用蝸牛亦可。此方治[illegible]

螺螄　味甘，微苦，氣寒。有毒。（吳氏曰：螺螄生溪澗河中，淺岸皆有。[illegible]類田螺而小。[illegible]清明後[illegible]不堪食矣。）

○螺螄，解酒熱，消黃疸，清火眼，利大小腸之藥也。[illegible]門，此物食土居水，體性大寒。善解一[illegible]因火者，服用見效甚速。惟[illegible]調和食之，不雜藥料劑中。但[illegible]腹中有久泄不實，并有冷瘕宿痛，或有久瘧[illegible]及痔漏瘰癧，破爛諸疾，不宜食之。食之恐生努肉。○治諸瘡爛濕不收，用墻內白螺螄殼，火燒存性，敲碎，去[illegible]肉泥土，研極細，摻之即收。

人部

亂髮（又名血餘）味苦，氣溫，無毒。入手足少陰經血分。

（李氏曰：頭上曰髮，屬足少陰陽明；耳前曰鬢，屬手足少陽；目上曰眉，屬手足陽明；脣上曰髭，屬手陽明；頦下曰鬚，屬足少陰太陽；兩頰曰髯，屬足少陽。其經氣血俱盛，則色潤而長；氣多血少，則色潤而短；血多氣少，則色悴而長；氣血俱少，則其處不生；氣血俱熱，則色黃而業；氣血俱衰，則色白而稀。又血氣清者鬚稀，血氣濁者鬚濃。心慈者鬚軟，心堅者鬚硬。貴壽者鬚索，貧夭者鬚枯。素問云：腎之華在髮。王冰註云：腎主髓，腦者髓之海，髮者腦之華，腦減則髮悴而少壽。又云：水出高原，故腎華在髮。髮者血之餘，血者水之類也。又葉氏云：精之榮在鬚，氣之榮在眉，血之榮在髮。類苑云：髮屬心，稟火氣而上生；鬚屬腎，稟水氣而下生；眉屬肝，稟木氣而橫生。故男子腎氣外行而有鬚，女子宮人眉髮不異而無鬚者，無外腎故也。又有鬚髮之白，有遲早之不同，此不係年壽修短、疾病之由，而由稟受遺體髓本氣感應而已。）

○亂髮，解癰毒，補陰髓，利小便之藥也。（別錄）茅日江曰：髮乘陽

氣而生，稟陰髓而長，為心之標，血之餘也。叢生陽首而復倒垂，則炎上之用，即潤下之體，故血盛之人則髮潤而黑，血少之人則髮燥而黃。男子八歲腎氣盛，齒更髮長，是髮因人之血氣以為生長榮枯也。故聖惠方治一切血病，凡上下諸竅出血，或吐血、衄血、舌上出血、齒縫出血，或內崩脫血、糞前後血、小便淋血等證，有關陽躁陰離，營陰失守而致走失者，能入心走肝，益血止血也。況心主血，髮為血餘，實為血之苗也。本屬神化之精，以火煅之，復化而凝成，自還血質，非神化而何？又蘇氏方，用亂髮燒灰，或熬汁，治一切癰毒瘡癤，能止痛散毒，長肉生肌者，髮本心血之苗，而諸毒癰疽，實由心氣鬱閉不通，血脉因之而凝澀，為腫為癰矣。今以精心血生長之物，而治心鬱血凝為毒之病，以類從治，所以癰毒熾盛之際，用此立解也。

○集方：治一切血病（方脈正宗），凡耳目口鼻上部諸竅出血，如吐血、衄血、舌上出血、齒縫出血、內崩脫血、糞前後血、小便淋血等證，用亂髮八兩，滾湯洗去油垢，淨水一斗，鍋內煮水乾，添湯，以髮化為度，入砂鍋內微火熬成膏，人參湯調服十茶匙。○治吐血衄血（同上），用亂髮一兩，湯洗淨，烘乾，火燒灰存性，為末，細羅篩過，如有燒不化者，不可用，取細末用。生地四兩，生側栢葉二兩，水三大碗，煎一碗，和髮灰一半，與服；渣再用水如法煎，再和髮灰一半，與服。

服完血立止。○治腸風瀉血（和劑局方），用亂髮二兩，湯洗同前，入鍋內炒焦，再入荊芥三兩，槐花、槐角各一兩，俱入鍋同亂髮再炒，以焦黑為度，研極細末，每早服二錢，空心溫酒調下。○治婦人內崩脫血（婦人良方），用亂髮二兩，湯洗同前，入鍋內炒焦，為細末，配當歸身、丹參各三兩，微炒為末，和入髮灰，煉蜜丸梧子大，每早服三錢，白湯送下。○治小（鹿）便淋血（五泉家抄），用亂髮六錢，湯洗同前，車前子一兩，茯苓五錢，生地二兩，水五碗，煎一碗，食前服，二帖愈，兼治小便不通。○治一切諸毒（華佗中藏經），膏藥油內熬入亂髮數兩，未潰能消毒止痛，已潰能長肉生肌。○治齒縫出血，亂髮炒焦，研細末摻之。○治黃疸（肘後方），尿赤，用亂髮燒灰，每服一錢，白湯

調下。○治蜈蚣螫咬，用亂髮燒烟熏之。○治大風癩，用新竹筒十箇，內裝黑豆一層，亂髮一層，至滿，以稻火盆內煨之，候有汁，倒傾滴出，以盞承接，以鵝羽掃瘡上，數日即愈。亦治諸瘡。

○頭垢，味苦鹹，氣溫，有微毒。（梳上者名百齒霜）

頭垢，主小便淋閉不通，及婦人吹乳腫痛之藥也。（簡便方）陸平林曰：頭垢，頭上垢膩也。其性滑潤而下走，故陶氏《別錄》方治淋閉不通，小便澁滯，而楊起《簡便方》治婦人吹乳腫痛，並用白湯調服數分，咸取其滑潤而下泄，滑潤而腫消之意。

指甲，味甘鹹，有微毒。（李氏曰：爪甲者，筋之餘，肝膽之外候也。靈樞經云：肝膽應爪，爪厚色黃者膽厚，爪薄色紅者膽薄，爪堅色青者膽急，爪耎色淡紫者膽緩，爪直色白者膽直，爪惡色黑者膽結。）

○指甲，催生產，去目翳之藥也。顧朽匏曰：指甲爲肝之標，筋之餘也，名爲筋退，謂其積日漸長而能自脫也。李氏方用其催生產，去目翳，取其脫以治不脫之意，與蛇蛻、蟬脫義同。而陳藏器又謂用懷妊婦人爪甲更佳者，何也？蓋婦人氣血充實，乃能受孕，取其有生長力緊之意，又兼有待日而脫之情。

○集方：治難產不下（聖惠方），并胞衣不落，取受孕本婦逐月剪取手足指甲，臨產將近，炒焦，研細末，臨產坐草時，溫酒調服，生產甚易。○治月生花翳（同上），用衆人手指甲，炒焦，研極細末，乳汁調，以簪頭蘸少許，點入目內。

治面生疔毒，腫脹至目與鼻俱隱入肉，牙關緊急，用患者手足指甲入茶匙內，燈上炙之，研細，和入患者耳垢、齒垢，和勻，如豆大，將銀簪挑開疔頭，掐入其藥，外用綿紙一層，津濕覆之，痛立止，半日腫半消，目可開，次日服仙方活命飲一二劑愈。此法兼可治紅絲疔并一切諸疔皆效。（廣筆記）

人胞衣（又名紫河車）味甘、微鹹、氣溫、無毒。（吳氏曰、首胎者、胞蒂居中、次胎者、胞蒂偏倚、欲試男女胞衣、投水中、頻攪、候水定、其胞覆者男、仰者女也。董氏曰、人胞衣、古方不分男女、不論首生次生、惟健壯無病婦人者可用、以紫色者佳。用米泔或清水洗去穢惡血水、用銀簪兩面穿孔、使胞中穢水盡去、再用清水洗淨、或用酒煮搗膏、和入藥中、或用火烘乾燥、存貯、臨用磨爲細末、配入藥也。一方挑去筋膜用、繆氏言筋膜乃初結真氣、不可剔去也。）

○方龍潭先生曰、紫河車、昔人未有用者、始于藏器陳氏拾遺、而丹溪確言其功、遂爲時用。吳球老人創大造丸、治一切虛損勞極、謂有益氣養血補精之功。故正、嘉、隆、萬、泰、天六朝時醫治諸虛不足、五勞七傷、情慾斲喪、咳嗽無痰、或飲食少進、咳嗽有痰、自汗盗汗、形瘦無力、骨痿少氣。凡精血不足之證、用此精血所化之物而補精

血、乃虧之地、則精血完足、而諸虛之證自除矣。設男子精氣虛寒、子嗣難成、女人血氣有虧、胎孕不育、以此修製服之、則精血充足、自能子矣。

繆仲醇先生曰、按丹書云、紫河車係天地之先、陰陽之祖、乾坤之橐籥、鉛汞之括囊、胚胎將兆、我則乘而載之、故謂之河車。兒孕胎中、臍系于胞、胞系母脊、真元所鍾、主吸呼胎息、轆轤任督、所謂龍虎兩弦、噓吹盈望、位育嬰兒之一系也。合而言之、實先天之郛廓、主培後天之形骸。非草木金石之比、蓋本其所自出、以從其類也。如陰陽兩虛者、服之有反本還元之功、誠爲要藥也。然得男女坎離之氣而成、不熱不寒、不潤不燥、凡陰虛陽虛、

有火無火、俱宜服之。或者不達此理、謬言性熱、此未之思也。

○集方、（吳球方）大造丸、治虛勞骨蒸、女人無子、及多生女、月水不調、小產難產、服之必主有子。危疾將絕者、一二服可更活數旬、其補氣血之功力可見也。久服耳目聰明、鬚髮烏黑、延年益壽、有奪造化之功。故名大造丸。用紫河車一具（製法詳見前註）、龜板二兩、童便浸三日、酒炙酥黃、黃柏、杜仲、牛膝、俱鹽酒拌炒、各一兩二錢。北五味子、一兩、茯苓三兩、當歸身二兩。人參、一兩五錢、共八味、俱微炒、研細末。天門冬、麥門冬、俱去心、懷生地、各五兩。和砂仁末五錢、同酒煮爛、搗膏、配入紫河車（或酒煮搗膏、或炙乾、共爲末、亦詳見前註。）

搗和、煉蜜爲丸、梧子大。每早晚各食前服三錢、白湯下。男子遺精夢泄、婦人赤白漏下、本方並加牡蠣粉、一兩五錢。○治久癲失志（劉氏方）、氣血兩虧、精神虛散者、用紫河車一具、治淨、酒水煮爛、和油醬五味食之。

人牙齒味甘鹹性熱有毒入手足少陰足陽明經（李氏曰兩旁有尖曰牙無尖而平曰齒腎主骨齒者骨之餘也女子七月齒生七歲齒齔三七腎氣平而眞牙生七七腎氣衰齒漸槁髮漸白矣男子八月齒生八歲齒齔三八腎氣盛而眞牙生五八腎氣衰齒漸槁髮漸墮矣錢乙曰小兒變蒸齒長不及三十六者由變蒸之不及其數也修治以火煅淬醋散研細用）

○人牙齒攻毒氣發痘瘡倒靨之藥也周士和曰按李氏本草發明云近世用人牙齒治痘瘡陷伏稱爲神品夫齒者腎之標骨之餘也凡痘瘡其毒自腎出方長之際外爲風寒穢氣所冒腠理閉塞血濇不行毒不能出或變黑倒靨宜用此以酒漿和麝香達之竄入腎經發出毒氣使熱令復行而瘡自紅活蓋刼劑也若伏毒在心昏冒不省人事及氣虛色白癢塌不能起發作膿或熱沸紫泡之證止宜解毒補虛苟誤用此則鬱悶聲啞反成不治之證可不慎哉

○集方治痘瘡倒靨用人牙燒存性入麝香一釐酒漿調五分服或用豶豬血調服亦可誤服寒凉而致黑靨者此方亦宜○治一切陰疽不起發頭凹陷沉黯不疼無熱內服溫補亦不起者用人牙二個燒過川山甲三錢炒焦共研極細末分作二服用當歸黃耆各五錢煎湯調下或用酒調服亦可○治臭爛惡瘡用人牙齒燒亂髮燒雞內金燒三味各一錢五分研極細入輕粉五分麝香一分再研勻油調敷之

人乳味甘鹹氣寒無毒可升可降通行十二經（李氏曰人乳乃陰血所化生于脾胃攝于衝任未受孕則下爲月水既受孕則留而養胎已產則變赤爲白上爲乳汁此造化玄微自然之妙也入藥宜取無病婦人之乳白而稠者佳若色黃赤清而腥穢如涎者夏月久頓不吮有腥氣者並不可用有孕之婦其乳謂之忌奶小兒吮之吐瀉成疳鬾之病最有毒也）

○人乳主充和臟府榮華腠理灌溉百骸潤澤枯燥人身轉運之神液益壽延年之聖藥也江春野曰此乃血氣之精液轉赤爲白亦內丹也凡治元神不足精神衰乏咳嗽無痰日晡潮熱或陰虛火動而骨蒸盜汗或久患勞嗽而時有紅痰或面赤口燥而煩渴引飲或肌瘦皮黃而毛髮焦槁或筋攣骨痿而四體乏力或血竭陰消而腸胃閉結或三消渴燥而多食易饑或目暗昏蒙而瞳仁乾結是皆元虛火勝之證惟此濡潤養榮之劑統能治之繆氏曰但其性凉而滋潤血虛有熱燥渴枯涸者宜之若藏氣虛寒滑泄不禁及胃弱不思食脾虛不磨食者並不宜服

○集方治已上一切諸虛十證統用茯苓山藥沙參地骨皮紫苑百部黃耆牛膝酸棗仁各二兩陳皮一兩用好人乳五碗拌勻晒燥微炒研末再配懷熟地四兩乳汁浸和酒煮半日再蒸半日搗爛爲膏和前末藥爲丸梧子大每早服五錢白湯下惟目病昏蒙瞳仁乾結無光本方加密蒙花二兩枸杞六兩俱用人乳拌炒和入○治男婦氣血衰弱虛痰虛火上升或兼咳嗽吐血者凡

一切陰虛火勝之證、又治中風癱瘓、手足疼痛、或麻木不仁、不能動履等證。用人乳二杯、香甜濃白者佳、好梨汁半盞、和勻。砂銚內頓滾、以五百沸爲度。每日五更一服。能消痰補虛、生血止嗽。此以人補人之妙法也。如胃弱作瀉者、勿用。（臞仙方）○治風火時眼、赤腫疼痛。用人乳半盞、黃連五分、以飯鍋上蒸熟、頻點兩目背內、即效。○陳氏養和方、治一切陰陽兩虛、形神衰頓、精血枯涸、飲食減餐、懨懨不振者、或勞損吐血、咳嗽夜熱、骨蒸津液內乏者。用無病乳婦數十人、每日取乳數十碗、用竹篩、下鋪桑柴灰一層、中鋪粗紙數十張、上鋪白絹一幅、將乳汁傾入薄鋪、烈日中晒乾。如不燥、用微火再烘、以鬆燥爲度。收貯淨磁器中。每日用好酒調一錢服。或和龜鹿膠酒調服、更妙。（侍御陳自柳）

（龔雲林曰一貴家子年十八歲患虛勞熱嗽痰帶血赤白汗頻發晝夜不能倒臥痰不絕口如此旬日命在須臾一家傍徨諸醫束手召予診視六脉微數乃陰虛火動之證予令其五更時將壯盛婦人乳汁一鍾重湯頓溫作三四十口服之至天明服麥門冬懷熟地知母貝母湯少頃將白米三合入連肉紅棗數枚稀粥食之半晌又進前藥加竹瀝童便少許薑汁數滴頻頻服之至午又進稀粥碗許又食粉糕二塊半晌又照前藥頓服至晝將晚進白米粥碗許又進前藥一劑夜間睡則藥止醒則仍服如此三晝夜藥不住口火乃漸息方以倒以後日服前藥一劑過半月病減十之七調理二月而愈此證危甚至急非予用此法救之幾乎不起今後患此證者當照此服醫者當照此治未有不愈者也如已作泄瀉者亦不在此例）

人屎味苦、氣寒、無毒。（李氏曰人屎乃飲食所化故字從尸從米會意也）

○人屎、解一切熱毒之藥也。釋醫師曰、人食五穀入胃、津液上升、而爲氣血。糟粕下降、而成糞。醞釀變化、得脾土之氣、故色黃也。味苦氣寒、故日華子主天行時疾、陽明熱狂、癖癰疽發背、一切無名惡毒、及黃疸身黃腹脹、或男婦一切心腹急痛、瘕疝攻痛、盤腸伏痞、一時攻發、速絕、月餘不止者、並皆治之。雖係汚穢不潔之物、如此急病、投用較諸藥獨靈。好仁居士當留意焉。（寇氏衍義）

○集方、治傷寒大熱狂渴、用人屎一塊、以新汲水調澄清灌之、即解。（秘要）○治一切火毒疔毒、并時氣熱病、口鼻出血者、用乾人屎一大塊、火燒赤、水調頓服。（寇氏衍義）○治發背危急、并一切癰腫惡毒、未潰時、用乾人屎三兩、醋和、加麝香五分、擂勻。圍毒四邊、如乾燥、以鵝羽蘸蜜水潤之。圍三日、大減毒勢。（金[illegible]寶備）○治黃疸身黃腹脹、用乾人糞一塊、火燒赤研末。大人服一錢、小兒服五分、白湯調服。三次即退。（經驗良方）○治男婦積年心腹急痛、或疝瘕攻痛、或多年盤腸伏痞、一時攻發、米粥不入、連綿月餘不止者、用乾人屎三兩、火燒赤、研細末、配烏藥二十兩、爲細末、和勻。每蚤服二錢、白湯調服。（千金方）○治疔毒初起、刮破、以人屎乘熱敷之、乾即易、不過數十遍、疔根即出、立瘥。○治痘瘡黑陷、腹脹危篤者、此爲劫劑。用人糞、猪糞、貓糞、犬糞、各等分、布包（[illegible]判快覽）

臘月初旬。收埋高燥土中。至次年臘月八日取出。炒燥傾銀大土罐盛之。鹽泥固濟。炭火煅令烟盡為度。取出為末。入麝香少許研勻。瓷器密封收之。一歲服三分。二歲六分。三歲一錢。蜜湯調下。須臾瘡起。此以毒攻毒。用火假者。從治之義也。

○糞清味苦。氣大寒。無毒。

（陶氏曰、取糞清以臘月截竹一段。兩頭留節。隔去外青皮。浸糞窖中。三年內積汁滿。埋土中一月。取出節中開孔。濾入淨磁瓶中。仍埋土中。上覆以瓦。臨用旋取之。）

糞清化熱毒。消熱痰。解痘毒熱悶倒厥之藥也。（方龍潭）臨水曰。此藥性味大寒而苦。其色黑綠。取之人糞更寒也。故韋氏集簡方。亦治天行時疾。瘟疫熱狂。煩渴唇焦。舌裂垂斃者。飲一二杯。無有不活者。凡一切火毒疔毒。丹石藥毒。野草毒。菌毒。百蟲諸毒等。並皆療之。

○集方。治天行時疾。陽明燥熱。煩渴譫妄之證。并治一切火毒。疔毒。丹石藥毒。野草毒。菌毒。百蟲諸毒。用糞清一盞。真犀角磨汁一盞。合和服之。二劑即解。○治毒藥箭傷人。立斃。急飲糞清一碗即解。

○人中黃味苦微甘。氣大寒。無毒。即多年廁坑中。磚石上所凝結黃垽是也。藥性治療。大畧與人屎同。解胃家熱毒有効。○治人頭麻至心窩而死。或自足心麻至膝蓋而死者。用人屎燒灰。豆腐漿調灌。即甦而愈

童便味鹹。氣寒。無毒。沉也。降也。入手足少陰、太陰經。

（日華子曰、取童便。必擇無病童子。先飲米湯數盞。去其濁穢。候轉清白。無臊臭者取用。自溺亦可服。）

○童便既濟陰陽。清和血氣之良藥也。夏碧潭曰。此乃津液之濁者。滲入膀胱而出。其鹹寒下降。降火甚速。降血甚神。故大氏為除勞熱骨蒸。咳嗽吐血。及婦人臨產血暈悶絕之聖劑。如褚氏勞極論有云。飲溲溺。百不一死。服寒凉。百不一生。極言功力之最優也。第其性氣寒降。惟不利於脾胃虛寒。或大便溏泄。久不實者。及陽虛無火。食飲減少者。胃中有寒痰停飲者。咸在所忌。

李瀕湖先生曰。按經云。飲入於胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。故人服溲便。

入胃。亦隨脾之氣。上歸于肺。下通水道而入膀胱。乃循其舊路也。故能治肺病。引火下行。而骨蒸勞嗽。吐血上逆之所必須用也。

方龍潭先生曰。童便係真陽之精。真陰之質。血見則止。氣見則和。陰見則存。陽見則守。水見則升。火見則降也。屢治婦人血氣有虧。陰無所附。男子真陰內損。陽有所乘。所以臨產之時。惡心煩悶。血上搶心。或已產之後。頭暈眼黑。血崩不止。或呵欠。或嘔逆。或狂躁。或譫語失笑。一切臨產危證。用此。則陰與陽合。血氣和平。設有衝逆于上者。得此鹹寒之味。可以順下。或妄崩於下者。得此清陽之氣。可以旋上。故于婦人為胎產之聖藥云。如男

子陰虛不足者。可以滋陰。陽火有餘者。可以抑陽。治見嘔吐咯唾衄血者。用此止之。咳嗽肺痿骨蒸夜熱者。用此清之。血虛勞火者。用此養之。目赤腫痛者。用此散之。火盛水衰者。用此調之。傷寒陽極狂躁者。用此定之。陳氏方所云。童便既濟陰陽。清和血氣。良有義焉

○集方治一切嘔吐衄血之證。用懷生地、麥門冬、沙參各三錢。甘草二錢。牡丹皮、○錢。水二碗。煎七分。和新鮮童便一盞。服。○治骨蒸夜熱。咳嗽有痰。將成勞者。用本方加地骨皮、青蒿各二錢。○治婦人臨產血暈。悶絕垂死或呵欠。或嘔逆。或狂躁。或譫語失笑。及一切危證見者。用炮薑、炮黑豆、當歸身各五錢。真川芎、益母葉各一錢。

玄胡索、牛膝各三錢。水三大碗。煎七分。和新鮮童便一盞服。如血崩不止。本方加黑荊芥、人參各二錢。○治赤眼腫痛。以溲便。時時取之。

○續補雜方治中腸昏倒。以熱溲便灌下。即甦。○治頭痛至極。以童便時時飲之。○治火燒悶絕。不省人事。用新鮮溲便。頓灌數碗。即甦。○治跌撲折傷疼痛。用童便和好酒飲之。能推陳致新。其功甚大。○治人咬手指瓶中盛熱尿浸一夜。即愈。○治絞腸沙痛。用童便服之即止。○治三消消渴。以溲便頻頻飲之。○治傷寒少陰證。下利不止。厥逆無脈。乾嘔而煩。欲飲水者。用溲便豬膽汁鹹苦寒物於白通湯薑附藥中。其氣相從。可去格拒之患也。

倪朱謨曰。昔海昌劉默齋醫張學師。三陰中寒。厥逆自汗。煩躁脈微。而用附子理中。倍加人參。臨服。和童便一鍾與服。即得安睡。諸證霍然。思此。則龍潭方公所謂童便能使陰與陽合。血氣和平。可味。

○人中白、（又名溺白垽）味鹹。氣寒。無毒。入足厥陰、少陰、太陽經。（李氏曰。人中白係人溺澄下白垽也。以清水攪澄。以烈日乾者。良。）

人中白。療心肺虛熱。止傳尸勞熱之藥也。葛小溪曰。此係人溺積滓。結成鹹寒潤下之物耳。宋人治肺熱勞嗽肺癰肺痿。心膈虛熱。羸瘦渴疾。及鼻衄屢發等證。昔張杲醫說載李士常苦鼻衄。垂危僅存喘息。張思順用人

中白散。即時血止。又延陵鎮官魯棠病鼻血如傾。日計盆餘。頭空空然。思順亦用人中白散治之。即止。終身不再作。此皆鹹寒潤下。散血之驗也。

○集方治諸竅出血。（不拘吐衄便溺諸血證。）用人中白。每早服二錢。白湯調下。立驗。○治小兒牙疳。用人中白、枯白礬、川黃連各等分。研細末。用髮帶蘸鹽湯。攪洗牙穢淨。摻之屢效。

○尿瓶鹹。味鹹。氣寒。無毒。年久者。每日灌滾湯浸之。灌浸二十一次。候乾燥。打破瓶。用銅刀刮取。功力與人中白同。

○秋石。味鹹。氣溫。無毒。

寇氏曰、秋石須秋月取童子溺。每缸入石膏細末七錢、桑條攪、澄定、傾去清液、如此二次、乃入秋雨水一桶、攪澄、如此數次、滓穢滌淨、鹹味減除、以重紙鋪灰上、曬乾、完全取起、輕清在上者爲秋石、重濁在下者刮去。古人立名、實本此義、用溺惟取童男女、今人不取秋時、亦不取童男女溺、隨便雜收衆人之溺、但以皂莢水澄、曬爲陰煉、火熬爲陽煉、失其本性、何合于名、射利收人、安能應病、況經火煉、燥烈精血、久服令人成渴疾。

○秋石、滋腎水、養丹田、潤心肺、消痰渴之藥也。門吉士曰、此係人尿、人中白、王公大人惡其不潔、方士遂以設法修製爲秋石也。治病功力、與人中白同、亦無大奇驗處。

○紅鉛、味鹹、氣溫、有毒。門吉士曰、按李氏綱目發明云、女人入月、血液腥穢、故君子遠之、爲其不潔、能損清貞之氣也。如煎膏煉藥、養痘燒鉛、出兵演武、持齋誦經、修心養性命者、咸避忌之、此屬污穢、能壞人神氣故也。今有妖妄邪術、鼓弄愚人、其法取童女初行經血、巧立名色、謂之先天紅鉛、多方配合、謂之參同氣之金華悟真篇之首經。愚人信之、吞嚥滓穢、以爲秘方、往往發出丹疹惡毒、一切雜以爲名之病、殊可嘆惜。按蕭了翁真金丹書云、一等愚人性好淫、強陽復去采他陰、口含天癸稱仙藥。恁你洳沮往用心、嗚呼、愚人觀此、可自悟矣。

口津唾、味甘鹹、無毒。

李氏曰、口津唾乃人之精氣所化也。舌下有四竅、兩竅通心氣、兩竅通腎液、心氣流注舌下爲神水、腎液流注舌下爲靈液、聚于華池、泛爲津液、復使下嚥、所以灌溉臟府、潤澤肢體、濡養筋脈、蓋此也。故修養家嚥津納氣、謂之返元。人能終日不唾、則精氣常留、顏色不槁、若久唾、則損精氣、成肺病而壽夭。故患天時熱疾人、則心腎不交、腎水不上、故真氣耗而精液乾、致渴也。難經云、腎主五液、入肝爲淚、入肺爲涕、入脾爲涎、入心爲汗、自主爲唾也。

○口津唾、消瘡痍疥癬皶皰腫毒之藥也。（綱目）門吉士曰、須於五更未語時、頻塗擦之、極驗。又旦漱口擦齒、以水洗目、及常時以舌舐拇指甲、揩目、久久、令目光明不昏。又能退翳。（楊氏方）又治毒蛇咬傷、急以小便洗去毒血、隨取口中津唾頻頻塗之即解。又治代指腫痛、以口津唾和碙砂數分、再加小麥麪少許、搜和作梃子、盛唾令滿、再著碙末數分、以指浸之、一日即瘥。

人氣

李氏瀕湖曰。人氣。醫家所謂元氣。眞火也。天非此火不能生長萬物。人非此火不能存養生命。故老人。及久病虛弱人。與二七以下童男。或童女。同寢。藉其薰蒸。最爲有益。此眞氣不熱不寒。溫潤培養。元氣衰弱之人。宜用此法。按謝承續漢書云。太醫史循宿禁中。陡寒疝病。求火不得。令衆人以口更噓其背。至旦遂愈。又抱朴子云。人在氣中。氣在人中。天地萬物。無不須氣以生。善行氣者。內以養身。外以却邪。然行之有法。從子至巳。爲生氣之時。從午至亥。爲死氣之時。常以生氣時。鼻中引氣。入多出少。閉而數之。從九九。八八。七七。六六。五五。而止。乃微吐之。勿令耳聞。習之既熟。增至千數。此爲胎息。或春食東方青氣。夏食南方赤氣。秋食西方白氣。冬食北方黑氣。四季月食中央黃氣。亦大有效。故善行氣者。可以耐饑渴。可以延年命。可以行水上。可以居水中。可以治百病。可以驅瘟疫。以氣噓水。可使逆流。以氣噓火。可使撲滅。噓沸湯。則手可探物。噓金瘡。則血即自止。噓兵刃。則刺不能入。噓箭矢。則矢反逆回。噓犬則不吠。噓虎狼。則退伏。噓蛇蜂。則不能傷。我昔張三丰。善得行氣之法。遇有疫疾。可與同牀。不相傳染。遇有精魅。或聞聲。或現形。或擲石放火。以氣禁之。皆自絕滅。若人在百里之外有難。以我手噓氣。男左女右。亦即可安。夫氣出于無形。用之其妙至此。而況[illegible]絕穀延年乎。按此即吾[illegible]法然之靈氣也。符籙家取祖氣即此。但彼徒係氣餒庸人。依法行此。安能得其驗哉

按養眞方。治下元虛冷。日令童男女。以時隔衣噓氣臍中。甚良。如身體骨節痛痛。令人更互呵痛處。久久經絡通透。又治鼻衄不止。令病人仰臥。于眉中間噓氣數十口。即止。

初生臍帶味甘鹹氣溫無毒（李氏曰胎在母腹臍連于胞臍帶既分一點眞元屬之命門丹田臍乾自落如瓜脫蒂故臍者人之命蒂也其當心腎之中前直神闕後直命門故謂之臍）

○初生臍帶補腎命解胎毒化痘毒之藥也周士和曰臍者命帶也當心腎之中為眞元歸縮之處胎在母腹臍連于胞喘息及呼滋養之妙由此而通胎出母腹臍帶剪斷則一點眞元之氣從此而歸入命門丹田故臍為命帶而臍帶亦眞氣之所結也薛氏保嬰方以此治痘瘡灰白寒陷不起發者用臍帶炙燥為末乳汁調服能使痘毒外發漿水充足虛寒之甚藉此眞陽之氣以培不足也如前古以此治三陰久瘧取臍帶九枚燒存性於白朮二兩人參五錢焙乾俱為末入童便煮附子一兩搗膏和丸梧子大每早服三錢酒送下亦取其補益眞元消靡陰瘧耳

人血味鹹有毒（李瀕湖曰血猶水也水穀入于中焦泌別熏蒸化其精微上注於肺流溢于中布散于外中焦受汁變化而赤行于隧道以奉生身是謂之血命曰營氣血之與氣異名同類清者為營濁者為衛營行于陰衛行于陽氣主呴之血主濡之血體屬水以火為用火活則紅火死則黑故曰氣者血之帥氣升則升氣降則降氣熱則行氣寒則凝邪犯陽經則上逆邪犯陰經則下流蓋人身之血生長于脾統攝于心藏受于肝宣布于肺而施化由于腎也修養家煉之化為白汁陰盡陽純也萇弘死一腔熱血化為碧雲積精靈之所致也凡人血入土年久化為燐燐陰魄之所化也）

○集方治吐血不止（濟生方）隨用吐出血塊炒黑為末每服三分以麥門冬湯調服蓋血不歸元則積而上逆以血導血歸元則止矣治衄血不止亦同法（要方）○治產後血暈隨取本婦血一塊炒焦醋湯調服

人骨（許氏曰腎主骨骨者肉之核也靈樞經有骨度篇論骨之大小長短廣狹甚詳）

○人骨接骨折療撲打跌傷之藥也許日聞曰按醫林集要云治杖打傷損用火燒過人骨五錢為末乳香三錢瓦上焙出汗共研勻酒調服三錢受杖者服此不痛不腫如撲打跌傷之人服此先以杉木片以軟絹札定傷處立效

簡選雜方六首

○治墜損跌撲疼痛能散血止痛重陽日收老茄子百枚去蒂四破切之用消石十二兩擣細以不津器先鋪茄子一重乃下消石一重如此間鋪令盡以綿紙十層密封安置淨處正月後取出去紙三層日中曝之逐日如此至二三月茄已爛開瓶傾出濾去滓取汁別入新磁器中以薄綿紙三層益口又曝至成膏乃可用每以酒調一匙空腹飲之日再服數次後惡血散則痛止而愈矣若膏久乾硬即以飯湯化軟用之

○治走馬牙疳（直指方）出血作臭用銅綠五分麝香二分研極細用屋角大蜘蛛一枚再同研用少許搽之

○治吹奶疼痛用小麥麩冰和作皮取屋角上大蜘蛛一枚燒存性為末酒服即愈

○治腹脹（[illegible]醫林集要）方用石菖蒲[illegible][illegible]為末每服二錢白湯下

○治頸下結核用好酒半盞浸大蜘蛛一箇浸半日研爛濾去渣取清酒服服十數箇即效凡一切腫毒初起服之即消

○治痘瘡倒黶色黑唇口冰冷諸藥不效用酒漿一鍾取狗蠅七枚擂細調酒漿服

○治娠婦惡阻不進食（汪元通[illegible]方）用大麥米煮粥食即進食也

○治小兒急慢驚風用茭蔬根搗汁一盞加白蜜半盞調勻以茶匙挑入口內立刻行痰驚病立定

本草彙言卷之二十

錢塘倪朱謨純宇甫選集　男倪洙龍冲之氏藏稿

山陰茹之憲引東甫校正

摘靈素兩經要句以爲用藥綱領

會稽張景岳介賓甫註

氣味陰陽

素問六節藏象論岐伯曰天食人以五氣地食人以五味（天以五氣食人者臊氣入肝焦氣入心香氣入脾腥氣入肺腐氣入腎也地以五味食人者酸味入肝苦味入心甘味入脾辛味入肺鹹味入腎也）五氣入鼻藏於心肺上使五色修明音聲能彰（五氣入鼻由喉而藏于心肺以達五藏心氣充則五色修明肺氣充則聲音彰著蓋心主血故華于面肺主氣故發于聲）五味入口藏於腸胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生（五味入口由咽而藏于腸胃胃藏五味以養五藏之氣而化生津液

以成精精氣充而神自生人生之道止于是耳而其所以成之者則在乎天之氣地之味氣味之切于用者則在乎藥食之間而已）

靈樞五味篇伯高曰胃者五藏六府之海也（胃者水穀氣血之所聚也）水穀皆入於胃五藏六府皆稟氣於胃（氣味之正者莫如水穀水穀入胃以養五藏故藏府者皆稟氣于胃而胃爲五藏六府之本）五味各走其所喜穀味酸先走肝穀味苦先走心穀味甘先走脾穀味辛先走肺穀味鹹先走腎（五藏嗜欲不同各有所喜故五味之走亦各有先然既有所先必有所後而生克佐使五藏皆有相涉矣）穀氣津液已行營衛大通乃化糟粕以次傳下（人受氣于穀故穀氣入於營衛其糟粕之質降爲便溺以次下傳而出于大腸膀胱之竅）○又曰穀始入於胃其精微者先出於胃之兩焦以漑五藏別出兩行營衛之道（穀之精氣先出于胃即中焦也而後至上下兩焦以漑五藏之至也漑灌注也兩行言清者入營營行脈

（主濁者入衛衛行脉外故營主血而濡于內衛主氣而布于外以分營衛之道）其大氣之摶而不行者積于胸中命曰氣海出於肺循喉咽故呼則出吸則入（大氣宗氣也摶聚也循由也氣海即上氣海一名膻中居于膈上蓋人有三氣營氣出于中焦衛氣出于下焦宗氣積于上焦出于肺由喉嚨而爲呼吸出入故曰氣海）天地之精氣其大數常出三入一故穀不入半日則氣衰一日則氣少矣（人之呼吸通天地之精氣以爲吾身之真氣故真氣者所受于天與穀氣并而充身也然天地之氣從吸而入穀食之氣從呼而出總計出入大數則出者三分入止一分惟其出多入少故半日不食則穀化之氣衰一日不食則穀化之氣少矣知氣爲吾身之寶而得養氣之玄者可以語道矣）

靈樞·五味論黃帝問曰五味入于口也各有所走各有所病酸走筋多食之令人癃鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多食之令人悗心願聞其故少俞答曰酸入于胃其氣濇以收上之兩焦弗能出入也（謂上中二焦濇結不舒也）不出即留于胃中胃中和溫則下注膀胱膀胱之胞薄以懦得酸則縮綣約而不通水道不行故癃（綣不分也約束也癃小水不利也味過于酸則上之兩焦弗能出入若留于胃中則爲吞酸等疾若胃中溫和不留則下注膀胱膀胱得酸則縮綣故爲癃也○愚按陰陽別論有云女子胞氣厥論有云胞移熱于膀胱者五音五味篇有云衝脉任脉皆起于胞中者凡此胞字乃以子宮爲言也此節云膀胱之胞者其音拋以溲脬爲言也故在本篇特加膀胱二字以明此非子宮正欲辯其疑似耳奈何後人不解其意遂認膀胱與胞爲二物夫脬即膀胱膀胱即脬也焉得復有一物耶知者當詳察之）陰者積筋之所終也故酸入而走筋矣（陰者陰器也積筋者宗筋之所聚也肝主筋其味酸故內爲膀胱之癃而外走肝經之筋也又宣明五氣篇曰酸走筋筋病無多食酸）黃帝曰鹹走血多食之令人渴何也少俞曰鹹入于胃其氣上走中焦注于脉則

血氣走之血與鹹相得則凝凝則胃中汁注之注之則胃中竭竭則咽路焦故舌本乾而善渴血脉者中焦之道也故鹹入而走血矣（血爲水化鹹亦屬水鹹與血相得故走注血脉若味過于鹹則血凝而結水液注之則津竭而渴然血脉必化于中焦故鹹入中焦而走血又宣明五氣篇曰鹹走血血病無多食鹹）黃帝曰辛走氣多食之令人洞心何也少俞曰辛入于胃其氣走于上焦上焦者受氣而營諸陽者也薑韭之氣薰之營衛之氣不時受之久留心下故洞心辛與氣俱行故辛入而與汗俱出（洞心透心若空也營諸陽營養陽分也辛味屬陽故走上焦之氣分過于辛則開竅而散故爲洞心爲汗出又宣明五氣篇曰辛走氣氣病無多食辛）黃帝曰苦走骨多食之令人變嘔何也少俞曰苦入于胃五穀之氣皆不能勝苦苦入下脘三焦之道皆閉而不通故變嘔齒者骨之所終也故苦入而走骨故入而復出知其走骨也（苦味性堅而沉故走骨味過于苦則抑遏胃中陽氣不能運化故五穀之氣不能勝之三焦之道閉而不通所以入而復出其變爲嘔又加齒爲骨之所終若通于骨肉不能受其氣從齒而出正因其走骨也又宣明五氣篇曰苦走骨骨病無多食苦）黃帝曰甘走肉多食之令人悗心何也少俞曰甘入于胃其氣弱小不能上至于上焦而與穀留于胃中者令人柔潤者也胃柔則緩緩則蟲動蟲動則令人悗心其氣外通于肉故甘走肉（甘性柔緩故其氣弱小不能至于上焦味過于甘則與穀氣留于胃中令人柔潤而緩久則甘從濕化致生諸蟲蟲動于胃甘緩于中心當悗矣悗悶也甘入脾脾主肉故甘走肉宣明五氣篇曰甘走肉肉病無多食甘）

陰陽應象大論黃帝曰清陽爲天濁陰爲地地氣上爲雲天氣下爲雨雨出地氣雲出天氣（此下言陰陽精氣之升降以見天人一理也天

（地者陰陽之形體也。雲雨地之精氣也。陰在下者為精。精者水也。精升則化為氣。雲因雨而出也。陽在上者為氣。氣者雲也。氣降則化為精。雨由雲而生也。自下而上者。地交于天也。故地氣上為雲。又曰雲出天氣。自上而下者。天交于地也。故天氣下為雨。又曰雨出地氣。六微旨大論曰。升已而降。降者謂天。降已而升。升者謂地。天氣下降。氣流于地。地氣上升。氣騰于天。可見天地之升降者。謂之雲雨。人身之升降者。謂之精氣。天人一理。此其為最也。○象水同類。詳見後章）故清陽出上竅。濁陰出下竅。（本乎天者親上。本乎地者親下也。上竅七。謂耳目口鼻。下竅二。謂前後二陰。）清陽發腠理。濁陰走五藏。（腠理肌表也。陽發散于皮膚。故清陽歸之。陰受氣于五藏。故濁陰走之。）清陽實四支。濁陰歸六府。（四支為諸陽之本。故清陽實之。六府傳化水穀。故濁陰歸之。）水為陰。火為陽。（水潤下而寒。故為陰。火炎上而熱。故為陽。凡天地萬物之氣。無往而非水火之運用。故天以日月為水火。易以坎離為水火。醫以心腎為水火。丹以精炁為水火。夫腎者水也。水中生氣。即真火也。心者火也。火中生液。即真水也。水火互藏。乃至道之所在。醫家首宜省察。）陽為氣。陰為味。（氣無形而升。故為陽。味有質而降。故為陰。此以藥石氣味言也。）味歸形。

形歸氣。（歸依投也。五味生精血以成形。故味歸于形。形之存亡。由氣之聚散。故形歸于氣。）氣歸精。（氣者真氣也。所受于天。與穀氣并而充身者也。人身精血由氣而化。故氣歸于精。）精歸化。（精者坎水也。天一生水。為五行之最先。故物之初生。其形皆水。由精以化氣。由氣以化神。是水為萬化之原。故精歸于化。）精食氣。形食味。（食如子食母乳之義。氣歸精。故精食氣。味歸形。故形食味。）化生精。（萬物化生。必從精始。故化生精。前言精歸化者。言未化之前由精為化也。此言化生精者。言既化之後由化生精也。）氣生形。（氣聚則形生。氣散則形死也。）味傷形。氣傷精。（味既歸形。而味有不節。必反傷形。氣既歸精。而氣有失調。必反傷精。）精化為氣。（精化為氣。謂元氣由精而化也。然上文既云氣歸精。是氣生精也。而此又曰精化氣。是精生氣也。二者似乎相反。而不知此正精氣互根之妙。以應上文天地雲雨之義也。夫陽化氣。即雲之類。陰成形。即雨之類。雨乃不生于地而降于天之雲。氣歸精也。雲乃不出于天而升于地之氣。精化為氣也。人身精氣。全是如此。故氣聚則精盈。精盈則氣盛。精氣充而形自強矣。所以先與雲雨為言者。正欲示人以精氣升降之即此耳。）氣傷于味。（上文曰味傷形。則未有形傷而[illegible]味過于酸。肝氣以津。脾氣乃[illegible]

氣也）陰味出下竅。陽氣出上竅。（味為陰故降。氣為陽故升。）味厚者為陰。薄為陰之陽。氣厚者為陽。薄為陽之陰。（此言氣味之陰陽。而陰陽之中。復各有陰陽也。味為陰矣。而厚者為純陰。薄者為陰中之陽。氣為陽矣。而厚者為純。薄者為陽中之陰。）味厚則泄。薄則通。氣薄則發泄。厚則發熱。（陰味下行。故味厚者能泄于下。薄者能通利。陽氣上行。故氣薄者能泄于表。厚者能發熱也。）壯火之氣衰。少火之氣壯。壯火食氣。少火生氣。（火。天地之陽氣也。天非此火。不能生物。人非此火。不能有生。故萬物之生。皆由陽氣。但陽和之火則生物。亢烈之火反害物。故火太過則氣反衰。火和平則氣乃壯。壯火食氣。猶言火食此氣也。少火生氣。猶言氣食此火也。此雖承氣味而言。然造化之道。少則壯。壯則衰。自是如此。不特專言氣味者。）

至真要大論。岐伯曰。辛甘發散為陽。酸苦涌泄為陰。鹹味涌泄為陰。淡味滲泄為陽。六者或收或散。或緩或急。或燥或潤。或耎或堅。以所利而行之。調其氣。使其平也。（涌吐也。泄瀉也。滲泄利小便及通竅也。辛甘酸苦鹹淡六者之性。辛主散。主潤。甘主緩。酸主收。主急。苦主燥。主堅。鹹主耎。淡主滲泄。藏氣法時論曰。辛散。酸收。甘緩。苦堅。鹹耎。故五味之用。升而輕者為陽。降而重者為陰。各因其利而行之。則氣可調而平矣。）

冦宗奭曰。生物者氣也。成之者味也。以奇生則成而偶。以偶生則成而奇。寒氣堅。其味可用以耎。熱氣耎。其味可用以堅。風氣散。其味可用以收。燥氣收。其味可用以散。土者冲氣之所生。冲氣則無所不和。故其味可用以緩。氣堅則壯。故苦可以養氣。脉耎則和。故鹹可以養脉。骨收則強。故酸可以養骨。筋散則不攣。故辛可以養筋。肉緩則不壅。故甘可以養肉。

李東垣曰。一陰一陽之謂道。偏陰偏陽之謂疾。陽劑剛勝

積若燎原。爲消狂癰疽之屬。則天癸竭而榮涸。陰劑柔勝。積若凝冰。爲洞泄寒中之病。則眞火微而衛散。故大寒大熱之藥。當從權用之。氣平而止。

升降浮沉

李東垣曰。藥有升降浮沉化。生長收藏成。以配四時。春升。夏浮。秋收。冬藏。土居中化。是以味薄者。升而生。氣薄者。降而收。氣厚者。浮而長。味厚者。沉而藏。氣味平者。化而成。但言補之以辛甘溫熱。及氣之厚。味之薄者。卽助春夏之升浮。便是瀉秋冬收藏之藥也。但言補之以酸苦鹹寒。及氣之薄。味之厚者。卽助秋冬之降沉。便是瀉春夏生長之藥也。淡味之藥。滲卽爲升。泄則爲降。佐使諸藥者也。

王海藏曰。溫熱天之陽。寒凉天之陰。陽則升。陰則降。辛甘淡。地之陽。酸苦鹹。地之陰。陽則浮。陰則沉。或溫多而成熱。或凉多而成寒。或寒熱各半而成溫。或熱多寒少。寒不爲之寒。或寒多熱少。熱不爲之熱。或寒熱各半。晝服則從熱之屬而升。夜服則從寒之屬而降。或晴則從熱。陰則從寒。不可一途而取也。

王海藏曰。升而使之降。須知抑也。沉而使之浮。須知載也。辛散也。而行之也橫。甘發也。而行之也上。苦泄也。而行之也下。酸收也。其性縮。鹹爽也。其性舒。鼓掌成聲。沃火成沸。二物相合。象在其間矣。

李瀕湖曰。酸鹹無升。甘辛無降。寒無浮。熱無沉。其性然也。而升者。引之以鹹。則沉而直達下焦。沉者引之以酒。則浮而上至巔頂。一物之中。有根升稍降。生升熟降。是升降在物。亦在人也。

五運六淫用藥主治

會稽張景岳介賓前註

素問至眞要大論岐伯曰。厥陰司天。其化以風。（厥陰屬木。其化以風。凡和氣升陽。發生萬物。皆風之化。）少陰司天。其化以熱。（少陰屬君火。其化以熱。凡炎蒸鬱燠。庶類蕃茂。皆火之化。）太陰司天。其化以濕。（太陰屬土。其化以濕。凡雲雨滋澤。津液充實。皆土之化。）少陽司天。其化以火。（少陽屬相火。凡炎暑赫烈。陽氣盛極。皆相火之化。）陽明司天。其化以燥。（陽明屬金。其化以燥。凡清明乾肅。萬物堅斂。皆金之化。）太陽司天。其化以寒。（太陽屬水。其化以寒。凡慘凝嚴冽。萬物閉藏。皆水之化。）又曰。厥陰司天。爲風化。（木氣在天。爲風化。而飄怒擧動。雲物飛揚。如巳亥歲。厥陰司天是也。）在泉爲酸化。（木氣在地。則味爲酸化。如寅申歲。厥陰在泉是也。）少陰司天爲熱化。（君火在天。爲熱化。而爲陽光明耀。溫養萬物。如子午歲。少陰司天是也。）在泉爲苦化。（火氣在地。則味爲苦化。如卯酉歲。少陰在泉是也。）太陰司天爲濕化。（土氣在天。爲溼化。而爲埃鬱曚昧。雲雨潤溼。如丑未歲。太陰司天是也。）在泉爲甘化。（土氣在地。則味爲甘化。如辰戌歲。太陰在泉是也。）少陽司天爲火化。（相火在天爲火化。而爲炎光赫烈。燔灼焦然。如寅申歲。少陽司天是也。）在泉爲苦化。（火氣在地。則味爲苦化。如巳亥歲。少陽在泉是也。）陽明司天爲燥化。（金氣在天。爲燥化。而爲清涼勁肅。霧露蕭飂。如卯酉歲。陽明司天是也。）在泉爲辛化。（金氣在地。則味爲辛化。如子午歲。陽明在泉是也。）太陽司天爲寒化。（水氣在天。爲寒化。而爲嚴冷凜冽。陰慘堅凝。如辰戌歲。太陽司天是也。）在泉爲鹹化。（水氣在地。則味爲鹹化。如丑未歲。太陽在泉是也。）〇厥陰司天。風淫所勝。則太虛埃昏。雲物以擾。寒生春氣。流水不冰。蟄蟲不出。（巳亥歲也。風淫于上。故太虛埃昏。雲物擾亂。風木主溫。故寒生春氣。而流水不冰。然風勝則金令承之。清肅氣行。故蟄蟲不出也。）民

病胃脘當心而痛上支兩脇膈咽不通飲食不下舌本強食則嘔冷泄腹脹溏泄瘕水閉病本于脾（胃脘當心而痛等證病皆在脾此以木邪乘土故諸病皆本于脾也）衝陽絕死不治（衝陽足陽明胃脈也在足跗上動脈應手土不勝木則脾胃氣竭而衝陽絕故死不治）風淫所勝平以辛涼佐以甘苦以甘緩之以酸寫之（風淫于上平以辛涼佐以苦甘以甘緩之俱與下文在泉治同以酸寫之者木之正味其寫以酸也）○少陰司天熱淫所勝怫熱至火行其政大雨且至（子午歲也熱淫于上故火行其政君火之下陰精承之故大雨且至）民病胸中煩熱嗌乾右胠滿皮膚痛寒熱欬喘唾血血泄鼽衄嚏嘔溺色變甚則瘡瘍胕腫肩背臂臑及缺盆中痛心痛肺䐜腹大滿膨膨而喘欬病本于肺（胸中煩熱嗌乾等證皆火上炎肺金受傷也金氣主右故右胠滿皮膚痛以致腹大滿膨膨而喘欬為手太陰肺病金被火傷故諸病皆本于肺也）尺澤絕死不治（尺澤

手太陰肺脈也在肘內廉大文中動脈應手金不勝火則肺氣竭而尺澤絕故死不治）熱淫所勝平以鹹寒佐以苦甘以酸收之（此與下文在泉同治）○太陰司天濕淫所勝則沈陰且布雨變枯槁（丑未歲也濕淫于上故沈陰且布沈深也沈陰雨變則浸漬為傷故物多枯槁）民病胕腫骨痛陰痹按之不得腰脊頭項痛時眩大便難陰氣不用饑不欲食欬唾則有血心如懸病本于腎（胕腫骨痛至心如懸皆足少陰腎經病也水為土克故諸病皆本于腎也）太谿絕死不治（太谿足少陰腎脈也在足內踝後跟骨上動脈應手水不勝土則腎氣竭而太谿絕故死不治）濕淫所勝平以苦熱佐以酸辛以苦燥之以淡泄之（與下文在泉治同惟佐以酸辛與彼酸淡少異蓋辛勝酸所以防酸之過也故當用以為佐）濕上甚而熱治以苦溫佐以甘辛以汗為故而止（濕上甚而熱者濕鬱于上而成熱也治以苦溫欲其燥也佐以甘辛欲其散也以燥以散則濕熱之在上者以汗之故而止矣）○少陰司天火淫所勝則溫氣流行金政不平（寅申歲也相火淫于上則金受其制故溫氣流行金政不平）民病頭痛發熱惡寒而瘧熱上皮膚痛色變黃赤傳而為水身面胕腫腹滿仰息泄注赤白瘡瘍欬唾血煩心胸中熱甚則鼽衄病本于肺（相火用事金氣受邪客熱內燔水不能制故為瘧諸病皆本于肺也）天府絕死不治（天府手太陰肺脈也在臂臑內廉腋下三寸動脈應手金不勝火則肺氣竭而天府絕故死不治）火淫所勝平以鹹冷佐以苦甘以酸收之以苦發之以酸復之（此與在泉熱淫治同蓋水能勝火故平以鹹冷苦能寫火之實甘能緩火之急故佐以苦甘火盛而散越者以酸收之火鬱而伏匿者以苦發之然以發去火未免傷氣故又當以酸復之而火熱二氣同治也）○陽明司天燥淫所勝則木迺晚榮草迺晚生筋骨內變大涼革候名木斂生菀于下草焦上首蟄蟲來見（卯酉歲也燥金淫勝于上則木受其克故草木生榮俱晚其在于人則肝血受傷不能榮養筋骨故生內變且金氣大涼能革發生之候故草

木之應如此然陽明金氣在上則少陰火氣在下故蟄蟲來見也）民病左胠脅痛寒清于中感而瘧欬腹中鳴注泄鶩溏心脅暴痛不可反側嗌乾面塵腰痛丈夫㿗疝婦人少腹痛目眛眥瘍瘡痤癰病本于肝（左胠脅痛等證皆肝經病肝木主左也心脅痛不能轉側為足少陽膽病腰痛不可俛仰丈夫㿗疝嗌乾面塵為足厥陰肝病此以肝與膽為表裏木被金傷故諸病皆本于肝也○寒清于中感而瘧欬腹中鳴注泄鶩溏又屬肝與脾之為病也）太衝絕死不治（太衝足厥陰肝脈也在足大指本節後二寸動脈應手木不勝金則肝氣竭而太衝絕故死不治）燥淫所勝平以苦溫佐以酸辛以苦下之（此與燥淫于內治同但彼云佐以甘辛此云酸辛為異也）○太陽司天寒淫所勝則寒氣反至水且冰運火炎烈雨暴迺雹（辰戌歲也寒淫于上故寒反至若乘火運而火氣炎烈則水火相激故雨暴迺雹）民病血變于中發為癰瘍厥心痛嘔血血泄鼽衄善悲時眩仆胸腹滿手熱肘攣腋腫

心澹澹大動胸脇胃脘不安面赤目黃善噫嗌乾甚則色炲渴而欲飲病本于心（寒水勝則邪乘心故爲血變于中發爲癰瘍等證按經脈篇以手心熱臂肘攣急腋腫胸脇支滿心中澹澹大動面赤目黃爲手厥陰心包絡病蓋火受寒傷故諸病皆本于心也）神門絕死不治（神門手少陰心脈也在手掌後銳骨之端動脈應手火不勝水則心氣竭而神門絕故死不治）寒淫所勝平以辛熱佐以苦甘以鹹寫之（辛熱足以散寒苦甘可以勝水以鹹寫之水之正味其寫以鹹也）

厥陰在泉風淫所勝則地氣不明平野昧草迺蚤秀（厥陰在泉寅申歲也風淫于地則木勝土風勝濕塵埃飛揚故地氣不明平野昏昧木氣有餘故草迺蚤秀）民病洒洒振寒善伸數欠心痛支滿兩脇裏急飲食不下鬲咽不通食則嘔腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重（按經脈篇自洒洒振寒至數欠爲陽明胃病自食則嘔至身體皆重爲太陰脾病且厥陰肝脈貫膈布脇肋故又爲心痛

支滿等證皆木邪淫勝脾胃受傷之爲病）風淫于內治以辛涼佐以苦甘以甘緩之以辛散之（風爲木氣金能勝之故治以辛涼過于辛恐反傷其氣故佐以苦甘苦勝辛甘益氣也木性急故以甘緩之風邪勝故以辛散之藏氣法時論曰肝苦急急食甘以緩之肝欲散急食辛以散之此之謂也）

○少陰在泉熱淫所勝則焰浮川澤陰處反明蟄蟲不藏（少陰在泉卯酉歲也君火淫勝于下故焰浮川澤陰處反明蟄蟲不藏）民病腹中常鳴氣上衝胸喘不能久立寒熱皮膚痛目瞑齒痛䪼腫惡寒發熱如瘧少腹中痛腹大（腹中常鳴者火氣奔動也氣上衝胸者火性炎上也喘不能久立寒熱皮膚痛者火邪乘肺也目瞑者熱甚陰虛畏陽光也齒動䪼腫熱乘陽明經也惡寒發熱如瘧金水受傷陰陽爭勝也熱在下焦故少腹中痛熱在中焦故腹大）熱淫于內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之（熱爲火氣水能勝之故治宜鹹寒佐以甘苦甘勝鹹所以防鹹之過也苦能泄所以去熱之實也熱盛于經而不斂者以酸收之熱鬱于內而不解者以苦發之）

○太陰在泉草乃蚤榮濕淫所勝則埃昏巖谷黃反見黑至陰之交（太陰在泉辰戌歲也土爲草木之所資生故草乃蚤榮巖谷者土厚之處埃昏巖谷黃土色黑水色土勝濕淫故黃反見黑五常政大論曰太陰司天濕氣下臨腎氣上從黑起水變卽土臨水應之義至陰之交當三氣四氣之間土之令也）民病積飲心痛耳聾渾渾焞焞嗌腫喉痺陰病血見少腹痛腫不得小便病衝頭痛目似脫項似拔腰似折髀不可以曲膕如結腨如別（飲積心痛寒濕乘心也自耳聾至喉痺按經脈篇爲三焦經病自陰病至不得小便以邪濕下流爲陰虛腎病自衝頭痛至腨如別按經脈篇爲膀胱經病此以土邪淫勝克水而腎合三焦膀胱俱爲水藏故病及焉）濕淫于內治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以淡泄之（濕爲土氣燥能除之故治以苦熱酸從木化制土者也故佐以酸淡以苦燥之者苦從火化也以淡泄之者淡能利竅也藏氣法時論曰脾苦濕急食苦以燥之此之謂也）

○少陽在泉火淫所勝則焰明郊野寒熱更至（少陽在泉巳亥歲也相火淫勝于下故焰明郊野熱極生寒故

寒熱更至）民病注泄赤白少腹痛溺赤甚則血便少陰同候（熱傷血分則注赤熱傷氣分則注白熱在下焦故少腹痛溺赤血便其餘諸病皆與前少陰在泉同候）火淫於內治以鹹冷佐以苦辛以酸收之以苦發之（相火畏火也故治宜鹹冷苦能泄火辛能散火故用以爲佐以酸收之以苦發之義與上文熱淫同治）

○陽明在泉燥淫所勝則霿霧清暝（陽明在泉子午歲也金氣淫勝于下故霿暗如霧清冷晦暝也）民病喜嘔嘔有苦善太息心脅痛不能反側甚則嗌乾面塵身無膏澤足外反熱（按經脈篇以上若善太息心脅痛不能轉側甚則面微有塵體無膏澤足外反熱爲足少陽膽經病嗌乾面塵爲厥陰肝經病此以金邪淫勝故肝膽受傷而爲病如此）燥淫于內治以苦溫佐以甘辛以苦下之（燥爲金氣火能勝之治以苦溫苦從火化也佐以甘辛木受金傷以甘緩之金之正味以辛寫之也燥結不通則邪實于內故當以苦下之按下文燥淫所勝佐以酸辛與此甘辛稍異）

○太陽在泉寒淫所勝則凝肅慘慄（太陽在泉丑未歲也水氣淫勝于下

（故凝慘慄）肅民病少腹控睾引腰脊上衝心痛血見嗌痛頷腫（寒淫于下自傷其類則膀胱與腎受之膀胱居腹故少腹痛腎主陰丸故控睾太陽之脈挾脊抵腰中故引腰脊腎脈絡心故上衝心痛心主血屬而寒逼之故血見按經脈篇以嗌痛頷腫為小腸經病亦水邪勝火而然也）寒淫于內治以甘熱佐以苦辛以鹹寫之以辛潤之以苦堅之（寒為水氣土能勝水熱能勝寒故治以甘熱甘從土化熱從火化也佐以苦辛等義如藏氣法時論曰腎苦燥急食辛以潤之腎欲堅急食苦以堅之用苦補之鹹寫之也）

○按司天主上半年天氣司之故謂之所勝上淫于下也在泉主下半年地氣司之故謂之于內外淫于內也當其時而反得勝己之氣者謂之反勝六氣之勝何以徵之燥勝則地乾暑勝則地熱風勝則地動濕勝則地泥寒勝則地裂火勝則地涸是也

四時用藥

李瀕湖曰按五常政大論曰必先歲氣毋伐天和河間曰升降浮沉則順之寒熱溫涼則逆之故春月宜加辛溫之藥薄荷荊芥之類以順春升之氣夏月宜加辛熱之藥香薷生薑之類以順夏浮之氣長夏宜加甘苦辛溫之藥人參白朮蒼朮黃柏之類以順化成之氣秋月宜加酸溫之藥芍藥烏梅之類以順秋降之氣冬月宜加苦寒之藥黃芩知母之類以順冬沉之氣所謂順時氣而養天和也又云春省酸增甘以養脾氣夏省苦增辛以養肺氣長夏省甘增鹹以養腎氣秋省辛增酸以養肝氣冬省鹹增苦以養心氣此則既不伐天和而又防其太過所以體天地之大德也昧者舍本從標春用辛涼以伐木夏用鹹寒以抑火秋用苦溫以泄金冬用辛熱以涸水謂之時藥殊背素問逆順之理以夏月伏陰冬月伏陽推之可知矣

王海藏曰四時總以芍藥為脾劑蒼朮為胃劑柴胡為時劑十一藏皆取決于少陽為發生之始故也

君臣佐使

素問至眞要大論云岐伯曰主病之謂君佐君之謂臣應臣之謂使非上中下三品之謂也（為君者最多為臣者次之佐者又次之藥之於證所主同者則各等分按主病者對證之要藥也故為君味數少而分兩重賴之以為主也臣則味數稍多分兩稍輕使則分兩更輕所以備通行向導之使也）

上中下三品

李瀕湖曰按經言上藥一百二十種為君主養命以應天無毒多服久服不傷人欲輕身益氣不老延年者本上經中藥一百二十種為臣主養性以應人無毒有毒斟酌其宜欲遏病補虛羸者本中經下藥一百二十五種為佐使主治病以應地多毒不可久服欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者本下經陶貞白曰上品亦能遣疾但勢力和厚不為速效歲月常服必獲大益中品療病之辭漸深輕身之說稍薄祇患為速延齡為緩下品專主攻擊毒烈之氣傾損中和不可常服疾愈則止

七方十劑

顧朽匏選輯

○大方岐伯云君一臣三佐九制之大也君一臣二佐五

制之中也。君一臣二。制之小也。此以品件之多寡爲大小也。又云遠而奇偶。制大其服。近而奇偶。制小其服。大則數少。小則數多。多則九之。少則二之。此以分兩之多寡爲大小也。按品件多之大方。乃病有兼證而邪不一。不可以一二味治者。宜之也。分兩多之大方。及肝腎。及下部位遠。數多則其氣緩。不能速達于下。必數少而劑大。取其迅速下達也。

一小方。有品件少之小方。乃病無兼證。邪氣專一。可一二味治者。宜之也。有分兩少之小方。乃心肺上部位近。數少。則其氣下走。不能升發于上。必數多而劑小。徐徐細呷。取其升散上行也。

一緩方。岐伯云補上治上。制以緩。補下治下。制以急。急則氣味厚。緩則氣味薄。適其至所。病所遠而中道氣味之者食而過之。無越其制度也。王冰註云。假如病在腎。而心氣不足。服藥宜急過之。不以氣味飼心。腎藥凌心。心益衰矣。凡上下遠近。其例皆同。按病有上下表裏之異。治上必妨下。治表必連裏。用黄芩以治肺。必妨脾。用蓯蓉以治腎。必妨心。服乾薑以治中。必僭上。服附子以補火。必涸水。用藥之道。治上不犯下。治下不犯上。治中則上下俱不犯。惟在緩急合宜耳。有甘以緩之之方。甘草糖蜜之類是也。病在胸膈。取其留戀也。有丸以緩之之方。比之湯藥。其行遲慢也。有品件衆多之緩方。藥衆則遞相拘制。不得各騁其性也。有無毒治病之緩方。無毒則性純功緩也。有氣味俱薄之緩方。氣味薄則長于補上。比至其下。藥力已衰矣。

一急方。有急病急攻之急方。中風關格之病是也。有湯散蕩滌之急方。下咽易散而行速也。有毒藥之急方。毒性能上涌下泄。以奪病勢也。有氣味俱厚之急方。氣味俱厚。直趨于下而力不衰也。

一奇方。獨用一物謂之奇方。一三五七九。藥合陽數。亦謂之奇方。唐許胤宗治病。多用單方。謂藥與病合。惟用一物攻之。氣純而愈速。今人認病不真。多其物以幸有功。譬獵不知兔。廣絡原野。冀一人獲之。術亦疎矣。一藥偶得他藥相制。弗能專力。而欲愈疾。不亦難乎。

一偶方。二物相配。二方相合。皆謂之偶方。二四六八十。藥合陰數。亦謂之偶方。王太僕言汗藥不以偶。則氣不足以外發。下藥不以奇。則藥毒攻而致過。蓋下本易行。故單行則力孤而微。汗或難出。故併行則力齊而大乎。然仲景制方。桂枝汗藥。五味爲奇。大承氣下藥。四味爲偶。則奇偶之數。似不必拘也。

一複方。奇之不去。複以偶。偶之不去。複以奇。所謂十補一泄。數泄一補也。又傷寒見風脈。傷風得寒脈。爲脈[illegible]相應。宜以複方主之。凡二方三方及數方相合者。如[illegible]二越婢一湯。五積散之屬是也。

一宣劑。徐之才曰。宣可去壅。生[illegible]皮之屬是也。本[illegible]垣

曰。外感天淫之邪。欲傳入裏。三陰實而不受。逆于胸中。天分氣分。窒塞不通。或噦或嘔。所謂壅也。故必破氣藥。如薑橘半夏藿香之類。瀉其壅塞也。張子和曰。宣劑即涌劑也。人以宣爲瀉。以宣爲通。然十劑中。已有瀉與通矣。宣者升而上也。經曰。高者因而越之。木鬱則達之是也。凡胸中諸實痰飲寒結熱鬱。上而不下。久則嗽喘滿脹。水腫之病生焉。非宣劑莫能愈也。如引涎追淚噴鼻。凡上行者。皆吐法也。李瀕湖曰。壅者塞也。宣者布也。散也。鬱塞之病。不升不降。傳化失常。或鬱久生病。或病久生鬱。必藥以宣布敷散之。不獨涌越爲宣也。是以氣鬱則香附川芎以開之。不足則補中益氣以運之。火鬱則山梔青黛以散之。甚則升陽

解肌以發之。濕鬱則蒼朮白朮以燥之。甚則風藥以勝之。痰鬱則南星橘皮以化之。甚則瓜蒂藜蘆以涌之。血鬱則桃仁紅花以行之。甚則或吐或利以逐之。食鬱則山查神麴以消之。甚則上涌下利以去之。皆宣劑也。

一通劑。徐之才曰。通可去滯。通草防己之屬是也。李瀕湖曰。滯。留滯也。濕熱之邪。留于氣分而爲痛痺癃閉者。宜淡滲之藥。以助肺氣下降。通其小便。而泄氣中之滯。木通豬苓之類是也。濕熱之邪。留于血分。而爲痺痛腫注。二便不通者。宜苦寒之藥。通其前後。而泄血中之滯。防己大黃之類是也。

一補劑。徐之才曰。補可去弱。人參羊肉之屬是也。張子和曰。五藏各有補瀉。五味各補其藏。有表虛裏虛。上虛下虛。陰虛陽虛。氣虛血虛。精不足者。補之以味。形不足者。補之以氣。五穀五菜五果五肉。皆補養之物也。李瀕湖曰。生薑之辛補肝。炒鹽之鹹補心。甘草之甘補脾。五味子之酸補肺。黃蘗之苦補腎。又如茯苓補心氣。生地黃補心血。人參補脾氣。白芍藥補脾血。黃芪補肺氣。阿膠補肺血。杜仲補腎氣。熟地黃補腎血。芎藭補肝氣。當歸補肝血之類。皆補劑也。

一泄劑。徐之才曰。泄可去閉。葶藶大黃之屬是也。張子和曰。實則瀉之。諸痛爲實。痛隨利減。芒硝大黃牽牛甘遂巴豆之屬。皆瀉劑也。催生下乳。磨積逐水。破堅泄氣。凡下行

者。皆下法也。李瀕湖曰。去閉當作去實。經云。實者瀉之。又云。實則瀉其子。五藏五味皆有瀉。如肝實瀉以芍藥之酸。心實瀉以甘草之甘。脾實瀉以黃連之苦。肺實瀉以石膏之辛。腎實瀉以澤瀉之鹹是矣。

一輕劑。徐之才曰。輕可去實。麻黃葛根之屬是也。張子和曰。風寒之邪。始客皮膚。頭痛身熱。宜解其表。癰瘡疥痤。亦宜解表。內經所謂輕而揚之。發汗是也。凡薰洗蒸炙熨烙刺砭導引按摩。皆汗法也。李瀕湖曰。去實當作去閉。有表閉裏閉。上閉下閉。表閉者。風寒傷營。腠理閉密。陽氣怫鬱不能外出。而爲發熱惡寒。頭痛脊強諸病。宜輕揚之劑發其汗。而表自解也。裏閉者。火熱鬱抑。津液不行。皮膚乾閉。

而爲肌熱煩熱頭痛[illegible]脊瘡傷諸病。宜輕揚之劑解其肌而火自散也。上閉[illegible]二。一則外寒內熱。上焦氣閉。發爲咽喉腫痛之證。宜辛凉之劑揚散之。則閉自開。一則飲食寒冷。抑遏陽氣在下。發爲胸膈痞滿閉塞之證。宜揚其淸而抑其濁。則痞自泰也。下閉亦有二。有陽氣陷下。發爲裏急後重。數至圊而不行之證。但升其陽而大便自順。所謂下者舉之也。有燥熱傷肺。金氣膹鬱。竅閉于上。而膀胱閉于下。爲小便不利之證。以升麻之類探而吐之。上竅通而下竅自利。所謂病在下。取之上也。

一重劑。徐之才曰。重可去怯。磁石鐵粉之屬是也。張子和曰。重者鎮墜之謂也。怯則氣浮。驚悸氣上。硃砂水銀沉香黃丹寒水石之倫。體皆沉重。久病咳嗽。涎潮于上。形羸不可攻者。以此墜之。經云重者因而減之。貴其漸也。李瀕湖曰。重劑凡四。有驚則氣亂。魂氣飛揚。如喪神守者。有怒則氣逆。肝火激烈。病狂善怒者。並鐵粉雄黃之類以平其肝。有神不守舍。多驚健忘。迷惑不寧者。宜硃砂紫石英之類以鎮其心。有恐則氣下。精志失守。如人將捕者。宜磁石沉香之類以安其腎。大抵重劑壓浮火而墜痰涎。不獨治怯也。故諸風掉眩。驚癇痰喘。吐逆反胃之病。皆浮火痰涎爲害。俱宜重劑以墜之也。

一滑劑。徐之才曰。滑可去著。冬葵子榆白皮之屬是也。劉守真曰。澀則氣著。必滑劑以利之。滑能養竅。故潤利也。張子和曰。大便燥結。宜麻仁郁李之類。小便淋瀝。宜葵子滑石之類。前後不通。兩陰俱閉。名曰三焦約。約者束也。宜先以滑劑潤養其燥。然後攻之。李瀕湖曰。著者有形之邪留著于經絡藏府間。如溺帶痰涎胞胎癰腫之類。皆宜滑藥以引去其留著之物。此與木通猪苓通以去滯不同。木通猪苓淡滲之物。去濕熱無形之邪。葵子榆皮甘滑之類。去濕熱有形之邪。故彼曰滯。此曰著也。大便澀者。菠薐牽牛之屬。小便澀者。車前榆皮之屬。精竅澀者。黃柏葵花之屬。胞胎澀者。黃葵子王不留行之屬。引痰涎自小便去者。則半夏茯苓之屬。引瘡毒自小便去者。則五葉藤萱草根之屬。皆滑劑也。半夏南星皆辛而涎滑。能泄濕氣。通大便。蓋辛能潤。能走氣。能化液也。

一澀劑。徐之才曰。澀可去脫。牡蠣龍骨之屬是也。劉守真曰。滑則氣脫。如開腸洞泄。便溺遺失之類。必澀劑以收斂之。張子和曰。寢汗不禁。澀以麻黃根防風。滑泄不已。澀以豆蔻枯礬木賊罌粟殼。喘嗽上奔。澀以烏梅訶子。凡酸味同于澀者。收斂之義也。然皆先攻其本。而後收之可也。李瀕湖曰。有氣脫。血脫。精脫。神脫。脫則散而不收。故用酸澀之藥。以斂其耗散。汗出亡陽。精滑不禁。泄痢不止。大便不固。小便自遺。久嗽亡津。皆氣脫也。下血不已。崩中暴下。諸大亡血。皆血脫也。牡蠣龍骨海螵蛸五倍子五味子烏梅榴皮訶黎勒罌粟殼蓮房椶灰赤石脂麻黃根之類。皆澀

藥也。氣脫兼以氣藥。血脫兼以血藥。及氣藥。氣者血之帥也。脫陽者見鬼。脫陰者目盲。此神脫也。非澀藥所能收也。

一燥劑。徐之才曰。燥可去濕。桑白皮、赤小豆之屬是也。按濕有在上。在中。在下。在皮。在經。在裏之分。而不出于外感內傷二種。外感之濕。雨露嵐霧。地氣水濕。襲于皮肉筋骨經絡之間。內傷之濕。水飲酒食。膏粱厚味。積于腸胃之中。風藥可以勝濕。燥藥可以除濕。淡藥可以滲濕。泄小便可以引濕。利大便可以逐濕。吐痰涎可以祛濕。濕之主藥。蒼朮、白朮、陳皮、木香之屬。濕而有熱。苦寒之劑燥之。黃連、黃柏、巵子、大黃之屬。濕而有寒。辛熱之劑燥之。乾薑、附子之屬是也。

一濕劑。徐之才曰。濕可去枯。白石英、紫石英之屬是也。按濕與滑類。而實不同。人有枯涸皴揭之病。非獨金化。益有火以乘之。風熱怫甚。則津液枯竭。營衛涸流。而爲燥病。上燥則渴。下燥則結。筋燥則強。皮燥則揭。肉燥則裂。骨燥則枯。肺燥則痿。腎燥則消。凡麻仁、阿膠、膏潤之屬。皆潤劑也。養血。則當歸、地黃之屬。生津。則麥門冬、栝樓根之屬。益精則從蓉、枸杞之屬。皆濕劑也。

吐汗下三法

人身不過表裏。氣血不過虛實。良工先治其實。後治其虛。粗工或治實。或治虛。謬工則實實虛虛。惟庸工能補其虛。不敢治其實。張子和儒門事親一書。內稱聖人止有三法。無第四法。夫病非人身本有之物。或自外[illegible]。或自[illegible]邪氣也。邪氣中人。輕則久而自盡。甚則久而不已。更[illegible]暴亡矣。若不去邪。而先用補。是盜未出門。而先固扃鑰。有是理乎。惟脉脫下虛。無邪無積之人。始可議補。他病惟用汗吐下三法攻去邪氣。而元氣自復也。素問一書。言辛甘發散。淡滲泄爲陽。酸苦涌泄爲陰。發散歸于汗。涌歸于吐。泄歸于下。滲爲解表。同于汗。泄爲利小便。同于下。殊不言補。所謂補者。辛補肝。鹹補心。甘補脾。酸補肺。苦補腎。皆以發腠理。致津液。通氣血而已。蓋草木皆以治病。病去。則穀果菜肉皆補物也。是故三法猶刑罰也。粱肉猶德教也。治亂用刑。治治用德。理也。三法亦兼衆法。如引涎、漉涎、取嚏、

追淚。凡上行者。皆吐法也。薰、蒸、渫洗、熨烙、針刺、砭射、導引、按摩。凡解表者。皆汗法也。催生下乳。磨積、逐水。破經、泄氣。凡下行者。皆下法也。天之六氣。風寒暑濕燥火。發病多在乎上。地之六氣。霧露雨雪水泥。發病多在下。人之六味。酸苦甘辛鹹淡。發病多在中。發病者三。出病者亦三。風寒暑濕之邪。結搏于皮膚之間。滯于經絡之內。或發痛注、麻痺、拘攣。莫如發汗。所以開玄府而逐邪氣也。凡破傷風、小兒驚風、飧泄不止。酒病、火病。皆可汗之。所謂火鬱則發之也。汗有數法。有溫熱發汗。寒凉發汗。薰漬發汗。導引發汗。善擇者當熱而熱。當寒而寒。不善擇者反此。則病有變也。凡痰飲宿食。病在胸膈中脘。以上者。皆宜吐之。用法先宜少服。

不涌漸加之。仍以雞羽探之。不出。以虀投之。且投且探。吐至瞑眩。慎勿驚疑。但飲新水立解。強者可一吐而安。弱者作三次吐之。吐之次日有頓愈者。有轉甚者。引之未盡也。越數日再吐之。吐後忌飽食酸鹹硬物乾物油肥之物。吐後心火既降。陰道必強。大禁房室悲憂。病人既不自責。必歸咎于吐也。不可吐者有六。性好怒喜淫者。病勢已危老弱氣衰者。自吐不止者。吐血、咯血、衄血、嗽血、崩血、溺血者。病人無正性。反復不定者。左右多嘈襍之言者。皆不可吐也。凡積聚陳莝于中。留結寒熱于內。必用下之。陳莝去而腸胃潔。癥瘕盡而營衛通。下之者。所以補之也。或苦寒下之。或辛熱下之。庸工妄投。當寒反熱。當熱反寒。故謂下爲

害也。惟巴豆性熱非寒。積不可輕用耳。不可下者。凡四。洞泄寒中者。表裏俱虛者。厥而唇青手足冷者。小兒病後慢驚者。誤下必致殺人。其餘大積、大聚、大痞、大秘、大燥、大堅。非下不可也。

按仲景傷寒論用吐汗下三法。而張子和儒門事親一書。發揮甚暢。蓋謂治病之要。在于御邪。邪去則正自安。若非吐汗下。則邪無出路。何自而去。庸醫用補。是關門養寇也。直謂聖人秖有三法。無第四法。其論頗卓。李東垣謂飲食勞倦內傷脾胃。亦能使人發熱惡寒。此與外感風寒之證頗同而實異。外感風寒。乃傷其形。內傷脾胃。乃傷其氣。傷其形爲有餘。傷其氣爲不足。有餘者瀉之。不足者補之。

論主于升陽益胃。取潔古枳朮丸之義。而立補中益氣湯一方。以發脾胃之氣。升騰而行春令。此發前人所未發也。朱丹溪謂天不足西北。地不滿東南。西北之人陽氣易降。東南之人。陰火易升。苟不知此而徒守升陽之法。將見下焦丹田之氣。日漸虛乏。于是上盛下虛。有升無降之病作矣。其論主于滋補陰氣。與劉守眞之用凉劑以降心火益腎水爲主。大致相同。迨至明朝王宇泰輩。則謂氣爲陽。血爲陰。人之一身。形骸精血皆陰也。而通體之溫者。陽氣也。一生之活者。陽氣也。五官五藏之神明不測者。陽氣也。及其既死。形固存而氣則去。此以陽氣爲生死也。天之大寶。只此一輪紅日。人之大寶。只此一息眞陽。孰謂陽常有餘

陰常不足。而欲以苦寒之物。伐陽而益陰乎。其論主于溫補陽氣。以上諸家。皆原本內經之旨。而各成其是者也。夫古今之運氣不齊。南北之風土亦異。人之藏府。萬有不同。人之疾病。亦萬有不同。學者深維乎內經之理。而融會乎諸家之論。臨證切脉。不執古法。實邪在表裏者。當用吐汗下三法。陽氣下陷者。則當升陽益胃。陰虛火熾者。則當滋養陰氣。脾腎虛寒者。則當溫補陽氣。善法水者。以水爲師。善治病者。以病爲師。斯其庶幾矣乎。

藏府虛實寒熱主治之藥（集本草綱目）

肝藏血屬木。膽火寄于中。主血。主目。主筋。主呼。主怒。本病諸風眩運。僵仆強直驚癇。兩脇腫痛。嘔血。小腹疝痛癥瘕。

女人經病、標病、瘧、頭痛、吐涎、目赤、面青、多怒、耳閉、頰腫、筋攣。卵縮。丈夫㿗疝。女人少腹腫痛。陰病。有餘瀉之。甘草、以瀉子也。香附、芎藭、瞿麥、牽牛、青皮、以行氣也。紅花、蘇木、桃仁、丹皮、莪蒁、三稜、大黃、鼈甲、穿山甲、水蛭、蝱、以行血也。雄黃、真珠、龍骨、金箔、銀箔、鐵落、鉛丹、胡粉、代赭石、夜明砂、石決明、以鎮驚也。羌活、獨活、防風、荊芥、薄荷、皂莢、槐子、蔓荊子、烏頭、白附子、僵蠶、蟬蛻、白花蛇、以袪風也。不足補之。枸杞子、兔絲子、熟地、阿膠、萆薢、杜仲、苦參、以補母也。當歸、白芍、芎藭、牛膝、續斷、血竭、沒藥、以補血也。天麻、白朮、菊花、細辛、生薑、決明、栢子仁、穀精草、密蒙花、以補氣也。本熱寒之。芍藥、烏梅、澤瀉、以瀉木也。黃連、黃芩、苦茶、猪膽、龍膽草、以瀉火也。大黃、以攻裏也。標熱發之。柴胡、半夏、以和解也。麻黃、桂枝、以解肌也。

心藏神。為君火。包絡為相火。代君司令。主血。主言。主汗。主笑。本病諸熱。瞀瘛驚惑。譫妄煩亂。啼笑罵詈。怔忡健忘。自汗、諸痛癢瘡瘍。標病肌熱畏寒。戰慄。舌不能言。面赤目黃。手心煩熱。胸脇滿痛。引腰背、肩胛、肘臂。火實瀉之。黃連、大黃、以瀉子也。甘草、人參、赤茯苓、木通、黃蘗、以瀉氣也。生地、玄參、丹參、丹皮、以瀉血也。硃砂、牛黃、紫石英、以鎮驚也。神虛補之。細辛、烏梅、酸棗仁、生薑、陳皮、以補母也。遠志、桂心、石菖蒲、白茯苓、茯神、澤瀉、以補氣也。當歸、熟地、乳香、沒藥、以補血也。本熱寒之。黃芩、竹葉、麥門冬、芒硝、炒鹽、以瀉火也。地黃、梔子、天竹黃、以涼血也。標熱發之。甘草、獨活、麻黃、柴胡、龍腦、以散火也。

脾藏智。屬土。為萬物之母。主營衛。主味。主肌肉。主四肢。本病諸濕腫脹。痞滿噫氣。大小便閉。黃疸痰飲。吐瀉霍亂。心腹痛。飲食不化。標病身體胕腫。重困嗜臥。四肢不舉。舌本強痛。足大趾不用。九竅不通。諸痙項強。土實瀉之。訶子、防風、桑白皮、以瀉子也。豆豉、梔子、常山、瓜蒂、鬱金、虀汁、藜蘆、苦參、鹽湯、苦茶、葡萄子、赤小豆、以涌吐也。大黃、芒硝、青礞石、大戟、芫花、甘遂、續隨子、以攻下也。土虛補之。桂心、茯苓、以補母也。人參、黃芪、甘草、升麻、葛根、陳皮、藿香、葳蕤、縮砂仁、木香、扁豆、以補氣也。白朮、蒼朮、白芍、膠飴、大棗。乾薑、木瓜、烏梅、蜂蜜、以補血也。本濕除之。白朮、蒼朮、橘皮、半夏、南星、吳茱萸、草豆蔻、白芥子、以燥中宮也。木通、赤茯苓、猪苓、藿香、以潔淨府也。標濕滲之。葛根、蒼朮、麻黃、獨活、以開鬼門也。

肺藏魄。屬金。總攝一身元氣。主臭。主哭。主皮毛。本病諸氣膹鬱。諸痿喘嘔。氣短。欬嗽上逆。欬唾膿血。不得臥。小便數而欠。遺失不禁。標病灑淅寒熱。傷風自汗。肩背痛冷。臑臂前廉痛。氣實瀉之。澤瀉、葶藶、桑白皮、地骨皮、以瀉子也。半夏、白礬、白茯苓、薏苡仁、木瓜、橘皮、以除濕也。粳米、石膏、寒水石、知母、訶子、以瀉火也。枳殼、薄荷、乾生薑、木香、厚朴、杏仁、皂莢、桔梗、蘇梗、以通滯也。氣虛補之。甘草、人參、升麻、黃

耆、山藥、以[illegible]母也。蚧蛤、阿膠、麥冬、天冬、貝母、百合、天花粉、以潤燥也。烏梅、粟殼、芍藥、五味子、五倍子、以斂氣也。本熱清之、黃芩、知母、天冬、麥冬、巵子、沙參、紫菀、以涼血也。本寒溫之、丁香、藿香、檀香、白豆蔻、益智仁、縮砂仁、款冬花、百部、糯米、以溫氣也。標寒散之、麻黃、葱白、紫蘇、以解表也。

腎藏志。屬水。為天一之原。主聽。主骨。主二陰。本病諸寒厥逆。骨痿。腰痛。腰冷如冰。足胻腫。少腹滿急。疝瘕。大便閉塞。泄吐利。腥穢。水液澄澈清冷。不禁。消渴引飲。標病。發熱不惡熱。頭眩。頭痛。咽痛。舌燥。脊股後廉痛。水強瀉之、大戟、牽牛、以瀉子也。澤瀉、豬苓、車前子、防己、茯苓、以瀉府也。水弱補之。人參、山藥、以補母也。知母、玄參、苦參、砂仁、補骨脂、以補氣也。黃蘗、枸杞子、五味子、熟地、阿膠、山茱萸肉、蓯蓉、瑣陽、以補血也。本熱攻之。大承氣湯、以攻下也。本寒溫之、附子、乾薑、肉桂、蜀椒、白朮、以溫裏也。標寒解之、麻黃、細辛、獨活、桂枝、以解表也。標熱涼之、連翹、玄參、甘草、豬膚子、以清熱也。

命門為相火之原。天地之始。藏精生血。主三焦元氣。本病前後癃閉。氣逆裏急。疝痛。奔豚。消渴。膏淋。精漏。精寒。赤白濁。溺血。崩中帶漏。火強瀉之、黃柏、知母、生地、茯苓、玄參、丹皮、地骨皮、寒水石、以瀉相火也。火弱補之、附子、川烏、天雄、肉桂、益智、補骨脂、胡桃、巴戟、當歸、蛤蚧、覆盆子、沉香、烏藥、茴香、丹砂、硫黃、陽起石、以益陽也。精脫固之、牡蠣、芡實、蛤粉、遠志、金櫻子、五味子、山茱萸、以澀精也。

三焦為相火之用。分布命門元氣。主升降出入。遊行天地之間。總領五藏六府。營衛經絡。內外上下左右之氣。號中清之府。上主納。中主化。下主出。本病諸熱瞀瘛。暴病暴死暴瘖。躁擾狂越。譫妄驚駭。諸血溢血泄。諸氣逆衝上。諸瘡瘍。痘疹瘤核。上熱則喘滿。諸嘔吐酸。胸痞脇痛。食飲不消。頭上出汗。中熱則善饑而瘦。解㑊中滿。諸脹腹大。諸病有聲。鼓之如鼓。上下關格不通。霍亂吐利。下熱則暴注下迫。水液渾濁。下部腫滿。小便淋瀝。或不通。大便閉結。下利。上寒則吐。飲食痰水。胸痺。前後引痛。食已還出。中寒則飲食不化。寒脹。反胃吐水。濕瀉不渴。下寒則二便不禁。臍腹冷疝痛。標病惡寒。戰慄如喪神守。耳鳴。耳聾。嗌腫。喉痺。胕腫疼酸。驚駭。手小指次指不用。實火瀉之。麻黃、柴胡、葛根、荊芥、升麻、羌活、石膏。以發汗也。瓜蒂、滄鹽、虀汁、以涌吐也。大黃、芒消、以攻下也。虛火補之。人參、天雄、桂心、以補上也。人參、黃耆、丁香、木香、草果、以補中也。人參、附子、硫黃、桂心、沉香、烏藥、補骨脂、以補下也。本熱寒之。黃芩、連翹、巵子、知母、玄參、石膏、生地、以清上也。黃連、連翹、生地、石膏、以清中也。黃柏、知母、生地、石膏、丹皮、地骨皮、以清下也。標熱散之。柴胡、細辛、荊芥、羌活、葛根、石膏、以解表也。

膽屬木。為少陽相火。發生萬物。為決斷之官。十一藏之主。本病。口苦。嘔苦汁。善太息。澹澹如人將捕狀。目昏不眠。標

病寒熱往來。痞瘧、胸脇痛、頭額痛、耳痛、鳴聾、瘰癧、結核、馬刀。足小指次指不用。實火瀉之。龍膽草、牛膽、猪膽、生蕤仁、生棗仁、黃連、苦茶以瀉膽也。虛火補之。人參、細辛、當歸、地黃、半夏、炒蕤仁、炒棗仁以溫膽也。本熱平之。黃芩、黃連、芍藥、連翹、甘草以降火也。黑鉛、水銀以鎮驚也。標熱和之。柴胡、芍藥、黃芩、半夏、甘草以和解也。

胃屬土，主容受，爲水穀之海。本病噎膈、反胃、中滿腫脹、嘔吐、瀉痢、霍亂、腹痛、消中善饑、不消食、胃管當心痛、支兩脇。標病發熱蒸蒸、身前熱、身前寒、發狂譫語、咽痹、上齒痛、口眼喎斜、鼻痛、鼽衄、赤齄。胃實瀉之。大黃、芒消以攻濕熱也。巴豆、神麴、山查、阿魏、硇砂、鬱金、三稜、輕粉以消食積也。胃

虛補之。蒼朮、白朮、半夏、茯苓、生薑以清濕熱也。乾薑、附子、草果、肉桂、丁香、肉果、人參、黃耆以溫寒濕也。石膏、生地、犀角、黃連以降火也。標熱解之。升麻、葛根、豆豉以解肌也。

大腸屬金，主變化，爲傳送之官。本病大便閉結、泄痢、下血、裏急後重、痔、脫肛、腸鳴而痛。標病齒痛、喉痹、頸腫、口乾、咽中如核、鼽衄、目黃、手大指次指痛、宿食發熱、寒慄。腸實瀉之。大黃、芒消、牽牛、巴豆、石膏、桃仁、郁李仁以攻熱也。枳殼、木香、橘皮、檳榔以瀉氣也。腸虛補之。皂莢以理氣也。桃仁、麻仁、杏仁、地黃、乳香、松子、當歸、肉蓯蓉以潤燥也。白朮、蒼朮、半夏、硫黃以滲濕也。升麻、葛根以升陷也。龍骨、白堊、訶子、粟殼、烏梅、白礬、赤石脂、禹餘糧、石榴皮以固脫也。本熱寒之。秦尤、槐角、生地、黃芩以清熱也。本寒溫之。乾薑、附子、肉果以溫裏也。標熱散之。石膏、白芷、升麻、葛根以解肌也。

小腸主分泌水穀，爲受盛之官。本病大便水穀利、小便短、小便閉、小便血、小便白利、大便後血、小腸氣痛、宿食夜熱旦止。標病身熱惡寒、嗌痛、頷腫、口糜、耳聾。實熱瀉之。木通、猪苓、滑石、瞿麥、澤瀉、燈草以瀉氣也。生地、蒲黃、赤茯苓、梔子、丹皮以瀉血也。虛寒補之。白朮、楝實、茴香、砂仁、神麴、扁豆以補氣也。桂心、玄胡索以補血也。本熱寒之。黃柏、黃芩、黃連、連翹、梔子以降火也。標熱散之。蒼朮、羌活、防風、蔓荊子以解肌也。

膀胱主津液，爲胞之府，氣化乃能出，號州都之官。諸病皆干之。本病小便淋瀝，或短數，或黃赤，或白，或遺失，或氣痛。標病發熱惡寒、頭痛、腰脊強、鼻窒、足小指不用。實熱瀉之。滑石、茯苓、猪苓、澤瀉以瀉火也。下虛補之。虛而熱者，黃柏、知母以寒補也。虛而寒者，升麻、桔梗、益智、烏藥、山茱萸以溫補也。本熱利之。生地、梔子、茵陳、黃柏、丹皮、地骨皮以降火也。標寒發之。麻黃、桂枝、羌活、蒼朮、防己、黃耆、木賊以發表也。

寒熱虛實各有真假（集類經註）

張介賓曰：愚按病名甚多，診病之要，不出寒熱虛實而已。綱目分列病之標本，藥之補瀉，真如網之提綱，衣之挈領。

大無不包細無不舉學者熟讀數行之簡勝千卷之繁矣然而臨證治病動多乖舛者非寒熱虛實之難知而眞假之難辨也既不辨其眞假則是以寒爲熱以熱爲寒以虛爲實以實爲虛未有不顛隕者矣經曰寒者熱之熱者寒之微者逆之甚者從之逆者正治從者反治從少從多觀其事也若使病無眞假則祇有正治之法耳何以有反治之法哉如寒熱之眞假者眞寒則脉沉而細或弱而遲爲厥逆爲嘔吐爲腹痛爲飱泄下利爲小便清頻即有發熱必欲得衣此浮熱在外而沉寒在內也眞熱則脉數有力滑大而實爲煩躁喘滿爲聲音壯厲或大便秘結或小水赤澁或發熱掀衣或脹疼熱渴此皆眞病眞寒者宜溫其寒眞熱者直解其熱是當正治者也至若假寒者陽證似陰火極似水也外雖寒而内則熱脉數而有力或沉而鼓擊或身寒惡衣或大便秘結或煩渴引飲或腸垢臭穢此則惡寒非寒明是熱證所謂熱極反兼寒化也假熱者陰證似陽水極似火也外雖熱而内則寒脉微而弱或數而虛或浮大無根或弦芤斷續身雖熾熱而神則靜語雖譫妄而聲則微或虛狂起倒而禁之則止或蚊跡假斑而淺紅細碎或喜冷水而所用不多或舌胎面赤而衣被不撤或小水多利或大便不結此則惡熱非熱明是寒證所謂寒極反兼熱化也此皆假病假寒者清其內熱內清則浮陰退舍矣假熱者溫其眞陽中溫則虛火歸原矣是當從治者也又如虛實之治實則瀉之虛則補之此不易之法也然至虛有盛候則有假實矣大實有羸狀則有假虛矣蓋虛者正氣虛也爲色慘形疲爲神衰氣怯或自汗不收或二便失禁或夢遺精滑或嘔吐隔塞或病久攻多或氣短似喘或勞傷過度或暴困失志雖外證似實而脉弱無神皆虛證之當補也實者邪氣實也或外閉于經絡或内結于藏府或氣壅而不行或血留而凝滯此實證之當攻也惟是虛實之間最多疑似有正已奪而邪方盛者將顧其正而補之乎抑先其邪而攻之乎若正氣既虛則邪氣雖盛亦不可攻恐呼吸變生措手無及故治虛邪者當先顧正氣且補中有攻補陰所以攻熱補陽所以攻寒兼之的量緩急從少從多寓戰于守斯可矣此治虛之道也若邪氣内壅者外雖尫羸自不宜補蓋補之則正無與而邪反盛適足藉寇兵而資盜糧當直去其邪邪去則身安此治實之道也要之假虛之證少而假實之證多假寒之證不難治而假熱之證最易誤也眞假之間非智者孰能與于此哉

反治之法（集類經註）

素問至眞要大論云岐伯曰熱因寒用寒因熱用塞因塞用通因通用必伏其所主而先其所因可使氣和可使必已張介賓曰按熱因寒用　如大寒内結當治以熱然寒甚格熱熱不得前則以熱藥冷服下嗌之後冷體既消熱

性便發。此熱因寒用之法也。寒因熱用者。如大熱在中。以寒攻治則不入。以熱攻治則病增。乃以寒藥熱服。入腹之後。熱氣既消。寒性遂行。此寒因熱用之法也。寒因寒用者。如下氣虛之中氣壅塞。欲散滿。則更虛其下。欲補下。則滿甚于中。治不知本。而先攻其滿。藥入或減。藥過依然。氣必更虛。病必漸甚。不知少服則資壅。多服則宜通。峻補其下。以疏啓其中。則下虛自實。中滿自除。此塞因塞用之法也。通因通用者。如大熱內蓄。或大寒內凝。積聚留滯。瀉利不止。寒滯者以熱下之。熱滯者以寒下之。此通因通用之法也。以上四治。必伏其所主者。制病之本也。先其所因者。求病之由也。既得其本。而以真治真。以假治假。則能使氣和

而病必已也。

素問至真要大論云。黃帝曰。服寒而反熱。服熱而反寒。其故何也。岐伯曰。治其王氣。是以反也。張介賓曰。愚按治其王氣者。如陰虛火旺之病。醫者用苦寒以治火之王。豈知苦寒皆沉降。沉降則亡陰。陰愈亡。則火愈盛。故服寒反熱者。陰虛不宜降也。氣弱生寒之病。醫者用辛溫以治陰之王。豈知辛溫皆耗散。耗散則亡陽。陽愈亡。則寒愈甚。故服熱反寒者。陽虛不宜耗也。又如夏令本熱。而伏陰在內。故多中寒。冬令本寒。而伏陽在內。故多內熱。醫不察此。而但用寒于夏。用熱于冬。則有中寒隔陽。服寒反熱。中熱隔陰。服熱反寒者矣。

素問至真要大論云。岐伯曰。寒熱溫涼。反從其病。王太僕曰。愚按微小之熱。為寒所折。微小之冷。為熱所消。甚大寒熱。則必能與違性者爭雄。異氣者相格。聲不同不相應。氣不同不相合。則病氣與藥氣抗衡。而閉關拒守矣。是以聖人反其佐以同其氣。借熱以行寒。借寒以行熱。使其始同終異。凌鬪而敗堅。是皆反佐變通之妙。所謂因其勢而利導之也。

素問至真要大論云。岐伯曰。諸寒之而熱者。取之陰。熱之而寒者。取之陽。所謂求其屬也。張介賓曰。愚按苦寒治熱而熱反增。非火之有餘。乃真陰之不足也。當取之于陰。謂不宜治火也。宜補陰以配其陽。壯水之主以制陽光。則陰

氣復而熱自退矣。辛熱治寒。而寒愈甚。非寒之有餘。乃真陽之不足也。當取之于陽。謂不宜攻寒也。宜補水中之火。益火之源以消陰翳。則陽氣復而寒自消矣。所謂益與壯者。溫養陽氣。填補真陰是也。

治氣之法

素問陰陽應象大論云。岐伯曰。氣虛宜掣引之。張介賓曰。愚按掣者。挽也。挽回其氣而引之使復也。上氣虛者。升而舉之。中氣虛者。溫而補之。下氣虛者。納而歸之。皆掣引之義也。

素問疏五過論云。黃帝曰。治病之道。氣內為寶。張介賓曰。夫氣有外氣。天地之六氣也。有內氣。人身之元氣也。氣

失其和則爲邪氣氣得其和則爲正氣亦曰真氣真氣所在有三上中下也上者所受于天以通呼吸者也中者生于水穀以養榮衛者也下者氣化于精藏于命門以爲三焦之根本者也故上有氣海曰膻中也其治在肺中有水穀氣血之海曰中氣也其治在脾胃下有氣海曰丹田也其治在腎人之所賴惟此氣耳氣聚則生氣散則死故曰氣內爲寶誠最重之詞醫家最切之旨也

治病從本

李瀕湖曰治病當知標本以身論之外爲標內爲本陽爲標陰爲本六府屬陽爲標五藏屬陰爲本十二經絡在外爲標藏府在內爲本以病論之先受爲本後傳爲標故百

病必先治其本後治其標縱先生輕病後生重病亦先治其輕後治其重惟中滿及大小便不利則無問先後標本必先治滿及大小便爲其急也故曰急則治其標也

氣味補瀉

李瀕湖曰凡藥補者則于藏府皆補瀉者則于藏府皆瀉分之則或補氣或補血或瀉氣或瀉血若晝夜之不同晷水陸之不同途也細而分之則氣味之于藏府各有補各有瀉肝膽二經溫補涼瀉辛補酸瀉心小腸命門三焦四經熱補寒瀉鹹補甘瀉肺大腸二經涼補濕瀉酸補辛瀉腎膀胱二經寒補熱瀉苦補鹹瀉脾胃二經濕熱補寒涼瀉甘補苦瀉凡人之病一經寒則一經熱一經實則一經虛醫者既別不精混而施之則有實實虛虛之患而欲愈疾難矣

引經報使

李東垣曰手少陰心經黃連細辛爲使手太陽小腸經藁本黃蘗爲使足少陰腎經獨活肉桂知母細辛爲使足太陽膀胱經羌活爲使手太陰肺經桔梗升麻葱白白芷爲使手陽明大腸經白芷升麻石膏爲使足太陰脾經升麻蒼朮葛根白芍爲使足陽明胃經白芷升麻石膏葛根爲使手厥陰心包絡經柴胡丹皮爲使手少陽膽經柴胡青皮爲使足少陽三焦經柴胡連翹爲使上焦地骨皮爲使中焦青皮爲使下焦附子爲使此皆引經之藥劑中用爲

向導則能接引衆藥直入本經用力寡而獲効捷也

採藥時候

陶貞白曰凡根多二月八月採者春初津潤始萌未充枝葉勢力淳濃也至秋枝葉乾枯津潤歸于下也春寧宜蚤秋寧宜晚花實莖葉各隨其成熟可也

陶貞白曰狼毒枳實橘皮半夏麻黃吳茱萸並須陳久者良其餘皆貴新也按大黃木賊荊芥芫花槐花木瓜之類亦宜陳久不獨此六陳也

辨藥真僞

李瀕湖云醫不識藥惟聽市人市人又不辨究皆委採送之家傳習造作真僞莫辨鍾乳醋煮令白細辛水漬使直

黃耆蜜蒸爲甜，當歸酒洒取潤，蜈蚣朱足令赤，螵蛸膠于桑枝，以蛇床當蘼蕪，以薺苨亂人參，古壙灰云死龍骨，苜蓿根爲土黃耆，鹽松稍爲肉蓯蓉，搗荔核爲麝香，采茄葉爲藿香，染半夏爲玄胡索，熬廣膠入蕎麪作阿膠，煮雞子及魚枕爲琥珀，枇杷蕋代款冬，驢脚脛作虎骨，松脂混騏驎竭，番硝和龍腦香，巧詐百般，難以悉數，此皆亂僞作真，不可不察者也。

稱藥分劑

陶隱居云：古秤惟有銖兩而無分名，今則以十黍爲一銖，六銖爲一分，四分成一兩，十六兩爲一觔。按蠶初吐絲曰忽，十忽曰絲，十絲曰氂，四氂曰絫，（音壘）十氂曰分，六絫曰

字，二分半也。十絫曰銖，四分也。四字曰錢，十分也。六銖曰一分，（去聲）二錢半也。四分曰兩，二十四銖也。八兩曰錙，二錙曰觔，二十四兩曰鎰，一觔半也。三十觔曰鈞，四鈞曰石，一百二十觔也。

丸散方用刀圭者，十分方寸匕之一，准如梧桐子大也。方寸匕者，作匕正方一寸，鈔散取不落爲度。一撮者，四刀圭也。

藥以升合分者，謂藥有虛實輕重，不得用觔兩，則以升平之。十撮爲一勺，十勺爲一合，十合爲一升，升方上徑一寸，下徑六分，深八分，十升爲斗，五斗曰斛，二斛曰石。

凡方云㕮咀者，謂秤畢擣之如大豆，又吹去細末。藥有易[illegible]皆細切[illegible]

凡蜜一觔有七[illegible]一[illegible]二合。

凡去皮除心之屬，如遠志、牡[illegible]取半，地黃、門冬之三分耗一分，兩不應不知取足，則于君臣之分未能得當，而于配方之意相去遠矣。

劉守貞曰：蛇之性上竄而引藥，蟬之性外脫而退翳，虻飲血而用以治血，鼠善穿而用以治漏，因其性而爲用也。弩牙速產，以機發而不括也；杵糠下噎，以杵築下也，因其用而爲使也。浮萍不沉水，可以勝酒；獨活不搖風，可以治風，因其所勝而爲制也。麻木穀而治風，豆水穀而治水，因其氣相同則相求也。牛土畜，乳可以止渴疾；豕水畜，心可以

鎮恍惚，因其氣相克則相制[illegible]羸，兔肝明視，因其氣有餘補不足也。鯉之治水，鶩之利水，因其氣相感則以意使也。

凡藥根之在土中者，中半以上，氣脈之上行也，以生苗者爲根；中半以下，氣脈之下行也，以入土者爲稍。人之身半以上，天之陽也，用頭；中焦，陰陽之間也，用身；身半以下，地之陰也，用稍。乃述類象形者也。

用藥參伍

李瀕湖曰：藥有單行者，有相須者，有相使者，有相畏者，有相惡者，有相反者，有相殺者。按單行者，獨行不用輔也；相須者，同類不可離也；相使者，我之佐使也；相惡者，奪我之

能也。相畏者受彼之制也。相反者兩不相合也。相殺者制彼之毒也。凡此七情。合和視之。當用相須相使者。勿用相惡相反者。若有毒宜制。可用相畏相殺者。不爾勿合用也。舊方用藥。亦有相惡相反者。如仙方甘草丸。有防己細辛。俗方玉石散用栝樓乾薑之類。然不如不用為良。半夏有毒須用生薑。取其相畏相制也。相反深于相惡。乃彼我交仇。必不和合。今畫家用雌黃、胡粉相近。即便黯妒。可徵矣。

丸散湯膏

陶隱居曰。凡藥性有宜丸者。宜散者。宜水煮者。宜酒漬者。宜膏煎者。亦有一物兼宜者。亦有不可入湯酒者。並隨藥性。不得違越。按病亦有宜湯者宜丸者宜散者。湯可以蕩

滌藏府。開通經絡。丸可以逐風冷。破堅積。進飲食。散可以去風寒濕熱之邪。散五藏之結伏。開腸利胃。湯者蕩也。去大病用之。散者散也。去急病用之。丸者緩也。舒緩而治之也。昔宋高陽大守有疾。醫用小柴胡湯為末。連進三服。胸滿。宋永議曰。小柴胡湯煎清汁服之。能入經絡攻病取快。今乃為散。滯在膈上。宜乎作滿。因煮二劑與之。頓安。同一藥也。而湯散之不同至此。微矣哉。

製藥節度

陶隱居曰。製藥貴在適中。不及則功効難求。太過則氣反失。火製四。煅炮炙炒也。水製三。漬泡洗也。水火共製二。蒸煮也。酒製升提。[illegible]軟堅。用醋注肝[illegible][illegible]童便製除劣性而降下。米泔製去燥性而和中。乳製潤枯生血。蜜製甘緩益元。陳壁土製竊真氣以補中焦。麥麩皮製抑酷性。勿傷上膈。烏豆湯、甘草湯漬曝。並解毒致令平和。羊酥、猪脂塗燒。咸滲骨容易脆斷。去穰者免脹。去心者除煩。

陶隱居曰。凡病在頭面及皮膚者。藥須酒炒。在咽下臍上者酒洗之。在下者生用。寒藥酒浸曝乾。恐傷胃也。

陶隱居曰。凡篩丸散。用重密絹各篩畢。合于臼中擣數百遍。色理和同。乃佳也。

陶隱居曰。凡丸藥治下焦者。丸極大。治中焦者次之。治上焦者極小。水滴丸取其易化。煉蜜丸取其遲化而氣循經

絡也。蠟丸取其難化而護藥之氣力以過關膈而作効也。

陶隱居曰。凡煮湯欲微火。令小沸。古法二十兩藥用水一斗。煮取四升為准。今之小湯劑。每一兩用水二甌為准。如劑多水少。則藥味不出。劑少水多。又煎耗藥力也。然利瀉欲生。宜少水而多取汁。補湯用熟。宜多水而少取汁。若發汗藥宜緊火熱服。攻下藥亦緊火煎熟。下芒消大黃再煎溫服。補中藥宜緩火溫服。陰寒煩躁藥宜緊火煎熟。水中沉冷服。凡湯中用麝香、牛黃、犀角、羚羊角、蒲黃、丹砂、芒消、阿膠之類。須細末如粉。臨時納湯中攪和服之。

服藥時候

陶隱居曰。病在胸膈已上者。先食而後服藥。病在心腹已

下者先服藥而後食病在四肢血脈者宜空腹而在旦病在骨髓者宜飽滿而在夜病在上者不厭頻而少病在下者不厭頻而多少服則滋榮于上多服則峻補于下服湯宜小沸熱則易下冷則嘔涌故也

藥弗過劑

陶隱居曰經云大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去其九穀肉果菜食養盡之無使過之傷其正也蓋穀食得氣之正藥餌得氣之偏凡人病氣非偏勝則偏不足偏勝者以藥攻之偏不足者以藥補之逆疾已而氣平當以穀食平補之若久服不輟則藥氣有偏勝必藏氣有偏虧故十分去其六七八九而止也

本草原始叙

李君儒者也胡以輯本草余授李君業儒者也胡為李君叙本草要以物而物眎之物不與於我物而豕眎之即一根一荄一飛一遊一泳以及塊然凝黷然呈者疇非吾性之森羅而法象乎我列三五以

降氣漸澆漓疵癘夭札人或不安其天年咎在方術之家謬執臆見誤投藥餌本始之不原而憒憒焉承舛襲訛曷其有極廼吾儒者又末技鄙之置弗道夫孰知格物窮理之外二事而同類痺瘵固無異其身之疴痛耶若然則李君之輯本草原始其意良厚而心獨苦矣以較他刻樊然淆究挂此漏彼者不啻軒輊試取而披之圖其象矣必覈其名詳其用矣必推其體與夫甘苦辛鹹之味青黃赭堊之色寒熱溫涼之性採製蒸晒之宜無不種種具備之觀

者煥若發矇燦如指掌斯刻詎不大有裨於世哉雖然始者始矣所以始者口不可得而述簡不可得而陳探之未始有始之先以觀其眇驟之既始有始之後以觀其竅則始從何始原無可原乃伊耆巫彭桐君之著猶糟粕也是在得魚

兔而忘筌蹄者之神遇耳李君名中立少從余遊博極秦漢諸書余雅器重李君與李君夙自負更有進於此者此一斑又何足爲李君知己

旹

萬曆四十年歲次壬子吉旦

賜進士第徵仕郎中書科中書舍人

雍丘羅文英質先甫撰

本草原始序

醫雖方技爾然理微而道大用廣而功切故稱仁術焉上古神農氏始嘗百草而知藥軒轅氏咨訪岐伯伯高少俞而知脈後世始有生生之術矣夫人之五藏六腑氣脈周流陰陽穴

絡上按天道下侔地理非冥心聚精博考沉思不能入其奧妙而況粗浮之氣疏略之見又何當焉余幼善病留心此技二十餘年僅得其梗槩以自衛寧杞時得李君中立氏年幼而姿敏多才藝其醫雖不敢即謂與古

入方駕而偏至之能有足取焉所著有本草原始夫本草者醫之肯綮也之生而致死之死而致生所係在呼吸間可弗慎乎李君覈其名寔考其性味辨其形容定其施治運新意於法度之中標奇趣於尋常之外皆手

自書而手自圖之抑勤且工矣書成遣人邸中丐余一言以傳余以爲昔人讀爾雅不熟爲蟚蜞所悞孜白澤不審陷傒囊於亡然則非有易牙之口不能辨淄澠之水非有師曠之聰不能發勞薪之味故古人不三折肱

不稱良醫吾與子固無所用其患矣特以告夫來者

賜進士第文林郎禮部儀制清吏司主
事渤海馬應龍伯光甫撰

本草原始卷之一

草部上

黃精　地黃（生熟二品）　白朮　蒼朮
茈胡（銀茈胡）　麥門冬　沙參　五味子　車前
茵陳蒿　山藥（原名薯蕷）　澤瀉　遠志（苗名小草）　龍膽（即草龍膽）
巴戟天　衛矛（即鬼箭）　細辛　石斛　肉蓯蓉
草蓯蓉　甘草　牛膝　黃連　地膚子
赤芝　黑芝　青芝　白芝　黃芝
紫芝　卷柏　芎藭（即川芎）　藍實　蒺藜子（二種）
黃耆　蒲黃　續斷　漏蘆　防風
決明子　丹參　茜草（即茜根）　菟絲子　茺蔚（即益母草）
人參　菊花（二種）　菖蒲　天門冬　獨活
羌活　升麻　木香　蛇床子　王不留行

草部上五十五種附名者四種

本草原始卷之一

雍丘正宇李中立纂輯并書畫

草部上

黃精出茅山嵩山者良。二月始生。一枝多葉。葉狀似竹。而鹿兔食之。故別錄名鹿竹。兔竹。根如嫩生薑黃色。故俗呼為野生薑。洗淨九蒸九晒。味甚甘美。代粮可過凶年。故救荒本草名救窮草。蒙筌本草名米餔。仙家以為芝草之類。以其得坤土之精粹。故謂之黃精。

氣味甘平無毒

主治補中益氣除風濕安五臟久服輕身延年不飢○補五勞七傷助筋骨耐寒暑益脾胃潤心肺單服九蒸九暴食之駐顏斷穀○補諸虛止寒熱填精髓下三尸蟲

黃精
別錄
上品


有一二歧者
亦有無歧者

生淡黃色類白芨熟深黑色象熟地黃有二三歧者

入藥用根故予惟畫根形後倣此

按博物誌曰太陽之草名黃精餌之可以長生太陰之草名鉤吻食之入口立死人信鉤吻殺人並無敢食之者何嘗信黃精延壽而餌之不厭者耶按此但以黃精鉤吻相對待而言非言其相似也

修治先以溪水洗潔淨用木甑釜內安置得所入黃精令滿密蓋蒸至氣溜暴之如此九蒸九暴餌之若生則刺人咽喉

若服生者初時只可一寸半漸漸增之十日不食服止三尺五寸三百日後盡見鬼神久必昇天

忌梅實

昔臨川士家一婢逃入深山中見野草枝葉可愛拔根食之久而不飢夜宿大樹下聞草中動以為虎懼而上樹避之及曉下平地其身歘然凌空而去若飛鳥焉數歲家人采薪見之捕之不得臨絕壁下網圍之俄而騰上山頂或云此婢安有仙骨不過靈藥服食遂以酒餌置往來之路果來食訖遂不能去擒之具述其故指所食之草即此黃精

黃精君

生地黃

生咸陽黃土地者佳。二月生葉布地便出。似車前葉。上有皺文而不光。高者及尺餘。低者三四寸。其華似油麻花而紅紫色。亦有黃花者。其實作房如連翹。子甚細而沙褐色。根如人手指黃色。二月八月采根陰乾。以水浸試之。浮者名天黃。半浮半沉者名人黃。沉者名地黃。以沉者為良。故以地為名。爾雅云。苄。地黃。苄字從下。亦趨下之議也。本經所謂乾地黃者。即生地黃之乾者也。

氣味甘寒無毒

主治傷中逐血痺填骨髓長肌肉作湯除寒熱積聚除痺療折跌絕筋久服輕身不老鮮者尤良○主男子五劳七傷女子傷中胞漏下血破惡血溺血利大小腸去胃中宿食飽力斷絕補五臟內傷不足通血脉益氣力利耳目○助心膽氣強筋骨長志安魂定魄治驚悸劳劣心肺損吐血鼻衄婦人崩中血運○產後腹痛久服變白延年○凉血生血補腎水真陰除皮膚燥去諸濕熱○主心病掌中熱痛脾氣痿蹷嗜臥足下熱而痛○治齒痛唾血

鮮地黃大寒主治婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下血胎不落墮墜踠折瘀血留血鼻衄吐血皆擣飲之○解諸熱通月水利水道擣貼腹能消瘀血

生地黃形

本經上品


形肥大者俗呼頂條
釘頭鼠尾沉水者佳
二條
再小者不堪用
俗呼中條今多用

產杭地者質雖光潤力微出懷慶者皮有疙瘩力大凡資入藥宜用懷慶

有一種山地黃乾枯輕浮不宜入劑

修治揀擇沉水者酒洗晒乾或火焙乾用亦有以薑汁炒者各依方法酒浸上行薑製不泥膈日乾者平火乾者溫

生地黃味厚氣薄陰中之陽入手足少陰厥陰及手太陽經

得清酒麥門冬良惡貝母畏蕪荑忌葱蒜萊菔勿犯銅鐵器令人腎消并髮白

千金方治吐血唾血補虛除熱取乳石去癰癤等疾鮮地黃不拘多少三擣三壓取汁令盡以磁器盛之密蓋勿洩氣湯上煮減半絞去滓再煎如餳丸彈子大每溫酒服一丸日二服良

生地黃君

熟地黃

係縮砂酒拌蒸熟者。

氣味甘微苦微溫無毒

主治填骨髓長肌肉生精血補五臟內傷不足通血脉利耳目黑鬚髮男子五劳七傷女子傷中胞漏經候不調胎產百病補血氣滋腎水益真陰去臍腹急痛病後脛股酸痛○坐而欲起目䀮䀮無所見

懷熟地黃

本經上品



入藥惟懷慶熟地黃最優杭地黃及山地黃不堪用今市家
或以酒煮或以黑豆湯拌蒸或用鐵鍋煮熟售者勿用
修治揀取沉水肥大者以好黃酒入縮砂仁在內拌勻用木甑
於瓦鍋內蒸令氣透晾乾再以砂仁酒拌蒸晾如此九蒸九
晾乃止蓋地黃性泥得砂仁之香而竄合和五臟冲和之氣
歸宿丹田故也
熟地黃味厚氣薄陰中之陽沉也入手足少陰厥陰經
忌葱蒜萊菔諸血
聖惠方治病後虛汗口乾心燥熟地黃五兩水三盞煎一盞半
分三服一日盡　熟地黃君

白朮始生鄭山山谷漢中南鄭春生苗青色無椏莖作蒿榦狀
青赤色長三二尺以来夏開花紫碧色或黃白色似刺薊花故
本經載名山薊根類薑故別録名山薑楊州之域多種白朮其

狀如枹故一名楊枹枹乃鼓槌之名按六書本義朮字篆文象
其根榦枝葉之形

氣味甘溫無毒
主治風寒濕痺死肌痙疸止汗除熱消食作煎餌久服輕身延
年不飢○主大風在身面風眩頭痛目淚出消痰水逐皮間
風水結腫除心下急滿霍亂吐下不止利腰臍間血益津液
暖胃消穀嗜食○治心腹脹滿中冷痛胃虛下利多年氣痢
除寒熱止嘔逆○反胃利小便主五勞七傷補腰膝長肌肉
治冷氣痃癖氣塊婦人冷癥瘕○除濕益氣和中補陽消痰
逐水生津止渴止瀉痢消足脛濕腫除胃中熱肌熱得枳實
消痞滿氣分佐黃芩安胎清熱○理胃益脾補肝風虛主舌
本強食則嘔胃脘痛身體重心下急痛心下水痞衝脈為病
逆氣裏急臍腹痛
入藥用根二月三月八月九月采暴乾

白朮
本經
上品


雲頭朮
產歙者
俗呼狗頭朮
浙朮
俗呼雞腿朮
過夏生油

雲頭朮種平壤雖肥大由糞力也易生油狗頭朮雞腿朮雖
瘦小得土氣充也甚燥白凡用不拘州土惟白為勝
修治去蘆以朮泔浸一宿切片用東壁土炒亦有乳汁浸者
白朮味厚氣薄陽中陰也可升可降入手太陽少陰足太陰陽
明少陰厥陰六經
防風地榆為之使忌食桃李雀蛤
簡便方治濕瀉暑瀉白朮車前子等分炒為末白湯調下二三
錢効
白朮君

蒼朮今以茅山者為良苗高二三尺其葉抱莖而生稍間葉似

棠梨其脚下葉有三五叉有鋸齒小刺根蒼黑色故名蒼朮朮
者山之精也故抱朴子名山精服之令人長生辟穀致神仙故
来仙家仙朮之稱

氣味甘辛溫無毒
主治風寒濕痺死肌痙疸作煎餌久服輕身延年不飢○主頭
痛消痰水逐皮膚風水結腫除心下急滿及霍亂吐下不止
暖胃消穀嗜食○除惡氣弭災沴○主大風𤸷痺心腹脹痛
水腫脹滿除寒熱止嘔逆下泄冷痢○治筋骨軟弱痃癖氣
塊婦人冷氣癥瘕山嵐瘴氣溫疾○明目暖水臟○除濕發
汗建胃安脾治痿要藥○散風益氣總解諸鬱

蒼朮
本經
上品



茅山蒼朮堅小肉白氣味甘辛他山蒼朮塊大肉黃氣味辛烈又有一種蒼朮皮白肉白堅實氣味亦甘辛較之茅山者次之北人每呼為南蒼朮北西山者勝

修治蒼朮性燥九用去上粗皮以米泔浸一宿去其油切片焙乾亦有用脂麻同炒以制其燥者

蒼朮性溫而燥陰中陽也可升可降入足太陰陽明手太陰陽明太陽之經

忌桃李菘菜雀肉青魚

張仲景辟一切惡氣用蒼朮同豬蹄甲燒烟陶隱居亦言朮能除惡氣弭灾沴故今病疫及歲旦人家往往燒蒼朮以辟邪氣類編載越民高氏妻病恍惚譫語亡夫之鬼憑之其家燒蒼朮烟鬼遽求去夷堅志載江西一士人為女妖所染其鬼將別曰君為陰氣所侵必然暴泄但多服平胃散為良中有蒼朮能去邪也　蒼朮君

透骨草　苗春生田野間。高尺餘。莖圓。葉尖有齒。至夏抽三四穗。

花黃色。結實三稜類蓖麻子。五月採苗。治風濕有透骨搜風之功。故名透骨草。

氣味甘辛無毒

主治一切風湿筋骨疼痛拘攣寒湿脚氣遍身瘡癬疥癩腫毒



入藥苗花並用與馬鞭草大不相似馬鞭草花葉如菊紫花透骨草尖葉類藍黃花治療亦異用者宜審

普濟方治反胃吐食透骨草獨科蒼耳生牡蠣各一錢薑三片水煎服

楊誠經驗方治一切腫毒初起用透骨草漏蘆防風地榆等分煎湯綿蘸乘熱不住盪之二三日即消

茈胡（茈音柴）始生弘農川谷及寃句。今以銀夏者為佳。根長尺餘。色白而軟。俗呼銀柴胡。生北地者。根狀如前胡。而強硬如柴。故名柴胡。其苗有如韭葉者。竹葉者。邪蒿者。以竹葉者為勝。柴胡生山中。其苗嫩則可茹。故別錄名芸蒿。吳普本草名山菜。又名茹草。其苗老則采而為柴。故根名柴胡。此又一說也。

氣味苦平無毒

主治心腹腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新久服輕身明目益精○除傷寒心下煩熱諸痰熱結實胸中邪氣五臟間遊氣大腸停積水脹及濕痺拘攣亦可作浴湯○治熱

勞骨節煩疼熱氣肩背疼痛勞之羸瘦下氣消食宣暢氣血主時疾內外熱不解單煑服之良○補五勞七傷除煩止驚益氣力消痰止嗽潤心肺添精髓健忘○除虛勞散肌熱去早晨潮熱寒熱往來膽痺婦人產前產後諸熱心下痞胸脇痛○治陽氣下陷平肝膽三焦包絡相火及頭痛眩運目昏赤痛障翳耳聾鳴諸瘧及肥氣寒熱婦人經水不調小兒痘疹餘熱五疳羸熱

銀夏柴胡根類沙參而大皮皺色黃白肉有黃紋市賣皆然



入藥用根

修治去蘆及鬚水洗浄剉用勿令犯火欲上升用根酒浸欲下降用稍

柴胡氣味俱輕陽也升也陰中之陽手足少陽厥陰四經引經藥也

半夏為之使惡蜀葵皂莢畏女菀藜蘆

許學士本事方治傷寒之後邪入經絡體瘦肌熱推陳致新解利傷寒時氣伏暑倉卒並治不論長幼柴胡四两甘草一两每用三錢水一盞煎服

千金方治眼目昏暗者柴胡六銖决明子十八銖治篩人乳汁和傅目上久久夜見五色　柴胡君

麥門冬

始生函谷川谷。及隄坂肥土石間久廢處。葉青如韭。故秦名烏韭。齊名愛韭。楚名馬韭。越名羊韭。此草凌冬不凋。故吳普本草名忍冬。又名忍凌。根白色有鬚連珠類穬麥顆。故名麥虋冬。麥鬚曰虋。俗作門冬便于字也。

氣味甘平無毒

主治心腹結氣腸中傷飽胃絡脉絕羸瘦短氣久服輕身不老不飢○療身重目黃心下支滿虛劳客熱口乾燥渴止嘔吐愈痿蹷強陰益精消穀調中保神定肺氣安五臟令人肥健美顔色有子○去心熱止煩熱寒熱體劳下痰飲○治五劳七傷安魂定魄止嗽定肺痿吐膿時疾熱狂頭痛○治熱毒大水面目肢節浮腫下水主泄精○治肺中伏火補心氣不足主血妄行及經水枯乳汁不下○久服明目和車前地黃丸服去濕痺變白夜視有光○斷穀為要藥

麥虋冬

本經

上品



凡用揀肥大者為佳

修治以滚水潤溫少頃抽心或以沙鍋焙軟乘熱去心不爾令人煩若以水浸多時去心柔則柔矣然氣味都盡用之不効天門冬亦然

麥虋冬微苦微寒陽中微陰入手太陰經氣分

地黃車前為之使惡款冬花苦瓠苦芺畏苦參青蘘木耳伏石鍾乳

保命集治衂血不止麥門冬去心生地黃各五錢水煎服立止

蘭室寶鑑治齒縫出血麥門冬煎湯漱之

麥虋冬君　虋音門

沙參

始生河内川谷及寃句般陽續山。今出近道。二月生苗如葵葉青色。七八月抽莖高一二尺。莖上之葉如枸杞葉有細齒。開紫花。亦有白花者。折其莖根。有白汁出。故别録名羊乳。俚人呼為羊婆奶。其根如葵根白色。生黃土地者短而小。生沙地者長尺餘白而實。此草宜於沙地。故本經名沙參。吳普名白參。弘景曰。沙參與人參。玄參。丹參。苦參。是為五參。其形不盡相類。而主療頗同。故皆有參名。

氣味甘微苦無毒

主治血結驚氣除寒熱補中益肺氣○療胸痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五臟久服利人主頭腫痛益氣長肌肉○去皮肌浮風疝氣下墜治常欲眠養肝氣宣五臟風氣○補虛止驚煩益心肺并一切惡瘡疥癬及身癢排膿消腫毒

沙參

本經

上品


入藥用根
二月八月采根暴乾

沙參形如桔梗無桔梗肉實亦無桔梗金井玉欄之狀又似薺苨無薺苨色白亦無薺苨蘆頭數股之多然而有心者為桔梗多蘆者為薺苨市者彼此代充深為可恨用沙參者宜擇獨蘆無心色黃白肉虛者真也本經云中正白實者良就沙參之虛實黃白而論也

沙參惡防己反藜蘆

衛生易簡方沙參五錢水煎服之治肺熱欬嗽効

沙參臣

五味子

出高麗者第一。今南北俱有。春初生苗。引赤蔓於木上。葉似杏葉。三四月開黃白花。七月成實。叢生莖端。如梧子大。生青熟紅紫。其實皮甘、肉酸、核中辛苦、都有鹹味。故名五味子。典術曰。五味者。五行之精。其莖赤、花黃白、生青熟紫黑。亦具五色。

且能養五臟。是以稱五。

氣味酸溫無毒

主治益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益男子精○養五臟除熱生陰中肌○治中下氣止嘔逆補虛勞令人體悅澤○明目暖水臟壯筋骨治風消食反胃霍亂轉筋痃癖奔豚冷氣消水腫心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒○生津止渴治瀉痢補元氣不足收耗散之氣瞳子散火○治喘欬燥嗽壯水鎮陽

五味子

本經上品



遼五味子鮮紅色久黑色俱多膏潤澤



南五味子新紫色久亦黑但少膏乾燥

子比蔓荊子而大北者溫潤南者乾枯凡用以北為勝雷公云小顆皺有白樸鹽霜一重其味酸鹹苦辛甘味全者為真則南五味陳久自生白樸是雷公之言是南而非北不知南北各有所長風寒欬嗽南五味為奇虛寒勞傷北五味為佳

修治入補藥蜜浸蒸用入嗽藥生用連核入藥其核如豬腎

五味子味厚氣輕陰中微陽入手太陰血分足少陰氣分

蓯蓉為之使惡萎蕤勝烏頭

攝生方治久欬不止用五味子一兩真茶四錢晒研為末以甘草五錢煎膏丸綠豆大每服三十丸沸湯下數日即愈

五味子君

車前

始生真定平澤丘陵阪道中。今處處有之。春初生。苗葉布地如匙面。累年者長及尺餘。中抽數莖。作長穗如鼠尾。花甚細密。結實如葶藶赤黑色。此草好生道邊及牛馬足跡中。故本經名車前。又名當道。別錄名馬舄。（舄音昔足履也）又名牛遺。幽人謂之牛舌草。象形也。蝦蟇喜藏伏于下。故江東稱爲蝦蟇衣。詩云采采

芣苡即此也。

子甘寒無毒主治氣癃止痛利水道小便除濕痺久服輕身耐老○男子傷中女子淋瀝不欲食養肺強陰益精令人有子明目療赤痛○去風毒肝中風熱毒風衝眼赤痛障翳腦痛淚出壓丹石毒去心胸煩熱○養肝○收婦人難產○導小腸熱止暑瀉痢

葉根氣味甘寒無毒主治金瘡止血衄鼻瘀血血瘕下血小便赤止煩下氣除小蟲主陰㿗葉主泄精病治尿血能補五臟明目利小便通五淋



車前本經上品

五月五日采苗七月八月采實

修治　凡用須一窠有九葉內有蘂莖長一尺二寸者力全堪用用子必以水淘洗去泥沙晒乾入湯液炒過盛絹袋中同群藥煎庶湯清飲不糊口或藥煎熟臨服入車前子亦滑入九散以酒浸一宿蒸熟研爛作餅晒乾焙研○使葉根洗去土稱一鎰者力全用葉勿使蓋莖剉細於新瓦上攤乾用

子常山為之使葉伏硫黃結草砂伏五礬粉霜

全幼心鑑治初生小兒尿澀不通車前搗汁入蜜少許灌之

圖經本草治鼻衄不止生車前葉搗汁飲之甚善

千金方治金瘡血出車前葉搗傳之良

車前君

茵陳蒿　始生太山及丘陵坡岸上。今近道有之。似蓬蒿而葉緊細。無花實。莖幹經冬不死。至春更因舊莖而生新葉。故謂之茵陳蒿。

氣味苦平微寒無毒

主治風濕寒熱邪氣熱結黃疸久服輕身益氣耐老面白悅長年治小便不利除頭熱去伏瘕通關節傷寒用之治時疫熱狂頭痛風眼瘴瘧悶損

凡用茵陳要連枯莖者方真入藥去莖并根細剉

陰中微陽入足太陽經伏硇砂

千金方治遍身風痒瘡疥用茵陳蒿煮濃汁洗之立瘥

茵陳蒿使



春生苗其莖如艾葉如淡色青蒿而背白多岐

亦有有花實者

三月采收晒乾

本經上品

山藥　始生嵩高山谷。今處處有之。春生苗延蔓紫莖青葉有三尖光澤。夏開細白花。亦有淡紅花者。秋結實于葉間狀如鈴。有一種根如薑芋之類而皮紫。極有大者。有一種生山中。根細如指極緊實者。刮磨入湯煮食。味咸甘美。因根皮外黃如芋。山谷生者。入藥為勝。故吳普本草名山芋。圖經名山藷。又一名藷藇。一名藷署。一名土藷。彼土人呼為藷。其音相近。或語有輕重。或相傳之訛耳。其山藥正名薯蕷。因唐代宗名預。避諱改為薯藥。又因宋英宗諱署。改為山藥。蓋言山中之藥也。

氣味甘溫平無毒

主治傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣力長肌肉強陰久服耳目聰明輕身不飢延年○主頭面遊風頭風眼眩下氣止腰痛治虛勞羸瘦充五臟除煩熱○補五勞七傷去冷風鎮心神安魂魄補心氣不足開達心孔多記事○強筋骨主泄精健忘○益腎健脾止洩痢化痰涎潤皮毛○生搗貼腫硬毒能消散

山藥

本經

上品



皮黃多鬚

俗呼片子山藥堪食



肉白指細緊實者入藥

今人多用懷慶者

凡入藥白色者為上青黑者不堪

修治　擇山產條直堅白者生乾之故古方皆用乾山藥蓋生則性滑熟則滯氣只宜用竹刀刮去皮竹篩盛置簷風處或置焙籠中微火烘乾亦佳若晒乾九藥晒乾極多則古人何必加乾字于山藥之上

紫芝為之使惡甘遂入手足太陰二經

普濟方治心腹虛脹手不厥逆或飲苦寒之劑過多未食先嘔不思飲食山藥半生半炒為細末米飲調服二錢一日二服大有功効忌鐵器生冷

山藥臣

澤瀉始生汝南池澤。今以漢中者為佳。苗春生。葉似牛舌。獨莖而長。根作塊。色黃白。痕中有鬚毛。多生池澤淺水。性能瀉水。故名澤瀉。

氣味甘寒無毒

主治風寒濕痺乳難養五臟益氣力肥健消水久服耳目聰明不飢延年輕身面生光能行水上○補虛損五臟痞滿起陰氣止洩精消渴淋瀝逐膀胱三膲停水○主腎虛精自出治五淋宣通水道○主頭旋耳虛鳴筋骨攣縮通小腸止尿血主產難補女人血海令人有子○入腎經去舊水養新水利小便消脹腫滲瀉止渴○去脬中留垢心下水痞○滲濕熱行痰飲止嘔吐瀉痢疝痛脚氣

今汝南不復采惟以涇州華州者為善今山東河陝江淮亦有之惟漢中者最優

澤瀉本經上品


八月采
色黃白
痕中有鬚毛
入藥用根蟲易蛀損宜密藏

有一種形象三稜體稍輕山人每呼為水澤瀉市多以此亂真用者宜審

修治去毛酒浸一宿細剉暴乾任用

氣寒味厚陰也陰中微陽入足太陽少陰經

畏海蛤文蛤

保命集治水濕腫脹白朮澤瀉各一兩為末或為丸每服三錢白茯苓湯下

澤瀉君

遠志始生太山及宛句川谷。今河陝洛西州郡皆有之。莖葉青色而極細小。故苗名小草。三月開白花。亦有紅花者。其根長及一尺。昔陵陽仲子服此二十年。開書所視。永記而不忘。功能強志。故有遠志之稱。

根氣味苦溫無毒

主治欬逆傷中補不足除邪氣利九竅益智慧耳目聰明不忘強志倍力久服輕身不老○利丈夫定心氣止驚悸益精去心下膈氣皮膚中熱面目黃○殺天雄附子烏頭毒煎汁飲之○治健忘安魂魄令人不迷堅壯陽道○長肌肉助筋骨婦人血噤失音小兒客忤○腎積奔豚

葉主治益精補陰止虛損夢洩

遠志本經上品


入藥根苗俱用
皮皺粗大者良
四月采

修治遠志甘草湯浸一宿去骨暴乾或焙乾用

得茯苓冬葵子龍骨良畏珍珠藜蘆蜚蠊齊蛤入足少陰腎經

肘后方治心孔惛塞多忘丁酉日密自至市買遠志着巾角中還為末服之勿令人知

遠志君

龍膽生齊朐山谷及宛句。今出近道。根黃白色。下抽根十餘條。類牛膝而粗短。四月生苗。細莖如小竹枝。七月開花。如牵牛花。作鈴鐸狀青碧色。冬後結子。因葉如龍葵。根如膽苦。故名龍膽。俗呼龍膽草。亦名草龍膽。

氣味苦濇大寒無毒

主治骨間寒熱驚癇邪氣續絕傷定五臟殺蠱毒○除胃中伏熱時氣溫熱熱泄下痢去腸中小蟲益肝膽氣止驚惕久服益智不忘輕身耐老○治小兒壯熱骨熱驚癇入心時疾熱

黃癰腫口乾○客忤痱氣熱狂明目止煩治瘡疥○去目中黃及睛赤腫脹瘀肉高起痛不可忍○退肝經邪熱除下焦濕熱之腫瀉膀胱火○療咽喉痛風熱盜汗

龍膽
本經
上品



二月八月十一月采根陰乾　根彷彿當歸

凡用根肥長色黃白者佳

修治以甘草湯浸一宿去頭子剉細暴乾用

氣味俱厚沉而降陰也足厥陰少陽經氣分藥也貫仲小豆為之使惡地黃防葵

楊氏家藏方治婦人小兒一切盜汗并傷寒後盜汗不止龍膽草為末每服一錢豬膽汁三兩點入溫酒少許調服

姚僧坦集驗方治卒然尿血不止龍膽一虎口水五升煑取二升半分為五服

龍膽君

巴戟天生巴郡及下邳山谷。今江淮河東州郡亦有之。根如連珠。宿根青色。嫩根白色。老根紫色。其葉似茗。經冬不凋。故日華子。大明序集諸家本草。名不凋草。（巴戟天名義不知以俟後之君子解之）

氣味辛甘微溫無毒

主治大風邪氣陰痿不起強筋骨安五臟補中增志益氣○療頭面遊風小腹及陰中相引痛補五勞益精利男子○治男子夜夢鬼交精洩強陰下氣治風癩○治一切風療水脹

入藥用根

巴戟天
本經上品



二月八月采根陰乾連珠肉厚者勝

今方家多以紫色者為良蜀人云都無紫色者采時或用黑豆同煑欲其色紫殊失氣味尤宜辨之又有一種山葎根正似巴戟但色白土人采得以醋水煑之乃以雜巴戟莫能辨也但擊破視之中紫色而鮮絜者偽也其中雖紫又有微白糝有粉色而理小暗者真也

修治巴戟以酒浸一宿入心剉焙若急用以滾水浸軟去心

巴戟天腎經血分藥也　覆盆子為之使惡雷丸丹參朝生

巴戟天使

衛矛始生霍山山谷。今江淮州郡有之。生山石間。小株成叢。春長嫩條。條上四面有羽如箭羽。視之若三羽爾。葉青狀似野茶。對生。三四月開碎花。黃綠色。結實大如冬青子。劉熙釋名言齊人謂箭羽為衛。此物幹有直羽。如箭羽矛刃自衛之狀。故名衛矛。廣雅謂之神箭。別錄謂之鬼箭。

氣味苦寒無毒

主治女子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼毒蠱疰　中惡腹痛去白虫消皮膚風毒腫令陰中解　療婦人血氣大效破陳血能落胎主百邪鬼魅　通月經破癥結止帶下殺腹臟蟲及產後血咬腹痛

衛矛俗呼鬼箭
本經中品



衛矛莖黃綠色羽紫皂色二月七月采莖陰乾入藥

修治衛矛去葉剉以酥拌緩炒

聖濟總錄治鬼瘧日發鬼箭羽川山甲燒灰為末每以一字發時嗃鼻

道家所用十二精鬼精鬼箭即此也

衛矛使

細辛生華陰山谷。今處處有之。然他處所出者。不及華陰者真。葉如葵。赤黑色。其根細而其味極辛。故名之曰、細辛。按山海經云。浮戲之山多少辛。管子云。五沃之土群藥生少辛、是矣。

氣味辛溫無毒

主治欬逆上氣頭痛腦動百節拘攣風溼痺痛死肌久服明目利九竅輕身長年○溫中下氣破痰利水道開胸中滯結除喉痺齆鼻不聞香臭風癇癲疾下乳結汗不出血不行安五臟益肝膽通精氣○添膽氣治嗽去皮風溼痒風眼淚下除齒痛血閉婦人如瀝腰痛○含之去口臭○潤肝燥治督脉為病脊強而厥○治口舌生瘡大便燥結起目中倒睫得當歸芍藥白芷芎藭牡丹皮藁本甘草共療婦人得决明鯉魚膽青羊肝共療目痛以獨活為使治少陰頭痛如神亦止諸陽頭痛

細辛
本經
上品



氣香色黃白味極辛

二月八月采根陰乾入藥



根粗色黑味微辛微苦

慱物志言杜衡亂細辛自古已然沈氏所說甚詳大抵亂細辛者不止杜衡用者當以根苗色味細辨之葉如葵柔莖細根色紫味極辛嚼之習習如椒而更甚於椒者細辛也葉似馬蹄莖粗根曲色黃白味微辛者杜衡也俗呼馬蹄香當細辛用最多一莖直上莖端生葉如纖根似細辛微粗直而色黃白味辛微苦者鬼督郵也似鬼督郵而色黑者及己也葉似小桑根似細辛微粗長而黃色味辛而有臊氣者徐長卿也葉似柳而根似細辛粗長黃白色而味苦者白微也

修治細辛切去頭子以爪水浸一宿暴乾用

氣厚于味陽也升也入足厥陰少陰血分為手少陰引經之藥

曾青棗根為之使惡黃耆狼毒山茱萸忌生菜狸肉畏消石滑

石反藜蘆

龔氏經驗方治諸般耳聾真細辛末溶黃蠟丸鼠屎大綿裹一（丸塞之二次即愈）

細辛臣

石斛始生六安山谷。今出荊襄及漢中江左。有二種。一種生水旁石上。莖似小竹。節節間出碎葉。折之有肉中實。名石斛。一種生櫟木上。莖似麥稈而匾大。葉在莖頭。折之無肉中虛。名木斛。因莖如金釵之股。故獲金釵石斛之稱。

氣味甘平無毒

主治傷中除痺下氣補五臟虛勞羸瘦強陰益精久服厚腸胃補內絕不足平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱痱氣腳膝疼冷痺弱定志除驚輕身延年○益氣除熱治男子腰腳軟弱健陽

逐皮肌風痺骨中久冷補腎益力壯筋骨煖水臟益智清氣治發熱自汗癰疽排膿內塞



本經
上品

石斛叢生石上根糾結甚繁乾則白軟莖有節心實

木斛亦叢生根黑莖亦有節心空

石斛入藥佳木斛不堪用今人見木斛形匾如釵多用木斛醫家亦不能明辨乎茲寫其象令用者知莖

（圓中實者為石斛實者有力莖圓中虛者為木斛虛者無能不特此也凡藥皆然）

修治（石斛去根頭酒浸軟暴乾剉用或以酥拌蒸焙乾剉用）

（味甘淡微鹹陰中之陽降也乃足太陰脾足少陰右腎之藥）

（石斛陸英為之使惡凝水石巴豆畏雷丸殭蠶）

（柚珍方治睫毛倒入用石斛川芎藭等分為末口內含水隨左右嗃鼻日二次）

（石斛君）

肉蓯蓉

陝西州郡俱有。生大木及土塹垣中。舊說是馬遺瀝所生。此非游牝之所而有此。則知自是一種類耳。皮如松稍有鱗甲。形柔軟如肉。故吳普名肉松蓉。本經名肉蓯蓉。從容、和緩之貌。此藥補而不峻。故有蓯蓉之號。

氣味甘微溫無毒

主治五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五臟強陰益精氣多子婦人癥瘕久服輕身○除膀胱邪氣腰痛止痢○益髓悅顏色延年大補壯陽日御過倍治女人血崩○男子絕陽不興女子絕陰不產潤五臟長肌肉暖腰膝男子洩精血遺瀝女子帶下陰痛


肉蓯蓉本經上品
色黑
長五六寸至一尺以來
皮有鱗甲肉有筋膜
二月采陰乾

肉蓯蓉肥大柔軟者佳乾枯瘦小者劣今人多以金蓮根草蓯蓉、嫩松稍鹽潤充之用者宜審

修治酒浸一宿刷去浮甲劈破中心去白膜一重焙乾用或酥炙得所、

肉蓯蓉腎經血分藥也

本經方（肉蓯蓉四兩刮去鱗甲酒浸洗去黑汁薄切合山藥四兩羊肉八兩作羹極美益人勝服補藥　肉蓯蓉臣）

草蓯蓉

生山南巖石上。暮春抽苗。長五六寸。至一尺以來。莖花俱紫色。與肉蓯蓉極相類。故名草蓯蓉。日華子名花蓯蓉。俗呼紫花地丁。

氣味甘溫無毒

主治男子五勞七傷補腰腎令人有子去風血煮酒浸酒服之諸瘡可作洗湯


草蓯蓉開寶名列當
今原州秦州渭州靈州皆有之
花繁密紫色莖圓有鱗甲四月中旬采取壓匾日乾

食醫心鏡治陽不興草蓯蓉好者二斤以好酒一斗浸之經宿隨意日飲之

甘草

生河西川谷積沙山及上郡春生青苗。高一二尺。葉如槐葉。七月開紫花。結角作一本生。如相思角。至熟時角拆。子扁如小豆。極堅。根長者。三四尺。粗細不定。皮赤肉黃。其味甘甜。故名甘草。別錄名蜜草。又名國老。弘景曰。此草最為衆藥之主。經方少有不用者。猶如香中有沉香也。國老即帝師之稱。雖非君而為君所宗。是以能安和草石而解諸毒也。甄權曰。諸藥中甘草為君。治七十二種乳石毒。解一千二百般草木毒。調和衆藥有

功。故有國老之稱。

氣味甘平無毒

主治五臟六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍氣力金瘡尰解毒久服輕身延年○溫中下氣煩滿短氣傷臟欬嗽止渴通經脉利血氣解百藥毒為九土之精安和七十二種石一千二百種草○主腹中冷痛治驚癇除腹脹滿補益五臟腎氣內傷令人陰不痿主婦人血瀝腰痛凡虛而多熱者加用之○安魂定魄補五勞七傷一切虛損驚悸煩悶健忘通九竅利百脉益精養氣壯筋骨○生用瀉火熱熟用散表寒去咽痛除邪熱緩正氣養陰血補脾胃潤肺○吐肺痿之膿血消五發之瘡疽○解小兒胎毒

稍　主治生用治胸中積熱去莖中痛加酒煑玄胡索苦楝子尤妙

頭　主治生用能行足厥陰陽明二經污濁之血消腫導毒

節　主治癰疽焮腫



二月八月除日采根暴乾

皮赤肉黃

甘草本經上品

今甘草有數種其堅實斷理粗大者佳其輕虛縱理及細韌者不堪

修治去頭尾刮去赤皮補中宜炙用瀉火宜生用

甘草氣薄味厚升而浮陽也入足太陰厥陰經綱目曰通入手足十二經

术苦參乾漆為之使惡遠志反大戟芫花甘遂海藻

金匱玉函方治飲饌中毒未審何物卒急無藥只煎甘草薺苨入口便活

千金方治陰頭生瘡蜜煎甘草末頻頻塗之神效

甘草君

牛膝始生河內川谷及臨朐。今以懷慶者為良。春生苗。莖高二三尺。青紫色。有節。如牛膝。葉頗似莧菜葉而長且尖艄。兩兩相對於節上。生花作穗。秋結實甚細。根長二三尺。柔潤。有雄雌二種。雄者麄長。雌者細短。因莖似牛膝。故名牛膝。廣雅名牛莖。因葉似莧。嫩可茹。故救荒本草名山莧菜。

氣味苦酸平無毒

主治寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎久服輕身耐老○療傷中少氣男子陰消老人失溺補中續絕益精利陰氣填骨髓止髮白除腦中痛及腰脊痛婦人月水不通血結○治陰痿補腎助十二經脉逐惡血○治腰膝軟怯冷弱破癥結排膿止痛產後心腹痛并血運落死胎○強筋補肝臟風虛○同蓯蓉浸酒服益腎竹木刺入肉嚼爛罨之即出○治久瘧寒熱五淋尿血莖中痛下痢喉痺口瘡齒痛癰腫惡瘡傷折

牛膝本經上品　九月末取根水浸挼皮暴乾懷慶者佳



莖紫節大者為雄莖青節細者為雌

根長大柔潤者為雄根細小多歧者為雌俱有肉色

凡用牛膝擇懷慶白亮長及尺餘無歧者最優色紫短細者下色黑乾枯者乃土牛膝耳不堪服食

修治牛膝去蘆頭欲下行生用滋補焙用或酒拌蒸過用

牛膝足厥陰少陰之藥

惡螢火龜甲畏白前忌牛肉

外臺祕要治勞瘧積久不止者牛膝一握生切以水六升煑二升分三服早晨一服未發前一服臨發時一服

牛膝君

黃連始生巫陽川谷及蜀郡太山之陽。今以宣城者爲勝。苗高一尺以来。葉似甘菊。凌冬不凋。四月開花黃色。六月結實似芹子。色亦黃。其根如鷹鷄爪連珠而色黃。故名黃連。

氣味苦寒無毒

主治熱氣目痛眥傷泣出明目腸澼腹痛下痢婦人陰中腫痛久服令人不忘○主五臟冷熱久下洩澼膿血止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡○治五勞七傷益氣止心腹痛驚悸煩燥潤心肺長肉止血天行熱疾止盜汗并瘡疥豬肚蒸為丸治小兒疳氣殺蟲○羸瘦氣急○治鬱熱在中燥煩悪心兀兀欲吐心下痞滿○主心病逆而盛心積伏梁○去心竅悪血解巴豆輕粉毒

出川省俗呼川黃連產雅州俗呼雅黃連生宣城俗呼宣黃連有連珠無毛而堅實色深黃者有無珠多毛而中虛

黃色稍淡者

黃連
本經上品



入藥用根　二月八月采



凡用黃連選粗大黃色鮮明多節堅重相擊有聲者為勝小而連珠無鬚者次之無珠多毛色淺而虛者不堪用

修治黃連去蘆及鬚治本臟之火生用治肝膽之實火以豬膽汁浸炒治肝膽之虛火以醋漫炒治上焦之火以酒炒治中焦之火以薑汁炒治下焦之火以鹽水或朴消炒治氣分溫熱之火以茱萸湯浸炒治血分塊中伏火以乾漆水炒治食積之火以黃土炒不獨為之引導蓋辛熱能制其苦寒鹹寒能制其燥性在用者詳酌之

黃連氣味俱厚可升可降陰中陽也入手少陰心經為治火之主藥

黃連黃芩龍骨理石為之使悪菊花玄參白鮮皮芫花白殭蠶畏款冬花牛膝勝烏頭解巴豆毒

斗門方治雞冠痔以黃連末傅之良

黃連臣　蘇東坡收筆黃連煎汁調輕粉蘸筆頭候乾收不蛀

地膚子生荊州平澤及田野。今近地有之。苗春生。葉似荊芥。一莖數十枝。攢簇團團直上。性最柔弱。七月開黃花。子青色。似一眠起蠶沙之狀。田野人呼為地麥草。名地膚地麥。因其子形似也。本經名地葵。因其苗味似也。圖經名鴨舌草。因其葉形似也。俗呼千頭草。因枝繁而頭多也。藥性名益明。因其子功能明目也。子落則老莖可為帚。故日華子名落帚。圖經名獨帚。郭璞名王帚。弘景名掃帚。

子氣味苦寒無毒○主治膀胱熱利小便補中益氣久服耳目聰明輕身耐老○去皮膚中熱氣使人潤澤散惡瘡疝瘕強陰○治陰卵癩夫熱風可作湯沐浴與陽起石同服主丈夫陰痿不起補氣益力○治客熱丹腫

八月九月采實陰乾

壽域神方治脅下疼痛地膚子為末酒服方寸匕

苗葉氣味苦寒無毒主治搗汁服主赤白痢燒灰亦善煎水洗目去熱暗雀盲澁痛主大腸泄瀉和氣澁腸胃解惡瘡毒煎水日服治手足煩疼

地膚本經上品



按虞摶醫學正傳云摶兄年七十秋間患淋二十餘日後得一方取地膚草擣自然汁服之遂通　地膚君

靈芝 赤芝。一名丹芝。生霍山。黑芝。一名玄芝。生常山。青芝。一名龍芝。生泰山。白芝。一名玉芝。生華山。黃芝。一名金芝。生嵩山。紫芝。一名木芝。生高夏山。六芝俱主祥瑞。故曰靈芝。

赤芝如珊瑚味苦平主胷中結益心氣補中增慧智不忘久服輕身不老延年神仙



黑芝黑如澤漆味鹹平主癃利水道益腎氣通九竅聰察久食輕身不老延年神仙



青芝如翠羽味酸平主明目補肝氣安精魂仁恕久食輕身不老延年神仙



黃芝如紫金味甘平主心腹五邪益脾氣安神忠信和樂久食輕身不老延年神仙



白芝白如截肪味辛平主欬逆上氣益肺氣通利口鼻強志意勇悍安魄久食輕身不老



紫芝味甘溫主耳聾利關節保神益精氣堅筋骨好顏色久食輕身不老延年



六芝皆無毒六月八月采

按爾雅云菌芝釋曰瑞草名也一歲三華一名菌一名芝論衡云芝生於土土氣和故芝草生瑞命禮曰王者仁慈則芝草生是也

靈芝署蕷為之使得髮良得麻子仁白瓜子牡桂共益人惡常山畏扁青茵陳蒿

卷柏 始生常山山谷。今出近道。根紫色多鬚。形僅寸餘。莖葉青黃。彷彿柏葉。卷束如雞足。故名卷柏。吳普名豹足。象形也。別錄名萬歲。綱目名長生不死草。言其耐久也。

氣味辛平無毒

主治五臟邪氣女子陰中寒熱痛癥瘕血閉絕子久服輕身和顏色○止欬逆治脫肛散淋結頭中風眩痿躄強陰益精令人好容顏○通月經治尸疰鬼疰腹痛百邪鬼魅啼泣○鎮心除面皯頭風暖水臟生用破血炙用止血

卷柏本經上品修治以鹽水煮日曬焙用百一選方治遠年下血卷柏地榆焙等分每用一兩煎數沸通口服　卷柏君



五月五日采陰乾葉似柏而細色青黃水潤色青綠可愛

芎藭 香草也。四五月生葉。似水芹胡荽蛇床輩。作叢而莖細。其葉倍香。七八月開碎白花。葉堪作飲。古人因其根節狀如馬銜。謂之馬銜芎藭。後世因其狀如雀腦。謂之雀腦芎。出關中者為京芎。亦曰西芎。出蜀中者為川芎。出天台者為台芎。出撫郡者

為撫芎。皆因地而得名也。惟川為勝。故方中用芎。惟曰川芎。或曰。人頭穹窿窮高。天之象也。此藥上行。專治頭腦諸病。故有芎藭之名。

氣味辛溫無毒

主治中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人血閉無子○除腦中冷動面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脇風痛溫中內寒○腰脚軟弱半身不遂胞衣不下○一切風一切氣一切勞損一切血補五勞壯筋骨調衆脉破癥結宿血養新血吐血鼻血溺血腦癰發背瘰癧癭贅痔瘻瘡疥長肉排膿消瘀血○搜肝氣補肝血潤肝燥補風虛○燥濕止瀉痢行氣開鬱

蜜和丸芡實大夜服治風痰殊效

齒根出血含之多瘥

芎藭　本經上品


川雀腦者俗呼南芎
三四月采根日乾
西芎多蘆肉甚白氣甚辛烈○已上俱根形

凡用以川中大塊重實作雀腦皮色黃黑肉色白不油膩之微辛芎者佳他種不入藥止可為末煎湯沐浴而已九月采佳

修治以净水洗浸切片日乾用

芎藭氣厚味薄浮而升陽也少陽本經引經藥入手足厥陰氣分

白芷為之使畏黃連伏雌黃得細辛療金瘡止痛得牡蠣療頭風吐逆

靈苑方治婦人經水三箇月不行驗胎法川芎生為末空心濃煎艾湯下一匙腹中微動者是有胎

續十全方治胎氣因跌撲舉重促損不安及子死腹中以芎藭為末酒服方寸匕須臾一二服立出

芎藭臣

芎藭今人所服最多頭面風不可缺也然須以他藥佐之沈括云予一族子舊服芎藭醫鄭叔熊見之云芎藭不可久服多令人暴亡後族子果無疾而卒又朝士張子通之妻病腦風服芎藭甚久一旦暴亡皆目見者此皆單服久則走散真氣若使他藥佐使又不久服中病便已則烏能至此哉由此觀之芎藭久服為禍匪輕奈何鄉落愚民不知藥性時采芎藭苗蘼蕪煎茶自謂香美體氣壯健僥倖無虞儻涉虛羸鮮不蹈其禍者

藍實即今大葉藍子也。始生河內平澤。今處處有之。人家蔬圃中作畦蒔。至三月四月生苗高三二尺許。葉似水蓼。花紅白色。實亦若蓼子而大黑色。五月六月采實。其葉可以染青。染反勝于其質。故曰。青出于藍而青于藍者也。爾雅所謂葴馬藍是也。埤雅云。月令仲夏令民無刈藍以染。鄭玄言恐傷長養之氣也。然則刈藍先王有禁。故制字從監。

藍實氣味苦寒無毒

主治解諸毒殺蠱蚑疰鬼螫毒久服頭不白輕身

填骨髓明耳目利五臟調六腑通關節治經絡中結氣使人健少睡益心力○療毒腫

藍葉汁氣味苦甘寒無毒主治殺百藥毒解狠毒射罔毒汁塗五心煩悶療蜂螫毒

昔張薦員外在劍南為張延賞判官忽被斑蜘蛛咬項上一宿咬處有二道赤色細如箸繞項上從胷前下至心經兩宿頭面腫疼如數升盌大肚漸腫幾至不救張相素重薦因出家

藍　本經上品



財五百千并薦家財又數百千募能療者忽一人應召云可治張相初甚不信欲驗其方遂令目前合藥其人曰不惜方當療人性命耳遂取大藍汁一盌以蜘蛛投之藍汁良久方出浮汁中甚困不能動又别擣汁加麝香末取蜘蛛投之至汁而死又更取藍汁麝香復加雄黄和之更取蜘蛛投汁中隨化為水張相及諸人甚異之遂令點於咬處兩日內悉平愈咬處作小瘡痂落如舊凡蟲豸傷皆可點咬處或服其汁神異之極也　藍實君

青黛是波斯國藍靛花也○路遠難得○中國靛花○主治與青黛同功○亦可以此代之○故假為名○綱目云○黛眉色也○劉熙釋名曰○滅去眉毛○以此代之○故謂之黛○

氣味鹹寒無毒

主治解諸藥毒小兒諸熱驚癇發熱天行頭痛寒熱并水研服之亦磨傅熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等毒○解小兒疳熱殺蟲○小兒丹熱和水服之同雞子白大黄末傅瘡癰蛇虺螫毒○瀉肝散五臟鬱火解熱消食積○去熱煩吐血咯血斑瘡惡瘡

青黛本經（上品）



花紫碧體輕浮者佳



靛枯黑體重實者劣

市多取乾靛羅青充賣入藥宜擇嬌嫩體輕者以水飛淨灰脚日乾任用

按靛花雖非青黛然治小兒疳蝕下痢消瘦發熱屢有奇功古歌云小兒雜症變成疳不問強羸女與男腹內時時如下痢青黄赤白一般般眼澁面黄鼻孔赤穀道開張不欲看煩熱毛焦鼻口渴皮膚枯槁四肢癱唇裂嘔逆不乳哺壯熱增寒卧不安此方便是青黛散取效猶如服聖丹

談埜翁方治耳疳出汁青黛黄柏末乾搽愈又名綠袍散搽口瘡效　青黛君

蒺藜子生馮翊平澤○或道傍○布地蔓生○葉如初生皂莢葉○整齊可愛○子有刺○狀如菱而小○人過之○足不敢履○故本經一名屈人○一名止行○今軍家乃鑄鐵作之○以布敵路○名鐵蒺藜○易云○據于蒺藜○言其凶傷○詩云○墻有茨○不可掃也○以刺梗穢也○綱目云○蒺、疾也○藜、利也○茨、刺也○其刺傷人○甚疾而利也○故名蒺藜○爾雅名茨○又一種白蒺藜○今生同州沙苑牧馬草地最多○而近道亦有之○綠葉細蔓○綿布沙上○結莢長寸許○子大如黍○壯如羊腎而帶綠色○今人謂之沙苑蒺藜○

子氣味苦溫無毒

主治惡血破癥結積聚喉痺乳難久服長肌肉明目輕身○身體風痒頭痛欬逆傷肺肺痿止煩下氣小兒頭瘡癰腫陰㿗可作摩粉○治諸風癧瘍療吐膿去燥熱○治奔豚腎氣肺氣胷膈滿催生墮胎益精療水藏冷小便多止遺瀝泄精溺血腫痛○痔漏陰汗婦人發乳帶下

蒺藜子君　本經上品



蒺藜子有刺嫩青色老黄白色八月采實暴乾冬月亦采之

修治舂去刺酒拌炒用

蒺藜子烏頭為之使

神仙秘旨云服蒺藜子一碩當七八月熟時收日乾舂去刺然後杵為末每服二錢新汲水調下日三服勿令中絕斷穀長生服之一年已後冬不寒夏不熱服之二年老者復少髮白復黑齒落重生服之三年身輕長生

白蒺藜氣味甘溫無毒主治補腎治腰痛泄精虛損勞乏

白蒺藜即沙苑蒺藜



沙苑蒺藜一種形如羊腎綠色如黍粒大一種一頭大一頭小有鈎青黃色二者並堪主治又一種形頗類羊腎褐綠色粒小如粟而圓者劣

修治微炒入藥

黃耆葉似槐葉而微尖小。又似蒺藜葉而微濶大。青白色。開黃紫花。結小尖角長寸許。根長二三尺。生赤水鄉。名赤水耆。生白水鄉。名白水耆。生山西沁州綿上。名綿耆。一云折之如綿。故謂之綿黃耆。夫耆者。年高有德之稱。耆老歷年久而性不燥。此藥性緩如之。故得以耆稱。一云耆長也。黃耆色黃為補藥之長。故

名黃耆。俗作黃芪非矣。

氣味甘微溫無毒

主治癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘻補虛小兒百病○婦人子臟風邪氣逐五臟間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛泄痢益氣利陰氣○主虛喘腎衰耳聾療寒熱治發背內補○助氣壯筋骨長肉補血破癥癖瘰癧癭贅腸風血崩帶下赤白痢產前後一切病月候不勻痰嗽頭風熱毒赤目○治虛勞自汗補肺氣瀉肺火心火實皮毛益胃氣去肌熱及諸經之痛○主太陰瘧疾陽○為病苦寒熱督脈為病逆氣裏急

入藥佳　肉白心黃彷彿人參防風



黃耆本經上品

多岐劣　八月采根

凡用黃耆以長二三尺緊實如箭幹者為良多岐者劣一種木耆似黃耆體虛蘆頭大首蓿根體堅肉色黃折之皆脆不似箭幹黃耆肉白心黃折之綿軟

修治須去頭刮皮以蜜炙熟為度治癰生用亦可

黃耆氣薄味厚可升可降陰中陽也入手足太陰氣分又入少陽足少陰命門

茯苓為之使惡龜甲白鮮皮

衍義云防風黃耆世多相須而用唐許胤宗初仕陳為新蔡王外兵參軍時柳太后感風不能言脉沉而口噤胤宗曰既不能下藥宜湯氣熏之藥入腠理周時可瘥乃造防風黃耆湯數斛置於床下氣如煙霧其夕便得語藥力熏蒸其效如此因著之使善醫者知所取法焉

蒲黃生河東池澤。今處處有之。以秦州者為良。香蒲。蒲黃苗也。春初生嫩葉未出水時。紅白茸茸然。取其中心入地白蒻大如

匕柄者。生啖之。甘脆。以醋浸如食筍大美。周禮以為蒲菹。至夏抽梗於叢葉中。花抱梗端。如武士棒杵。故俚俗謂之蒲槌。亦曰蒲萼花。其蒲黃即此香蒲花中蕊屑也。

葉為席作扇軟滑而溫

蒲黃氣味甘平無毒

主治心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血久服輕身益氣力延年神仙○治痢血鼻衄吐血尿血瀉血利水道通經脉止女子崩中○婦人帶下月候不勻血氣心腹痛妊婦下血墮胎血運



蒲黃本經上品乃香蒲花上黃粉也

四月采

血癥兒枕氣痛顛撲
血悶排膿瘡癤遊風
腫毒下乳汁止洩精

南人以蒲黃苗為香蒲以菖蒲為臭蒲也
今人謂蒲槌為蒲棒

世多以薑黃末攙麥麪丸之每稱為羅過蒲黃其色嫩黃可愛其麪細如黃粉用是治病安得獲效人當擇色淡黃有蕊屑者入藥方真

修治蒲黃方破血消腫者生用之補血止血者須炒用

蒲黃手足厥陰血分藥也

按許叔微本事方云有士人妻舌忽脹滿口不能出聲一老叟教以蒲黃頻摻比曉乃愈又芝隱方云宋度宗欲賞花一夜忽舌腫滿口蔡御醫用蒲黃乾薑末等分乾搽而愈據此二說則蒲黃之凉血活血可證矣

續斷始生常山山谷。今陝西河中興元府舒越晉州亦有之。三月已後生苗。葉似苧而莖方。兩葉對。花紅白色。根如大薊。一株

有五六枝。一種葉似旁翁菜而小厚。兩邊有刺刺人。其花紫色與今越州生者相類。而市之貨者。亦有數種。少能辨其麄良。醫人用之。但以節節斷皮黃皺者為真。功能續筋骨之斷折。故名續斷。本經名屬折。別錄名接骨。

氣味苦微溫無毒

主治傷寒補不足金瘡癰傷折跌續筋骨婦人乳難久服益氣力○婦人崩中血金瘡血內漏止痛生肌肉及踠傷惡血腰痛關節緩急○去諸溫毒通宣血脉○助氣補五勞七傷破癥結瘀血消腫毒腸風痔瘻乳癰瘰癧婦人產前後一切病胎漏子宮冷面黃虛腫縮小便止泄精尿血

續斷本經上品

本經云狀如雞脚節節斷皮黃皺者真也

續斷市之貨者形類山玄參色皂而瘦折之有煙塵起者為良

狀如雞脚赤黃色節節斷皮多皺者極少難得

川續斷皮微白肉微皂一根二三枝及五六枝今入藥惟用川

修治續斷以酒浸一伏時焙乾用

地黃為之使惡雷丸


八月采根陰乾

昔宋張叔潛秘書知劍州時其閣下病血痢一醫用平胃散一兩入川續斷末二錢半每服二錢水煎服即愈紹興壬子會稽時行痢疾叔潛之子以方傳人往往有驗小兒痢疾服之

皆效

續斷　君

漏蘆生喬山山谷。今京東州郡及秦海州皆有之。舊說莖葉似白蒿。花黃白。莢莖若筋大。房類油麻而小。故蘇恭名莢蒿。日華子名鬼油麻。今諸郡所圖上。惟單州者差相類。沂州者花葉頗似牡丹。秦州者花似單葉寒菊。紫色。五七枝同一簳。海州者花紫碧如單葉蓮花。花蕚下及根旁有白茸裹之。根黑色。如蔓菁而細。又類葱本。淮甸人呼為老翁花。三州所生雖別。而葉頗相類。但秦海州者。葉更作鋸齒狀耳。一物而殊類若此。醫家何所

適從。當依舊說以單州出者為勝。六月七月采莖苗日乾。八月采根陰乾。古人多用苗。今人多用根。蘆黑色也。此草秋後皆黑。異於衆草。然髙兩雖有。而川澤漏下之地最多。故名漏蘆。

氣味鹹寒無毒

主治皮膚熱毒惡瘡疽痔溼痺下乳汁久服輕身益氣耳目聰明不老延年○止遺溺熱氣瘡痒如麻豆可作浴湯○通小腸泄精尿血腸風風赤眼小兒壯熱撲損續筋骨乳癰瘰癧金瘡止血排膿補血長肉通經脉

漏蘆
本經
上品


根形
皮黑如玄參肉白
近蘆頭有白茸

前言根傍有白茸裹之根黑色如蔓菁而細者即此也今市

通當之醫通用之乎然見使苗者故盡根以示人

按飛廉根如牛蒡而綿頭古方漏蘆散下云用有白茸者則是有白茸者乃飛廉無疑矣今考二物氣味功用俱不相遠似可通用或者一類有數種古今名稱各處不同乎

修治漏蘆細剉拌生甘草對蒸熟揀去甘草晒乾任用

漏蘆足陽明本經藥也連翹為之使

外臺秘要治蚘蟲漏蘆為末以餅臛和方寸七服之

漏蘆君

防風始生沙苑川澤及邯鄲琅琊上蔡。今京東淮浙皆有之。莖葉俱青綠色。莖深而葉淡。似青蒿而短小。五月開細白花。中心攢聚作大房。似茴香花。其氣如芸蒿。故本經一名銅芸。別録名茴草。吳普名茴芸。實似胡荽子而大。根土黃色。與蜀葵根相類。防禦也。此藥身去身半已上風邪。稍去身半已下風邪。逕禦諸風要藥。因名防風。又一名屏風。

氣味甘辛溫無毒

主治大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痛久服輕身○煩滿脇痛風頭面去來四肢攣急字乳金瘡內痙○治三十六般風男子一切勞劣補中益神風赤眼止冷淚及癱瘓通利五臟關脉五勞七傷羸損盜汗心煩体重能安神定志匀氣脉○治上焦風邪瀉肺實散頭目中滯氣經絡中留溼主上部見血○搜肝氣

防風
本經
上品

皮淡黃色肉有心色深堅實溫潤

今出齊州龍山最善淄州兗州青州者亦佳俗呼東防風關中出者輕虛不及齊州者良

石防風生于山石之間根如蒿根而黃粗醜多岐亦療頭風眩痛



今江淮河中諸山有之俗呼山防風

修治防風選東道肥潤者去蘆細剉任用

防風氣味俱薄浮而升陽也手足太陽經之本藥又行足陽明太陰二經為肝經氣分藥

防風能制黃耆黃耆得防風其功愈大乃相畏而相使者也

得葱白能行周身得澤瀉藁本療風得當歸芍藥陽起石禹餘粮療婦人子臟風畏萆薢殺附子毒惡藜蘆白歛乾薑芫花

經驗後方治破傷風防風天南星等分為末每服二三匙童子小便五升煎至四升二服即止

防風臣

決明子始生龍門川澤。今處處有之。夏初生苗。高三四尺許。根

帶紫色葉似苜蓿而大七月開花黃白色其子作穗如青菉豆而銳十月十日采子陰乾功主明目故名决明子。

氣味鹹平無毒　別錄曰苦甘微寒

主治青盲目淫膚赤白膜眼赤痛淚出久服益精光輕身○療唇口青○助肝氣益精以水調末塗腫毒熁太陽穴治頭痛又貼胷心止鼻洪作枕治頭風明目○治肝熱風眼赤淚每旦取一匙挼淨空心吞之百日後夜見物光益腎解蛇毒

决明子本經上品



修治决明子挼淨土塵杵碎入藥　蓍實為之使惡大麻子

外臺秘要治積年失明不識人决明子二升杵為末每食後以粥飲服方寸匕

决明子臣

丹參始生桐柏山谷及泰山今陝西河東州郡及隨州皆有之二月生苗高一尺許莖幹方稜青色葉相對如薄荷而有毛三月開花紅紫色似蘇花根大如指長尺餘一苗數根赤色故名丹參并人參沙參玄參牡蒙是為五參五參五色配五臟故人參入脾曰黃參沙參入肺曰白參玄參入腎曰黑參牡蒙入肝曰紫參丹參入心曰赤參蕭炳云酒浸服之治風軟脚可逐奔馬故名奔馬草

氣味苦微寒無毒

主治心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣○養血去心腹痛疾結氣腰脊強脚痺除風邪留熱久服利人○漬酒飲療風痺足軟○主中惡及百邪鬼魅腹痛氣作聲音鳴吼能定精○養神定志通利關脉治冷熱勞骨節疼痛四肢不遂頭痛赤眼熱溫狂悶破宿血生新血安生胎落死胎止血崩帶下調婦人經脉不勻血邪心煩惡瘡疥癬癭贅腫毒丹毒排膿止痛生肌長肉

丹參
本經
上品



丹參一莖數十枝皮赤而肉白九月十月采根陰乾

修治丹參去土淨用酒洗細剉日乾任用

丹參味苦氣平而降陰中之陽也入手少陰厥陰之經心與包絡血分藥也畏鹹水反藜蘆　弘景曰性熱久服多眼赤

聖惠方治寒疝小腹及陰中相引痛白汗出欲死以丹參一兩杵為散每服熱酒調下二錢佳

丹參臣

茜草一作蒨始生喬山山谷今近處有之染緋草也葉似棗葉頭尖下闊三五對生節間其苗蔓延草木上根紫色陶隱居本草言東方有而少不如西方多則西草為茜以此也詩云茹藘在坂者是已陸璣云齊人謂之茜徐人謂之牛蔓又草之盛者為蒨牽引為茹連覆為藘則蒨茹藘之名又取此義也

氣味苦寒無毒

主治寒濕風痺黃疸補中○止血內崩下血膀胱不足踒跌蠱毒久服益精氣輕身可以染絳○治六極傷心肺吐血瀉血○止鼻洪尿血產後血運月經不止帶下撲損瘀血泄精痔

癰瘍癧排膿酒煎服

茜草（本經上品）



修治（茜草去土用銅刀細剉炒用勿犯鉛鐵）

元素曰（微酸鹹溫陰中之陰手足厥陰血分之藥也畏鼠姑制雄黄）

俗方（用治女子經水不通以一兩煎酒服之一日即通甚效）

菟絲子　始生朝鮮川澤。今近道皆有之。以寃句者為勝。夏生苗。初如細絲。遍地不能自起。得他草梗則纏繞而生。其根漸絕于地而寄空中。或云無根假氣而生。信然。六七月結實極細如蠶子。土黄色。九月采實暴乾。其實有二種。色黄而細者名赤網。色淺而大者名菟虆。其功用並同。苗如絲綜。初生之根。其形似兎。握則菟絲之名因此也。

氣味辛甘平無毒

主治（續絕傷補不足益氣力肥健久服明目輕身延年○養肌強陰堅筋骨主莖中寒精自出溺有餘瀝口苦燥渴寒血為積○治男女虛冷添精益髓去腰疼膝冷消渴熱中久服去面䵟悅顏色○補五勞七傷治鬼交泄精尿血潤心肺○補肝臟風虛）

菟絲子本經上品

子大如粟褐色

修治（菟絲子以溫水淘去沙泥酒浸一宿杵爛日乾入藥或酒煑杵爛亦得）

（菟絲子得酒良薯蕷松脂為之使惡雚菌）

附後方（治面上粉刺擣菟絲子絞取汁塗之瘥）

茺蔚　始生海濱池澤。今處處有之。園圃及田野見者極多。春初生苗如嫩蒿。至夏高三四尺。莖方如黄麻。故俗呼野天麻。對節生枝。一枝三葉。節節生穗。叢簇抱莖。五六月間穗內開小花。紅紫色。亦有微白色者。每蕚內有細子數粒。大如同蒿子。有三稜。蒼黑色。此草及子皆充盛密蔚。故名茺蔚。其功宜於婦人。故本經有益母之稱。俗呼益母草。

子氣味辛甘微溫無毒

主治（明目益精除水氣久服輕身○療血逆大熱頭痛心煩○產後血脹○春仁生食補中益氣通血脈填精髓止渴潤肺）

修治（茺蔚子微炒香日暴燥春簸去殼取仁用）

（茺蔚子陰中之陽手足厥陰經藥也白花者入氣分紫花者入血分治婦女經脉不調崩中帶下胎前產後一切血氣諸病妙品也）

茺蔚（本經上品）



茺蔚根味甘花味微苦甘莖葉味辛微苦並無毒

主治（癮疹可作浴湯○擣汁服主浮腫下水消惡毒丁腫乳癰丹遊等毒并傅之又服汁主子死腹中及產後血脹悶滴汁）

入耳中主聤耳擣傳蚰蜒毒○入面藥令人光澤治粉刺

濟陰返魂丹一名益母丸治婦人胎前產後諸疾危證其效神妙活人甚多用益母草葉似艾葉莖類脂麻方梗凹面對節生枝五六月節節開紅紫花者端午小暑或六月六日花正開時連根收采陰乾用葉及花子忌鐵器以石器擣為細末煉蜜丸如彈子大嚼服或丸如梧桐子大每服五七十丸其藥不限丸數以病愈為度飲具于後

一胎前臍腹痛或作聲者米飲下

一胎前產後臍腹刺痛胎動不安下血不止當歸湯下

一產後以童子小便化下一丸能安魂定魄血氣自然調順諸病不生又能破血痛養脉息調經絡並溫酒下

一胎衣不下及橫生死胎不下經日脹滿心悶心痛並用炒鹽湯下

一產後血運眼黑血熱口渴煩悶如見鬼神狂言不省人事以童子小便和酒化下

一產後結成血塊臍腹奔痛時發寒熱有冷汗或面垢顏赤五心煩熱並用童子小便酒下或薄荷湯下

一產後惡露不盡結滯刺痛上衝心胷滿悶童子小便酒下

一產後瀉血水棗湯下

一產後痢疾米湯下

一產後血崩漏下糯米湯下

一產後赤白帶下艾湯下

一月水不調溫酒下

一產後中風牙關緊急半身不遂失音不語童便酒下

一產後氣喘咳嗽胷膈不利惡心吐酸水面目浮腫兩脇疼痛舉動失力溫酒下

一產後咳嗽自汗發熱久則變為骨蒸童便酒下

一產後鼻衄舌黑口乾童便酒下

一產後兩太陽穴痛呵欠心忪氣短羸瘦不思飲食血風身熱手足頑麻百節疼痛秦艽湯下

一產後太小便不通煩燥口苦者薄荷湯下

一婦人久無子息溫酒下

茺蔚制硫黄雌黄砒石

人參生上黨山谷及遼東其根形狀如防風而潤實春生苗多于深山中背陰近椵漆下濕潤處初生小者三四寸許一椏五葉四五年後生兩椏五葉未有花莖至十年後生三椏年深者生四椏各五葉中心生一莖俗名百尺杵三月四月有花細小如粟蕋如絲紫白色秋後結子或七八枚如大豆生青熟紅自落根如人形者神乃年深浸漸長成者故說文曰人薓薓字從浸亦浸漸之義薓即浸字後世因字文繁遂以參之字代之從簡便爾然承誤日久亦不能變矣惟仲景傷寒論尚作薓字其成有階級故本經名人銜其草背陽向陰故本經名鬼蓋其在

五參色黃屬土而補脾胃生陰血故吳普名黃參別錄名血參得地之精靈故別錄名土精廣雅名地精廣五行記云隋文帝時上黨有人宅後每夜聞人呼聲求之不得去宅一里許見人參枝葉異常掘之入地五尺得人薓一如人體四肢畢備呼聲遂絕觀此則土精地精之名尤可證也醫學入門解參字曰參叅也久服補元氣有叅贊之功故名參

氣味甘微寒無毒

主治補五臟安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智久服輕身延年○療腸胃中冷心腹鼓痛胷脅逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脉補堅積令人不忘○主五勞七傷虛損

痰弱止嘔噦補五臟六腑保中守神消胸中痰治肺痿及癇疾冷氣逆上傷寒不下食凡虛而多夢紛紜者加之○止煩躁變酸水○消食開胃調中治氣殺金石藥毒○治肺胃陽氣不足肺氣虛促短氣少氣補中緩中瀉心肺脾胃中火邪止渴生津液○治男婦一切虛證發熱自汗眩運頭痛反胃吐食痎瘧滑瀉久痢小便頻數淋瀝中風中暑痿痺吐血嗽血下血血淋血崩胎前產後諸病

范蠡曰狀類人者善珣曰出新羅國所貢有手脚狀如人形

人參本經上品



神力全價勝金

或曰生邯鄲者根有頭足手面目如人或曰生上黨者人形皆具本經云如人形者有神

遼東上黨者形狀如東防風而潤實布金井玉闌色黃有鬚稍纖長嚼之甘苦此品最佳

高麗國作人參讚曰三椏五葉背陽向陰欲來求我椵樹相尋椵樹似桐甚大陰廣故人參多生于下　三月九月采根



生人參形類蔓菁桔梗故世以桔梗造參欺人形像亦相似亦有金井玉闌但皮無橫紋味亦淡薄不同耳

市人參者皆繩縛扦上蒸過故參有繩痕買者若不識真偽惟要透明似肉近蘆有橫紋者則假參自不得紊之凡用宜擇秋參勿用春參本草蒙筌曰春參輕匏因汁升萌芽抽梗秋參重實得汁降結暈成膠

人參形



此參廼蒸造成者形塊大小不等

堅實明亮為上

上黨參色黃堅實有肉色高麗參色雖黃輕虛內多有白色者紫團參紫大稍扁百濟參白堅且圓名白條參新羅參亞黃味薄清河參塊小色白堅實明亮諸參並堪主治獨上黨黃參功効易鬆至于竹節參條參蘆參參鬚不堪入藥

唐本註云欲試上黨人參者當使二人同走一與人參含之一不含度走三五里許其不含者必大喘含者氣息自如其參乃真也

修治人參易蛀惟用盛過麻油瓦罐洗净焙乾入華陰細辛與參相間收之密封可留經年人參生時背陽故見風日易蛀凡生用宜㕮咀熟用宜隔紙焙之並忌鐵器

人參性溫味甘微苦氣味俱薄浮而升陽也陽中微陰入手太陰

人參茯苓馬藺為之使惡溲疏鹵鹹反藜蘆畏五靈脂惡皂莢黑豆動紫石英

聖惠方治產後發喘乃血入肺竅危症也人參末一兩蘇木二兩水二盌煑汁一盌調參末服神效

人參君

始生雍州川澤及田野今處處有之以南陽菊潭者為佳初春布地生細苗夏茂秋花冬實然菊之種類頗多有紫莖而氣香葉厚至柔嫩可食者其花微小味甚甘此為真故古方云甘菊花即此也其莖青而大葉細氣烈似蒿艾花小味苦者名苦薏非真也南陽菊亦有兩種白菊葉大如艾葉莖青根細花白蕋黃其黃菊葉似同蒿花蕋都黃今服餌家多用白者又有一種開小黃花花瓣下如小珠子謂之珠子菊云入藥亦佳按陸佃埤雅云菊本作蘜從鞠鞠窮也今之秋華鞠也鞠艸有華

至此而窮焉。故謂之蘜。子曰。菊、鞠也。必鞠養而後得稱。佳菊。故名菊。月令九月菊有黄華、是也。因應節候。故本經名節華。

菊花氣味甘微苦平無毒

主治諸風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風濕痺久服利血氣輕身耐老延年○療腰痛去來陶陶除胸中煩熱安腸胃利五脈調四肢○治頭目風熱風旋倒地腦骨疼痛身上一切游風令消散利血脈並無所忌○作枕明目葉亦明目生熟並可食養目血去翳膜○主肝氣不足



甘菊花本經上品色黄而味甘

野菊花名苦薏花小于甘菊而味苦



苦者勿用

白菊氣味苦辛平無毒

主治風眩能令頭不白○染髭髮令黑和巨勝茯苓蜜丸服之去風眩變白不老益顏色

菊花本經云正月采根三月采葉五月采莖九月采花十一月采實今人惟用花故予惟畫花形



菊花寒可升可降陰中微陽也朮及枸杞根桑根白皮為之使

救急方治病後生翳白菊花蟬蛻等分為散每用二三錢入蜜少許水煎服大人小兒皆宜屢驗

菊花使　催花法以馬糞浸水澆之則速開花凡花皆然

菖蒲

始生上洛池澤及蜀郡嚴道。今處處有之。而池州戎州者良。春生青葉長一二尺許。其葉中心有脊。狀如劍。故一名水劍草。爾雅云。其花九節者食之仙。其根盤屈有節。一根旁引三四根。傍根節尤密。入藥以緊小似魚鱗者為佳。此乃蒲類中之昌盛者。故曰菖蒲。

氣味辛温無毒

主治風寒濕痺欬逆上氣開心孔補五臟通九竅明耳目出聲音主耳聾癰瘡温腸胃止小便利久服輕身不忘不迷惑延年益心智高志不老○四肢濕痺不得屈伸小兒温瘧身積熱不解可作浴湯○治耳鳴頭風淚下鬼氣殺諸蟲惡瘡疥瘙○除風下氣丈夫水臟女人血海冷敗多忘除煩悶止心腹痛霍亂轉筋及耳痛者作末炒乘熱裹署甚驗心積伏梁治中惡卒死客忤癲癇下血崩中安胎漏散癰腫擣汁服解巴豆大戟毒

菖蒲十二月采根陰乾露根不可用

菖蒲本經上品



五月五日浸酒服佳



一名菖陽肉虛

多節者良不必泥于九節

生石澗中根小節密名石菖蒲入藥方靈種池塘內根大節疏名水菖蒲作餞堪用。

修治菖蒲以銅刀刮去黄黑硬節皮一重以嫩桑枝條相拌蒸熟暴乾剉用若急用但去毛微炒耳勿犯鐵器

菖蒲秦皮秦艽為之使惡地膽麻黄

漢武帝上嵩上忽見仙人長可二丈問之曰吾九嶷山人也聞中嶽有石上菖蒲一寸九節食之長生故來採之忽然不見

抱朴子云韓衆服菖蒲十三年身上生毛日記萬言冬袒不寒

衍義云有人患遍身生熱毒痛而不痒手足尤甚然至頸而止粘着衣被曉夕不得睡痛不可任有人教以菖蒲三斗日乾

爲末布席上令臥之仍以衣被覆之既不粘着衣被又復得睡不五七日其瘡如失後以此治人應手神驗

除狗蚤方五月五日採石菖蒲晒乾為末置于席下蚤自來無

菖蒲君

天門冬始生奉高山谷。今處處有之。春生藤蔓大如釵股。高至丈餘。葉如茴香極尖細而踈滑。有逆刺。亦有澁而無刺者。其葉如絲杉而細散。夏開白花。亦有黃花者。秋結黑子。在其根枝傍。入伏後無花暗結子。其根白或黃紫色。大如手指長二三寸。一二十枚同一撮。爾雅謂之蘠蘼。一名虋冬。山海經云條谷之山。其草多芍藥虋冬是也。一名滿冬。或名地門冬。或名莚門冬。在東嶽名淫羊藿。在中嶽名天門冬。在西嶽名管松。在北嶽名無不愈。在南嶽名百部。在京陸山阜名顛勒。在越人名浣草。抱朴子云。一名顛棘。或云天棘。顛天音相近也。蓋草之茂者爲虋。俗作門。此草蔓茂而功同麥門冬。故曰天門冬。

氣味苦平無毒

主治諸暴風濕偏痺強骨髓殺三蟲去伏尸久服輕身益氣延年不飢〇保定肺氣去寒熱養肌膚利小便冷而能補〇肺氣欬逆喘息促急肺痿生癰吐膿除熱通腎氣止消渴去熱中風治濕疥宜久服煑食之令人肌體滑澤白淨除身上一切惡氣不潔之疾〇鎮心潤五臟補五勞七傷吐血治嗽消痰去風熱煩悶〇主心病嗌乾心痛渴而欲飲痿蹷嗜臥足下熱而痛〇潤燥滋陰清金降火〇陽事不起宜常服之

天門冬本經上品

此係蒸剝去皮者

二八月采根



修治天門冬肥大明亮者佳去心但以溫水漬漉使周潤滲入肌候軟緩緩擘取不可浸出脂液不知者乃以湯浸多時柔則柔矣然氣味都盡用之不效麥冬亦然若入丸藥雖暴乾猶脂潤難擣必須薄切暴於日中或火焙之用

別錄曰天門冬甘大寒氣薄味厚陽中之陰入手太陰足少陰經氣分之藥

天門冬垣衣地黃貝母爲之使畏曾青制雄黃硇砂服天門冬禁食鯉魚

列仙傳赤須子食天門冬齒落更生細髮復出〇神仙傳甘始者太原人服天門冬在人間三百餘年〇抱朴子云杜紫微服天門冬御八十妾有男一百四十歲

天門冬君

獨活生雍州川谷或隴西南安。今出蜀漢者佳。春生苗葉。夏開小黃花作叢。一莖直上。不爲風搖。故曰獨活。其根黃白虗大。氣香如蜜。亦有作槐葉氣者。此草得風不搖。無風自動。故別錄名獨搖草。

氣味苦甘平微溫無毒

主治療諸賊風百節痛諸風濕冷皮肌苦痒手足攣痛〇主風寒所擊金瘡止痛奔豚癇痓女子疝瘕勞損風毒齒痛

獨活本經上品



色黃白亦有淡黑色氣香



二月八月采根

獨活類羌前胡尋常皆以老宿前胡為獨活非矣近時江淮中出一種土當歸長近尺許肉白皮黃氣極織惡山人每呼香白芷又謂之水白芷用充獨活解散亦或用之不可不辨

修治（獨活去皮細剉焙用）

獨活微溫甘苦辛氣味俱薄陽也足少陰行經氣分之藥

蠡實為之使

千金方治中風口噤通身冷不知人獨活四兩好酒一升煎半升服　獨活君

羌活亦生雍州川谷及隴西南安益州北郡。此州縣並是羌地。故此草以羌名。其苗葉如青麻。故本經名羌青。六月開花或黃或紫亦作叢。結實時葉黃者是夾石上所生。葉青者是土脉中所生。其根紫色節密。氣味芳烈。而療風之功同獨活。故以活名。以羌中来者爲良。故本經名護羌使者。按文系曰。唐劉師貞之兄病風。夢神人曰。但取胡王使者浸酒服便愈。師貞訪問皆不曉。復夢其母曰。胡王使者。即羌活也。求而用之。兄疾遂愈。故吳普本草名胡王使者。

氣味苦辛無毒

主治賊風失音不語多痒血癩手足不遂口面喎斜遍身㿺痺

治一切風赤目疼痛○去腎間風邪搜肝風瀉肝氣治項強腰脊痛○散癰疽敗血

羌活
本經
上品



南羌活節少



西羌活節密　二八月采根

南西羌活色並蒼紫氣味芳烈咸堪治療今人多用鞭節

修治（羌活以溫水潤透切片任用）

羌活性溫辛苦氣味俱薄浮而升陽也足太陽行經風藥並入足厥陰少陰經氣分

夏子益奇疾方治人睛忽垂至鼻如黑角塞痛不可忍或時時大便血出痛名曰肝脹用羌活煎汁服數盞自愈　羌活君

升麻始生益州川谷。今蜀漢陝西淮南州郡皆有之。以蜀川者爲勝。春生苗高三尺以来。葉莖俱青色。四月五月著花似粟穗白色。六月以後結實黑色。根如蒿根紫黑色多鬚。其葉似麻。其性上升。故名升麻。

氣味甘苦平微寒無毒

主治解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆

吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕身長年○安魂定魄鬼附啼泣疳䘌遊風腫毒小兒驚癇熱壅不通療癰腫豌豆瘡水煎綿沾拭瘡上○治陽明頭痛補脾胃去皮膚風邪解肌肉間風熱療肺痿欬唾膿血能發浮汗○牙根浮爛惡臭太陽鼽衄為瘡家聖藥消斑疹行瘀血治陽陷眩運胸脇虛痛久泄下痢後重遺濁帶下崩中血淋下血陰痿足寒

升麻
本經
上品



皮黑
多鬚



二八月采根

升麻形小而黑極堅實削去皮青綠色者謂之雞骨升麻最佳形虛大肉黃白者次之肉黑者下

修治（升麻去鬚及蘆頭剉用）

升麻性溫味辛微苦氣味俱薄浮而升陽也為足陽明太陰引經藥得葱白白芷亦入手陽明太陰（引葱白散手陽明風邪引石膏止陽明齒痛人參黃耆非此引之不能上行同葛根能發陽明之汗同柴胡引生發之氣上行）

姚、和衆至寶方治小兒尿血蜀升麻五分水五合煎取一合去滓一歲兒一日一服

木香

始生永昌山谷○今惟廣州舶上有來者○葉似羊蹄而長大●花如菊○實黃黑○亦有葉如山芋而開紫花者○不拘時采根入藥○以形如枯骨者良○因其氣香如蜜○故別錄名蜜香○緣沉香中有蜜香○遂訛此為木香○爾古人謂之青木香○後人因呼馬兜鈴根為青木香○乃呼此為南木香廣木香以別之○其一株五根一莖五枝一枝五葉○葉間五節○故圖經名五木香○

氣味辛溫無毒

主治邪氣辟毒疫瘟鬼強志主淋露久服不夢寤魘寐○消毒殺鬼精物溫瘧蠱毒氣劣氣不足肌中偏寒引藥之精○治心腹一切氣膀胱冷痛嘔逆反胃霍亂泄瀉痢疾建脾消食安胎○九種心痛積年冷氣痃癖癥塊脹痛壅氣上衝~~煩~~悶羸劣女人血氣刺心痛不可忍末酒服之○散滯氣調諸氣和胃氣泄肺氣○行肝經氣煨熟實大腸○治衝脈為病逆氣裏急主脬滲小便秘

木香
本經上品



廣木香形如枯骨者佳肉色青者優黃白者次之色黑油者下

修治木香凡入理氣藥只生用不見火若實大腸宜麪煨熟用

氣熱味辛苦氣味俱厚沉而降陰也一云味厚於氣陰中陽也乃三焦氣分之藥

孫兆秘寶方治丈夫婦人小兒痢木香一塊方圓一寸黃連半兩二味用水半升同煎乾去黃連只薄切木香焙乾為末三服第一橘皮湯第二陳米飲第三甘草湯下此乃李景純傳所傳有一婦人久患痢將死夢中觀音授此方服之遂愈

蛇牀

始生臨淄川谷及田野○今處處有之○三月生苗○高二三尺○葉青碎作叢○每枝上有花頭百餘○結同一窠○子類小茴香而小○茴褐色○至輕虛○蛇喜食其子○故本經一名蛇粟○一名蛇米○蛇常棲息此草下○故名蛇牀○

子氣味苦平無毒

主治男子陰痿濕癢婦人陰中腫痛除痹氣利關節癲癇惡瘡久服輕身好顏色○溫中下氣令婦人子臟熱男子陰強久服令人有子○治男子女人虛濕痹毒風㾓痛去男子腰痛浴男子陰去風冷大益陽事○暖丈夫陽氣女人陰氣治腰胯酸疼四肢頑痹縮小便去陰汗濕癬齒痛赤白帶下小兒驚癇撲損瘀血煎湯浴大風身癢

蛇牀子本經上品



修治蛇牀子微炒用作湯沐浴生用○五月采子陰乾體輕虛

蛇牀子辛苦乃右腎命門少陽三焦氣分之藥

惡牡丹貝母巴豆伏硫黃

千金方治陽事不起蛇牀子五味子兔絲子等分為末煉蜜為丸梧子大每服三十丸溫酒下日三服

蛇牀子君

王不留行

始生泰山山谷○今處處有之○苗葉俱青○高一二尺許○

葉如小匙頭四月開花紅白色俗謂之翦金花結實如燈籠草子殼有五稜殼內包一實大如豆實內子大如菘子生白熟黑正圓此物性走而不住雖有王命不能留其行也故名王不留行

苗子氣味苦平無毒

主治金瘡止血逐痛出刺除風痺內塞止心煩鼻衄癰疽惡瘡瘻乳婦人難產久服輕身耐老增壽○治風毒通血脈○遊風風疹婦人血經不勻發背○下乳汁○利小便出竹木刺

元素曰甘苦平陽中之陰時珍曰能走血分乃陽明衝任之藥下乳引導用之取其利血脈也

頌曰張仲景治金瘡有王不留行散貞元廣利方治諸風痙有王不留行湯最效

王不留行本經上品



五月收采

子大如黍而圓色黑

修治雷公云凡採得拌濕蒸從巳至未出却下漿水浸一宿焙乾用

指南方治鼻衄不止王不留行連莖葉陰乾濃煎汁温服立效

湧泉湯治婦人乳汁不通王不留行三錢川山甲炒二錢當歸身天花粉各一錢五分木通一錢炙甘草一錢共擣爲細末用煮猪蹄湯一鍾調服乳立通

本草原始卷之一

本草原始卷之二

草部中

葈耳（即蒼耳）　葛根（葛花葛粉）　栝樓（子根）　苦參
麻黃　通草（即木通）　芍藥（白赤二種）　瞿麥　玄參
秦艽　百合　知母　貝母　白芷
淫羊藿　黃芩　狗脊　茅根　紫菀
紫草　前胡　白鮮　紫參　藁本
石韋　萆薢　白微　香薷　艾
惡實（即牛旁子）　地榆　大薊（小薊）　海藻　昆布
海帶　水萍（即浮萍）　澤蘭　防己　天麻
高良薑　紅豆蔻　百部　款冬花　紅藍花
牡丹　三稜　薑黃　蓽撥　鬱金
玄胡索　草豆蔻　肉豆蔻　補骨脂（即破故紙）　縮砂蔤（即砂仁）
蓬莪茂　白前　白藥　葒草　莎草根（即香附子）
蓽澄茄　胡椒　胡黃連　鱧腸（即旱蓮草）　使君子
白豆蔻

草部中六十六種附名者二種

本草原始卷之二

雍丘正宇李中立纂輯並書畫

草部中

葈耳　始生安陸川谷及六安田野。今處處有之。謹按詩人謂之卷耳。爾雅謂之蒼耳。幽州人呼爲爵耳。皆以實得名也。其葉形如葈麻。故本經名葈耳。又如茄。故本草綱目名野茄。又如粘糊菜。可煮爲茹。故弘景謂之常思菜。記事珠謂之進賢菜。陸機詩疏云。其實正如婦人耳璫。今或謂之耳璫草。博物志云。洛中有人驅羊入蜀。胡葈子多刺。粘綴羊毛。遂至中國。故一名羊負來。俗呼爲道人頭。

葈耳甘温有小毒

主治風頭寒痛風濕周痺四肢拘攣痛惡肉死肌膝痛久服益氣耳目聰明強志輕身○治肝熱明目○治一切風氣填髓暖腰脚治瘰癧疥瘡及瘙癢○炒香浸酒服去風補益



葈耳即蒼耳　色蒼黑有刺

本經中品

七八月收采

又名葹名地葵名猪耳名喝起草名縑絲草

修治葈耳炒熟搗去刺用或酒拌蒸過用

別錄曰苦　權曰甘無毒　恭曰忌猪肉馬肉米泔害人

食醫心鏡除一切風濕痺四肢拘攣蒼耳子三兩搗末以水一升半煎取七合去滓呷

葛根　始生汶山川谷。今處處有之。春生苗。引藤蔓長一二丈紫色。葉頗似楸葉而小。青色。其花成穗。纍纍相綴。紅紫色。其莢如小黃豆莢。亦有毛。其子綠色。扁扁如塩梅子核。本經所謂葛穀是也。根形大如手臂。外紫內白。鹿食九草。此其一種。故別錄名鹿藿。爾雅翼云。葛。絺綌草也。俗呼乾葛。

葛根氣味甘平無毒

主治消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒○療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止脇風痛○治天行上氣嘔逆開胃下食解酒毒○治胷膈煩熱狂止血痢通小腸排膿破血傅蛇蟲咬署箭傷○殺野葛巴豆百藥毒○生者墮胎蒸食消酒毒可斷穀不飢作粉循妙○作粉止渴利大小便解酒去煩熱壓丹石傅小兒熱瘡搗汁飲治小兒熱痞猘狗傷搗汁飲并末傅之○散鬱火

葛根　本經　中品



皮紫　肉白

一名雞齊　一名黃斤

葛根五月五日午時采取破之暴乾以入土深者為佳今市賣者多劈截成片用者以片寬二三指色白多麵者為良條細色黃白少脂者乃白葛也不宜入藥

其根入土五六寸已上者名葛脰脰者頸也服之令人吐以有微毒也

別錄曰生根汁大寒　好古曰氣平味甘升也陽也陽明經行經之藥

傷寒類要治天行時氣初覺頭痛內熱脉洪者葛根四两水二升入豉一升煮取半升服生薑汁尤佳

葛花似豌豆花紅紫色可作茹



花消酒治腸風下血

弘景曰葛花并小豆花乾末服方寸匕飲酒不知醉

乾葛臣

栝樓始生洪農山谷及山陰地。今所在有之。三四月生苗引藤。葉如甜瓜而窄。作叉有細毛。七月開花似葫蘆花。淺黃色。結實在花下。大如拳。生青。至九月熟。赤黃色。其形有正圓者。有銳而長者。功用皆同。許慎曰。木上曰果。地下曰蓏。此物蔓生附木。故得名果蓏。詩所謂果臝之實是也。綱目曰。臝與蓏同。栝樓即果

臝二字音轉也。亦作菰𤬪。後人又轉為瓜蔞。愈轉愈失其真矣。別錄謂之天瓜。齊人謂之黃瓜。象形也。醫學入門解栝樓。曰栝檃也。樓蔞斂也。言包斂其子在內。如栝囊也。其根直下生年久者長數尺。夏月掘者。有筋無粉。秋後掘者。結實有粉。皮黃肉白。亦名白藥。作粉潔白如雪。故圖經名天花粉。

栝樓實氣味苦寒無毒

主治胃痺悅澤人面〇潤肺燥降火治欬嗽滌痰結利咽喉止消渴利大腸消癰腫瘡毒

子炒用補虛勞口乾潤心肺治吐血腸風瀉血赤白痢手面皺

栝樓有圓有長皮有黃有赤子扁類葫蘆子殼色褐仁色綠

栝樓
本經
中品



修治皮子莖根其效各別其栝形圓皮黃蒂小樓則形長皮赤蒂粗陰人服樓陽人服栝並去殼皮革膜及油用根亦取大二三圍者去皮搗爛以水澄粉用今人多用子根子去殼取仁去油亦有不去油微炒者根惟切用

子剝殼用仁滲油只一度免人惡心毋多次失藥潤性

栝樓枸杞為之使惡乾薑畏牛膝乾漆反烏頭

李仲南永類方治便毒初發者用黃栝樓一箇黃連五錢水煎連服効

栝樓根名天花粉氣味苦寒無毒

主治消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絕傷除腸胃中痼熱八疸身面黃脣乾口燥短氣止小便利通月水〇治熱狂時疾通小腸消腫毒乳癰發背痔瘻瘡癤排膿生肌長肉消撲損瘀血

天花粉形



市賣係長根切成片晒乾者

修治天花粉周憲王曰秋冬采根去皮寸切水溫逐日換水四五日取出搗泥以絹衣濾汁澄粉晒乾用

天花粉使惡畏反同栝樓實

用后方治耳卒烘烘栝樓根削尖以臘豬脂煎三沸取塞耳三日即愈

苦參始生汝南山谷及田野○今近道處處皆有之○其根黃色○長五七寸許○兩指麄細○三五莖並生○苗高三二尺已來○葉碎青色○極似槐葉○故本經、名水槐○別錄、名菟槐○地槐○驕槐○綱目、名野槐○春生冬凋○其花黃白色○七月結實如小豆子○河北生者無花子○十月采根暴乾○苦以味名○參以功名○

苦參氣味苦寒無毒

主治心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚○養肝膽氣安五臟平胃氣令人嗜食輕身定志益精利九竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部䘌○漬酒飲治疥殺蟲○治惡蟲脛酸○治熱毒風皮肌煩燥生瘡赤癩眉脫除大熱嗜睡治腹中冷痛中惡腹痛○殺疳

蟲炒存性米飲服治腸風瀉血并熱痢

苦參
本經
中品



修治苦參雷公云用糯米泔汁浸一宿其腥穢氣並浮水面上須重重淘過蒸之從巳至申取曬切用

元素曰苦參味苦氣沉純陰足少陰腎經君藥也

之才曰玄參為之使惡貝母兎絲漏蘆反藜蘆時珍曰伏汞制雌黃焰消

勝金方治時疾熱病狂言心燥苦參不限多少炒黃色為末每服二錢水一盞煎至八分溫服連煎三服有汗無汗皆愈

治小兒身熱苦參湯浴兒良

當歸始生隴西川谷○今川蜀陝西諸郡及江寧府滁州皆有之○以蜀中者為勝○春生苗○綠葉有三瓣○七八月開花似蒔蘿淺紫色○根黑黃色○二月八月采根陰乾○然苗有二種○都類芎藭○而葉有大小為異○莖梗比芎藭甚卑小○根亦二種○大葉名馬尾當歸○細葉名蠶頭當歸○大抵以肉厚而不枯者為勝○謹按爾雅云○薜○山蘄○郭璞注引廣雅云○山蘄○當歸也○似芹而麄大○釋曰○說文云○蘄草也○生山中者名薜○一名山蘄○然則當歸芹類也○在平地者名芹○生山中而麄大者名當歸也○承曰○當歸治妊婦產後○惡血上衝○倉卒取效○氣血昏亂者○服之即定○能使氣血各有所歸○故

因名曰當歸○

當歸氣味苦溫無毒

主治欬逆上氣溫瘧寒熱洗洗在皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘍金瘡煑汁飲之○溫中止痛除客血內塞中風痓汗不出濕痺中惡客氣虛冷補五臟生肌肉○止嘔逆虛寒熱下痢腹痛齒痛女人瀝血腰痛崩中補諸不足○治一切風補一切勞治一切氣破惡血養新血及癥癖腸胃冷○主瘻癖嗜臥足下熱而痛衝脈為病氣逆裏急帶脈為病腹痛腰溶溶如坐水中○治頭痛心腹諸痛潤腸胃筋骨皮膚治癰疽排膿止痛和血補血

當歸
本經
中品



頭圓尾多色紫氣香肥潤者名馬尾當歸最勝他處當歸頭大尾粗色白堅枯者為蠶頭當歸止宜入發散藥爾



修治去蘆頭以酒浸一宿或火乾日乾入藥

杲曰頭止血而上行身養血而中守尾破血而下流全活血而不走

杲曰甘辛溫氣厚味薄可升可降陽中微陰入手少陰足太陰厥陰經血分

當歸惡蔄茹濕麪畏菖蒲海藻牡蒙生薑

貢和公進過牛經牛有尿血病當歸紅花各半兩為末以酒半升煎候冷灌之差

當歸臣

麻黃始生晉地及河東。今近汴京多有之。以滎陽中牟者為勝。苗春生。至夏五月則長及一尺已來。稍有黃花。結實如百合瓣而小。又似皂莢子。味甜。微有麻黃氣。外皮紅。裏仁子黑。根紫赤色。俗說有雌雄二種。雌者於三月四月內開花。雄者無花不結子。至立秋後收採其莖陰乾。或云其味麻。其色黃。故名麻黃。

麻黃氣味苦溫無毒

主治中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥瘕積聚○五臟邪氣緩急脅痛字乳餘疾止好唾○通腠理解肌泄邪惡氣消赤黑斑毒不可多服令人虛○治身上毒風瘴痺皮肉不仁主壯熱溫疫山嵐瘴氣○通九竅調血脈開毛孔皮膚○去營中寒邪泄衛中風熱○散赤目腫痛水腫風腫產後血滯


莖
麻黃本經中品
莖類節節草嫩青老黃
根紫

修治麻黃折去根節水煑十餘沸以竹片掠去上沫沫令人煩今人惟去根節切用

麻黃根節味甘平無毒主治止汗夏月雜粉撲之

元素曰性溫味苦而甘辛氣味俱薄輕清而浮陽也升也手太陰之藥入足太陽經兼走手少陰陽明

厚朴白微為之使惡辛夷石韋

子母秘錄治產後腹痛及血下不盡麻黃去節杵末酒服方寸七一日二三服血下盡即止澤蘭湯服亦妙

談埜翁試驗方麻黃根黃耆等分為末飛麪糊作丸梧子大每（服一百丸浮小麥湯送下以愈為度）

（麻黃君）

通草始生石城山谷及山陽。今澤潞漢中江淮湖南州郡亦有之。生作藤蔓。大如指。其莖幹大者徑三寸。每節有二三枝。枝頭出五葉。頗類石韋。又似芍藥。三葉相對。夏秋開紫花。亦有白花者。結實如小木瓜。核黑瓤白。食之甘美。南人謂之鷰覆。亦云烏覆。正月二月採枝陰乾。其枝有細孔。兩頭皆通。含一頭吹之。則氣即出彼頭。故名通草。今人呼為木通。

通草氣味辛平無毒

主治除脾胃寒熱通利九竅血脈關節令人不忘去惡蟲○療

脾疸常欲眠心煩噦出声音治耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻踒折齆鼻息肉墮胎去三蟲○治五淋利小便開關格治人多睡主水腫浮大○利諸經脉寒熱不通之氣○理風熱小便數急疼小腹虛滿宜煎湯并葱飲有效○安心除煩止渴退熱明目治鼻塞通小腸下水破積聚血塊排膿治瘡癤止痛催生下胞女人血閉月候不匀天行時疾頭痛目眩羸劣乳結及下乳○利大小便令人心寬下氣○主諸瘻瘡喉痺咽腫濃煎含嚥○通經利竅導小腸火

通草　本經　中品


莖類葡萄皮似楥木肉色黄白有細孔

正月采莖陰乾

木通本經載名通草今人咸呼為木通又呼作花通脫木為通草不知木通即通草而作花者迺通脫木也用通草者當細玩本經

修治去粗皮切片有紫白二色紫者皮厚味辛白者皮薄味淡

本經言味辛別錄言味甘是二者皆能通利也

杲曰味甘而淡氣平味薄降也陽中陰也手厥陰心包絡手足太陽小腸膀胱之藥也

食療云煑飲之通婦人血氣濃煎三五盞即便通又除寒熱不通之氣消鼠瘻金瘡踒折煑汁釀酒妙

通草臣

芍藥始生中岳川谷今處處有之淮南者勝春生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡丹而狹長高一二尺夏開花有紅白紫數種子似牡丹子而小秋時採根根亦有赤白二色醫學入門曰芍灼也灼灼其花根能治病故名芍藥本草綱目曰芍藥猶婥約也婥約美好貌此草花容婥約故名芍藥詩云伊其相謔贈之以芍藥韓詩外傳云芍藥離草也董子云芍藥一名將離故將別贈之本經白者名金芍藥赤者名木芍藥

芍藥氣味苦平無毒

主治邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益氣○通順血脉緩中散惡血逐賊血去水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰痛○治臟腑擁氣強五臟補腎氣治時疾骨熱婦人血閉不通能蝕膿○女人一切病胎前産後諸疾治風補勞退熱除煩益氣驚狂頭痛目赤明目腸風瀉血痔瘻發背瘡疥○瀉肝安脾肺收胃氣止瀉利固腠理和血脉收陰氣歛逆氣○理中氣治脾虛中滿心下痞脇下痛善噫肺急脹逆喘欬太陽鼽衂目澁肝血不足陽維病苦寒熱帶脉病苦腹痛滿腰溶溶如坐水中○止下痢腹痛後

重○芍藥山谷花葉單根重實有力家園花葉盛根輕虛無能一云山谷芍藥花單瓣類杓形故名芍藥

本草蒙筌云白芍藥色應西方能補能收酒炒纔妙和血脉緩中固腠理止瀉痢為血虛腹痛捷方

芍藥　本經　中品


南芍藥形

二月八月采根

白芍藥肉牙色

南芍藥亦有齊者兩頭尖者多切片肉極堅實西芍藥亦有尖者兩頭齊者多切片肉有花文凡用惟南為勝

本草蒙筌云赤芍藥色應南方能瀉能散生用正宜利小便去熱消癰腫破積堅主火盛眼疼要藥

赤芍藥形


八月采根

別錄曰酸微寒有小毒氣薄味厚可升可降陰中之陽入手足
太陰行經藥入肝脾血分

芍藥雷丸為之使惡石斛芒消畏消石鼈甲小薊反藜蘆

博濟方治五淋赤芍藥一兩檳榔一箇麵裹煨為末每服一錢
水一盞煎七分空心服

古今錄驗治咯血衂血白芍藥一兩犀角末二錢半為末新水
服一錢七血止為限

芍藥臣

芍藥凡婦人產後諸病切忌煎嘗因其酸寒恐伐生發之性故
也儻不淂已要用桂酒漬炒少加血虛寒人亦禁莫服冬月
減芍藥以避中寒此經言可徵矣

瞿麥始生太山川谷○今處處有之○苗高一尺以來○葉似地膚而尖小○又似初生小竹葉而細窄○其莖纖細有節○稍間開花○有紅

紫赤數色○二月至五月開○七月結實作穗○子頗似麥○故名瞿麥○按陸佃解韓詩外傳云○生于兩傍謂之瞿○此麥之穗旁生○故名○爾雅謂之蘧麥○本經謂之巨句麥○廣雅謂之茈萎○別錄謂之大蘭○綱目謂之南天竺草○日華子謂之石竹○

穗氣味苦寒無毒
主治關格諸癃結小便不通出刺決癰腫明目去翳破胎墮子
下閉血○養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂長毛髮○主五淋月
經不通破血塊排膿

葉主治痔瘻并瀉血作湯粥食又治小兒蛔蟲及丹石藥發并
眼目腫及腫毒擣傅治浸淫瘡婦人陰瘡

凡使瞿麥只用蕊殼不用莖葉若一時同使即空心令人氣噎
小便不禁也

瞿麥　本經中品



瞿麥蘘草牡丹為之使惡螵蛸伏丹砂○按經云采實實中子
至細燥熱便脫盡今市人惟合莖葉用而實正殼空無子爾

崔氏治魚臍瘡毒腫燒灰和油傅於腫上甚佳

瞿麥臣

玄參始生河間山谷及冤句○今處處有之○二月生苗○葉似脂麻○又如槐柳○細莖青紫色○七月開花青碧色○八月結子黑色○亦有

白花○莖方大紫赤色而有細毛有節若竹者○高五六尺○葉如掌大而尖長如鋸齒○其根尖長生青白○乾即紫黑○新者潤膩○一根可生五七枚○三月九月採暴乾○李時珍曰○玄黑色也○陶弘景曰○其莖微似人參○故名玄參○又一名黑參○

玄參氣味苦微寒無毒
主治腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人明目○主暴
中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人溫瘧洒洒血瘕下寒
血除胸中氣下水止煩渴散頸下核癰腫心腹痛堅癥定五
臟久服補虛明目強陰益精○熱風頭痛傷寒勞復治暴結
熱散瘤瘻瘰癧
治遊風補勞損心驚煩燥骨蒸傳尸邪氣止健忘消腫毒
滋陰降火解斑毒利咽喉通小便血滯

玄參　本經中品



修治玄參用蒲草重重相隔入甑蒸兩伏時晒乾用勿犯銅器餌之噎喉喪目

別錄云味鹹元素曰足少陰腎經君藥也治本經須用之才曰惡黃耆乾薑大棗山茱萸反藜蘆

衛生易簡方治鼻中生瘡玄參末塗之或以水浸軟塞之

玄參使

秦艽始生飛烏山谷○今河陝州郡多有之○其根土黃色而相交斜○長一尺已來○麤細不等○枝幹高五六寸○葉婆娑連莖梗俱青色如萵苣葉○六月中開花紫色似葛花○當月結子○每於春秋采根陰乾○以出秦中根作羅紋交斜者佳○故名秦艽○

秦艽氣味苦平無毒

主治寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下水利小便○療風無問久新通身攣急○傳尸骨蒸治疳及時氣○牛乳點服利大小便療酒黃黃疸解酒毒去頭風○除陽明風濕及手足不遂口噤牙痛口瘡腸風瀉血養血榮筋○泄熱益膽氣○治胃熱虛勞發熱

秦艽　本經中品


根形土黃色以左文者為良

修治秦艽破開除土去蘆以濕布拭淨日乾用

別錄曰辛微溫陰中微陽可升可降入手陽明經菖蒲為之使

畏牛乳

貞元廣利方治黃疸皮膚眼睛如金色小便赤心煩口乾者以秦艽三兩牛乳一大升煑取七合溫服又孫真人方加芒硝六錢

百合始生荊州川谷○今近道處處有之○春生苗○高數尺○幹粗如箭○四面有葉如雞距○又似柳葉青色○近莖處微紫○莖端碧白○四五月開紅白花○如石榴嘴而大○根如葫蒜○重疊生二三十瓣○因根以衆瓣合成○故名百合○或云○專治百合病○故名百合○

百合氣味甘平無毒

主治邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣○除浮腫臚脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痺止涕淚○百邪鬼魅涕泣不止除心下急滿痛治脚氣熱欬○安心定膽益志養五藏治顛邪狂叫驚悸產後血運殺蠱毒氣脇癰發背諸瘡腫○心急黃宜蜜蒸食之○溫肺止嗽○治百合病

百合　本經中品



百合辦似蓮花辦鮮者色白乾者色黃白二月八月采日乾

修治搥破入藥鮮者可蒸可煑和肉更美乾者作粉食益人

聖惠方治傷寒百合病腹中滿痛用百合一兩炒令黃色擣為散不計時候粥飲調下二錢服

百合使

知母始生河內川谷○今瀕河諸郡及解州滁州亦有之○根黃色○似菖蒲而柔潤○葉類韭○四月開花如韭花○八月結實○二月八月

採根暴乾。補陰藥用之。以其能知血之母也。故名知母。

知母氣味苦寒無毒

主治消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣○療傷寒久瘧煩熱脇下邪氣膈中惡及風汗內疸多服令人洩○心煩躁悶骨熱勞往來產後蓐勞腎氣勞增寒虛煩○熱勞傳尸疰痛通小腸消痰止嗽潤心肺安心止驚悸○涼心去熱治陽明火熱瀉膀胱腎經火熱厥頭痛下痢腰痛喉中腥臭○瀉肺火滋腎水治命門相火有餘

知母
本經中品


根形
皮黃有毛肉白
知母亦有無毛者
肥潤者佳

知母狀如蚳又一名蚳母　爾雅名蕁

修治知母揀肥潤肉白者去毛切片勿犯鐵器引經上行則用酒浸焙乾下行則用鹽水潤焙

元素曰氣寒味大辛苦氣味俱厚沉而降陰也陰中微陽腎經本藥入足陽明手太陰經氣分

知母得黃蘗良能伏鹽及蓬砂

肘後方用知母治溪毒大勝其法連根葉搗作散服之亦可投水搗絞汁飲一二升夏月出行多取此屑自隨欲入水先取少許投水上流便無畏兼辟射工亦可和水作湯浴之甚佳

知母君

貝母始生晉地。今河中江陵府郢壽隨鄭蔡潤滁州皆有之。二月生苗。莖細青色。葉亦青似蕎麥葉。隨苗出。七月開花碧綠色。形如鼓子花。十月採根暴乾。根有瓣子。黃白色。如聚貝子。故名貝母。詩云。言采其莔。即此也。

氣味辛平無毒

主治傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺乳難金瘡風痙○療腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五藏利骨髓○服之不饑斷穀○消痰潤心肺末和沙糖丸含之止嗽燒灰油調傅人畜惡瘡斂瘡口○主胸脇逆氣時疾黃疸研末點目去膚翳以七枚作末酒服治產難及胞衣不出與連翹同服主項下瘤癭疾

貝母
本經中品



西貝母色白體輕雙瓣　南貝母色青白體重單粒

凡用以黃白輕鬆者為良油黑重硬者為劣西者南者俱宜入劑而西者尤良貝母中獨顆團不作兩瓣者號曰丹龍睛誤服令人筋脈不收

今出近道者葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相着有分解也入藥無能堪醫馬而已

修治貝母於柳木灰中炮黃去內口鼻中有米許大心一顆後拌糯米於鏊上同炒待米黃去米用今惟去心任用

近有無恥小人以製過半夏削成兩瓣內入鬚心合為一顆彷彿西貝母形狀欺人深為可恨買者宜細辨之

別錄曰苦微寒厚朴白微為之使惡桃花畏秦艽莽草礜石反烏頭

昔江左嘗有商人左膊上有瘡類人面亦無它苦商戲滴酒口中其面亦赤色以物食之亦能食食多則覺膊內肉脹起或不食之則一臂痺有善醫者教其歷試金石草木之藥無若至貝母其瘡廼聚眉閉口商人喜曰此藥可治也因以葦筒毀其口灌之數日成痂遂愈

貝母臣

白芷始生河東川谷下澤。今所在有之。吳地猶多。根長尺餘。白

色粗細不等○枝幹去地五寸已上○春生葉相對婆娑○紫色闊三指許○花白微黃○入伏後結子○立秋後苗枯○二月八月採根暴乾○徐鍇云○初生根幹為芷○則白芷之義○取乎此也○許慎說文云○晉謂之虈○齊謂之茝○楚謂之蘺○又謂之葯○生於下澤○芬芳○與蘭同德○故騷人以蘭茝為詠○本經名芳香○別録名澤芬○今人每呼為香白芷○

氣味辛溫無毒

主治女人漏下赤白血閉陰腫寒熱頭風侵目淚出長肌膚潤澤顏色可作面脂○療風邪久渴吐嘔兩脇滿頭眩目癢可作膏藥○治目赤胬肉去面皯疵瘢補胎漏滑落破宿血補新血乳癰發背瘰癧腸風痔瘻瘡痍疥癬止痛排膿○能蝕膿止心腹血刺痛女人瀝血腰痛血崩○解利手陽明頭痛中風寒熱及肺經風熱頭面皮膚風痺燥癢

白芷
本經中品



色白氣香者佳

修治采得根洗刮寸截以石灰拌勻晒收為其易蛀并欲色白也入藥水潤微焙切片

元素曰氣溫味苦大辛氣味俱輕陽也手陽明引經本藥同升麻則通行手足陽明經亦入手太陰經

白芷當歸為之使惡旋覆花制雄黃硫黃

談埜翁試效方治偏正頭風百藥不治一服便可天下第一方也香白芷炒二兩五錢川芎炒甘草炒川烏頭半生半熟各一兩為末每服一錢細茶薄荷湯調下

白芷君

淫羊藿

俗名仙靈脾○始生上郡陽山山谷○今江東陝西泰山漢中湖湘間皆有之○葉青似杏葉上有刺○莖如粟稈○根紫色有鬚○四月開花白色○亦有紫色○碎小獨頭子○五月採葉曬乾○陶隱居云○服此使人好為陰陽○西川北部有淫羊一日百遍合○蓋食藿所致○故名淫羊藿○

氣味辛寒無毒

主治陰痿絕傷莖中痛利小便益氣力強志○堅筋骨消瘰癧赤癰下部有瘡洗出蟲丈夫久服令人無子○丈夫絕陽無子女人絕陰無子老人昏耄中年健忘一切冷風勞氣筋骨攣急四肢不仁補腰膝強心力

生處不聞水聲者良

淫羊藿
本經中品



葉青似杏葉有刺莖淡紫
根深紫色

用葉者多亦有用根者關中呼為三枝九葉草

修治淫羊藿須用夾刀夾去葉四畔花刺盡後細剉用羊脂相對拌炒待羊脂盡為度每修事一斤用羊脂四兩

保昇曰性溫之才曰薯蕷為之使得酒良亦使紫芝

食醫心鏡益丈夫興陽理腰膝冷淫羊藿一斤酒一斗浸經三日飲之佳

黃芩

始生秭歸川谷及冤句○今川蜀河東陝西近郡皆有之○苗

長尺餘莖幹麄如筋葉從地四面作叢生類紫草高一尺許亦有獨莖者葉細長青色兩兩相對六月開紫花根黃色長四五寸二月八月採根暴乾根圓實者弘景名子芩俗呼條芩破者名宿芩俗呼片芩內心空腐色黯者本經名腐腸別錄名空腸名內虛吳普名妬婦妬婦心黯故以比之說文芩作菳謂其色黃也

氣味苦平無毒

主治諸熱黃疸腸澼泄痢逐水下血閉惡瘡疽蝕火瘍○療痰熱胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛○治熱毒骨蒸寒熱往來腸胃不利破壅氣治五淋令

人宜暢夫關節煩悶解熱渴○下氣主天行熱疾丁瘡排膿治乳癰發背○凉心治肺中濕熱瀉肺火上逆療上熱目中腫赤瘀血壅盛上部積血補膀胱寒水安胎養陰退陽○治風濕熱痛頭痛火欬諸失血


條芩形圓堅實
色黃者良
片芩破飄成片
枯芩中心朽爛
本經云三月三日採根陰乾

修治黃芩治上膈病酒炒為宜治下焦病生用最妙

別錄曰大寒味薄氣厚可升可降陰也陰中微陽宿芩入手太陰血分子芩入手少陽陽明經

山茱萸龍骨為之使惡葱實畏丹砂牡丹藜蘆得厚朴黃連止腹痛得五味子牡蠣令人有子得黃耆白歛赤小豆療鼠瘻得酒上行得豬膽汁除肝膽火得柴胡退寒熱得芍藥治下痢得桑白皮瀉肺火得白朮安胎

梅師方治火丹杵黃芩末水調傅之　黃芩臣

狗脊始生常山川谷今太行山淄溫眉州亦有之苗尖細碎青色高一尺以來無花其莖葉似貫仲而細其根黑色長三四寸大如兩指許多岐狀如狗之脊骨故名狗脊一種有金黃毛狀如金毛狗俗每呼為金毛狗脊

氣味苦平無毒

主治腰背強關機緩急周痺寒濕膝痛頗利老人○療失溺不節男女腳弱腰痛風邪淋露少氣目闇堅脊利俛仰女子傷中關節重○男子女人毒風軟腳軟腎氣虛弱續筋骨補益男子○強肝腎健骨治風虛



狗脊有金黃毛肉青綠色亦有赤色者市賣皆此樣也

修治剉炒去毛鬚用

別錄曰甘微溫萆薢為之使惡敗醬莎草

吳綬蘊要治病後足腫用狗脊煎湯漬洗

萆薢始生楚地山谷田野今處處有之春生苗布地如針俗謂

之茅針。夏開白茸花。易曰。藉用白茅。即此也。根有節如管。故本經名地管。詩云。白華管兮。白茅束兮。是也。醫學入門曰。茅冐也。毛也。冐然而生。爲地之毛也。


茅根本經中品

氣味甘寒無毒

主治勞傷虛羸補中益氣除瘀血血閉寒熱利小便○下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利人○主婦人月經不勻通血脉淋瀝○止吐衄諸血傷寒噦逆肺熱喘急水腫黃疸解酒毒

根至潔白味至甘美甚益小兒

千金翼治吐血不止用白茅根一握水煎服之

茅根臣

紫菀生房陵山谷及真定邯鄲。今耀成泗壽台孟興國諸州皆有之。三月內布地生苗葉。其葉三四相連。五月六月內開黃紫白花。結黑子。本有白毛。其根色紫而柔宛。故名紫菀。


紫菀本經中品

二月三月采根陰乾

氣味苦溫無毒○主治欬逆上氣胸中寒熱結氣去蠱毒痿蹷安五藏療欬唾膿血止喘悸五勞體虛小兒驚癇治尸疰補虛下氣勞氣虛熱百邪鬼魅調中消痰止渴潤肌膚添骨髓益肺氣主息賁

修治紫菀去頭及土用東流水洗淨以蜜浸一宿至明放火上焙乾用一兩用蜜二分

別錄曰辛之才曰款冬爲之使惡天雄瞿麥藁本雷丸遠志畏茵陳

千金方治婦人卒不得小便紫菀末以井花水服三撮便通小便血服五撮立止

紫菀臣

紫草始生碭山山谷及楚地。今處處有之。人家或種之。苗似蘭香。莖赤節青。二月開花紫白色。結實白色。三月采根陰乾。此草根紫。可以染紫。故名紫草。別錄名紫丹。一名紫芙。

紫草氣味苦寒無毒

主治心腹邪氣五疸補中益氣利九竅○通水道療腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皶○治惡瘡瘑癬○治斑疹痘毒活血涼血利大腸


紫草本經中品

根紫色

外紫內白

修治紫草每一兩用蠟二錢溶水浸之待水乾去蘆剉用或以酒洗剉用　入手足厥陰經

千金翼治卒小便淋瀝痛用紫草一兩搗羅爲散每於食前以井花水調下二錢匕産後淋瀝同

前胡近道皆有。生下濕地。出吳興者爲勝。春生苗青白色。似斜蒿。初出時有白芽。長三四寸。味甚香美。又似芸蒿。七月內開白花。與葱花相類。八月結實。根似柴胡而柔軟。苗生柴胡之前。故名前胡。

前胡氣味苦微寒無毒

主治痰滿胸脇中痞心腹結氣風頭痛去痰下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精○能去熱實及時氣內外俱熱單煮服之○治一切氣破癥結開胃下食通五臟主霍亂轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘欬嗽安胎小兒一切疳氣○清肺熱化痰涎散風邪

前胡本經中品


根外黑裏黃白

修治去蘆并鬚土了水洗令潤細剉日中晒乾用之○八月采

權曰甘辛平之才曰半夏爲之使惡皂莢畏藜蘆

外臺秘要治小兒夜啼前胡擣篩蜜丸如大豆日服一丸熟水下至五六丸以差爲度

前胡使

白鮮始生上谷川谷及寃句今近道處處有之以蜀中者爲良○

苗高尺餘莖青葉稍白如槐亦似茱萸四月開花淡紫色似小蜀葵根似蔓菁皮白而心實四月五月採根陰乾其氣息都似羊羶故俗呼爲白羊鮮陶弘景名白羶圖經名地羊鮮今人呼爲白鮮皮○

氣味苦寒無毒○主治頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛濕痺死肌不可屈伸起止行步○療四肢不安時行腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產後餘痛○治一切熱毒風惡風風瘡疥癬赤爛眉髮脫脆皮肌急壯熱惡寒解熱黃酒黃急黃穀黃勞黃○通關節利九竅及血脉通小腸水氣天行時疾眼疼頭痛其花同功○治肺嗽

白鮮本經中品


苗可爲茹

根皮白色入藥

白鮮皮惡螵蛸桔梗茯苓萆薢

葛洪治鼠瘻已有口膿血出者白鮮皮煑汁服一升當吐鼠子乃愈

白鮮皮臣

紫參始生河西及寃句山谷今所在有之苗長一二尺莖青而細其葉青似槐亦有似羊蹄者五月開花白色似葱花亦有紅紫而似水葒者根紫黑色肉紅白色肉淺而皮深三月採根火炙紫色而治療頗同人參故名紫參按錢起詩集云紫參幽芳也五葩連萼狀如飛禽羽舉故俗名五鳥花○

氣味苦寒無毒

主治心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便○療腸胃大熱唾

血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精○治心腹堅脹散瘀血治婦人血閉不通○主狂瘧瘟瘧鼽血汗出○治血痢

根形

皮紫黑肉紅白

紫參本經中品



修治水洗細剉

別錄曰微寒之才曰畏辛夷

紫參使

金匱玉函治痢紫參半斤水五升煎二升入甘草二兩煎取半升分三服

藁本始生崇山山谷今西川河東州郡及兗州杭州有之葉似白芷香又似芎藭但芎藭似水芹而大藁本葉細耳根上苗下似禾藁故名藁本○

氣味辛温無毒

主治婦人疝瘕陰中腫痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色○辟霧露潤澤療風邪嚲曳金瘡可作沐藥面脂○治一百六十種惡風鬼疰流入腰痛冷能化小便通血去頭風䵟皰○治皮膚疵皯酒皶粉刺癇疾○治太陽頭痛巔頂痛大寒犯腦痛連齒頰○頭面身體皮膚風濕○督脈為病脊強而厥

藁本本經中品

根黑色



二月采根暴乾

元素曰氣温味苦氣厚味薄升也陽也足太陽本經藥惡蕳茹畏青葙子

保幼大全治小兒疥癬藁本煎湯浴之

[illegible] 始生華陰山谷石上。今處處有之。叢生石傍陰處。葉青背有斑點黃毛。綱目曰。柔皮曰韋。此葉柔韌如皮。故名石韋。

石韋氣味苦平無毒

石韋本經中品



二月采葉陰乾

主治勞熱邪氣五癃閉不通利小便水道止煩下氣通膀胱滿補五勞安五臟去惡風益精氣治淋瀝遺溺炒末冷酒調服治發背甚效治崩漏金瘡清肺氣

修治石韋水浸軟以新布拭去黃毛微炒入藥不則毛射人肺令人欬不可療

別録曰甘権曰微寒之才曰滑石杏仁射干為之使得菖蒲良制丹砂礬石

崩中漏下石韋為末每服三錢温酒調服甚効

石韋使

萆薢 始生真定山谷。今河陝京東荊蜀諸郡有之。根黃白色多節。三指許大。苗葉俱青。作蔓生。葉作三叉似山芋。又似菉豆葉。花有黃紅白數種。亦有無花結白子者。春秋採根暴乾。唐本注云。此藥有二種。莖有刺者。根白實。無刺者。根虛軟。以軟者為勝。醫學入門曰。萆、卑下也。薢、解也。言性能治下部疾。解下部毒也。故名萆薢。

氣味苦平無毒

主治腰脊痛強骨節風寒濕周痺惡瘡不瘳熱氣○傷中恚怒陰痿失溺老人五緩關節老血○冷風𤸷痺腰脚癱緩不遂手足驚掣男子臂腰痛久冷腎間有膀胱宿水○頭旋癇疾補水藏堅筋骨益精明目中風失音○補肝虛○治白濁莖中痛痔漏壞瘡

根皮色黃白肉色白

萆薢別録中品



修治酥炙剉用

之才曰薏苡仁為之使畏葵根大黃柴胡前胡牡蠣

集玄方治小便頻數川萆薢為末酒糊丸梧子大每鹽酒下七十丸

川萆薢色白而虛軟山萆薢色赤而堅硬凡用以白軟者為勝

白微 始生平原川谷。今陝西諸郡及滁舒潤遼州亦有之。莖葉俱青。頗類桃葉。六七月開紅花。八月結實。根白色而微細。故名

白微〇

氣味苦鹹平無毒

主治暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼温瘧洗洗發作有時〇療傷中淋露下水氣利陰氣益精久服利人〇治驚邪風狂痓病百邪鬼魅〇風温灼熱多眠及熱淋遺尿金瘡出血

根黃白色類牛膝而短小

白微本經中品



三月三日採根陰乾

修治白微以酒洗之剉用

惡黃耆大黃大戟乾薑乾漆山茱萸大棗

白微臣

儒門事親治金瘡出血白微為末貼之

香薷

所在皆種〇但北土差少〇似白蘇而葉更細〇壽春及新安皆

有之〇綱目曰〇薷本作葇〇玉篇云〇葇菜蘇之類是也〇其氣香〇其葉柔〇故名香薷〇食療本草名香葇〇又有一種生石上〇莖葉更細〇色黃而辛香彌甚〇用之尤佳〇宋開寶名石香葇〇

氣味辛微温無毒

主治霍亂腹痛吐下散水腫〇去熱風卒轉筋者煑汁頓服半升即止為末水服止鼻衄〇下氣除煩熱療嘔逆冷氣〇春月煑飲代茶無可熱病調中温胃含汁漱口去臭氣〇主脚氣寒熱

苗葉花實俱用

香薷本經中品



乾形

石香葇氣味辛香温無毒主治調中温胃止霍亂吐瀉心腹脹滿腹痛腸鳴功比香薷更勝　制硫黃

修治去根剉用勿令犯火服至十兩一生不得食白山桃也

聖濟總錄治鼻衄不止香薷研末水服一錢

艾

處處有之〇初春布地生苗〇莖類蒿而葉背白〇以複道者為佳〇三月三日五月五日采葉暴乾〇按王安石字說云〇艾可乂疾〇久而彌善〇故字從乂〇醫家用灸百病〇故一名灸草〇別錄名醫草〇

艾葉氣味苦微温無毒

主治灸百病可作煎止吐血下痢下部䘌瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子作煎勿令見風〇擣汁服止傷血蚘蟲〇主衄血下血膿血痢水煑及丸散任用〇止崩血腸痔血搨金瘡止腹痛安胎苦酒作煎治癬甚良擣汁飲治心腹一切冷氣鬼氣〇治帶下止霍亂轉筋痢後寒熱〇治帶

脉為病腹脹滿腰溶溶如坐水中

艾別錄中品

五月五日采

不拘州土苗短者善自成化以来則以蘄州者為勝謂之蘄艾天下重之



艾形

修治艾葉須用陳久者治令細軟謂之熟艾若生艾灸火傷人肌脉故孟子云七年之病求三年之艾凡用擇久畜者揀取淨葉揚去塵屑入石臼內擣熟去滓取白者再擣至柔爛如綿為度用時焙燥則灸火得力入婦人丸散須以熟艾用醋煑乾擣成餅子烘乾再擣末方淂法

生温熟熱可升可降陽也入足太陰厥陰少陰經苦酒香附為之使

兵部手集治發背頭未成瘡及諸熱腫以濕紙搨上先乾處是熱氣衝上欲作瘡子便灸之如先疼痛灸即不痛即以痛為度（小兒黄爛瘡燒艾葉灰傅之　艾葉使）

惡實生魯山平澤今處處有之葉如芋而長大實似巨勝而褐色其殼狀惡而多刺鈎故名惡實鼠過之則綴惹不可脫故一名鼠粘子其根葉可飼牛故別録名牛蒡子術人隱之呼為大力子也

惡實氣味辛平無毒

主治明目補中除風傷○風毒腫諸瘻○研末浸酒每日服三二盞除諸風去丹石毒利腰脚又食前熟挼三枚吞之散諸結節筋骨煩熱毒○吞一枚出癰疽頭○炒研煎飲通利小便○潤肺散氣利咽膈去皮膚風通十二經○消斑疹毒

惡實別録中品



修治惡實酒拌炒焙乾擣粉用（即牛蒡子秋末採）

痘疹要訣治咽喉痘疹惡實二錢桔梗錢半甘草節七分水煎服

地榆生桐柏及寃句山谷今處處有之宿根三月內生苗初生布地莖直高三四尺對分出葉葉似榆葉而稍狹細長似鋸齒狀青色七月開花如椹子紫黒色根外黒裏赤二月八月採根暴乾因葉似榆初生布地故名地榆

氣味苦微寒無毒

主治婦人乳痓痛七傷帶下病止痛止汗除惡肉療金瘡○止膿血諸瘻惡瘡熱瘡補絶傷産後內塞可作金瘡膏消酒除渴明目○止冷熱痢疳痢極效○止吐血鼻衄腸風月經不止血崩産前後諸血疾并水瀉○治膽氣不足○汁醸酒治風痺補腦擣汁塗虎犬蛇蟲傷

地榆本經中品



修治水洗剉用（虚寒人及水瀉白痢未可輕使）

別録曰地榆甘酸氣味俱薄其體沉而降陰中陽也專主下焦血（之才曰得髮良惡麥門冬）

千金翼治代指逆臚單煑地榆作湯漬之半日愈

臞仙神隱書煑白石法七月七日取地榆不拘多少陰乾百日燒為灰復取生者與灰合擣萬下灰三分生末一分合之若石二三斗以水浸過三寸以藥入水攪之煑至石爛可食止

大薊小薊小薊處處有之俗名青刺薊二月生苗二三寸時併根作菜茹食甚美四月高尺餘多刺心中出花頭如紅藍花而青紫色北人呼為千針草四月采苗九月采根並陰乾用大薊與此相似但肥大爾本草綱目曰薊猶髻也其花如髻也

大薊根葉氣味甘温無毒　根

主治女子赤白沃安胎止吐血鼻衄令人肥健○擣根絞汁服半升主崩中下血立瘥○葉治腸癰腹臟瘀血作運撲損生研酒并小便任服又惡瘡疥癬同鹽研罯之

小薊根苗氣味甘温無毒　根

主治養精保血○破宿血生新血暴下血血崩金瘡出血嘔血等絞取汁温服作煎和糖合金瘡及蜘蛛蛇蝎服之亦佳○治熱毒風并胷膈煩悶開胃下食退熱補虚損○苗去煩熱

生研汁服○作菜食除風熱夏月熱煩不止擣汁半升服立瘥



大薊高三四尺葉皺

葉俱有刺

小薊高尺許葉不皺

大薊小薊
別録中品

大小薊皆能破血但大薊兼療癰腫而小薊專主血不能消腫

梅師方治卒瀉鮮血小薊根葉搗汁溫服一升

外臺秘要治陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死夜疼悶不得眠煑大薊根汁服立瘥

陳藏器曰薊門以多薊得名當以北方者爲勝也

海藻 水草之有文者。黑色如亂髮。葉類水藻而大。生東海池澤。橫陳于海。若自澡濯然。故名海藻。

海藻
本經中品
一名薻
一名落首
一名海蘿

海藻氣味苦鹹寒無毒

主治癭瘤結氣散頸下硬核癰腫癥瘕堅氣腹中上下雷鳴下十二水腫○療皮間積聚暴癀瘤氣結熱利小便○辟百邪鬼魅治氣急心下滿疝氣下墜疼痛卵瘇去腹中幽幽作聲○治奔豚氣脚氣水氣浮腫宿食不消五膈痰壅



七月七日采暴乾

反甘草

氣味俱厚純陰沉也

修治洗淨鹹味焙乾用

又有一種如短馬尾細黑色

肘后方治頷下瘰癧如梅李宜速消之海藻一斤酒二升漬數日稍稍飲之　（海藻臣）

昆布 葉如手。大如薄葦。紫色。吳普本草名綸布。一名昆布。則爾雅所謂綸似綸。東海有之者。即昆布也。綸青絲綬也。訛而爲昆耳。醫學入門曰。昆大也。形長大如布。故名昆布。

昆布氣味鹹寒滑無毒

主治十二種水腫癭瘤聚結氣瘻瘡破積聚治陰癀腫含之嚥汁利水道去面腫治惡瘡鼠瘻

昆布
別録
中品



昆布下氣久服之損人

千金翼治五癭昆布一兩切如指大酢漬含嚥汁則愈　（昆布臣）

海帶 出東海水中石上。形似紙條。薄而且長。黃白色。柔軟堪以繫束物。故名海帶。

海帶氣味鹹寒無毒○主治催生治婦人病及療風下水○治水病癭瘤功同海藻

海帶
宋嘉祐



此係散條作成編者亦有結成繩者入藥水洗剉用

水萍 始生雷澤池澤。今處處溪間水中皆有之。係柳絮隨風飛

起入池沼得水生成。一種面背皆綠。一種面青背紫。葉下微鬚
即其根也。平浮水面。故曰水萍。俗呼浮萍。

水萍氣味辛寒無毒

主治暴熱身癢下水氣勝酒長鬚髮止消渴久服輕身○下氣以沐浴生毛髮○治熱毒風熱熱狂熁腫毒湯火傷風瘮○擣汁服主水腫利小便爲末酒服方寸匕治人中毒爲膏傳面䵟○治發背

水萍本經中品



修治七月采紫背浮萍揀淨以竹篩攤晒下置水一盆映之即易乾也

宋時東京開河掘得石碑梵書天篆無有曉者真人林靈素逐字釋解迺是治中風方名去風丹也歌云天生靈草無根幹不在山間不在岸始因飛絮逐東風泛梗青青飄水面神仙一味去沉痾采時須是七月半選甚癱風與中風些小微風都不算豆淋酒化服三九鐵幞頭上也出汗

戲術種菜便生取水上浮萍些須和壁上土拌勻向人前撒開土在地上却取菜子種撒去用水洒之則見前萍青葉如菜初生也

澤蘭始生汝南諸大澤傍。今荊徐隨壽蜀梧州河中府皆有之。根紫黑色。如粟根。二月生苗。高二三尺。莖幹青紫色。作四稜。葉生相對。如薄荷微香。七月開花。帶紫白色。萼通紫色。亦似薄荷花。三月採苗陰乾。因葉似蘭。生于澤旁。故名澤蘭。

澤蘭氣味苦微溫無毒

主治金瘡癰腫瘡膿○產後金瘡內塞○產後腹痛頻產血氣衰冷成勞瘦羸婦人血瀝腰痛○產前產後百病通九竅利關節養血氣破宿血消癥瘕通小腸長肌肉消撲損瘀血治鼻血吐血頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黃

澤蘭本經中品



三月三日采陰乾

修治澤蘭去莖取葉細剉盛絹袋懸于屋南畔角上令乾用

澤蘭防己爲之使

集簡方治產後陰戸燥熱遂成翻花澤蘭四兩煎湯熏洗二三次再入枯礬煎洗之即安

澤蘭伏

防己始生漢中川谷。今黔中亦有之。但漢中出者。破之文作車輻解。黃實而香。莖梗甚嫩。苗葉小類牽牛。折其莖。一頭吹之。氣從中貫。如木通然。他處者青白虛軟。又有腥氣。皮皺上有丁足子。名木防己。二月八月採陰乾。惟漢者勝。故古方每書漢防己。

醫學入門曰。己、止也。防止足疾也。

防己氣味辛平無毒○主治風寒溫瘧熱氣諸癇除邪利大小便療水腫風腫去膀胱熱邪氣中風手脚攣急通腠理利九竅止洩散癰腫惡結諸瘑疥癬蟲瘡治濕風口面喎斜手足拘痛散留痰肺氣喘嗽治中下濕熱腫洩脚氣行十二經

防己本經中品



木防已主治男子肢節中風毒風不語散結氣擁腫溫瘧風水腫去膀胱熱

市賣防已一種如上條形類木通文如車輻理解諸本草曰漢防已或者是此也一種如上瓜形俗呼瓜防已今用甚多諸本草並無載瓜防已者陳藏器曰如陶隱居所說漢木二防已即是根苗為名予玩條防已像苗瓜防已像根或者是根苗為名乎予未見其鮮形難辨是否以俟後之君子再正之

修治防已去皮剉酒洗曬乾用治水用漢防已治風用木防已

元素曰大苦辛寒陰也

之才曰殷孽為之使殺雄黃毒惡細辛畏萆薢鹵鹹伏消石

初虞世方治肺痿咯血多痰防已葶藶等分為末糯米飲調下一錢

漢防已君

木防已使

東垣云防已性苦寒純陰能瀉血中濕熱通血中滯塞補陰泄陽助秋冬瀉春夏之藥也比之於人則險而健者也幸災樂禍遇有風塵之警能首為亂階然而見善亦喜見惡亦怒如善用之則可以敵凶暴之人突險固之地此瞑眩之藥聖人

所以存而不廢今夫防已聞其臭則可惡下咽則令身心煩亂飲食減少至于十二經有濕熱壅塞不通及治下注脚氣除膀胱積熱而庇其基本非此藥不可真行經之仙藥也亦在人為用而不錯爾復有不可用者數端若夫飲食勞倦陰虛內熱元氣穀氣已虧之病而以防已瀉去大便則重亡其血此不可用一也如外感風寒邪傳肺經氣分濕熱小便黃赤甚至不通此上焦氣病禁用血藥此不可用二也如人大渴引飲是熱在下焦氣分宜滲瀉之其防已乃下焦血藥此不可用三也若人久病津液不行上焦虛渴宜補以人參葛根之甘溫儻用苦寒之劑則速危亡此不可用四也仍不止如此但上焦濕熱者皆不可用若係下焦濕熱流入十二經以致二陰不通必須審而用之可也

天麻始生鄆州利州泰山崂山諸山。今京東京西湖南淮南州郡亦有之。春生苗。葉如芍藥而小。當中抽一莖。直上如箭簳狀。青赤色。故名赤箭。莖端結實。狀若續隨子。其根形如黃瓜。連生一二十枚。猶如天門冬之類。味大辛而麻辣。故名天麻。俗呼為瓜天麻。

天麻氣味辛平溫無毒

主治諸風濕痺四肢拘攣小兒風癇驚氣利腰膝強筋力久服益氣輕身長年○治冷氣𤸷痺癱緩不遂語多恍惚多驚失志○助陽氣補五勞七傷鬼疰通血脈開竅服食無忌○治風虛眩運頭痛

天麻
宋開寶

皮黃白肉明
亮者佳


瓜形


形如羊角者
俗呼羊角天麻


不堪
用

瓜天麻亦有皮蒼黑者但以內肉膠色者為良二月八月采根去皮沸湯畧煮過日乾

修治酒浸洗以濕紙包於煻火中煨熟取出切片焙用

好古曰天麻苦平陰中之陽也

衛生易簡方治腰脚疼痛天麻半夏細辛各二兩絹袋二箇各盛藥令勻蒸熱交互熨疼處汗出則愈數日再熨

高良薑今嶺南諸州及黔蜀皆有之。內郡雖有而不堪入藥。春生。莖葉如薑苗而大。高一二尺許。花紅紫色如山薑。陶隱居言此薑始出高良郡。故名高良薑。按高良即今高州也。漢為高涼

縣。吳改爲郡。其山高而清凉。因以爲名。則高良當作高凉也。

氣味辛大溫無毒

主治暴冷胃中冷逆霍亂腹痛○下氣益聲好顏色煑飲服之止痢○治風破氣腹內久冷氣痛去風冷痺弱○轉筋瀉痢反胃解酒毒消飲食○含塊嚥津治忽然惡心嘔清水逡巡即瘥若口臭者同草豆蔻爲末煎飲

高良薑
別錄中品



色紫赤
氣辛烈



二月三月采
根截切暴乾

修治炒過入藥

俗呼良薑

元素曰辛熱純陽入足太陰陽明經

千金方治心脾痛以高良薑細剉微炒杵末米飲調下一錢愈

太祖高皇帝御製周顛仙碑文亦載其有驗云又穢跡佛有治心口痛方云凡男女心口一點痛者乃胃間有滯或有蟲也多因怒及受寒而起遂致終身俗言心氣痛者非也用高良薑酒洗七次焙研香附子醋洗七次焙研各記收之病因寒得用薑末二錢附末一錢因怒得用附末二錢薑末一錢寒怒兼有薑附各一錢半以米飲入生薑汁一匙鹽一捻服之立止韓飛霞醫通書亦稱其功云

高良薑使

紅豆蔻生南海諸谷。高良薑子也。凡物盛多謂之蔻。此子形如紅豆叢生。故名紅豆蔻。

氣味辛溫無毒

主治腸虛水瀉心腹絞痛霍亂嘔吐酸水解酒毒○冷氣腹痛消瘴霧毒氣去宿食溫腹腸吐瀉痢疾

紅豆蔻　宋開寶



色淡紅亦有紫紅者

修治紅豆蔻微炒用

李時珍曰辛熱陽也浮也入手足太陰經若脾肺素有伏火者切不可用

紅豆蔻今人調食饌多用權曰苦辛多食令人舌粗不思飲食

百部今江湖淮陝齊魯州郡皆有之。春生苗作藤蔓。葉大而尖長頗似竹葉。面青色而光。根多部隊成百然。故名百部。

百部氣味甘微溫無毒

主治欬嗽上氣火炙酒漬飲之○治肺熱潤肺○治傳尸骨蒸勞治疳殺蚘蟲寸白蟯蟲及一切樹木蛀蟲燼之即死殺蝨及蠅蠓○火炙酒浸空腹飲治疥癬去蟲蠶咬毒

百部別錄中品



根下一撮數十枚相連黃白色二月八月采根暴乾用

修治百部酒浸一宿漉出焙乾剉用

百部一窠八十三條者號曰地仙苗若修事餌之可千歲也

欵冬花始出常山山谷及上黨水傍。今關中亦有之。根紫色。葉似萆薢。十二月開黃花。青紫萼。去土一二寸。初出如菊花萼。通直而肥實無子。則陶隱居所謂出高麗百濟者近此類也。又有紅花者。葉如荷而斗直。大者容一升。小者容數合。俗呼爲蜂斗葉。又名水斗葉。則唐注所謂欵如葵而叢生者是也。百草中惟此不顧冰雪。最先春者也。故世謂之鑽凍。欵者至也。至冬而花。故名欵冬花。

氣味辛溫無毒

主治欬逆上氣善喘喉痺諸驚癇寒熱邪氣○消渴喘息呼吸療肺氣心促急熱勞欬連連不絕涕唾稠粘肺痿肺癰吐膿血潤心肺益五臓除煩消痰洗肝明目及中風等疾

欵冬花

本經中品


黄花者
紫花者
花腹中有絲次
正月旦采花

修治欵冬花有黄紫二品入藥擇未舒嫩蕊去枝梗用

好古曰純陽入手太陰經之才曰杏仁為之使得紫菀良惡皂莢消石玄參畏貝母辛夷麻黄黄耆黄芩連翹青葙子

楊誠經驗方治口中疳瘡欵冬花黄連等分為細末用唾津調成餅子先以蛇床子煎湯漱口乃以餅子傅之少頃確住其瘡立消

欵冬花君

紅藍花即紅花也始生梁漢及西域花生時但作黄色茸茸故一名黄藍博物志云黄藍張騫所得今處處有之人家場圃所種冬而布子於熟地春生苗葉如小薊夏乃有花下作梂彙多刺花蘂出梂上圃人承露采之采巳復出至盡而罷梂中結實白顆如小豆大其花暴乾以染真紅及作臙脂主產後血病爲勝其實亦同花紅色葉頗似藍故名紅藍花俗呼紅花

花氣味辛溫無毒

主治產後血運口噤腹內惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煑服亦主蠱毒○多用破留血少用養血○活血潤燥止痛散腫通經○葉生擣碎傅遊腫○子吞數顆主天行瘡子不出

紅藍花

宋開寶



元素曰苦溫陰中之陽入心佐當歸生新血好古曰肝經血分藥也入酒良

崔元亮海上方治喉痺壅塞不通者取紅藍花擣絞取汁一小升服之以差為度如冬月無濕花可浸乾者濃絞取汁如前服之極驗亦療婦人產暈絕者

牡丹始生巴郡山谷及漢中今丹延青越滁和州山中皆有之花有黄紫紅白數色此當是山牡丹其莖梗枯燥黒白色二月於梗上止發五六葉耳花單瓣五月結子黒色類母丁香根黄白色可五七寸長如筆管大二月八月采根陰乾本草綱目曰牡丹以色丹者爲上雖結子而根上生苗故謂之牡丹

牡丹根皮氣味辛寒無毒

主治寒熱中風瘛瘲驚癇邪氣除癥堅瘀血留舍腸胃安五藏療癰瘡○除時氣頭痛客熱五勞勞氣頭腰痛風噤癲疾○久服輕身益壽○治冷氣散諸痛女子經脉不通血瀝腰痛○通關腠血脉排膿消撲損瘀血續筋骨除風痺治胎下胞

産後一切冷熱血氣○治神志不足無汗骨蒸衄血吐血○和血凉血治血中伏火除煩熱

牡丹

本經中品



入藥用牡丹皮乃根上皮非枝幹上皮

此花一名木芍藥近世人多貴重圃人欲其花之詭異皆秋冬移接培以糞土至春盛開其狀百變故其根性殊失本真此品入藥絕無力也

修治采山中單葉紅花牡丹根以銅刀破之去骨酒洗淨細剉日乾用

好古曰氣寒味苦辛陰中微陽入手厥陰足少陰經之才曰畏貝母大黃兔絲子大明曰忌蒜胡荽伏砒

千金方治癩疝偏墜氣脹不能動者牡丹皮防風等分為末酒服二錢甚効

肘後方治下部生瘡已決洞者服牡丹皮末方寸匕日三湯服

荆三稜

生荆楚地。故名荆三稜。以著其地。開寶本草作京非也。今江淮濟南河陝間皆有之。多生淺水傍及陂澤中。春生苗。葉似莎草極長。莖三稜如削。大如大指。高五六尺。莖端開花。大體如莎草而大。黃紫色。霜降後採根。削去皮鬚。暴乾。荆三稜、狀如鯽魚黄白體重。黑三稜、色若烏梅。輕鬆去皮則白。草三稜、形如雞爪屈曲。根上生根。一名雞爪三稜。石三稜色黃。堅硬如石。種雖有四。葉並三稜。故名三稜。

三稜氣味苦平無毒

主治老癖癥瘕積聚結塊産後惡血血結通月水墮胎止痛利氣○治氣脹破積氣消撲損瘀血婦人血脉不調心腹痛産後腹痛血運○心膈痛飲食不消○通肝經積血治瘡腫堅硬○下乳汁

三稜宋開寶

二月八月采根

荆三稜



黑三稜



草三稜



石三稜



修治三稜醋浸切炒或以醋煮熟焙乾入藥乃良亦有以火炮熟用者

元素曰苦甘陰中之陽能瀉真氣真氣虛者勿用

志曰俗傳昔人患癥癖死遺言令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色以為異物削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知此藥可療癥癖也

薑黃

今江廣蜀川多有之。葉青綠。長一二尺許。闊三四寸。有斜文如紅蕉葉而小。花紅白色。至中秋漸凋。春末方生。其花先生。次方生葉。不結實。根盤屈黃色。類生薑而圓。有節。故名薑黃。

氣味辛苦大寒無毒藏器曰性熱不冷

主治心腹結積疰忤下氣破血除風熱消癰腫功力烈於鬱金治癥瘕血塊通月經治撲損瘀血止暴風痛冷氣下食○祛邪辟惡治氣脹産後敗血攻心○治風痺臂痛

薑黃唐本草


片子薑黃形極似乾薑肉色黃

八月采根晒乾

陳藏器曰薑黃真者是經種三年以上老薑能生花花在根際一如蘘荷根節堅硬氣味辛辣種薑處有之近時以扁如乾薑形者為片子薑黃可浸水染色

雷公云切片油炒

千金翼治瘡癬初生或始痛痒以薑黃末傅之妙

集解始出波斯國。番語也。今嶺南有之。多生竹林內。正月發苗作叢。高三四尺。其莖如筋。葉青圓闊二三寸。如桑面光而厚。三月開花。白色在表。七月結子。如小指大。長二寸已来。黑色類椹子。九月收採灰殺暴乾。陳藏器本草作畢勃沒。扶南傳作逼撥。大明會典作畢發。李時珍本草曰華撥當作蓽茇。

華撥氣味辛大溫無毒

主治溫中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃冷陰疝癖○霍亂冷氣心痛血氣○水瀉虛痢嘔逆醋心產後洩痢與阿魏和合良得訶子人參桂心乾薑治臟腑虛冷腸鳴神效○治頭痛鼻淵牙痛

然辛熱耗散能動脾肺之火多用令人目昏·

華撥宋開寶


上乃子形

缺華撥市有以芥子造者

修治去挺以醋浸一宿焙乾用

華撥氣熱味辛陽也浮也入手足陽明經

唐太宗實錄云貞觀中上以氣痢久未痊服它名醫藥不應因詔訪求其方有衛士進黃牛乳煎華撥法御用有效劉禹錫亦記其事云後累試年長而虛冷者必效

集解今廣南江西州郡亦有之。然不及蜀中者佳。四月初生苗。似薑黃。花白質紅。末秋出莖。心無實。根銳圓有橫紋如蟬腹狀。色黃赤類金。始產鬱林郡。故名鬱金。

氣味辛苦寒無毒

主治血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡○單用治女人宿血氣心痛冷氣結聚溫醋摩傳之亦治馬脹○涼心○治陽毒入胃下血頻痛○治血氣心腹痛產後敗血衝心欲死失心顛狂蠱毒○入藥剉用

鬱金唐本草


形類莪朮

大小不常

色黃類金

根如蟬腹有節皮黃肉赤者真

鬱金薑黃二藥原不同種鬱金味苦寒色赤類蟬肚薑黃味辛溫色黃似薑爪亦有似薑塊者鬱金甚少薑黃甚多今市家惟取多者欺人謂原是一物指大者為薑黃小者為鬱金則一種之藥大小不齊者多矣何嘗因其異形而便異其名也夫何俗醫不味諸本草蟬肚之語而亦以薑黃之小者為鬱金獨何歟

元素曰氣味俱厚純陰

袖珍方治產後血氣上衝心痛鬱金燒灰為末二錢米醋調灌甦

可浸水染衣

[illegible]今出茅山西上龍洞種之。每年寒露後栽。立春後生苗。葉如竹葉。高三寸許。根叢生。如半夏。色黃。立夏掘取。始生胡地。玄言其色也。索言其苗交紐也。後避宋真宗諱。改玄為延也。今呼為延胡索。

氣味辛溫無毒

主治破血婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後諸血病血運暴血衝上因損下血煑酒或酒磨服○除風治氣暖腰膝止暴腰痛破癥癖撲損瘀血落胎○治心氣小腹痛有效散氣治腎氣通經絡○活血利氣止痛通小便

玄胡索
宋開寶



修治以茅山者為勝炒過咀片入劑
好古曰苦辛溫純陽浮也入手足太陰經
聖惠方治產後穢污不盡腹滿方延胡索杵為末和酒服一錢立止　心痛亦酒服

草豆蔻始生南海今嶺南皆有之苗似蘆葉似山薑杜若輩根似高良薑花作穗嫩葉卷之而生初如芙蓉穗頭深紅色葉漸展花漸出而色漸淡亦有黃白色者實若龍眼而無鱗甲中如石榴子候熟採之暴乾按楊椎方言云凡物盛多曰寇豆蔻之名或取此義豆象形也

草豆蔻氣味辛溫濇無毒

主治溫中心腹痛嘔吐去口臭氣○下氣止霍亂一切冷氣消酒毒○調中補胃健脾消食去客寒心與胃痛○治瘴癘寒瘧傷暑吐下洩痢噎膈反胃痞滿吐酸痰飲積聚婦人惡阻帶下除寒燥濕開鬱破氣殺魚肉毒制丹砂

草豆蔻
別錄上品



自果部移入此

修治以麪裹煻火煨熟去麪用
好古曰大辛熱陽也浮也入足太陰陽明經
千金方治心腹脹滿短氣以草豆蔻一兩為末以木瓜生薑湯下半錢

肉豆蔻始生胡國胡名迦拘勒今惟嶺南人家種之春生苗花實似草豆蔻而圓小皮紫緊薄中肉辛辣衍義曰肉豆蔻對草豆蔻言之

肉豆蔻氣味辛溫無毒

主治溫中消食止洩治積冷心腹脹痛霍亂中惡鬼氣冷疰嘔沫冷氣小兒乳霍○調中下氣開胃解酒毒消皮外絡下氣○治宿食痰飲止小兒吐逆不下乳腹痛○主心腹蟲痛脾胃虛冷氣併冷熱虛洩赤白痢研末粥飲服之○暖脾胃固大腸　肉油色者佳

肉豆蔻
宋開寶

一名肉果



外有皺紋內有斑纈紋如檳榔紋

修治以麪裹於煻火中煨熟去麪用勿令犯銅　入手足陽明經
普濟方治霍亂吐利肉豆蔻煨為末薑湯服一錢　肉豆蔻若

補骨脂始生廣南諸州及波斯國今嶺外山坂間多有之不及蕃舶上來者佳莖高三四尺葉似薄荷花微紫色實如麻子圓扁而黑九月採胡人呼為婆固脂而俗訛為破故紙也名為補骨脂者言其功也

補骨脂氣味辛大溫無毒

主治五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦人血氣墮胎

男子腰疼膝冷囊濕逐諸冷痺頑止小便腹中冷○興陽事

明耳目○治腎泄通命門煖丹田歛精神

補骨脂即破故紙



色黑



氣香　類茴麻子

修治酒浸一宿漉出日乾炒用一法以塩同炒過日乾用

日華子云南蕃者色赤廣南者色綠

破故紙今人多以胡桃合服此法出於唐鄭相國自叙云予為南海節度年七十有五越地卑濕傷於內外衆疾俱作陽事衰絕服乳石補益之藥百端不應元和七年訶陵國舶主李摩訶知予病狀遂傳此方并藥予初疑而未服摩訶稽首固請遂服之經七八日而覺應驗自爾常服其功神驗十年二月罷郡歸京錄方傳之破故紙十兩淨擇去皮洗過擣篩令細用胡桃瓤三十兩湯浸去皮細研如泥即入前末更以好蜜和攪令勻如飴糖盛於瓷器中旦日以暖酒二合調藥一匙服之便以飲壓如不飲酒人以煖熟水調亦可服彌久則延年益氣悅心明目補添筋骨但禁食芸薹羊血餘無忌

（經驗方治腰疼神妙用破故紙為末溫酒下三錢　嬰童百問治小兒遺尿破故紙炒為末每夜熱湯服五分）

縮砂蔤

始生西海及西戎波斯諸國今惟嶺南山澤間有之苗莖似高良薑高三四尺葉青長八九寸闊半寸已來三月四月開花近根處五六月成實五七十枚作一穗狀似白豆蔻殼有粟文細刺黃赤色殼內細子一團八漏可四十餘粒如黍米大微黑色八月採此物實在根下皮緊厚縮皺仁類砂粒密藏殼內故名縮砂蔤也俗呼砂仁

氣味辛溫澁無毒

主治虛勞冷瀉宿食不消赤白泄痢腹中虛痛下氣○主冷氣

痛止休息氣痢勞損消化水穀溫煖肝腎○上氣欬嗽奔豚鬼疰驚癇邪氣一切氣霍亂轉筋能起酒香味○和中行氣止痛安胎○治脾胃氣結滯不散○補肺醒脾養胃益腎理元氣通滯氣散寒飲脹痞噎膈嘔吐止女子崩中除咽喉口齒浮熱化銅鐵骨哽

縮砂蔤　宋開寶

連殼縮砂蔤形



去殼縮砂蔤形



味辛　氣香

修治去殼取仁慢火炒熟杵碎入藥　煑酒及調食味多用

珣曰得訶子豆蔻白蕪荑鼈甲良

陽也浮也入手足太陰足少陰七經

孫尚藥治婦人姙娠偶因所觸或墜高傷打致胎動不安腹痛不可忍者縮砂蔤不計多少熨斗內盛慢火炒令熱透去皮用仁擣羅為末每服二錢用熱酒調下須臾覺胎動處極熱即胎已安神效

縮砂蔤君

蓬莪茂

始生西戎及廣南諸州今江浙或有之三月生苗在田野中其莖如錢大高二三尺葉青白色長一二尺大五寸已來頗類蘘荷五月有花作穗黃色頭微紫根如生薑而茂在根下似雞鴨卵大小不常九月採削去麄皮蒸熟暴乾用一名蓬蒁俗呼蓬术亦呼我术　茂音述

氣味苦辛溫無毒

主治心痛腹痛中惡疰忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒飲食不消酒研服之久療婦人血氣丈夫奔豚○破痃癖冷氣以酒醋磨服○治一切氣開胃消食通月經消瘀血止損折痛下血及內損惡血○通肝經聚血

得醋良

蓬莪茂
宋開寶



九月
採根

修治以醋炒或煑熟用取其引入血分也頌曰此物堅硬難擣治用時熱灰火中煨令透乘熱擣之即碎如粉

保幼大全治初生小兒吐乳不止蓬莪茂少許塩一綠豆大以乳一合煎三五沸去滓入牛黃兩粟大服之甚效也

白前今蜀中及淮浙州郡皆有之。苗似細辛而大。色白易折。亦有似柳。或似芫花苗者。並高尺許。生洲渚沙積之上。根白色長於白微。苗生於白微之前。故名白前。

白前氣味甘微溫無毒主治胸脇逆氣欬嗽上氣呼吸欲絕

主一切氣肺氣煩悶賁豚腎氣　降氣下痰



別錄
中品

二月八月採根陰乾根比白微麤長而脆

修治白前先用甘草水浸一伏時後漉出去頭鬚了焙乾任用（本草蒙筌曰似牛膝粗長堅直易斷者白前也似牛膝短小柔軟能彎者白微也以此別之不致差誤）

白藥始出原州。今夔施江西嶺南亦有之。三月生苗。葉似苦苣。四月抽赤莖。長似壺盧蔓。六月開白花。八月結子。九月采根。以水洗切碎暴乾。色白。堪爲治馬肺熱之藥。故名白藥。俗呼白藥子。

氣味辛溫無毒○主治金瘡生肌○消腫毒喉痺消痰止嗽治渴并吐血○治喉中熱塞不通咽中常痛腫○解野葛生金巴豆藥毒刀斧折傷乾末傅之能止血痛

白藥唐本草即白藥子今治馬用最多市買者皆片子類天花粉堅實而小



九月
枝折
採根
日乾

葒草即水紅也。生水傍。今所在下濕地皆有之。似蓼而葉大。赤白色。高丈餘。花作穗。紅色。故名葒草。詩云隰有遊龍是也。

實氣味鹹微寒無毒主治消渴去熱明目益氣

花散血消積止痛

葒草別錄中品

陳藏器云作湯浸水氣惡瘡腫佳

唐本注云有毛花紅白除惡瘡腫脚氣煑濃汁漬之多差



修治子或炒或爲末隨方甚不可用蓼實

莎草根即香附子也。生田野。交州者大如棗。近道者如杏仁許。莖葉都似三稜。根若附子。周匝多毛而香。故名香附子。今近道生者。苗葉如薤而瘦。根如筯頭大。二月八月采根。本草綱目云。

其根相附連續而生可以合香故謂之香附子其草可爲笠及雨衣踈而不沾故字從草從沙上古謂之雀頭香按江表傳云魏文帝遣使于吳求雀頭香即此其葉似三稜及巴戟而生下濕地故圖經一名水三稜一名水巴戟金光明經謂之目萃哆記事珠謂之抱靈居士

根氣味甘微寒無毒

主治除胸中熱充皮毛久服令人益氣長鬚眉○治心腹中客熱膀胱間連脇下氣妨常日憂愁不樂心忪少氣○治一切氣霍亂吐瀉腹痛腎氣膀胱冷氣○散時氣寒疫利三焦解六鬱消飲食積聚痰痞滿胕腫腹脹脚氣止心腹肢體頭目齒耳諸痛癰疽瘡瘍吐血下血尿血婦人帶下月候不調胎前產後百病

苗及花主治丈夫心肺中虛風及客熱膀胱連脇下時有氣妨皮膚瘙痒癮瘮飲食不多日漸瘦常有憂愁心忪少氣等證並收苗花二十餘斤剉細以水二石五斗煑一石五斗斛中浸浴令汗出五六度其瘙痒即止四時常用癮瘮風永除煎飲散氣鬱利胷膈降痰熱

莎草別録中品

凡采得莎草根陰乾於石臼中搗之切忌鐵器

修治莎草根或生或炒或酒或醋塩水薑汁童便浸諸法各從本方


莖三稜
花紫色
葉堪作飲
根名香附子

氣厚於味陽中之陰血中之氣藥也

經驗方治酒腫虛腫香附子擣淨米醋煑乾焙研為末米醋糊丸服久之敗水從小便出神效

袖珍方治蜈蚣咬傷嚼香附塗之立效

蓽澄茄始生佛誓國今廣州亦有之春夏生葉青滑可愛結實似梧桐子及蔓荊子微大八月九月採之一名毗陵茄子皆番語也

氣味辛溫無毒主治下氣消食去皮膚風心腹間氣脹令人能食療鬼氣能染髮及香身○治一切冷氣痰澼并霍亂吐瀉肚腹痛腎氣膀胱冷煖脾胃止嘔吐噦逆



珣曰胡椒生南海諸國向陰者為澄茄向陽者為胡椒按廣志云生諸海國嫩胡椒也青時就樹採摘造之柄粗而蔕圓是也

修治去柄酒浸晒乾杵碎用

壽域神方華澄茄白豆蔻等分為漢乾甜之治噎食不納效

胡椒始出摩伽陁國呼爲昧履支今南番諸國及交趾滇南海南諸地皆有之其苗蔓生莖極柔弱葉長寸半有細條與葉齊其條上結子兩兩相對其葉晨開暮合合則裹其子于葉中形似漢椒至辛辣故得椒名

胡椒色深多皺澄茄色淺皺少

胡椒氣味辛大溫無毒主治下氣溫中去痰除臟腑中風冷去胃口虛冷氣宿食不消霍亂氣逆心腹卒痛冷氣上衝調五臟壯腎氣治冷痢殺一切魚肉鼈蕈毒去胃寒吐水大腸寒滑暖腸胃除寒濕反胃虛脹冷積陰毒牙齒浮熱作痛

胡椒唐本草木部移入此


色黑皮皺味辣
六月采今食料用

胡椒辛熱純陽走氣助火昏目發瘡多食損肺傷脾令人吐血

孟詵食療治心腹冷痛胡椒三七枚清酒吞之或云一歲一粒

胡黃連

始生胡國。呼爲割孤露澤。今南海及秦隴間亦有之。初生似蘆。乾似楊柳枯枝。心黑外黃。不拘時月收採。其性味功用似黃連。故名胡黃連。

胡黃連氣味苦平無毒主治補肝膽明目治骨蒸勞熱三消五心煩熱婦人胎蒸虛驚冷熱泄痢五痔厚腸胃益顏色浸人乳汁點目甚良治久痢成疳小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢傷寒欬嗽溫瘧理腰腎去陰汗去果子積惡菊花玄參白鮮皮解巴豆之毒



皮黃白亦有蒼黑者肉有白點類梅花

胡黃連　宋開寶

折之塵出如烟者真肉似鸜鵒眼者良

濟急仙方治嬰兒赤目茶調胡黃連末塗手足心即愈

鱧腸

即蓮子草也。生下濕地。所在坑渠間多有。苗似旋覆。開花細而白。其實若小蓮房。俗謂之旱蓮草。鱧烏魚也。其腸亦烏。此草莖斷之有墨汁出。故名鱧腸。

鱧腸氣味甘酸平無毒主治血痢鍼灸瘡發洪血不可止者傳之立已汁塗髮眉生速而繁○烏髭髮益腎陰○止血排膿通小腸傳一切瘡并蠶瘑○青點鼻中添腦

一名墨煙草一名墨菜



旱蓮草　唐本草

六月采揀青嫩無泥土者不用洗摘去黃葉用

使君子

始生交廣等州。今嶺南州郡皆有之。生田野中及水岸。其葉青。如兩指頭。長二寸。其莖作藤。如手指。三月生花。淡紅色。久乃深紅。有五瓣。七八月結子。形如梔子。稜瓣深而兩頭尖。亦似訶梨勒而輕。俗傳始因潘州郭使君療小兒多是獨用此物。後來醫家因號爲使君子也。

使君子氣味甘溫無毒主治小兒五疳小便白濁殺蟲療瀉痢○健脾胃除虛熱治小兒百病瘡癬

修治去殼取仁然仁絕小難得今醫家或兼用殼



皮黑仁白

使君子亦治小兒頭面陰囊虛腫用仁五錢蜜五錢炙盡爲末每食後米湯調服一錢

白豆蔻

始出伽古羅國。今廣州宜州亦有之。不及番舶者佳。苗類芭蕉。葉似杜若。長八九尺而光滑。冬夏不凋。花淺黃色。子作朶如葡萄。生青熟白。七月採。殼內子如豆。一團三四十粒。似草豆蔻。故名白豆蔻。

氣味辛大溫無毒主治積冷氣止吐逆反胃消穀下氣○散肺中滯氣寬膈進食去白睛翳膜○補肺氣益脾胃理元氣收脫氣○治噎膈除瘧疾寒熱解酒毒

白豆蔻　宋開寶



殼白

仁似砂仁

修治去殼取仁炒用味薄氣厚浮而升陽也入手太陰經

本草原始卷之二

本草原始卷之三

草部下

附子　烏頭（川烏草烏射罔）　烏喙　天雄
半夏　大黃　萆薢　桔梗
旋覆花　藜蘆　射干　常山　甘遂
白歛　青葙子　白及　大戟　貫仲
土茯苓　何首烏　商陸　威靈仙　牽牛子（黑白二種）
蓖麻子　天南星　萹蓄　狼毒　豨薟
馬鞭草　仙茅　劉寄奴草　骨碎補　續隨子
山豆根　馬兜鈴（青木香）　鶴虱　白附子　蚤休
胡盧巴　木賊　穀精草　夏枯草　鴨跖草
山慈菰　燈心草　水蓼　海金沙　雞冠
鎖陽　三七　甘松香　藿香　青蒿
蜀葵（紅白二種）　地丁　白頭翁　鳳仙　曼陀羅花
芫花　覆盆子　番木鱉　黃藥子　墓頭回
白龍鬚　草果　大茴香　兩頭尖　通脫木
罌子粟（阿芙蓉）　忍冬　南藤　清風藤　釣藤

草部下七十五種附名者六種

本草原始卷之三

雍丘正宇李中立纂輯並書畫

草部下

附子始生犍爲山谷及廣漢。今出蜀土。其根彷彿山芋。皮黑體圓底平。以八月上旬采。八角者良。一箇重一两者。氣全堪用。附烏頭而生。如子附母。故名附子。別有一種白附子而小。故俗呼此爲黑附子。亦呼大附子。

氣味辛溫有大毒

主治風寒欬逆邪氣寒濕踒躄拘攣膝痛不能行步破癥堅積聚血瘕金瘡○腰脊風寒脚氣冷弱心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白溫中強陰堅肌骨又墮胎爲百藥長○溫煖脾胃除脾濕腎寒下焦之陽虛○除臟腑沉寒三陽厥逆濕淫腹痛胃寒蚘動治經閉補虛散壅○督脉爲病脊強而厥○治三陰傷寒陰毒寒疝中寒中風痰厥小兒慢驚風濕痺腫滿頭風頭痛暴瀉脫陽久痢寒瘧嘔逆反胃療耳聾

附子本經下品

古方多用八角者

八角附子



今人多用九角者



市者有以鹽水浸之取其體重買者當以體乾堅實頂圓正底平者為良

修治附子生用則發散熟用則峻補生用去皮臍熟用以水浸過炮令皴折去皮臍切片炒黃色去火毒用

附子並下條烏頭烏喙天雄側子只是一種初採鮮時色黑後

經造釀色白釀之法先於六月內踏造大小麴麴未采前半月用大麥煑成粥以麴造醋候熟去糟其醋不用大酸酸則以水解之將附子去根鬚於新甕內淹七日每日攪一遍撈出以疎篩攤之令生白衣乃向慢風日中晒之百十日以透乾為度若猛日則皺而皮不附肉

元素曰附子大辛大熱氣厚味薄可升可降陽中之陰浮中沉無所不至為諸經引用之藥

地膽為之使惡蜈蚣畏防風黑豆甘草人參黄耆烏韭

孫兆口訣云若陰盛傷寒其人必燥熱而不欲飲水者是也宜服霹靂散附子一枚燒為灰存性為末蜜水調下一服而愈此逼散寒氣然後熱氣上行而汗出乃愈

烏頭係附子之正根。春時採。因有腦。似烏鳥之頭。故名烏頭。

氣味辛溫別錄曰甘大熱有大毒

主治中風惡風洗洗出汗除寒濕痺上氣破積聚寒熱○消胷

上痰冷不下心腹冷疾臍間痛肩胛痛不可俛仰目中痛不可久視又墮胎其汁煎之名

射罔味苦有大毒療尸疰癥堅及頭中風痺痛殺禽獸

烏頭本經下品

烏頭乃歪頂之附子也鮮時色黑經製過晒乾則色白







烏頭始生朗陵山谷今出蜀地市昔烏頭烏喙天雄附子混賣要知元種者母為烏頭傍出者為附子其長二三寸者為天雄兩岐相合者為烏喙附子小者為側子實五物而一種也今用側子者甚稀烏頭今呼為川烏頭亦呼川烏世用烏頭並用似草烏無蘆有臍先黑而小者不見用歪頂之附子也

莽草為之使反半夏栝樓貝母白斂白及惡藜蘆忌豉汁

千金方治耳鳴如流水聲耳癢及風聲不治久成聾生烏頭一味掘得承濕削如棗核大塞耳旦易夜易不三日愈使

又有一種野生者根苗花實並與川烏頭相同又無釀造之法其根外黑內白有蘆皮皺而枯燥為異耳然毒則甚焉名

草烏頭俗呼草烏治風濕麻痺疼痛發破傷風汗功同烏頭

烏頭本經下品

草烏頭處處有之





修治草烏頭或生或炮或薑汁炒或烏大豆同煑熟去其毒用中其毒者黑豆冷水能解之

烏喙始生朗陵山谷。今出蜀土。係兩岐之烏頭也。喙乃烏之口。此藥兩岐相合。如烏之口。故名烏喙。

氣味辛微溫有大毒

主治風濕丈夫腎濕陰囊痒寒熱歷節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎○治男子腎氣衰弱陰汗主療風濕邪痛治

寒熱癰腫歲月不消者　主大風頑痺

烏喙本經下品




釀造過則色白
二月八月採根

修治烏喙火炮去皮臍用　畏惡同烏頭

烏喙江東人呼為堇晉驪姬譖申生寘堇于肉者是也唐武后置堇于食賀氏食之暴死蘇秦曰人之饑所以不食烏喙者以其雖偷充腹而與死同患也可見烏喙廼至毒之物也

天雄始生少室山谷。今出蜀土。乃種附子而生出。或變出其形長而不生子。故曰天雄。

氣味辛溫有大毒

主治大風寒濕痺歷節痛拘攣緩急破積聚邪氣金瘡強筋骨

輕身健行。○療頭面風去來疼痛心腹結聚關節重不能行步除骨間痛長陰氣強志令人武勇作不倦○治風痰冷痺軟腳毒風能止氣喘促急殺禽蟲毒○治一切風一切氣助陽道暖水臟補腰膝益精明目通九竅利皮膚調血脈四肢不遂下胸膈水破痃癖癰結排膿止痛續骨消瘀血背脊傴僂霍亂轉筋發汗止陰汗炮食治喉痺

天雄本經下品



修治　天雄宜炮破去皮尖底用　權曰大熱宜乾薑制之之才曰遠志為之使惡腐婢忌豉汁　天雄君

側子　本經載烏頭、烏喙。生朗陵山谷。天雄、生少室山谷。附子、側子、生犍爲山谷及廣漢。今並出蜀土。然烏、喙、椎、附、側、同根。而本經分生三處者。各有所宜故也。其苗高三四尺以來。莖作四稜。葉如艾。花紫碧色。作穗。實小子黑色。如桑椹。號曰木鼈子。服之令人喪目。其根狀如棗核。生于附子之側。故名側子。

氣味辛大熱有大毒

主治癰腫風痺歷節腰腳疼冷寒熱鼠瘻又墮胎○療腳氣冷風濕痺大風筋骨攣急○冷酒調服治遍身風瘮神妙

側子別錄下品



側子修治同附子畏惡同附子

半夏　始生槐里山谷。今在處有之。以齊州者爲佳。二月生苗一莖。莖端三葉而光。頗似竹葉。淺綠色。江南者似芍藥葉。根下相

重生。上大下小。皮黃肉白。八月採根。以灰裛二日。湯洗暴乾。禮記月令五月半夏生。蓋當夏之半也。故名半夏。

氣味辛平有毒

主治傷寒寒熱心下堅胸脹欬逆頭眩咽喉腫痛腸鳴下氣上汗○消心腹胸膈痰熱滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫療痿黃悅澤面目墮胎○消痰下肺氣開胃健脾止嘔吐去胸中痰滿生者摩癰腫除瘤癭氣○治吐食反胃霍亂轉筋腸腹冷痰痺○治寒痰及形寒飲冷傷肺而欬消胷中痞膈上痰除胷寒和胃氣燥濕治痰厥頭痛消腫散結○治眉稜骨痛○補肝風虛

半夏本經下品



修治半夏以滾湯泡二三日每日換湯後以皂角白礬生薑煮過待冷以清水洗淨切片晒乾任用生戟人喉半夏研末以薑汁白礬湯和作餅子楮葉包置籃中待生黃衣日乾用謂之**半夏麴**主治同半夏但力柔耳

元素曰半夏味辛苦性溫氣味俱薄沉而降陰中陽也

射干柴胡為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

忌羊血海藻飴糖

凡採得半夏當以灰裛二日湯洗暴乾

治五絕一曰自縊二曰墻壁壓三曰溺水四曰魘魅五曰產乳凡五絕皆以半夏一兩搗羅為末丸如大豆內鼻孔中愈心溫者一日可治　丸半夏末以冷水和丸　半夏使

大黃　始生河西山谷及隴西。今蜀川河東陝西州郡皆有之。以蜀川錦紋者佳。其次秦隴來者。謂之土番大黃。正月內生青葉

似萆麻。大者如扇。根如芋。大者如椀。長一二尺。其細根如牛蒡。小者亦如芋。四月開黃花。亦有青紅似蕎麥花者。莖青紫色。形如竹。二月八月采根。去黑皮。火乾。蜀大黃乃作緊片如牛舌形。謂之牛舌大黃。二者功用相等。江淮出者。曰土大黃。二月開花結細實。鼎州出一種羊蹄大黃。治疥瘙甚效。初生苗葉如羊蹄累年長大。即葉似商陸而狹長。四月內抽條出穗。五七莖相合。花葉同色。結實如蕎麥而輕小。五月熟。即黃色。呼爲金蕎麥。九月採根。破之亦有錦文。亦呼爲土大黃。俗呼山大黃。弘景曰。大

黃其色也。杲曰。推陳致新。如戡定禍亂以致太平。所以有將軍之號。

氣味苦寒無毒○主治下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五臟○平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹痛諸老血留結○通經利水腫大小腸貼熱腫毒小兒寒熱時疾煩熱蝕膿○瀉諸實熱不通除下焦濕熱消宿食瀉心下痞滿



大黃本經下品

今人以莊浪出者爲優莊浪即古涇原隴西地

修治大黃用文如水旋斑緊重者酒浸透蒸九遍剉片曬乾用

藏器曰凡用有蒸有生有熟不得一槩用之

大黃塊大難乾作時燒石熱橫寸截著石上煿之一日微燥乃以樹枝條或繩穿眼繫之至乾故大黃有穿眼也山大黃塊小無穿眼堪爲末傳腫毒染房家亦多用之

別錄曰大黃大寒

元素曰氣味俱厚沉而降陰也酒浸入太陽經酒洗入陽明經餘經不用酒

黃芩爲之使忌冷水惡乾漆○凡胃寒血虛并妊娠產後並勿輕用

日華子云通宣一切氣調血脉利關節泄壅滯水氣四肢冷熱不調溫瘴熱疾利大小便并傅一切瘡癤癰毒

梅師方治卒外腎偏腫疼痛大黃爲末和醋塗之乾即易之

大黃使

[illegible]始生藁城平澤及田野今京東陝西河北州郡皆有之曹

州者尤勝。初春生苗。似薺菜。高六七寸。根白。枝莖俱青。花黃。結角。子黃細。立夏後採實。暴乾。月令孟夏之月。靡草死。即此也。醫學入門曰。葶、定也。藶、瀝也。行也。能定肺喘而行水。故名葶藶。

葶藶子氣味辛寒無毒主治癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道○下膀胱水伏留熱氣皮間邪水上出面目浮腫身暴中風熱疿癢利小腹久服令人虛○療肺壅上氣欬嗽止喘促除胸中痰飲○通月經



葶藶　本經下品

修治以糯米相合於熯上微焙待米熟去米搗用

宗奭曰葶藶有甜苦二種其形則一也經既言味辛苦即甜者不復更入藥也大槩治體皆以行水走泄為用故曰久服令人虛蓋取苦泄之義藥性論不當言味酸

別錄曰苦大寒　杲曰沉也陰中陽也

榆皮為之使得酒良惡白殭蠶石龍芮宜大棗

河東裴氏傳經効治水腫及暴腫葶藶三兩杵六千下令如泥即下漢防己末四兩取綠頭鴨就藥臼中截頭瀝血于臼中血盡和鴨頭更搗五千下丸如梧桐子患甚者空腹白湯下十丸輕者五丸頻服五日止此藥利小便有効如神　臣

桔梗始生嵩高山谷及寃句。今在處有之。根如指大。黃白色。春生苗。莖高尺餘。葉似杏葉而長。隨四葉相對而生。嫩時亦可煑食。夏開小花紫碧色。頗似牽牛花。秋後結子。二月八月採根暴乾。此草之根。結實而梗直。故名桔梗。

氣味辛微溫有小毒

主治胷脇痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣○利五臟腸胃補血氣除寒熱風痺溫中消穀療咽喉下蠱毒○治下痢破血積氣消聚痰涎去肺熱氣促嗽逆除腹中冷痛主中惡及小兒驚癇○下一切氣止霍亂轉筋心腹脹痛補五勞養氣除邪辟溫破癥瘕肺癰養血排膿補內漏及喉痺○利竅除肺部風熱清利頭目咽嗌胷膈滯氣及痛除鼻塞○治寒嘔主口舌生瘡赤目腫痛



桔梗　本經下品　根直色白有心

修治去頭上尖硬二三分已來米泔水浸一宿切片微炒用

節皮為之使畏白及龍膽草忌猪肉

好古曰桔梗氣微溫味苦辛味厚氣輕陽中之陰升也入手太陰肺經氣分及足少陰經

初虞古今錄驗治中蠱下血如雞肝晝夜出血石餘四臟皆損惟心未毀或鼻破將死者苦桔梗為末以酒服方寸匕三服不能下藥以物拘口灌之心中當煩須臾自定七日止當食猪肺肝補之神良一方加犀角等分

桔梗臣

莨菪子始生海濱川谷及雍州。今處處有之。苗莖高二三尺。葉似地黃王不留行紅藍等而三指闊。四月開花紫色。苗莢莖有白毛。五月結實有殼作罌子。狀如小石榴。房中子至細青白色。如米粒。五月採子陰乾。其子服之令人狂浪放蕩。故名莨菪子。

一名天仙子。因治牙痛獲效。俗呼牙疼子。

氣味苦寒有毒

主治齒痛出蟲肉痺拘急久服輕身使人健行走及奔馬強志益力通神見鬼多食令人狂走○療癲狂風癇顛倒拘攣○安心定志聰明耳目除邪逐風變白主痃癖取子洗晒隔日空腹水下一指捻亦可小便浸令泣盡暴乾如上服勿令子破破則令人發狂○炒焦研末治下部脫肛止冷痢主蛀牙痛咬之蟲出○燒熏蟲牙及洗陰汗

莨菪子　本經下品

修治莨菪子十兩以頭醋一鎰煑乾為度却用黃牛乳浸一宿至明日乳汁黑即是真者晒乾搗重篩用之



子小而扁青白色誤服之衝人心大煩悶眼生暹火

中莨菪子毒綠豆汁井草升麻犀角並能解之
李時珍曰莨菪之功未見如其說而其毒有甚焉煮一二日而
芽尤生其為物可知矣莨菪雲實防葵赤商陸皆能令人狂
惑見鬼者昔人未有發其義者蓋此類皆有毒能使痰迷心
竅蔽其神明以亂其視聽故耳唐安祿山誘奚契冊飲以莨
菪酒醉而坑之又嘉靖四十三年二月陝西遊僧武如香挾
妖術至昌黎縣民張柱家見其妻美設飯間呼其全家同坐
將紅散入飯內食之少頃舉家昏迷任其奸汚復將魘法吹
入柱耳中柱發狂惑見舉家皆是妖鬼盡行殺死凡一十六
人並無血迹官司執柱囚之十餘日柱吐痰二梲許問其故
乃知所殺者皆其父母兄嫂妻子姊姪也柱與如香皆論死
世
宗肅皇帝命榜示天下觀此妖藥亦是莨菪之流爾方其
迷之時視人皆鬼矣解之之法可不知乎
必
效方治牙齒宣落風痛莨菪子末綿裹咬之有汁勿嚥

旋覆花

始生平澤川谷。今所在有之。二月已後生苗。多近水傍。高一二尺已來。葉如柳。莖細。六月開花如菊花。小銅錢大。深黃色。俗呼六月菊。本草綱目名夏菊。上黨田野人呼為金錢花。本經載名金沸草。皆因花狀而名也。爾雅云。蕧。盜庚也。蓋庚者。金也。謂其夏開黃花。盜竊金氣也。宗奭曰。花緣繁茂。圓而覆下。故曰旋覆花。

氣味鹹溫有小毒○主治結氣脇下滿驚悸除水去五臟間寒熱補中下氣○消胸上痰結唾如膠漆心胸痰水膀胱留飲風氣濕痺皮間死肉目中眵䁾利大腸通血脈益色澤○主水腫逐大腹開胃止嘔逆不下食行痰水去頭目風



修治旋覆花去裹花蘂殼皮并蔕子蒸之曬乾任用
別錄曰甘微溫冷利大明曰無毒
經驗方治中風壅滯旋覆花洗净焙研煉蜜丸梧桐子大夜臥
以茶湯下五丸至七丸十丸

藜蘆

始生太山山谷。今所在山谷皆有之。三月生苗。葉似初出椶心。又似車前。莖似葱白。青紫色。高五六寸。上有黑皮裹莖。似椶皮。有花肉紅色。根似馬腸根。長四五寸許。黃白色。二月三月採根陰乾。本草綱目曰。黑色曰黎。其蘆有黑皮裹之。故名藜蘆。根際似葱。故別錄一名山葱。一名葱菼。本經名葱苒。吳普本草名葱葵。北人謂之憨葱。均人謂之鹿葱。俗名葱管藜蘆。

藜蘆氣味辛寒有毒
主治蠱毒欬逆洩痢腸澼頭瘍疥瘙惡瘡殺諸蟲毒去死肌○
療噦逆喉痺不通鼻中息肉馬刀爛瘡不入湯用○主上氣
○去積年膿血泄痢○吐上膈風涎暗風癇病小兒鰕齁痰疾
○末治馬疥癬

藜蘆
本經
下品


下截極似葱
外黑皮似棕

俗謂之蒜藜蘆

修治宜用葱管者去頭用糯米汁煮之晒乾用
黃連為之使反細辛芍藥人參沙參紫參丹參苦參惡大黃畏
葱白服之吐不止飲葱湯即止

（聖惠方治身面黑痣藜蘆灰五兩水一大椀淋灰汁于銅器中重湯煑成黑膏以針微刺破痣點之不過三次神驗）

射（音夜）**干**始生南陽山谷田野今所在有之人家庭砌間亦多種植春生苗高一二尺葉似蠻薑而狹長橫張踈如鳥羽及扇蒲之狀故本經名烏扇名烏蒲別録名烏翣名草薑土宿本草名鬼扇名仙人掌本草拾遺名鳳翼本草綱目名扁竹皆因其形相似也葉中抽莖似萱草莖而強硬六月開花黃紅色瓣上有細文秋結實作房中子黑色根多鬚須皮黃黑肉黃赤三月三日採根乾頌曰射干之形莖梗踈長正如射人之執竿者得名由此爾而陶氏以夜音爲疑蓋古字音多通呼若漢官僕射主射事而亦音夜非有別義也

根氣味苦平有毒

主治欬逆上氣喉痺咽痛不得消息散結氣腹中邪逆食飲大熱○療老血在心脾間欬唾言語氣臭散胷中熱氣○苦酒摩塗腫毒○治疰氣消瘀血通女人月閉○消痰破癥結胷膈滿腹脹氣喘痃癖開胃下食鎮肝明目○治肺氣喉痺爲佳○去胃中癰瘡○利積痰疝毒消結核○降實火利大腸治瘧母

修治射干先以米泔水浸一宿漉出然後以篁竹葉煑之日乾任用

別録曰微温久服令人虛保昇曰微寒權曰有小毒元素曰苦陽中陰也

時珍曰射干能降火故古方治喉痺咽痛爲要藥

（袖珍方治喉腫痛射干花根山豆根爲末吹之如神）

射干
本經
下品


葉如鳥翅根多白赤黃色

（普濟方治二便不通紫花扁竹根研汁一盞服即通）

本草綱目云射干即今扁竹今人所種多是紫花者呼爲紫蝴蝶三四月開花大如萱花結房大如指一房四隔一隔數子紫色咬之不破七月始枯陶弘景謂射干鳶尾是一種蘇恭陳藏器謂紫碧花者是鳶尾紅花者是射干韓保昇謂黃花者是射干蘇頌謂花紅黃者是射干花白者亦射干之類朱震亨謂紫花者是射干紅花者非各執一說何以憑依謹按

張揖廣雅云鳶尾射干也易卦通驗云冬至射干生土宿真君本草云射干即扁竹葉扁生如側手掌形莖亦如之青綠色一種紫色一種黃色一種碧花多生江南湖廣川浙平陸間八月取汁煑雄黃伏雌黃制丹砂能拒火據此則鳶尾射干本是一類但花色不同正如牡丹芍藥菊花之類其色各異皆是同屬也大抵入藥功不相遠　射干使

常山生益州山谷及漢中今京西淮浙湖南州郡亦有之葉似茗而狹長兩兩相當莖圓有節三月生紅花青萼五月結實青圓三子爲房苗高者不過三四尺根似荊黃色而海州出者葉似楸葉八月有花紅白色子碧色似山楝子而小八月採根陰乾始產常山故名

氣味苦寒有毒

主治傷寒寒熱熱發溫瘧鬼毒胸中痰結吐逆○療鬼蠱往來水脹洒洒惡寒鼠瘻○治諸瘧吐痰涎治項下瘤癭

常山本經下品




色褐多刻俗呼金剛
骨市每充常山
假

常山擇如雞骨色如鵝子黃色者佳

修治以酒浸一宿漉出細剉日乾麩擣用近時有以酒浸蒸熟酒拌炒熟用亦不甚吐人

別錄曰辛微寒　柄曰得甘草吐瘧之才曰畏玉札大明曰忌葱菜菘菜伏砒石　老人久病切忌服之

養生主論王隱者驅瘧湯常山酒蒸晒乾草果知母貝母各錢半水鍾半煎半熟五更熱服渣以酒浸發前服奇效不能盡述切勿加減萬無一吐者

甘遂 始生中山川谷。今陝西江東亦有之。或云京西出者最佳。汴滄呉者次之。苗似澤漆。莖短小而葉有汁。根皮赤肉白。作連珠實重者良。二月採根陰乾。或曰。甘者藥之味。遂者田溝行水之道。此藥專于行水攻决。故名甘遂。

氣味苦寒有毒　別錄曰甘大寒

主治大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲宿食破癥堅積聚利水穀道○下五水散膀胱多熱皮中痞熱氣腫滿○能瀉十二種水疾去痰水○瀉腎經及隧道水濕脚氣陰囊腫墜痰迷癲癇噎膈痞塞

甘遂本經下品



修治甘遂以麪包煨熟以去其毒用

元素曰純陽也　之才曰瓜蒂為之使惡遠志反甘草　勿輕用

白斂 始生衡山山谷。今江淮州郡及荊襄懷孟商齊諸州皆有之。二月生苗。多在林中。作蔓。赤莖。葉如小桑。五月開花。七月結實。根似天門冬。一株下有十許。二月八月採根破片暴乾。根皮赤黑肉白。惟斂瘡方多用之。故名白斂。

白斂氣味苦平無毒　別錄曰甘微寒

主治癰腫疽瘡散結氣止痛除熱目中赤小兒驚癇溫瘧女子陰中腫痛帶下赤白○殺火毒○治發背瘰癧面上疱瘡腸風痔漏血痢刀箭瘡撲損生肌止痛○解狼毒毒


皮黑色近肉皮紅色
內肉白色
本經下品
白斂形

白斂伐赭為之使反烏頭　一種赤斂花實功用皆同表裏俱赤

談埜翁方治耳凍成瘡白斂黃柏為末生油調搽　白斂使

青葙子 始生平谷道旁。今江淮州郡近道亦有之。二月內生青苗。長三四尺。葉濶似柳而軟。莖似蒿青紅色。六月七月內生花。上紅下白。子黑光而扁。似莨菪子。六月八月採子。醫學入門曰。葙囊篋也。藥雖微而治眼之功大。青囊中不可缺也。故名青葙子。其花葉似雞冠。故綱目名野雞冠。其子明目。與决明子同功。故本經名草决明。

子氣味苦微寒無毒

主治唇口青○治五臟邪氣益腦髓鎮肝明目堅筋骨去風寒

濕痺○治肝臟熱毒衝眼赤瘴青盲翳腫惡瘡疥瘡

（三國志云魏署初平中有青牛先生常服青葙子年如五六十歲者人或識之謂其已百歲有餘爾）


青葙子
本經下品
用子
即野雞冠

白及

始生北山川谷。又寃句及越山。今江淮河陝漢黔諸州皆有之。春生苗。長一尺許。似栟櫚及藜蘆。三四月生一臺。開紫花。七月實熟。黃黑色。冬凋。根似菱有三角。角端生芽。二月八月採根。其根白色連及而生。故曰白及。一名連及草。

白及氣味苦平無毒

主治癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣賊風鬼擊痱緩不收○除白癬疥蟲結熱不消陰下痿面上皯皰令人肌滑○止驚邪血邪血痢癇疾風痺赤眼癥結温熱瘧疾發背瘰癧腸風痔瘻撲損刀箭湯火瘡生肌止痛○止肺血



杲曰苦甘微寒性濇陽中之陰也　之才曰紫石英為之使惡理石畏李核杏仁反烏頭

按洪邁夷堅志云台州獄吏憫一囚因感之因言吾七次犯死罪遭訊拷肺皆損傷至于嘔血人傳一方只用白及為末米

飲日服其效如神後其囚凌遲劊者剖其胸見肺間竅穴數十處皆白及填補色猶不變也

經驗方治鼻衄不止津調白及末塗山根上立止

大戟

澤漆根也。始生常山。今近道有之。春生紅芽。漸長作叢。高一尺已來。葉似初生楊柳小團。三月四月開黃紫花。團圓似杏花。又似蕪荑。根似苦參。皮黃黑。肉黃白色。秋冬採根陰乾。淮甸出者。莖圓。高三四尺。花黃。葉至心亦如百合苗。江南生者葉似芍藥。北方綿大戟根皮柔靭如綿。本草綱目曰。其根辛苦。戟人咽喉。故名大戟。今俚人呼為下馬仙。言利人甚速也。

大戟氣味苦寒有小毒

主治蠱毒十二水腹滿急痛積聚中風皮膚疼痛吐逆○頸腋癰腫頭痛發汗利大小便○瀉毒藥泄天行黃病温瘧破癥結○下惡血癖塊腹內雷鳴通月水墮胎孕○治癮疹風及風毒脚腫並煑水日日熱淋取愈


本經下品
紅芽大戟形
紫色

杭州紫大戟為上江南土大戟次之


綿大戟形
皮黑肉白比紫大戟更峻利傷人

修治　以漿水煑之晒乾剉用

元素曰苦甘辛陰中微陽瀉肺損真氣　之才曰反甘草用菖蒲

解之恭曰畏菖蒲藘葦鼠屎大明曰赤小豆為之使惡薔薇

（李絳兵部手集方療水病無問年月淺深雖腹脉惡亦主之大戟當歸橘皮各一兩切以水二升煑取七合頓服利下水二三升勿怪至重者不過再服便瘥禁毒食一年永不復作）

貫衆始生玄山山谷及冤句少室山。今陝西河東州郡及荊襄間多有之。而少有花者。春生苗。赤葉大如蕨。莖幹三稜。葉綠色。似雞翎。圖經名鳳尾草。根紫黑色。形如大瓜。下有黑鬚毛。又似老鴟。故別錄名草鴟頭。根一本而衆枝貫之。故名貫衆。本經一名貫節。一名貫渠。一名百頭。吳普本草名貫中。俗作貫仲管仲。皆謬稱也。



貫衆氣味苦微寒有毒（主治腹中邪熱氣諸毒殺三蟲去寸白破癥瘕除頭風止金瘡為末水服一錢止鼻血有效治下血崩中帶下產後血氣脹痛）

（修治或火燒存性或生用各隨方法之才曰雚菌赤小豆為之使伏石鍾乳）

（集簡方治女人血崩貫衆半兩酒煎服之立止）

貫衆使

[illegible]楚蜀山箐中甚多。蔓生如蕣。莖有細點。其葉頗類大竹葉而質厚滑。如瑞香葉。長五六寸。其根狀如菝葜而圓大。若雞鴨卵。連綴而生。遠者離尺許。近或數寸。其肉軟可生啖。有赤白二種。白者入藥良。昔禹行山乏食。采此充糧而棄其餘。故本草拾遺名草禹餘糧。故今尚有仙遺糧。冷飯團之名。亦其遺意也

土茯苓氣味甘淡平無毒（主治食之當穀不飢調中止泄健行不睡○健脾胃強筋骨去風濕利關節止泄瀉治拘攣骨痛惡瘡癰腫解汞粉銀朱毒）


新增
土茯苓形
土象色茯苓象形
肉有赤白皮俱赤黃
肉軟味甜

（弘治正德間因楊梅瘡盛行率用輕粉藥取效毒留筋骨潰爛終身至人用此遂為要藥諸醫無從考正往往指為萆薢及菝葜然其根苗迥然不同宜參考之但其功用亦頗相近蓋亦萆薢菝葜之類也）

（楊梅瘡古方不載亦無病者近有淫邪之人病此毒瘡今醫家有搜風解毒湯病深者服月餘愈病淺者服半月愈服輕粉藥筋骨攣痛癱瘓不能動履者服之亦效其方用土茯苓一兩薏苡仁金銀花防風木瓜白鮮木通各五分皂莢子四分氣虛加人參七分血虛加當歸七分水二大盌煎飲一日三服惟忌飲茶及牛羊雞鵝魚肉燒酒法麪房勞蓋秘方也）

何首烏本出順州南河縣。嶺外江南諸州亦有。今在處有之。以西洛嵩山及南京柘城縣者為勝。春生苗。葉葉相對。如山芋而不光澤。其莖蔓延竹木牆壁間。夏秋開黃白花。似葛勒花。結子有稜。似蕎麥而細小。纔如粟大。秋冬取根。大者如拳。各有五稜瓣。似小甜瓜。有赤白二種。赤者雄。白者雌。此藥本名交藤。因何

首烏服而得名也。

氣味苦澀微溫無毒

主治瘰癧消癰腫療頭面風瘡治五痔止心痛益血氣黑髭髮悅顏色久服長筋骨益精髓延年不老亦治婦人產後及帶下諸疾○久服令人有子治腹臟一切宿疾冷氣腸風○瀉肝風

形有長圓大小俱有稜


椎者肉淺紅
雌者肉淡白

何首烏宋開寶一名陳知白何首烏傳一名交藤一名夜合一名地精斗門名赤葛綱目名馬肝石一名九真藤

何首烏者順州南河縣人祖名能嗣父名延秀能嗣本名田兒生而閹弱年五十八無妻子常慕道術隨師在山一日醉臥山野忽見有藤二株相去三尺餘苗蔓相交久而方解解了

又交田兒驚訝其異至旦遂掘其根歸問諸人無識者後有山老忽來示之答曰子既無嗣其藤乃異此恐是神仙之藥何不服之遂杵為末空心酒服一錢服數月似強健因此常服又加二錢服之經年舊疾皆痊髮烏容少數年之內即有子名延秀亦服是藥皆壽百六十歲延秀生首烏首烏亦服是藥生數子年百三十歲髮猶黑

明州刺史李遠傳錄經驗何首烏所出順州南河縣韶州潮州恩州賀州廣州潘州及嶺南四會縣者為上邕州桂州康州春州勤州高州循州晉興縣出者次之真仙草也五十年者如拳大號山奴服之一年髭鬢青黑一百年者如盌大號山哥服之一年顏色紅悅一百五十年如盆大號山伯服之一年齒落重生二百年如斗栲栳大號山翁服之一年顏如童子行及奔馬三百年如三斗栲栳大號山精服之一年延齡純陽之體久服成地仙

何首烏茯苓為之使忌諸血無鱗魚萊菔蒜葱鐵器

嘉靖初邵應節真人以七寶美髯丹方上進世宗肅皇帝服餌有效連生皇嗣於是何首烏之方天下大行宋懷州知州李治與一武官同官徑其年七十餘而輕健面如渥丹能飲食叩其術則服何首烏丸也乃傳其方後得病盛暑中半體無汗已二年竊自憂之造丸服至年餘汗遂浹體其活血治風之功大有補益其方用赤白何首烏各半斤米泔浸三夜竹刀刮去皮切焙石臼為末煉蜜丸梧子大每空心溫酒下五十丸亦可末服

商陸

始生咸陽山谷。今處處有之。多生於人家園圃中。春生苗。高三四尺。葉青如牛舌而長。莖青赤。至柔脆。夏秋開紅紫花作朵。根如蘆菔而長。八月九月採根暴乾。爾雅謂之蓫薚。廣雅謂之馬尾。易經謂之莧陸。開寶謂之白昌。本經謂之夜呼。圖經謂

之章柳。或云此草多當陸路而生。故一名當陸。

根氣味辛平有毒

主治水腫疝瘕痺熨除癰腫殺鬼精物○療胸中邪氣水腫痿痺腹滿洪直疏五臟散水氣○瀉十種水喉痺不通薄切醋炒塗喉外良○通大小腸瀉蠱毒墮胎熁腫毒傅惡瘡



商陸本經下品　入藥用根

大明曰白者苦冷得大蒜良赤者有毒能伏硇砂砒石雌黃拔錫　杲曰陽中之陰　恭曰赤者但可貼腫服之傷人痢血不已殺人令人見鬼神　張仲景曰商陸以水服殺人

修治取花白者根銅刀刮去皮薄切以東流水浸兩宿漉出架甑蒸以黑豆葉一重商陸一重如此蒸之從午至亥取出去豆葉暴乾剉用無豆葉以豆代之

古讚商陸云其味酸辛其形類人療水貼腫其效如神　使

威靈仙始出商州上洛山及華山并平澤。今陝西河東河北汴東江湖州郡皆有之。初生比衆草最先。莖如釵股四稜。葉如柳葉作層。每層六七葉如車輪。有六層至七層者。七月內生花六出。淺紫或碧白色。作穗似蒲臺子。亦有似菊花頭者。實青色。根稠密多鬚。長者二尺許。初時黃黑色。乾則黑色。俗呼鐵角威靈仙。本草綱目云。威言其性猛也。靈仙言其功神也。



氣味苦溫無毒

主治諸風宣通五臟去腹內冷滯心膈痰水久積癥瘕痃癖氣塊膀胱宿膿惡水腰膝冷疼療折傷久服無溫疾瘧○推新舊積滯消胷中痰唾散皮膚大腸風邪

威靈仙宋開寶

九月末至十二月採根陰乾餘月並不堪採

元素曰味苦純陽入太陽經杲曰可升可降陰中陽也

忌茶及麪湯　根性快多服疏人五藏真氣　弱者不可服

先時商州有人患重足不履地數十年良醫殫技莫能療親置之道傍以求救者遇一新羅僧見之告曰此疾一藥可活但不知此土有否因為之入山求索果得乃威靈仙也遣服數日平復

千金方治腰脚痛威靈仙為末空心溫酒調下一錢逐日以微利為度

牽牛子處處有之。二月種子。三月生苗作藤蔓遶籬墻。高者或二三丈。其葉青有三尖角。七月生花微紅帶碧色。似鼓子花而大。八月結實。外有白皮裹作毬。每毬內有子四五枚。與棠梂子核一樣。有黑白二種。九月後收之。陶隱居云。此藥始出田野人牽牛易藥。故以名之。今人隱其名。黑者爲黑丑。白者爲白丑。蓋以丑屬牛也。

氣味苦寒有毒

主治下氣療脚滿水腫除風毒利小便○治痃癖氣塊利大小便除虛腫○取腰痛下冷膿瀉蠱毒藥并一切氣壅滯○和山茱萸服去水病○除氣分濕熱三焦壅結○逐痰消飲通大腸氣秘風秘殺蟲達命門落胎

牽牛子別錄下品

黑者屬水力速



白者屬金力遲



九月采子

大明曰味薟得青木香乾薑良　杲曰辛熱雄烈泄人元氣

海藏曰以氣藥引之則入氣以大黃引之則入血羅謙甫云味辛辣瀉人元氣非濕勝氣不得施化以致便閉腫滿不可輕用虛者猶宜慎之況濕病根在下焦血分飲食勞倦亦皆血分受病如用辛辣瀉上焦太陰之氣是血病瀉氣俾氣血俱病也可不慎與

修治牽牛碾取頭末或炒取頭末亦有半生半熟用者

生生編治小兒夜啼黑牽牛末一錢水調傅臍上即止　使

蓖麻今在處有之。夏生苗。葉似葎草而厚大。莖有赤有白。如

甘蔗高丈餘。秋生細花。隨便結實。殼上有刺。內子似巴豆。有黃黑斑點。狀如牛蜱。故名。

氣味甘辛平有小毒

主治水癥以水研二十枚服之吐惡沫加至三十枚三日一服瘥則止又主風虛寒熱身體瘡癢浮腫尸疰惡氣榨取油塗之○研傅瘡痍疥癩塗手足心催生○治瘰癧取子炒熟去皮臨臥嚼服二三枚漸加至十數枚有効○主偏風不遂口眼喎斜失音口噤頭風耳聾舌脹喉痺齁喘○脚氣毒腫丹瘤湯火傷鍼刺入肉女人胎衣不下子腸挺出開通關竅經絡能止諸痛消腫追膿拔毒

蓖麻子唐本草



斑紅者佳

修治以鹽湯煑半日去皮取仁研用　熟油可調印色

綱目云凡服蓖麻者一生不得食炒豆犯之必脹死

崔元亮海上集驗方治難產及胎衣不下取蓖麻子七粒去殼研膏塗脚心若胎及衣下便速洗去不爾腸出即以此膏塗頂則腸自入也

一人病手臂一塊腫痛用蓖麻仁擣膏貼之一夜而愈二人病氣鬱偏頭痛用此同乳香食鹽擣熁太陽穴一夜痛止一婦產後子腸不收擣仁貼丹田一夜而上此藥外用屢奏奇功但內服不可輕率爾或言擣膏以筯點于鷲馬六畜舌根下即不能食或點肛內即下血死其毒可知

天南星

生平澤。今處處有之。苗起數莖。每莖端六七葉。高一尺許。結實作包。稍如鼠尾。根比芋而圓。肌細膩且白。炮之易裂。本經云。葉似蒟蒻。兩枝相抱。五月開花。似蛇頭黃色。六月結子作穗。似石榴子紅色。根似芋而圓。是虎掌。非南星也。然南星多生南方。根圓如星。故以名之。

氣味苦溫有大毒○主治心痛寒熱結氣積聚伏梁傷筋痿拘緩利水道○除陰下濕風眩○主疝瘕腸痛傷寒時疾強陰○主中風麻痺除痰下氣利胷膈攻堅積消癰腫散血墮胎○金瘡折傷瘀血擣傅之○去上焦痰及眩運○主破傷風口噤身強○補肝風虛治痰功同半夏○治驚癇口眼喎斜喉痺口瘡結核解顱

天南星
宋開寶


莖葉搽蝎螫止痛
二月八月採根
根圓白

虎掌
本經下品



虎掌根蒟蒻根皆似天南星人雜採以為南星淆賣了不可辨火炮易裂者是南星炮之不裂者是虎掌蒟蒻也

虎掌南星根極相似葉逈然不同而功效相近古人通用之故頌曰天南星即本經虎掌也

修治去皮臍入器中湯浸五七日日換三四遍洗去涎暴乾用或火炮裂用或以皂莢白礬薑煑過用

造膽星法以南星生研末臘月取黃牯牛膽汁和納入膽中繫

懸風處乾之年久者彌佳方書謂之牛膽南星
杲曰苦辛有毒陰中之陽可升可降乃肺經之本藥
之才曰蜀漆為之使惡莽草大明曰畏附子乾薑生薑
時珍曰得防風則不麻得牛膽則不燥得火炮則不毒生能伏
雄黄丹砂焰硝
經驗方治急中風目瞑口噤無門下藥者開關散用天南星為
末入白龍腦等分五月五日午時合之每　中指點末揩齒
三二十遍揩大牙左右其口自開

萹蓄

始出東萊山谷。今在處有之。春中布地生道傍。故方士呼為道生草。苗似瞿麥。葉細綠如竹。故陶注本草謂之萹竹。赤莖如釵股。節間有粉。故本草綱目謂之粉節草。花出甚細微。青黄色。亦有紅色者。四月五月采苗陰乾。詩衛風云。綠竹猗猗。或云。

爾雅王芻即此也。俗呼猪牙草。

氣味苦平無毒

主治浸淫疥瘙疽痔殺三蟲○療女子陰蝕○煑汁飲小兒療蚘蟲有驗○治霍亂黄疸利小便小兒鬾病

萹蓄本經下品
生生編治熱淋濇痛
生萹蓄煎湯頓飲
海上歌云心頭急痛
不能當我有仙人海
上方萹蓄醋煎通口
嚥管教時刻便安康
萹蓄使



狼毒

始生秦亭山谷及奉高。今陝西州郡及遼石州亦有之。苗葉似商陸及大黄。莖葉上有毛。四月開花。八月結實。根皮黄肉白。二月八月採根陰乾。能殺飛鳥走獸。故曰狼毒。

氣味辛平有大毒

主治欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣惡瘡鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸○除胸下積僻○治痰飲癥瘕亦殺鼠○合野葛納耳中治聾

狼毒本經下品
共麻黄橘皮吳茱萸
半夏枳實是為六陳
共南星半夏川烏草
烏是為五毒



狼毒切片肉有黄紋

圖經曰狼毒陳而沉水者良今市賣者有全根有截成片子者
入水皆不沉
志曰陶云沉者是狼毒浮者是防葵此不足為信假使防葵秋
冬采者堅實得水皆沉狼毒春夏采者輕浮得水皆浮且二
物全別不可比類
之才曰大豆為之使宜醋炒惡麥句薑畏占斯蜜陀僧
藺氏經驗方治乾濕蟲疥狼毒為末以猪油或馬油調搽方睡
勿以被蒙頭使藥氣傷面也
狼毒使
狼毒是真者皆可用不必沉水

豨薟

處處有之。春生苗。葉似蒼耳。兩枝相對。莖圓有毛。秋開小花。深黄色。中有子如同蒿子。外萼有細刺。五月六月採葉日乾。此草多生江東。彼土人呼猪為豨。呼臭為薟。因其氣類。故以為名。唐本草名猪膏母。名虎膏。名狗膏。皆因其氣似及治虎狗傷也。救荒本草名粘糊菜。因其嫩苗可食也。俗呼火杴草。

氣味苦寒有小毒

主治熱䘌煩滿不能食生擣汁三合服多服令人吐○主金瘡止痛斷血生肉除惡瘡消浮腫擣封之湯漬散傅並良○主久瘧痰癊擣汁服取吐擣傅虎傷狗咬蜘蛛咬蠶咬蠼螋溺瘡○治肝腎風氣四肢麻痺骨痛膝弱風濕諸瘡

豨薟唐本草諸說皆云性寒有小毒惟文州及高郵州云性熱無毒服之補益安五臟生毛髮兼主風濕瘡肌肉頑痺婦人久冷尤宜用



五月五日六月六日七月七日九月九日採葉

按江陵府節度使成訥進豨薟丸方臣有弟䜣年三十一中風牀枕五年百醫不差有道人鍾針者因覩此患曰可餌豨薟丸必愈其藥多生沃壤高三尺許節葉相對其葉當夏五月已來收每去地五寸翦刈以温水洗泥土摘其葉及枝頭九蒸九暴不必大燥但取蒸為度仍熬擣為末丸如桐子大空心温酒或米飲下二三十丸服至二千丸所患忽加不得憂慮是藥攻之力服至四千丸必得復故五千丸當復丁壯臣依法修合與䜣服果如其言鍾針又言服後須喫飯三五匙壓之五月五日採者佳奉宣付醫院詳錄

馬鞭草今衡山廬山江淮州郡皆有之。春生苗似狼牙及茺蔚。抽三四穗。紫花似車前。穗類鞭鞘。故名馬鞭。

苗葉氣味苦微寒無毒

主治下部䘌瘡○癥瘕血瘕久瘧破血殺蟲擣爛煎取汁熬如飴每空心酒服一匕○治婦人血氣肚脹月候不勻通月經治金瘡行血活血○擣塗癰腫及蠼螋尿瘡男子陰腫

馬鞭草
別錄下品



集驗方治男子陰腫大如升核痛人不能治者擣馬鞭草塗之

仙茅始生西域及大庾嶺。今蜀川江湖兩浙諸州亦有之。葉青如茅而軟且畧闊。面有縱文。又似椶櫚。至冬盡枯。春生乃生三

月有花。如梔子花黃色不結實。其根獨莖而直。傍有短細根相附。肉黃白。外皮稍麄褐色。二月八月採根暴乾。梵音呼為阿輪勒陀。始因西域婆羅門僧。獻方於唐玄宗。故今江南呼為婆羅門參。言其功補如人參也。珣曰。其葉似茅。久服輕身。故名仙茅。

仙茅氣味辛温有毒

主治心腹冷氣不能食腰脚風冷攣痺不能行丈夫虛勞老人失溺無子益陽道久服通神強記助筋骨益肌膚長精神明目○治一切風氣補煖腰脚清安五臟久服輕身益顏色丈夫五勞七傷明耳目填骨髓○開胃消食下氣益房事不倦

仙茅宋開寶



修治仙茅以竹刀刮切糯米泔浸去赤汁出毒後無妨損

護按續傳信方叙仙茅云主五勞七傷明目益筋力宣而復補（本西域道人所傳開元元年婆羅門僧進此藥明皇服之有效當時禁方不傳天寶之亂方書流散上都不空三藏始得此方傳與李勉司徒路嗣恭尚書齊杭給事張建封僕射服之皆得力路公久服金石無效其得此藥其益百倍齊給事守縉雲日少氣力風瘮繼作服之遂愈八九月時採得竹刀刮去黑皮切如豆粒米泔浸兩宿陰乾擣篩熟蜜丸如梧子每旦空肚酒飲任使下二十丸禁食牛乳及黑牛肉大減藥力也續傳信方爲唐筠州刺史王顏所著皆因國書編錄其方當時盛行故今江南但呼此藥爲婆羅門參）

（仙茅勿犯鐵班人鬚鬢）

劉寄奴草

始生江南今河中府孟州漢中亦有之春生苗莖似艾蒿上有四稜高三二尺已來葉青似柳四月開碎小黃白花

七月結實似稗而細一莖上有數穗互生根淡紫色似萵苣六月七月采苗及花子通用按李延壽南史云宋高祖劉裕小字寄奴微時伐荻新州遇一大蛇射之明日往聞杵臼聲尋之見童子數人皆青衣於榛林中擣藥問其故答曰我主爲劉寄奴所射今合藥傳之裕曰神何不殺之曰寄奴王者不可殺也裕叱之童子皆散乃收藥而反每遇金瘡傳之即愈人因稱此草爲劉寄奴草

（氣味苦溫無毒）

（主治破血下脹多服令人痢○下血止痛治產後餘疾止金瘡血極效○心腹痛下氣水脹血氣通婦人經脈癥結止霍亂水瀉○小便尿血新者研末服）



劉寄奴草
唐本草

市賣乾劉寄奴草形

修治莖葉花實並可用酒洗蒸之晒乾用

（經驗方治湯火瘡至妙劉寄奴擣末先以糯米漿雞翎掃湯著處後摻藥末在上並不痛亦無痕大凡湯著處先用鹽末摻之護肉不壞然後藥末傳之）

（聖惠方治風入瘡口腫痛劉寄奴草爲末摻之即止）

骨碎補

始生江南今淮浙陝西夔路州郡亦有之根生大木或

石上多在背陰處引根成條上有黃毛及短葉附之又抽大葉成枝葉面青綠色有青黃點背青白色有赤紫點春生葉至冬乾黃無花實根入藥採無時本草拾遺名猴薑日華子名石毛薑江西人呼爲胡孫薑象形也開元皇帝以其主傷折補骨碎故作此名耳

根（氣味苦溫無毒）

（主治破血止血補傷折○主骨中毒氣風血疼痛五勞六極足手不收上熱下冷○惡疾蝕爛肉殺蟲○研末豬腎夾煨空心食治耳鳴及腎虛久泄牙疼）

（頌曰骨碎補入婦人血氣藥蜀人治閃折筋骨傷損取根擣篩煎黃米粥和裹傷處有效）

骨碎補　宋開寶



修治用銅刀刮去赤黃毛細剉蜜拌潤甑蒸一日晒乾用急用只焙乾不蒸亦得也

靈苑方治虛氣攻牙齒痛血出牙齦痒痛骨碎補二两細剉炒令黑色杵末依常盥漱後揩齒根下良久吐之嚥下亦可

骨碎補使

續隨子始生蜀郡。今南中多有。北土差少。苗如大戟。初生一莖。莖端生葉。葉中復出數莖相續。隨生實也。故名續隨子。子黃有殼。人家園亭中多種以爲飾。秋種冬長。春秀夏實。故又名拒冬。

一名千金子。

氣味辛溫無毒

主治婦人血結月閉瘀血癥瘕痃癖除蠱毒鬼疰心腹痛冷氣脹滿利大小腸下惡滯物○積聚痰飲不下食嘔逆及腹內諸疾研碎酒服不過三顆當下惡物○宣一切宿滯治肺氣水氣日服十粒瀉多以酸漿水或薄醋粥喫即止又塗疥癬

續隨子　宋開寶



修治去殼以紙包壓去油取霜用

崔元亮海上方治蛇咬腫毒悶欲死用重臺六分續隨子七顆去皮二物為末酒服方寸匕兼唾和少許傅咬處立差

山豆根始生劔南山谷。今廣西亦有。以忠萬州者爲佳。苗蔓如豆。葉青經冬不凋。八月採根。因蔓如豆。故名山豆根。

氣味苦寒無毒　本經云味甘誤矣

主治解諸藥毒止痛消瘡腫毒發熱欬嗽人及馬急黃殺小蟲含之嚥汁解咽喉腫毒極妙○研末湯服五分治腹脹喘滿酒服三錢治女人血氣腹脹又下寸白諸蟲丸服止下痢磨汁服止卒患熱厥心腹痛五種痔痛研末汁塗諸熱腫禿瘡蛇狗蜘蛛傷

山豆根　宋開寶



備急方治疥癬蟲瘡山豆根末臘豬油調塗

馬兜鈴始生古堤城旁。今關中河東河北江淮夔浙州郡皆有之。春生苗作蔓。附木而上。葉如山蕷葉而厚大。背白。六月開黃紫花。頗類枸杞花。七月結實如大棗。作四五瓣。葉脫時。其實尚垂。狀如馬項之鈴。故得名也。其根名獨行根。大如指。黃白色。微似木香。故唐本草名土青木香。俗呼青木香。

馬兜鈴氣味苦寒無毒○主治肺熱欬嗽痰結喘促血痔瘻瘡○肺氣上急坐息不得欬逆連連不止○清肺氣補肺去肺中濕熱

馬兜鈴　宋開寶



修治馬兜鈴開去革膜只取净子焙用○果四味厚氣薄陰中微陽入手太陰經

摘玄方治一切心痛不拘大小男女大馬兜鈴一箇燈上燒存性為末温酒服立效

聖惠方治中草蠱毒此術在西良之西及嶺南人中此毒入咽欲死者用馬兜鈴苗一兩為末温水調服一錢即消化蠱出神效

青木香氣味辛苦冷有毒○主治鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水磨為泥封之日三四次立瘥水煮一二兩取汁服吐蠱毒又擣末水調塗丁腫大效○治血氣○利大腸治頭風瘙痒禿瘡（即馬兜鈴根）多服令人吐痢不止

袖珍方治惡蛇所傷青木香半兩煎湯飲之

鶴虱始生西戎今江淮衡湘間皆有之春生苗葉皺似紫蘇大而尖長不光莖高二尺許七月生黃白花似菊八月結實子極尖細乾即黃黑色採無時形類鶴虱故名

氣味苦平有小毒

主治蚘蟯蟲用之為散以肥肉臛汁服方寸匕亦丸散中用○殺五藏蟲止瘧及傅惡瘡○治蟲咬心痛

鶴虱別錄下品



採數百粒置掌中勢如動者真

心痛鶴虱為末以淡醋和半七服之立差○日華子云凉無毒

白附子原出高麗今出凉州以西生砂磧下濕地獨莖似鼠尾草細葉周匝生於穗間三月採根色白苗與附子相似故名白附子

氣味辛甘大温有小毒

主治心痛血痺面上百病行藥勢○中風失音一切冷氣面䵟

瘢疵○諸風冷氣足弱無力疥癬風瘡陰下濕癢䵟面痕入面脂用○補肝風虛○風痰

白附子
別錄下品



根形　色白　藏灰中虫不蛀

修治入藥炮用乃陽明經藥日華子云新羅出者佳

簡便方治赤白汗斑白附子硫黃等分為末薑汁調稀茄蒂擦日數次

蚤休始生山陽川谷及冤句今河中河陽華鳳文州及江淮間亦有之苗葉似王孫鬼臼等作二三層六月開黃紫花蘂赤黃色上有金絲垂下秋結紅子根如紫參皮黃肉白四月五月採根日乾蟲蛇之毒得此治之即休故本經名蚤休別錄名蚩休日華子名螫休唐本草名重臺本草綱目名三層草因其葉狀也今呼金線重樓因其花狀也南人名草甘遂因其根狀也圖經名紫河車因其功用也

氣味苦微寒有毒

主治驚癎搖頭弄舌熱氣在腹中○癲疾癰瘡陰蝕下三蟲去蛇毒○生食一升利水○治胎風手足搐能吐泄瘰癧○去瘧疾寒熱

蚤休
本經下品



根形　皮黃肉白

修治蚤休洗切焙用　伏雄黃丹砂蓬砂及鹽　足厥陰藥也

集驗方治中鼠莽毒蚤休磨水服即愈

胡蘆巴　今出廣州。或云種出海南諸番。蓋其國蘆菔子也。舶客將種蒔於嶺外亦生。然不及番中來者真好。春生苗。夏結子作莢。至秋采。一名苦豆。

氣味苦大溫無毒

主治元臟虛冷氣。得附子硫黃治腎虛冷腹脇脹滿面色青黑。得蘹香子桃仁治膀胱氣甚效。○治冷氣疝瘕寒濕脚氣益右腎暖丹田

胡盧巴　宋嘉祐

色紫者真色綠者酒豆子也

右腎命門藥

修治水淘淨以酒浸一宿晒乾蒸熟或炒過用

直指方治小腸氣痛胡盧巴炒研末每服二錢茴香酒下

木賊　出秦隴華成諸郡近水地。苗長尺許。叢生。每根一幹。無花葉。寸寸有節。色青。凌冬不凋。四月采之。作木器　用之磨光。能去木屑。故名木賊。

氣味甘微苦無毒

主治目疾退翳膜消積塊益肝膽明目、療腸風止痢及婦人月水不斷得牛角鰓麝香治休息痢歷久不差得禹餘粮當歸芎藭療崩中赤白得槐鵝桑耳腸風下血服之效又與槐子枳實相宜主痔疾出血○解肌止淚止血去風濕疝痛大腸脫肛



木賊　宋嘉祐

寇亨曰木賊去節烘得發汗至易本草不曾言及

聖惠方治舌硬出血木賊煎水漱之即止

穀精草　處處有之。春生於穀田中。是穀田餘氣所生。故曰穀精草。葉莖俱青。根花俱白色。二月三月內採花用。一名戴星草。花白而小圓似星。故以名爾。

穀精草氣味辛溫無毒

主治喉痺齒風痛及諸瘡疥○頭風痛目盲翳膜痘後生翳止血○飤馬主蟲顙毛焦等病

明目方治目中翳膜穀精草防風等分為末米飲服之甚驗



穀精草

宋開寶

夏枯草　始生蜀郡川谷。今河東淮浙州郡亦有之。冬至後生葉似旋覆。三月四月開花作穗。紫白色。似丹參花。四月採。寇亨曰此草夏至後即枯。蓋稟純陽之氣。得陰氣即枯。故名夏枯草。

夏枯草氣味苦辛寒無毒○主治寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡破癥散癭結氣脚腫濕痺輕身

衛生易簡方治撲傷金瘡夏枯草口嚼爛署上即愈

夏枯草本經下品



葉似旋覆

四月收採

鴨跖草　始生江東淮南平地。今處處有之。葉如竹。故一名淡竹葉。一名碧竹子。高一二尺。花深碧。好為色。有角如鳥嘴。北人呼

爲雞舌草。亦呼爲青蜂兒。

苗氣味苦大寒無毒
主治寒熱瘴瘧痰飲
丁腫肉癥澁滯小兒
丹毒○和赤小豆煑
下水氣濕痺利小便
消喉痺
袖珍方治喉痺腫痛
鴨跖草汁點之
危亦林得效方治五
痔腫痛採取碧蟬兒
花挼軟納于患處即
效



鴨跖草宋嘉祐
花如蛾形
取汁作畫色彩羊皮燈色青碧可愛

山慈菰

生山中濕地。葉如韭。花狀如燈籠而朱色。故一名金燈。

根狀如水慈菰。故名山慈菰。

氣味甘微辛有小毒○主治癰腫瘡瘻瘰癧結核等醋摩傅之
亦剝人面除皯䵳○主疔腫攻毒破皮解諸毒蠱毒蛇蟲狂
犬傷

山慈菰
宋嘉祐


類獨
蒜頭
色白有毛殼包裹
用之去毛殼

普濟方治粉滓面䵟山慈菰搗爲膏夜塗旦洗

燈心草

生江南澤地。叢生。莖圓細而長直。穰可燃燈。故名燈心草。俗呼燈草。

氣味甘寒無毒○主治五淋生煑服之○瀉肺治陰竅濇不利
行水除水腫癃閉○治急喉痺燒灰吹之甚捷○降心火止
血通氣散腫止渴



燈心宋開寶

宗奭曰陝西亦有之蒸熟待乾折取中心白穰燃燈者是謂熟
草又有不蒸者但生乾剝取爲生草入藥宜用生草
經驗方治小兒夜啼用燈心燒灰塗乳上與喫

水蓼

生下濕水傍。莖赤。其葉大於家蓼。故名水蓼。俗呼蓼子草。

水蓼唐本草大槩與水葒相似葉稍狹耳

氣味辛冷無毒
主治蛇毒擣傅
之絞汁服止蛇
毒入心悶水煑
漬捋脚消氣腫
治脚痛成瘡先
剉水蓼煑湯令
溫熱得所頻頻
淋洗之瘡乾自
安



今造酒取以水浸汁和麪作麴假其辛味

海金沙

始出黔中郡。生作小株。高一二尺。七月收其全科。於日中暴之。令小乾。以紙襯承。以杖擊之。有細沙落紙上。旋收之。且暴且擊。以沙盡爲度。因色黃如海底細沙。故名海金沙。

海金沙宋嘉祐

海金沙氣味甘寒無毒
主治通利小腸得梔子
馬牙消蓬沙共療傷寒
熱狂或丸或散
治濕熱腫滿小便熱淋
膏淋血淋石淋莖痛解
熱毒氣
治熱淋急痛海金沙草
陰乾爲末煎生甘草湯
調服二錢



其粒細如黃沙今市家多以葶歷子充之用者宜辨

雞冠

處處有之。三月生苗。入夏高者五六尺。矮者數寸。其葉青柔。其莖或圓或扁。有筋起。六七月稍間開花。有紅白二種。其穗圓長而尖者。儼如青葙之穗。扁舒而平者。儼如雄鷄之冠。子在穗中。黑細光滑。因花狀命名鷄冠。

（花甘涼無毒主治痔漏下血赤白下痢崩中帶下分赤白用）

（子甘涼無毒主治止腸風瀉血赤白痢崩中帶下入藥炒用）

（苗甘涼無毒主治瘡痔及血病）



（孫氏集驗方治婦人白帶白鷄冠花晒乾為末空心酒調服三錢赤帶用紅鷄冠花）

鎖陽

出肅州。按陶九成輟耕録云。鎖陽生韃靼田地。野馬或與蛟龍遺精入地。久之發起如筍。上豐下儉。鱗甲櫛比。筋脉連絡。絶類男陽。即肉蓯蓉之類。或謂里之淫婦。就而合之。一得陰氣。勃然怒長。土人掘取洗滌去皮薄切晒乾。以充藥貨。功力百倍於蓯蓉。李時珍曰。此自有種類。如肉蓯蓉列當。亦未必盡是遺精所生也。

（氣味甘溫無毒）

（主治大補陰氣益精血利大便虛人大便燥結者啖之可代蓯蓉煮粥彌佳不燥結者勿用　潤燥養筋治痿弱）



三七

生廣西南丹諸州番峒深山中。採根暴乾。黃黑色。如老乾地黃有節。彼人言其葉左三右四。故名三七。蓋恐不然。原名山漆。謂其合金瘡如漆粘物也。三七者俗稱耳。

（味甘微苦溫無毒）

（主治止血散血定痛金刃箭傷跌撲杖瘡血出不止者嚼爛塗或為末摻之血即止亦治吐血衄血下血血痢崩中經水不止產後惡血不下血運血痛赤目癰腫虎咬蛇傷諸病）

（三七類竹節參味甘而苦亦似參味但色不同參色黃白而三七色黃黑）

（山漆新增）



（市多以定風草充之但色白體輕味薄為異或云試法以末摻猪血中血化為水者真）

（近傳一種草春生苗夏高二三尺葉似菊艾而勁厚有岐尖莖有赤稜夏秋開黃花蕊如金絲盤紐可愛花乾則絮如苦蕒絮根葉味甘治金瘡折傷出血及上下血病甚效云是三七而根如牛蒡與南中來者不類恐是劉寄奴之屬甚易繁衍）

（赤痢血痢三七三錢研末米泔水調服即愈）

甘松香

今黔蜀州郡及遼州亦有之。叢生山野。葉細如茅草。根極繁密。八月採根。始產川西松州。其味甘而香。故名甘松香。

甘松香氣味甘溫無毒

主治惡氣卒心腹痛滿下氣○黑皮䵟黯風疳䘌齒野鷄痔得白芷附子良○理元氣去氣鬱○脚氣膝浮煎湯洗

甘松香

宋開寶



色紫赤味甘而氣香

奇效方治勞瘵熏法甘松六兩玄參一斤為末每日焚之

藿香按廣志云○出海邊國○莖如都梁○葉似水蘇○可著衣服中○頌曰○嶺南多有之○人家亦多種○二月生苗○莖梗甚密○作叢○葉似桑而小薄○五六月采日乾○乃芬香○本草綱目云○豆葉曰藿○此葉似之○故名藿香○

藿香氣味辛微溫無毒

主治風水毒腫去惡氣止霍亂心腹痛○脾胃吐逆為要藥○助胃氣開胃口進飲食○溫中快氣肺虛有寒上○壅熱飲酒口臭煎湯漱之

藿香

別録木部上品

今移草部



藿香圓莖葉頗類茄葉而小亦像豆葉古人惟用其葉不用枝梗今人并枝梗用之因葉多偽故耳

杲曰可升可降陽也入手足太陰經

百選方治霍亂吐瀉垂死者服之回生用藿香葉陳皮各五錢水二鍾煎一鍾溫服

青蒿本經原名草蒿○蒿草之高者也○始生華陰川澤○今處處有之○春生苗○葉極細軟○至夏高四五尺○秋後開細淡黃花○花下便結子○如粟米大○八九月採根莖子葉○並入藥用○此蒿獨青○異於諸蒿○故名青蒿○

青蒿氣味苦寒無毒主治疥瘙痂痒惡瘡殺蝨治留熱在骨節間明目鬼氣尸疰伏留婦人血氣腹內滿及冷熱久痢秋冬用子春夏用苗並擣汁服亦暴乾為末小便入酒和服

青蒿

本經下品



補中益氣輕身補勞駐顏色長毛髮令黑不老兼去蒜髮殺風毒心痛熱黃生擣汁服并貼之○治瘧疾寒熱○生擣傅金瘡止血止疼良○燒灰隔紙淋汁和石灰煎治惡瘡瘜肉黶瘢

雷公云凡使惟中為妙到膝即仰到腰即俛使子勿使葉使根勿使莖四件若同使翻然成痼疾采得葉用七歲兒七箇溺浸七日七夜漉出曬乾

青蒿伏硫黃

百一方治蜂螫人嚼青蒿傅患處即差

蜀葵處處人家植之○春初種子○冬月宿根亦自生苗○葉似葵菜而大○亦似絲瓜葉有歧叉○嫩時亦可茹○過小滿後長莖高五六尺○花似木槿而大○有深紅淺紅紫黑白色○單瓣千層之異○惟紅白二色入藥○其實大如指頭○皮薄而扁○內仁如馬兜鈴仁○及蕪

萸仁輕虛易種其稭剝皮可績布作繩按爾雅翼云葵者揆也葵葉傾日不使照其根乃智以揆之也種出於蜀故名蜀葵

（花氣味甘冷無毒主治赤者治赤帶赤痢血燥白者治白帶白痢氣燥○苗氣味甘微寒滑無毒主治除客熱利腸胃煑食治丹石發熱大人小兒熱毒下痢擣爛塗火瘡燒研傅金瘡根莖主治客熱利小便散膿血惡汁○子氣味甘冷無毒主治淋澀通小腸催心落胎療水腫治一切瘡疥并瘢疵赤靨）

蜀葵　宋嘉祐



根主客熱通便

莖理惡瘡散血

葉擣爛貼金

（衛生寶鑑治小便淋痛葵花根洗剉水煎五七沸服之如神普濟方治誤吞銅錢葵花煑汁服之）

地丁始生山南巖石及高岡上今處處有之苗覆地春生葉青小花開有紫白二種根直如釘入藥宜用紫花者故俗每呼為紫花地丁

（氣味苦辛寒無毒主治一切癰疽發背疔腫瘰癧無名腫毒惡瘡乾坤秘韞治黃疸內熱地丁為末酒服三錢）



紫花地丁　新增

根紫色二月採

（孫天仁集效方治癰疽發背無名諸腫貼之如神紫花地丁草三伏時收以白麪和成盐醋浸一宿貼之昔有一尼發背夢得此方數日而痊）

白頭翁生嵩山山谷今處處有之苗作叢狀如白微而柔細稍長葉生莖端上有細白毛而不滑澤近根有白茸正似白頭老翁故名焉本經名野丈人名胡王使者別錄名柰何草皆狀老翁之意（本經下品）

（氣味苦溫無毒主治溫瘧狂易寒熱癥瘕積聚癭氣逐血止腹痛療金瘡鼻衄止毒痢赤痢腹痛齒痛百節骨痛項下瘤癧一切風氣暖腰膝明目消贅豚實為之使得酒良）



根紫色近根有白茸

七八月採根陰乾

白頭翁使

鳳仙人家多種之極易生二月下子五月可再種苗高二三尺莖大如指中空而脆有紅白二色葉長而尖似桃葉而有鋸齒椏間開花頭翅尾足俱具翹然如鳳狀故名鳳仙又一名金鳳花有紅白紫碧數色自夏初至秋盡開花謝相續結實大如櫻桃尖銳色如毛桃故一名小桃紅生青熟黃犯之即裂故一名急性子子似萊菔子而小褐色婦女採其花及莖葉包染指甲每呼為指甲草

（子氣味微苦溫有小毒主治產難積塊噎膈下骨哽透骨通竅花氣味甘滑溫無毒主治蛇傷擂酒服即解又治腰脇引痛不）

可忍者研餅晒乾為末空心每服三錢活血消積

根葉氣味苦甘辛有小毒主治雞魚骨哽誤吞銅鐵杖撲腫痛散血通經軟堅透骨

鳳仙新增

子性急速故能透骨軟堅庖人烹魚肉硬者投數粒即易爛是其驗也緑其透骨最能損齒與玉簪根同凡服者不可着齒多用戟人咽



鳳仙枝形

衛生易簡方治馬患諸病白鳳仙花連根葉熬膏遇馬有病抹眼四角上即汗出而愈

摘玄方金鳳花子研末入砒少許點疼牙根取之

曼陀羅花

生北土。人家亦栽之。春生夏長緑莖碧葉。高二三尺。八月開白花六瓣。狀如牽牛花而大。朝開夜合。結實圓而有丁拐。中有小子。八月采花。九月采實。法華經言佛說法時。天雨曼陀羅花。又道家北斗有陀羅星使者。手執此花。故後人因以名花曼陀羅。因葉形似茄。一名風茄兒。一名山茄子。一名胡茄。

新增

花子氣味辛溫有毒

主治諸風及寒濕脚氣煎湯洗之又主驚癇及脫肛并入麻藥



花白子紫色類茄子

李時珍曰相傳此花笑采釀酒飲令人笑舞采釀酒令人舞予常試之飲須半酣更令一人或笑或舞引之乃驗也八月采蔓陀羅花七月采火麻子花陰乾等分為末熱酒調服三錢少頃昏昏如醉割瘡灸火宜先服此則不覺苦也

芫花

始生淮源川谷。今處處有之。苗高二三尺。葉似白前及柳葉。根皮黃似桑根。正月二月花發紫碧色。亦有白色者。葉未生時收采日乾。別録名杜芫。吳普名赤芫。山海經云。首山其草多芫是也。

氣味辛溫有小毒

主治欬逆上氣喉鳴喘咽腫短氣蠱毒鬼瘧疝瘕癰腫殺蟲魚○消胷中痰水喜唾水腫五水在五臟皮膚及腰痛下寒毒肉毒根療疥瘡可用毒魚○治心腹脹滿去水氣寒痰涕唾如膠通利血脉治惡瘡風痺濕一切毒風四肢攣急不能行步○療欬逆瘴瘧○治水飲痰澼脇下痛

芫花木部下品今移此



修治芫花留數年陳久者良用當微炒或以醋炒不可近目

决明為之使反甘草　多服令人洩

集効方治白禿瘡芫花為末猪脂和傅之

覆盆子

長條。四五月紅熟。秦州甚多。永興華州亦有。及時山中人採取。其味酸甘。外如荔枝櫻桃許大。軟紅可愛。失採則就枝

生蛆。益腎臟小便。服之當覆溺器。故名覆盆子。

氣味甘平無毒

主治益氣輕身令髮不白○補虛續絕強陰健陽悅澤肌膚安和五臟溫中益力療勞損風虛補肝明目並宜擣篩每旦水服三錢○男子腎精虛竭陰痿能令堅長女子食之有子○食之令人好顏色榨汁塗髮不白○益腎臟縮小便取汁同少蜜煎為稀膏點服治肺氣虛寒

覆盆子別錄上品（自果部移入此）





青黃色（有鱗甲）



五月采之烈日（暴乾不爾易爛）

修治去蒂取子以酒拌蒸之晒乾用　覆盆子臣

集簡方治陽事不起覆盆子酒浸焙研為末每旦酒服三錢○良

木鼈子 始生回回國。今西土邛州諸處皆有之。蔓生。夏開黃花。七八月結實如栝樓。生青熟赤。亦如木鼈。其核圓小於木鼈而色白。味苦。故一名苦實。狀如馬之連錢。故一名馬錢子。

番木鼈味苦寒無毒

主治傷寒熱病咽喉痺痛消痞塊並含之嚥汁或磨水噙嚥

番木鼈新增



能毒狗至　亦能殺飛禽（今人多用毒烏鴉）

番木鼈形圓色白有毛細切擣爛和肉內毒鼠即死勿令猫食之

黃藥子 原出嶺南。今夔陝州郡及明越泰隴山中亦有之。以忠州萬州者為勝。蔓生。葉似薄荷而色青黃。莖赤有節。節有枝相當。其根初採時紅赤色。暴乾則黃。故名黃藥子。

氣味苦平無毒

主治諸惡瘡腫瘻喉痺蛇犬咬毒研水服之亦含亦塗○凉血降火消癭解毒○治馬心肺熱疾

黃藥子宋開寶（自木部移入此）



市賣根形



皮紫黑色多鬚每鬚處有白眼（肉黃色）

兵部手集治鼻衄出血以新汲水磨黃藥子汁一盞頓服立差

墓頭回 山谷處處有之。根如地榆。長條黑色。聞之極臭。俗呼雞糞草。

墓頭回乾久益善治崩中赤白帶下不拘遠年近日少則一服多則三服其効如神每用一把水酒各半盞童便半盞新紅花一捻煎七分臨臥服



根色黑氣臭
墓頭回新增
葉形見之
根形見市賣者

避水集驗要方盱眙蔡大尹任滑縣夫人有前病醫藥百計不效有一僧人獻上方一服輒愈後轉相傳治無不稱驗今人治傷寒瘟瘧多有用墓頭回者

白龍鬚 劉松石保壽堂方云。生近水傍有石處。寄生搜風樹節。

乃樹之餘精也。細如稯絲直起無枝葉。最難得真者。一種萬纓草。生于白線樹根。細絲相類。但有枝並稍粗爲異。誤用不效。此草形似龍鬚菜而色白。故名白龍鬚。

氣味甘微辛平無毒○主治男婦風濕腰腿疼痛左癱右瘓口目喎斜及產後氣血流散脛骨痛頭目昏暗腰腿疼不可忍者並宜服之惟虛勞癱瘓不可服研末每服一錢氣弱者七分無灰酒下密室隨左右貼床臥待汗出自乾勿多蓋被三日勿下床見風一方得疾淺者用末三錢蒸餅黃酒一壺每日先服桔梗湯少頃飲酒二盞早一服晚一服


白龍鬚 新增

真

色青白有節

（有一種色黃如細絲一種長及一二尺餘如草木之根皆偽也）

草果 生閩廣。八月采實。內子大粒成團。外殼緊厚多皺。凡資入劑去殼取仁。此草結實類果。故名草果。

氣味辛溫無毒

主治消宿食解酒毒除胃腸脹滿卻心腹冷痛同縮砂溫中焦佐常山截疫瘧辟山嵐瘴氣止霍亂惡心

草果新增


味辛氣烈造魚鱠調食饌伏此以為君

修治草果去殼取仁剉用　升也陽也

大茴香 出閩廣。殼赤色。大如錢。有八角。子藏殼中。秋月收采。嚼甚香甜。治膀胱腎間冷氣。大有回陽散冷之功。故名大茴香。

氣味辛平無毒

主治腎勞疝氣小腸吊氣攣疼乾濕腳氣膀胱冷氣腫痛開胃止嘔下食調饌止臭生香為諸瘻霍亂捷方補命門不足要理腰痛療惡瘡

大茴香 新增


紫色八角

俗呼八角茴香

修治鹽酒炒入心腎二臟及小腸膀胱亦有微炒為末用者

兩頭尖 自遼東來貨者甚多。每呼為附子。今呼兩頭尖。象形也。

氣味辛熱有毒主治風濕和氣癰腫金瘡四肢拘攣骨節疼痛多入膏藥中用

（兩頭尖似草烏而兩頭尖銳黑色予考諸本草俱無載之者是以不知出處之的以俟後之君子再正之）


新增

通脫木 生江南。葉似草麻。心中有瓤。輕白可愛。女工取以飾物。此瓤脫木得之。故名通脫木。爾雅云離南活莌。山海經又名寇脫。今俗亦名通草。

氣味甘淡寒無毒

主治利陰竅治五淋除水腫癃閉瀉肺解諸蠱毒痛明目退熱下乳催生

通脫木本經中品


瓤至輕虛有紋色白

今人看各樣顏色作花新鮮愛人

罌子粟 今處處有之。苗春生。繁茂。花有白紅紫粉紅杏黃墨色

者艷麗可愛一名麗春一名賽牡丹一名錦被花其實狀如罌子其米如粟故名罌子粟一名米囊子俗呼米殼又呼罌粟殼結青苞時午後刺其外面皮三五處次早津液出以竹刀刮收入瓷器陰乾名曰阿芙蓉故今市者猶有苞片在內每呼為鴉片又呼為啞片王氏醫林集要言是天方國紅罌粟花不令水淹頭花謝後刺黃皮取之者阿方音稱我也以其花似芙蓉故名阿芙蓉

粟甘平無毒主治丹石發動不下飲食和竹瀝煑粥食行風氣（逐邪熱治反胃胸中痰滯治瀉痢潤燥）

殼氣味酸澁微寒無毒主治止瀉痢固脫肛治遺精久欬斂肺澀腸止心腹筋骨諸痛

阿芙蓉是紅罌粟花之津液也氣味酸澀溫微毒主治瀉痢脫肛不止能澀丈夫精氣○色蒼黑嗅之豆腥氣者真合春方多用

罌子粟舊部下品今移此



乾殼色白



宛如酒罌



濕熱瀉痢禁服誤用殺人如斂

修治米殼去淨膜筋或蜜炙或醋炒各隨方法

一罌有子數千萬粒小如葶藶子其色碧隔年種則佳研子以水煎仍加蜜為罌粟湯服石人甚宜飲

忍冬多生田坂畦畛或產園圃牆垣凌冬不凋故名忍冬蔓延樹上藤多左纏故名左纏藤又名鷺鷥藤又名金釵股又名老翁鬚四月開花香甚撲鼻初開色白經久變黃因名金銀花凡數名者前乃美其藤之異常此則美其花之出類也

氣味甘溫無毒

主治寒熱身腫久服輕身長年益壽○治腹脹滿能止氣下澼○熱毒血痢水痢濃煎服○治飛尸鬼擊一切風濕氣及諸腫毒癰疽疥癬楊梅諸惡瘡散熱解毒

忍冬莖微紫對節生葉有澁毛花長寸許一蒂兩花二瓣一大一小如半邊狀長蕊氣甚芬芳四月采花陰乾藤葉不拘時日采

金銀花形



萬表積善堂方治一切腫毒不問已潰未潰或初起發熱用金銀花連莖葉自然汁半盌煎八分服之以渣傅上敗毒托裏散氣和血其功獨勝

忍冬莖葉及花功用皆同昔人稱其治風除脹解痢逐尸為要藥而後世不復知用後世稱其消腫散毒治瘡為要藥而昔人並未言及乃知古今之理萬變不同未可一轍論也

南藤始生南山山谷今泉州榮州有之生依南木故號南藤圖經名石南藤莖如馬鞭有節紫褐色葉如杏葉而尖采無時始因丁公用有效故別錄名丁父名丁公寄開寶名丁公藤

氣味辛溫無毒

主治金瘡痛延年○主風血補衰老起陽強腰腳除痺變白逐冷氣排風邪煑汁服冬月浸酒服○煑汁服治上氣咳嗽

石南藤宋開寶

按南史云解叔謙鴈門人母有疾夜禱聞空中語云得丁公藤治之即癢訪醫及本草皆無此藥至宜都山中見一翁伐木云是丁公藤療風乃拜泣求翁并示以漬酒法受畢失翁所在母服之遂愈


色紫有節
木部移此
八月采日乾用

清風藤生台州天台山中。其苗蔓延木上。四時常青。一名青藤。

主治風疾○治風濕流注歷節鶴膝麻痺瘙痒損傷瘡腫入酒藥中用

清風藤宋圖經　細條色青者佳

普濟方青藤根三兩防已一兩㕮咀入酒一瓶煮飲



鈎藤原出梁州。今秦中興元府有之。葉細長。其莖間有刺若鈎。故名鈎藤。亦作弔藤。從簡耳。俗呼鈎藤。

氣味甘微寒無毒

主治小兒寒熱十二驚癇○小兒驚啼瘈瘲熱壅客忤胎風○大人頭旋目眩平肝風除心熱小兒內釣腹痛發斑疹

鈎藤別錄木部下品今移此



古人多用皮後世多用鈎取其力銳耳手足厥陰藥也

錢氏方治小兒斑疹不快鈎藤鈎子紫草茸等分為末每服一字或半錢温酒服

鈎藤臣

本草原始卷之三

本草原始卷之四

木部

松（脂節茯苓茯神琥珀）　柏實（側柏葉）　桂（桂心桂枝牡桂箘桂）　槐（實花葉）　枸杞（地骨皮）
酸棗仁　蘗木（即黃蘗）　楮實　乾漆　五加皮
牡荊實　蔓荊實　辛夷　桑根白皮（椹桑上寄生）
杜仲　楓香脂（大楓子）　女貞實　蕤核　丁香
沉香　乳香　降真香　檀香　金櫻子
吳茱萸　巵子（即梔子）　樟腦（即朝腦）　騏驎竭（即血竭）　龍腦（即片腦）
阿魏　盧會　蕪荑　枳實（枳殼）　烏藥
厚朴　茗（兒茶）　山茱萸　紫葳（即凌霄花）　豬苓
五棓子（百藥煎）　没藥　海桐皮　合歡　密蒙花
巴豆　連翹　蜀椒（目）　皂莢　訶梨勒（即訶子）
楝實　無食子　益智子　蘇方木　木鼈子
椿木（樗木）　棕櫚

苞木部

竹（堇竹葉淡竹葉苦竹葉天竺黃）　雷丸

木部五十九種附名者十四種

本草原始卷之四

雍丘正宇李中立纂輯並書畫

松始生泰山山谷。今處處有之。其葉有兩鬣五鬣七鬣。歲久則實繁。凌冬不凋。按王安石字說云。松柏爲百木之長。松猶公也。柏猶伯也。故松從公。柏從伯。**松脂**松之膏脂也。本經一名松膏。一名松肪。本草綱目名松膠。因氣香而色黃。故俗呼松香。又呼黃香。**茯苓****茯神**生大松下。今以雲貴出者爲佳。形塊無定。以似人龜鳥獸形者爲良。有赤白二種。乃假松氣而生者。二月八月

採陰乾。茯者附也。伏松之下。有附之義也。苓者零也。離松之體。有零之義也。故名茯苓。茯神附結本根。既不離本。故曰茯神。史記龜莢傳作伏靈。蓋松之神靈之氣。伏結而成。故謂之伏靈伏神也。**琥珀**是松脂淪入地中千年所化。生永昌者佳。今西戎亦有。色差淡而明澈。南方者色深而重濁。入藥以手摩熱可拾草芥者爲上。李時珍曰。虎死則魄入地化爲石。此物狀似之。故謂之虎魄。俗文從玉。以其類玉也。

松葉氣味苦溫無毒○主治風濕瘡生毛髮安五臟守中不饑
延年○細切以水及麪飲服之或擣屑丸服可斷穀及治惡瘡○灸罯凍瘡風瘡佳○去風痛脚痺殺米蟲

列仙傳云毛女在華陰山中山客獵師世世見之形體生毛自言始皇宮人秦亡入山食松葉遂不飢寒身輕如飛

松脂氣味苦甘溫無毒○主治癰疽惡瘡頭瘍白禿疥瘙風氣安五臟除熱久服輕身不老延年○除胃中伏熱咽乾清渴風痺死肌鍊之令白其赤者主惡痺○煎膏生肌止痛排膿抽風貼諸瘡膿血瘻爛塞牙孔殺蟲○除邪下氣潤心肺治耳聾古方多用辟穀○強筋骨利耳目治崩中帶下

松節氣味苦溫無毒○主治百邪久風風虛脚痺疼痛○釀酒主脚弱骨節風○炒焦治筋骨間病能燥血中之濕○治風蛀牙痛煎水含漱或燒灰日揩有效

白茯苓氣味甘平無毒○主治胸脇逆氣憂恚驚邪恐悸心下結痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便久服安魂養神不饑延年○止消渴好睡大腹淋瀝膈中痰水水腫淋結開胸腑調臟氣伐腎邪長陰益氣力保神氣○開胃止嘔逆善安心神主肺痿痰壅心腹脹滿小兒驚癇女人熱淋○補五勞七

傷開心益智止健忘煖腰膝安胎○止渴利小便除濕益燥和中益氣利腰臍間血○逐水緩脾生津導氣平火止瀉除虛熱開腠理○瀉膀胱益脾胃治腎積奔豚

赤茯苓主治破結氣○瀉心小腸膀胱濕熱利竅行水

茯苓皮主治水腫膚脹開水道開腠理

茯神氣味甘平無毒主治辟不祥療風眩風虛五勞口乾止驚悸多恚怒善忘開心益智安魂魄養精神○補勞乏主心下急痛堅滿人虛而小腸不利者加而用之

茯神心內木主治偏風口面喎斜毒風筋攣不語心神驚掣虛而健忘○治脚氣痺痛諸筋攣縮

琥珀氣味甘平無毒主治安五臟定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血通五淋○壯心明目磨翳止心痛顛邪療蠱毒破癥瘕治產後血枕痛○止血生肌合金瘡○清肺利小腸

按曹昭格古論云琥珀出西番南番乃楓木津液多年所化色黃而明瑩者名蠟珀色若松香紅而且黃者名明珀有香者名香珀出高麗倭國者色深紅有蜂蟻松枝者尤好

松別錄上品

松脂松之津液也茯苓茯神乃假松氣而生者琥珀乃松脂入地所化



陶隱居云松脂以桑灰汁或酒煑軟挼內寒水中數十遍白滑則可用使

修治茯苓去皮及筋剉用茯苓有有筋者有無筋者無筋者佳

茯苓雲貴者皮紅他處者皮黑有小如雞鵝卵大如匏瓜者惟以堅如石者爲勝

元素曰茯苓性溫味甘而淡氣味俱薄浮而升陽也之才曰馬

閒爲之使得甘草防風芍藥紫石英麥門冬共療五臟惡白斂畏牡蒙地榆雄黃秦艽龜甲忌米醋及酸物

痔漏神方赤白茯苓去皮没藥各二兩破故紙四兩石臼擣成一塊春秋酒浸三日夏二日冬五日取出木籠蒸熟晒乾爲末酒糊爲丸梧子大每酒服二十丸漸至五十丸

茯苓臣

修治茯神去皮及心內木切用　忌惡同茯苓

茯神君

修治琥珀用水調側柏子末安瓷鍋中置琥珀于內煑之從巳至申當有異光搗粉篩用

直指方治小兒胎驚琥珀防風各一錢朱砂半錢爲末豬乳調一字入口中最妙　琥珀君

柏實始生泰山山谷今處處有之而乾州者最佳三月開花九月結子候成熟收採蒸暴乾舂礧取熟仁子用其葉名**側柏**密州出者尤佳按魏子才六書精蘊云萬木皆向陽而柏獨西指蓋陰木而有貞德者故字從白白者西方也陸佃埤雅云柏之指西猶鍼之指南也柏有數種入藥惟取葉扁而側生者故曰側柏

柏實俗呼柏子仁氣味甘平無毒

主治驚悸益氣除風濕安五臟久服令人潤澤美色耳目聰明不饑不老輕身延年○療恍惚虛損吸吸歷節腰中重痛益血止汗○治頭風腰腎中冷膀胱冷宿水興陽道益壽去百邪鬼魅小兒驚癇○潤肝○養心氣潤腎燥安魂定魄益智寧神燒瀝澤頭髮治癬疥

側柏葉氣味苦微溫無毒

主治吐血衄血痢血崩中赤白輕身益氣令人耐寒暑去濕痺

生肌○治冷風歷節疼痛止尿血○炙署凍瘡燒取汁塗頭黑潤鬢髮○傅湯火傷止痛滅瘢服之療蠱痢作湯常服殺五臟蟲益人

柏本經上品

側柏忌塚墓上采者

柏子仁新鮮無油者爲良



修治柏實蒸熟曝烈舂簸取仁炒研入藥　畏菊花羊蹄草

奇效方用柏子仁二斤爲末酒浸爲膏棗肉三斤白蜜白朮末地黃末各一斤擣勻丸彈子大每嚼一丸一日三服百日百病愈久服延年壯神

修治柏葉或生或炒各從本方

權曰苦辛性濇與酒相宜頌曰性寒之才曰瓜子牡蠣桂為之使畏菊花羊蹄諸石及麪麴伏砒硝

梅師方治頭髮不生側柏葉陰乾作末和麻油塗之

桂生桂陽。葉如柏葉。冬夏常青。二八十月采皮陰乾。半卷多脂其味辛烈。所謂官桂是已。名官桂者。乃上等供官之桂也。一云出觀賓宜韶欽諸州。因名觀桂。世人以觀字畫多。故寫作官也。俗呼桂皮。因皮赤。又呼為丹桂。按范成大桂海志云。凡木葉心皆一縱理。獨桂有兩道如圭形。故字從圭。陸佃埤雅云。桂猶圭也。宜導百藥為之先聘通使。如執圭之使也。爾雅謂之梫者。能侵害他木也。故呂氏春秋云。桂枝之下無雜木。雷公炮炙論云。桂釘木根。其木即死。是也。其肉厚辛烈者為肉桂。去其皮與裏、當其中者為桂心。其枝之細小者為桂枝。

桂即官桂桂之厚者名肉桂氣味甘辛大熱有小毒

主治利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻齆墮胎溫中堅筋骨通血脉理踈不足宣導百藥無所畏久服神仙不老○補下焦不足治沉寒痼冷之病滲泄止渴去營衛中風寒表虛自汗春夏為禁藥秋冬下部腹痛非此不能止○補命門不足益火消陰○治寒痺風瘖陰盛失血瀉痢驚癇

桂心氣味苦辛無毒

主治九種心痛腹內冷氣痛不可忍欬逆結氣壅痺脚痺不仁止下痢殺三蟲治鼻中息肉破血通利月閉胞衣不下○治一切風氣補五勞七傷通九竅利關節益精明目暖腰膝治風痺骨節攣縮續筋骨生肌肉消瘀血破痃癖癥瘕殺草木毒○治風僻失音喉痺陽虛失血內托癰疽痘瘡能引血化汗化膿解蛇蝮毒



桂別錄上品

桂心桂肉之中心非桂枝之中心也以枝代之非也

官桂皮卷色紫赤味辛辣市者每遇缺時即以西桂柳桂充之西桂皮薄不卷而味頗辣柳桂皮厚不卷而味不辣宜辨之

修治桂去粗皮用

杲曰桂辛熱有毒陽中之陽浮也氣之薄者桂枝也氣之厚者桂肉也氣薄則發泄桂枝上行而發表氣厚則發熱桂肉下行而補腎此天地親上親下之道也

好古曰桂枝入足太陽經桂心入手少陰經桂肉入足少陰太陰經血分雖有小毒亦從類化與黃芩黃連為使小毒何施與烏頭附子為使全取其熱性而已與巴豆硇砂乾漆川山甲水蛭等同用則小毒化為大毒與人參麥門冬甘草同用則調中益氣便可久服也

之才曰桂得人參甘草麥門冬大黃黃芩調中益氣得柴胡紫石英乾地黃療吐逆忌生葱石脂

甲乙經治足躄筋急桂末白酒和塗之一日一上

千金方治中風口喎面目相引偏僻頰急舌不可轉桂心酒煑取汁故布蘸搨病上正即止左喎搨右右喎搨左常用大效

素問曰辛甘發散為陽故漢張仲景桂枝湯治傷寒表虛皆須此藥是專用辛甘之意也

桂心君

牡桂 生南海。葉似枇杷。皮薄色黃味淡少脂肉。氣如木蘭。一名木桂。

牡桂氣味辛溫無毒○、桂枝味辛甘氣微熱主治同牡桂
主治上氣欬逆結氣喉痺吐吸利關節補中益氣○久服通神輕
身不老○心痛脇痛脇風溫筋通脉止煩出汗○去冷風疼
痛○去傷風頭痛開腠理觧表發汗去皮膚風濕○泄奔豚
散下焦畜血利肺氣○橫行手臂治痛風

牡桂
本經上品



修治牡桂去粗皮用
經驗後方治大人小兒喫雜果子多腹脹氣急取牡桂碾末飯
丸如菉豆大小兒熟水下五丸大人十丸未痊再服
牡桂君

菌桂 生交阯桂林山谷巖崖間。葉似柿葉而尖狹光淨。花白蘂黃。四月開。五月結實。樹皮青黃。二月七月採皮日乾。三重者良。菌者竹名。此桂正圓如竹。故名菌桂。嫩而易卷如筒。即古人所用筒桂也。故一名筒桂。筒菌字近。後人誤書為菌。今本經又作從草之菌。愈誤矣。

菌桂氣味辛溫無毒
主治百病養精神和顏色為諸藥先聘通使久服輕身不老面
生光華媚好常如童子

菌桂本經上品
主治與桂心牡
桂迥然不同昔
人所服食者蓋
此類耳



列仙傳云范蠡好食桂飲水討藥人世世見之又桂父象林人
常服桂皮葉以龜腦和服之
諸本草論桂紛紛不一幾不可考按尸子云春花秋英曰桂嵇
含南方草木狀云桂生合浦交趾生必高山之顛冬夏常青

其類自為林更無雜樹有三種皮赤者為丹桂葉似柿者為
菌桂葉似枇杷者為牡桂其說甚明足破諸家之辯矣

槐 始生河南平澤。今處處有之。其木有極高大者。按爾雅槐有數種。葉大而黑者名櫰槐。晝合夜開者名守宮槐。葉細而青綠者但謂之槐。其功用不言有別。四月五月開黃花。六月七月結實。七月七日采嫩實擣汁作煎。十月采老實入藥。皮根采無時。按周禮外朝之法面三槐三公位焉。王安石釋云。槐黃中懷其美。故三公位之。吳澄注云。槐懷也。可以懷來遠人。春秋元命包云。槐之為言歸也。古者樹槐聽訟其下。使情歸實也。一云槐虛

星之精。葉容而黑。晝合夜開。故從鬼。

槐實氣味苦寒無毒（俗呼槐角子又呼槐豆）（景天為之使）

主治五內邪氣熱止涎唾補絕傷火瘡婦人乳瘕子臟急痛○久服明目益氣頭不白延年治五痔瘡瘻以七月七日取之擣汁銅器盛之日煎令可丸如鼠屎納竅中日三易乃愈又墮胎○治大熱難產○殺蟲去風合房陰乾煑飲明目除熱淚頭腦心胸間熱風煩悶風眩欲倒心頭吐涎如醉瀁瀁如舡車上者○治丈夫女人陰瘡濕痒催生吞七粒○踈導風熱○治口齒風涼大腸潤肝燥

槐花氣味苦平無毒

主治五痔心痛眼赤殺腹臟蟲及皮膚風熱腸風瀉血赤白痢並炒研服○涼大腸○炒香頻嚼治失音喉痺又療吐血衄血崩中漏下

葉氣味苦平無毒主治煎湯治小兒驚癇壯熱疥癬及丁腫皮莖同用○邪氣產難絕傷及癮疹牙齒諸風采嫩葉食

枝主治洗瘡及陰囊下濕痒八月斷大枝候嫩蘗煑汁釀酒療大風痿痺甚效○炮熱熨蠍毒○青枝燒瀝塗癬煆黑揩牙去蟲煎湯洗痔核○燒灰沐頭長髮○治赤目崩漏

槐實凡采得只取兩子三子者待乾以銅鎚鎚破用烏牛乳浸一宿蒸用槐花未大開采收陳者良入藥炒用花未開者為槐子染家水煑染色

槐（本經上品）



和劑局方槐角丸治五種痔漏腸風下血脫肛槐角去梗炒一兩地榆當歸酒焙防風黃芩枳殼麩炒各半兩為末酒糊丸梧子大每服五十丸米飲下

別錄曰槐實酸鹹好古曰純陰肝經氣分藥也元素曰槐花味厚氣薄純陰也時珍曰味苦色黃氣涼陽明厥陰血分藥也

朱氏集驗方治舌衄出血槐花末傅之即止

槐子白

枸杞古以常山者為上。今以甘州者為佳。春生苗葉如石榴葉。而軟薄堪食。俗呼為甜菜。其莖幹高三五尺作叢。六月七月生小紅紫花。隨便結實。形微長如棗核。其根名**地骨**詩小雅云集于苞杞。陸機詩疏云。苦杞爾雅名枸檵。衍義名枸棘。綱目曰。枸杞二樹名。此木棘如枸之棘。莖如杞之條。故兼名之。其根最長。故曰地骨。俗呼地骨皮。

枸杞氣味苦寒無毒主治五內邪氣熱中消渴周痺風濕久服堅筋骨輕身不老耐寒暑○下胸脇氣客熱頭痛補內傷大勞噓吸強陰利大小腸○補精氣諸不足易顏色變白明目安神令人長壽

地骨皮氣味苦寒主治細剉拌麪煑熟吞之去腎家風益精氣○去骨熱消渴○解骨蒸肌熱風濕痺堅筋骨涼血○治在表無定之風邪傳尸有汗之骨蒸○瀉腎火降肺中伏火去胞中火退熱補正氣○治上膈吐血煎湯嗽口止齒血治骨槽風○治金瘡神驗

枸杞地骨（本經上品）



枸杞子氣味苦寒權曰甘平主治堅筋骨耐老除風去虛勞補精氣○主心病嗌乾心痛渴而引飲腎病消中○滋腎潤肺榨油點燈明目

修治枸杞子擇紅小鮮明者揀去枝梗酒潤搗爛入藥

修治地骨皮以熟甘草湯洗淨焙乾用

杲曰地骨皮苦平寒升也陰也好古曰入足少陰手少陽經制硫黃丹砂

道書言千載枸杞其形如犬故得枸名按劉禹錫枸杞井詩云僧房藥樹依寒井井有清泉藥有靈翠黛葉生籠石甃殷紅子熟照銅缾枝葉本是仙人杖根老能成瑞犬形上品功能甘露味還知一勺可延齡又續仙傳云朱孺子見溪側二花犬逐入于枸杞叢下掘之得根形如二犬烹而食之忽覺身輕周密浩然齋日鈔云宋徽宗時順州築城得枸杞其形如犬者據前數說則枸杞之滋益不獨子而根亦不止于退熱而已

地骨皮本經名地節日華子名地仙別錄名却暑名仙人杖

衍義云枸杞當用梗皮地骨當用根皮枸杞子當用紅實是一物有三用其皮寒根大寒子微寒亦三等此正是孟子所謂性由杞柳之杞今人多用其子直爲補腎藥是曾未考究經意當更量其虛實冷熱用之

酸棗始生河東川澤。今近京及西北州郡皆有之。野生。多在坡坂及城壘間。似棗木而皮細。其木心赤色。莖葉俱青。花似棗花。八月結實紫紅色。似棗而圓小。味酸。當月採實取核中仁陰乾。爾雅辨棗之種類。曰實小而酸曰樲棘。孟子曰養其樲棘。趙岐注所謂酸棗是也。

酸棗仁氣味酸平無毒

主治心腹寒熱邪結氣聚四肢酸痛濕痺久服安五臟輕身延年○煩心不得眠臍上下痛血轉久洩虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣能令人肥健○筋骨風炒仁研湯服

酸棗仁本經上品

斅曰用仁以葉拌蒸半日去皮尖用今人修治多曬生用不得曬炒熟用

俗呼山棗惡防己

外臺秘要療刺在人肉中不出酸棗核燒末水服之立便得出



酸棗小而圓其核中仁扁有紫色赤色者

蘗木（即黃蘗也）始生漢中山谷及永昌。今處處有之。以蜀中者爲佳。

木高數丈。葉類茱萸及紫椿。經冬不凋。皮外白裏深黃色。根如松下茯苓。二月五月采皮日乾。別錄名黃蘗。俗作黃柏者。省寫之謬也。

黃蘗氣味苦寒無毒

主治五臟腸胃中結熱黃疸腸痔止洩痢女子漏下赤白陰傷蝕瘡○療驚氣在皮間肌膚熱赤起目熱赤痛口瘡久服通神○熱瘡皰起蟲瘡血痢止消渴殺蛀蟲○男子陰痿及傅莖上瘡治下血如雞鴨肝片○安心除勞治骨蒸洗肝明目多淚口乾心熱殺疳蟲治蚘心痛鼻衄腸風下血後急熱腫痛○瀉膀胱相火補腎水不足堅腎壯骨髓療下焦虛諸痿癱瘓利下竅除熱○瀉伏火救腎水治衝脈氣逆不渴而小便不通諸瘡痛不可忍○得知母滋陰降火得蒼朮除濕清熱爲治痿要藥得細辛瀉膀胱火治口舌生瘡○傅兒頭瘡

黃蘗本經上品



修治擇皮緊厚二三分鮮黃者削去粗皮用生蜜水浸半日漉出晒乾用蜜塗文武火炙令蜜盡爲度

一云氣味俱厚沉而降陰也又云苦厚微辛陰中之陽入足少陰經爲足太陽引經藥

好古曰黃芩梔子入肺黃連入心黃蘗入腎燥濕所歸各從其類也故活人書四味解毒湯乃上下內外通治之藥

（黃蘗惡乾漆伏硫黃）

外臺秘要治口中及舌生瘡爛剉黃蘗含之

（黃蘗使）

楮實始生少室山。今所在有之。其葉似葡萄作瓣而有子者爲佳。其實大如彈丸。生青熟紅。八九月采實。水浸去皮穰取中子入藥。俗呼楮桃。本經一名穀實。楚人呼乳爲穀。其木中白汁如乳。故以名之。今人呼爲楮實子。

楮實氣味甘寒無毒

主治陰痿水腫益氣充肌明目久服不飢不老輕身○壯筋骨助陽氣補虛勞健腰膝益顏色

葉氣味甘凉無毒

主治小兒身熱食不生肌可作浴湯又主惡瘡生肉○治刺風身癢○治鼻衄數升不斷者擣汁三升再三服之良久即止嫩茹之去四肢風痺赤白下痢○炒研搜麪作餺飥食之主水痢○利小便去風濕腫脹白濁疝氣癖瘕

楮實別錄上品

實如彈丸生青有毛熟赤色秋采日乾去皮穰取中子子類紅穀



修治楮實子去輕浮者以酒浸一時焙乾用

廣利方治蝎螫人痛不止穀樹白汁塗之立差

（葉堪包半夏麴）

乾漆始生漢中川谷。今蜀漢金峽襄歙州皆有之。木高三二丈。皮白。葉似椿。花似槐。子若牛李。木心黃。夏至後。以竹筒釘入木中取之。舊云用漆桶中自然乾者。狀如蜂房孔孔隔者。今多用筒子內乾者。以黑如瑿堅如鐵石者爲佳。許慎說文曰。漆本作桼。木汁可以髹物。其字象水滴而下之形也。

乾漆氣味辛溫無毒

主治絕傷補中續筋骨填髓腦安五臟五緩六急風寒濕痺生漆去長蟲久服輕身耐老○乾漆療欬嗽消瘀血痞結腰痛女子疝瘕利小腸去蛔蟲○殺三蟲通經脉○治傳尸勞除風○削年深堅結之積滯破日久凝結之瘀血



修治乾漆擣碎炒熟不爾損人腸胃若是濕漆煎乾更好亦有燒存性者

（元素曰辛平有毒降也陽中陰也之才曰半夏為之使畏雞子忌油脂）

（淮南子云漆見蟹而不乾相感志云漆得蟹而成水蓋物性相制也宗奭曰濕漆藥中未見用凡用者皆乾漆耳其濕者在燥熱及霜冷時則難乾得陰濕雖寒月亦易乾亦物之性也若霑漬人以油治之凡驗漆惟稀者以物蘸起細而不斷斷而急收更又塗于乾竹上蔭之速乾者並佳）

（凡人畏漆者嚼蜀椒塗口鼻則可免生漆瘡者杉木湯紫蘇湯漆姑草湯蟹湯浴之皆良毒發飲鐵漿并黃櫨汁甘豆湯喫蟹並可制之）

（婦人產後血運多用乾漆火燒烟薰鼻）

（乾漆臣）

五加皮始生漢中及寃句。今近道處處有之。春生苗。莖葉俱青。作叢。赤莖。又似藤蔓。高三五尺。上有黑刺。葉生五杈作簇者良。四葉三葉者最多為次。每一葉下生一刺。三四月開白花。結青子。至六月漸黑色。根若荆根。皮黃黑。肉白骨硬。十月采根陰乾。今江淮所生者。根類地骨皮。輕脆芬香是也。其苗莖有刺類薔薇。長者至丈餘。葉五出。香氣如橄欖。春時結實如豆粒而扁青色。得霜乃紫黑。吳中亦多。俗名為追風使。機曰。生南方者類草。故小。生北方者類木。故大。時珍曰。春月于舊枝上抽條。山人采為蔬茹。正如枸杞。生南方堅地者如草類。生北方沙地者皆木類也。此藥以五葉交加者良。故名五加。楊慎丹鉛錄作五佳。云。一枝五葉者佳故也。炮炙論名五花。蜀人呼為白刺。譙周巴蜀異物志名文章草。有贊云。文章作酒。能成其味。以金買草。不言其貴。是已。

五加皮氣味辛溫無毒

主治心腹疝氣腹痛益氣療躄小兒三歲不能行疽瘡陰蝕○男子陰痿囊下濕小便餘瀝女人陰癢及腰脊痛兩脚疼痺○風弱五緩虛羸補中益精堅筋骨強志意久服輕身耐老○破逐惡風血四肢不遂賊風傷人軟脚𦜉腰主多年瘀血在皮肌治痺濕內不足○明目下氣治中風骨節攣急補五勞七傷○釀酒飲治風痺四肢攣急○作末浸酒飲治目僻眼緋○葉作蔬食去皮膚風濕

五加皮本經上品

今市賣一種曰南五加皮色白彷彿白鮮柔韌而無味殊為爭失

五加皮五葉者良



根黃色類地骨皮輕脆芬香者為真

修治五加皮去骨之才曰遠志為之使惡玄參蛇皮

昔魯定公母單服五加酒以致不死臨隱去伴託死時人自莫之悟耳張子聲楊建始王叔才于世彥皆服此酒而房室不絕得壽三百年有子二十人世世有得服五加酒散而獲延年不死者不可勝計或只為散以代湯茶而餌之驗亦然也大王君謂五加云蓋天有五車之星精也金應五湖人應五德位應五方物應五車故青精入莖則有東方之液白氣入

節則有西方之津赤氣入華則有南方之光玄精入根則有北方之粘黃煙入皮則有戊己之靈五神鎮生相轉青成用之者真仙服之者友嬰也

牡荊實始生河間南陽宛句山谷。或平壽都鄉高岸上及田野。今眉州蜀州及近京亦有之。俗呼黃荊是也。枝莖堅勁作科。不爲蔓生。故稱牡。葉如蓖麻更踈瘦。花紅作穗。實細而黃。如蔓荊子而小。故本經名小荊。古者刑杖以荊。故字從刑。

牡荊實氣味苦溫無毒

主治除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣○得柏實青葙术療風○炒焦爲末飲服治心痛及婦人白帶○用半升炒熟入酒一盞煎一沸熱服治小腸疝氣甚效浸酒飲治耳聾

牡荊別錄上品

之才曰防己爲之使畏石膏

集簡方治濕痰白濁牡荊子炒爲末酒服二錢



蔓荊實舊不載所出州土。今近京及秦隴明越州多有之。莖高四尺。對節生枝。初春因舊枝而生葉。類小楝。至夏盛茂。有花作穗淺紅色。蘂黃白色。花下有青萼。至秋結實。斑黑如梧子許大而輕虛。八月九月采實。一說葉如杏葉作蔓生。故名蔓荊。

蔓荊實氣味苦微寒無毒

主治筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒利九竅去白蟲久服輕身耐老小荊實亦等○風頭痛腦鳴目淚出益氣令人光澤脂綴○治賊風長髭髮○利關節治癇疾赤眼○太陽頭痛頭沉昏悶除昏暗散風和凉諸經血止目睛內痛○搜肝風

俗呼蔓荊子

元素曰味辛溫氣清陽中之陰入太陽經

之才曰惡烏頭石膏

蔓荊實本經上品



修治斅曰凡使去蒂子下白膜一重酒浸一伏時蒸之從巳至未晒乾用

危氏得效方治乳癰初起蔓荊子炒爲末酒服方寸匕渣傅之

蔓荊子臣

辛夷始生漢中川谷。今處處有之。木高數丈。葉似柿而長。正月二月生花。似著毛小桃子。故本經名侯桃。色白帶紫。花落無子。至夏復開花。入藥用花蘂縮者良。已開者劣。謝者不佳。初出如筆。北人呼爲木筆。其花最早。南人呼爲迎春。李時珍曰夷者荑也。其苞初生如荑而味辛也。

辛夷氣味辛溫無毒

主治五臟身體寒熱風頭腦痛面䵟久服下氣輕身明目增年耐老○溫中解肌利九竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩冒身兀兀如在車船之上者生鬚髮去白蟲○通關脈治頭痛

憎寒體噤瘙癢入面脂生光澤○鼻淵鼻衄鼻窒鼻瘡及痘後鼻瘡並用研末入麝香少許葱白蘸入數次甚良

辛夷本經上品

花有紅紫二種入藥當用紫者須未開時收之



修治辛夷去外毛皮用向裏實者微炙○時珍曰氣味俱薄浮而散陽也入手太陰足陽明經○之才曰芎藭為之使惡五石脂畏菖蒲蒲黃黃連石膏黃環

桑根白皮舊不載所出州土今處處有之有數種有白桑葉大如掌而厚雞桑葉花而薄子桑先椹而後葉山桑葉尖而長子種者不若壓條而分者入藥用根古本草言桑根見地上者名馬額有毒殺人旁行出土者名伏蛇亦有毒而致心痛故吳淑事類賦云伏蛇痛馬額殺人徐鍇說文字解云桑音若東方自然神木之名其字象形桑乃蠶所食葉之神木故加木于叒下而別之典術曰桑乃箕星之精

桑上寄生葉類橘而厚軟莖類槐而肥脆高一二尺諸樹皆有惟寄生桑樹枝節間者佳故曰桑上寄生

桑根白皮氣味甘寒無毒

主治傷中五勞六極羸瘦崩中絕脉補虛益氣○去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臚脹利水道去寸白可以縫金瘡○治肺氣喘滿虛勞客熱頭痛內補不足○煑汁飲利五臟入散用下一切風氣水氣○調中下氣消痰止渴開胃下食殺腹臟蟲止霍亂吐瀉研汁治小兒天弔驚癇客忤及傅鵞口瘡大驗○瀉肺利大小腸降氣散血

皮中白汁主治小兒口瘡白漫拭淨塗之便愈又塗金刃所傷燥痛須臾血止仍以白皮裹之甚良○塗蛇蜈蚣蜘蛛傷有驗取枝燒瀝治大風瘡疥生眉髮

桑椹主治單食止消渴利五臟關節痛血氣久服不飢安魂鎮神令人聰明變白不老多收暴乾為末蜜丸日服○擣汁飲解中酒毒釀酒服利水氣消腫

桑上寄生氣味苦平無毒

主治腰痛小兒背強癰腫充肌膚堅髮齒長鬚眉安胎○去女子崩中內傷不足產後餘疾下乳汁主金瘡去痺○助筋骨益血脉○主懷妊漏血不止令胎牢固

桑根白皮本經中品

種樹書云桑以構接則桑大桑根下埋龜甲則茂盛不蛀

桑上寄生本經上品

按鄭樵通志云寄生有兩種一種大者葉如石榴葉一種小者葉如麻葉黃色



修治桑根白皮采十年以上向東畔嫩根銅刀刮去黃皮取裏白皮切焙乾用其皮中涎勿去之藥力俱在其上也忌鐵及鉛

杲曰甘辛寒可升可降陽中陰也好古曰甘厚而辛薄入手太

陰經之才曰續斷桂心麻子為之使

聖惠方治髮鬢墮落桑白皮剉二升以水淹浸煑五六沸去滓頻頻洗沐自不落

桑白皮使

時珍曰寄生高者二三尺其葉圓而微尖厚而柔面青而光澤背淡紫而有茸人言川蜀桑多時有生者他處鮮得須自采或連桑采者乃可用世俗多以襍樹上者充之氣性不同恐反有害也

修治桑寄生以銅刀和根枝莖葉細剉陰乾用勿見火

桑寄生臣

杜仲 始生上虞山谷及上黨漢中○今深山大谷所在有之○樹高數丈○葉似辛夷○亦類柘○其皮類榆柳○折之內有白絲如綿相連○故一名木綿○昔杜姓仲名者服此得道○因名杜仲○

杜仲氣味辛平無毒

主治腰膝痛補中益精氣堅筋骨強志除陰下癢濕小便餘瀝久服輕身耐老○脚中酸疼不欲踐地○治腎勞腰脊攣○能使腎冷𦛗腰痛人虛而身強直風也腰不利加而用之○能使筋骨相着○潤肝燥補肝經風虛其木可作屐益脚

杜仲本經上品元素曰性溫味辛甘氣味俱薄沉而降陰也好古曰肝經氣分藥也惡玄參蛇蛻皮



修治凡使削去粗皮每一斤用酥一兩蜜三兩和塗火炙以盡為度細剉用今有以薑汁拌炒去絲者

按龐元英談藪云一少年新娶後得脚軟病且疼甚醫作脚氣治不效路鈐孫琳診之用杜仲一味寸斷片折每一兩半酒半水一大盞煎服三日能行又三日全愈琳曰此乃腎虛非脚氣也杜仲能治腰膝痛以酒行之則為效容易矣

楓香脂 所在大山皆有之○今南方及關陝甚多○樹甚高大○似白楊○葉圓而作歧○有三角而香○二月有花○其實作毬○有柔刺○大如鴨卵○其脂為白膠香○爾雅謂楓為欇欇○言天風則鳴欇欇也○說文解字曰○楓木厚葉弱枝善搖○故字從風○漢宮中多植之○至霜後葉丹可愛○故稱楓宸○梵書謂之薩闍羅婆香○俗呼芸香○

楓香脂即白膠香氣味辛苦平無毒

主治癮疹風痒浮腫煑水浴之○又主齒痛○一切癰疽瘡疥金瘡吐衄咯血活血生肌止痛解毒燒過揩牙永無牙疾

白膠香唐本草係楓木津液形類乳香色白而香堪焚



修治楓香脂以齏水煑二十沸入冷水中扯數十次晒乾用

簡要濟衆治吐血不止白膠香為散每服二錢新汲水調下

大楓子 楓樹高大○故曰大楓○或云能治大風疾○故名大楓子○

大楓子氣味辛熱○主治癘風癩疥瘡癬殺蟲又治楊梅諸瘡

（大楓子　有毒）



大楓子形類松子大如雷丸新者仁色白久者仁色黃

修（治去殼取仁）

按（楓木連抱大者甚多並結毬而不結子本經以大楓子內附但載主治餘無一言誠可憾也今問市家所得咸云海舶買来疑必外番別有一種楓木不然何獨指此爲名而不言他木耶姑述之以俟識者再政之）

（手背皴裂大楓子仁搗泥塗之）

女貞實始生武陵川谷今處處有之山海經云泰山多貞木是此木也其葉似枸骨及冬青木極茂盛凌冬不凋五月開細花青白色九月而實成似牛李子立冬採實暴乾李時珍曰此木凌冬青翠有貞守之操故以女貞狀之

（女貞實氣味苦平無毒主治補中安五臟養精神除百病久服肥健輕身不老○強陰健腰膝變白髮明目）

（女貞實本經上品亦呼爲冬青與冬青同名異物蓋一類二種爾女貞葉長子黑色冬青葉微圓子紅色爲異）



蕤核始生函谷川谷及巴西今河東亦有之其木高五七尺莖間有刺葉細似枸杞而尖長花白子紅紫色附枝莖而生類五

味子六月成熟采實破核取仁陰乾爾雅棫白桵即此也其花實蕤蕤下垂故謂之桵後人作蕤

（仁氣味甘溫無毒）

主（治心腹邪熱結氣明目目赤痛傷淚出目腫眥爛久服輕身益氣不饑○強志明耳目○破心下結痰痞氣齆鼻○治鼻衄○生治足睡熟治不眠）

（蕤核本經上品）



修（治蕤仁以湯浸去皮尖擘作兩片每四兩用芒硝一兩木通草七兩水煑一伏時取仁研膏入藥）

孫（氏集效方治一切眼疾蕤仁去油三錢甘草防風各六錢黃連五錢以三味熬取濃汁次下蕤仁膏日點）

經（驗良方治赤爛眼用蕤仁杏仁各一兩去皮研勻入膩粉少許爲丸每用熱湯化洗）

丁香始生交廣南蕃今惟廣州有之木類桂高丈餘葉似櫟凌冬不凋花圓細黃色其子出枝蕊上紫色長三四分形如釘子故名丁香有雄雌雄顆小俗呼公丁香雌顆大俗呼母丁香

雄（丁香氣味辛溫無毒主治溫脾胃止霍亂擁脹風毒諸腫齒疳䘌能發諸香○風䘌骨槽勞臭殺蟲辟惡去邪治奶頭花止五色毒痢五痔○治口氣冷氣冷勞反胃鬼疰蠱毒殺酒毒消痃癖療腎氣奔豚氣陰痛腹痛壯陽暖腰膝○療嘔逆甚驗○去胃寒理元氣氣血盛者勿服○治虛噦小兒吐瀉痘瘡胃虛灰白不發）

雌（丁香氣味辛微溫無毒主治風水毒腫霍亂心痛去惡熱○吹鼻殺腦疳入諸香中令人身香○同薑汁塗拔去白鬚孔中即生黑者異常）

丁（香樹皮名丁皮氣味同香主治齒痛○心腹冷氣諸病家用）

代丁香皮似桂皮而厚

宋開寶


雄
公丁香形瘦小頭有四瓣花
雌
母丁香形肥大似山茱萸

修治方中多用雌者力大膏煎中若用雄須去丁蓋乳子發人背癰也不可見火

好古曰純陽入手太陰足少陰陽明經（畏鬱金）

德生堂經驗方治反胃關格氣噎不通丁香木香各一兩每服四錢水一盞半煎一盞先以黄泥做成盞濾藥汁于內食前服此方乃掾史吳安之傳于都事蓋耘夫有效試之果然土盌取其助脾也

沉香出海南諸國及交廣崖州。其木類椿櫸多節。葉似橘花白。子似檳榔。大如桑椹。紫色而味辛。欲取之。先斷其積年老木根。經年其外皮幹俱朽爛。其木心與枝節不壞者即香也。細枝緊實未爛者爲青桂。黑堅沉水者爲沉香。俗謂之角沉。半沉者爲棧香。棧香中形象雞骨者。爲雞骨香。象馬蹄者。爲馬蹄香。在土中不待創剔而成薄片者。謂之龍鱗。俗呼鯽魚片。不沉者爲黄熟香。俗訛爲速香蘇香是已。削之成卷。咀之柔韌者。謂之黄蠟沉。入藥沉水者上。半沉者次之。不沉者。但可薰衣及焚燒而已。南越志言交州人稱爲蜜香。謂其氣如蜜脾也。梵書名阿迦嚧香。

沉香氣味辛微温無毒

主治風水毒腫去惡氣〇主心腹痛霍亂中惡邪鬼疰氣清人神並宜酒煑服之諸瘡腫宜入膏中〇調中補五臟益精壯陽暖腰膝止轉筋吐瀉冷氣破癥癖冷風麻痺骨節不任風濕皮膚瘙癢氣痢〇補石腎命門〇補脾胃及痰涎血出於脾〇益氣和神〇治上熱下寒氣逆喘急大腸虛閉小便氣淋男子精冷



修治沉香須要不枯如觜角硬重沉于水下者爲上半沉者次之不可見火入丸散剉爲末或以水磨粉晒乾亦可入煎劑惟磨汁臨時入之〇今市家多以夾板沉香充角沉香雖亦沉水但劈無正文內夾穢污如黑土焚之且不香爲異

大明曰辛熱元素曰有升有降

吳球活人心統治胃冷久呃沉香紫蘇白豆蔻仁各一錢爲末每柿蒂湯服五七分

乳香西出天竺。南出波斯等國。其樹類松。生于沙中。盛夏木膠流出沙上。狀如桃膠。其氣香。其形如乳頭。故名乳香。西者色黄白。南者色紫赤。如乳頭透明者。俗呼滴乳。又曰明乳。鎔塌在地雜沙石者。爲塌香。俗呼塌乳。

氣味微温無毒

主治耳聾中風口噤不語婦人血氣止大腸洩澼療諸瘡令內消能發酒理風冷〇下氣益精補腰膝治腎氣止霍亂衝惡

中邪氣心腹痛疰氣煎膏止痛長肉○治不眠○補腎定諸經之痛○仙方用以辟穀○消癰疽諸毒托裏護心活血定痛伸筋治婦人產難折傷

別錄上品

滴乳



松香可亂乳香焚之乃辨真偽

修治頌曰乳性至粘難碾用時以繒袋掛於窗隙處良久取研乃不粘也○大明曰入丸散微炒殺毒則不粘○或言入丸藥以少酒研如泥以水飛過晒乾用或言以燈草同研易細或以竹葉上炙之研易細

元素曰苦辛純陽震亨曰善竄入手少陰經

降真香出黔南並南海山中及大秦國其香似蘇方木燒之初不甚香得諸香和之則特美入藥以番降紫而潤者爲良按仙

傳云燒之感引鶴降醮星辰燒此香甚爲第一度籙燒之功力極驗降真之名以此俗呼降香

氣味辛溫無毒

主治燒之辟天行時氣宅舍怪異小兒帶之辟邪惡氣○療折傷金瘡止血定痛消腫生肌



鳳眼降香形



降真香證類

色紫而多節

醫林集要治金瘡出血降香炒五倍子等分爲細末傅之

檀香按大明一統志云出廣東雲南及古城真臘爪哇渤泥暹羅三佛齊回回等國今嶺南諸地亦有之樹葉皆似荔枝皮青

色而滑澤葉廷珪香譜云皮實而色黃者爲黃檀皮潔而色白者爲白檀皮腐而色紫者爲紫檀其木並堅重清香而白檀尤良宜以紙封收則不洩氣李時珍曰檀善木也故字從亶亶善也番人呼爲真檀

白檀氣味辛溫無毒主治消風熱腫毒○治中惡鬼氣殺蟲○煎服止心腹痛霍亂腎氣痛水磨塗外腎并腰腎痛處○散冷氣引胃氣上升進飲食○噎膈吐食又面生黑子每夜以漿水洗拭令赤磨汁塗之甚良

黃檀最香可作帶胯扇骨等物

檀香

別錄下品



白者良

大明曰熱元素曰陽中微陰入手太陰足少陰通行陽明經

金櫻子今南中州郡有而以江西劍南嶺外者爲勝叢生郊野中大類薔薇有刺四月開白花夏秋結實亦有刺黃赤色形似小石榴故一名山石榴又一名刺梨子本草綱目云金櫻當作金罌謂其子形如黃罌也

氣味酸濇平無毒

主治脾洩下痢止小便利濇精氣久服令人耐寒輕身

金櫻子蜀本草



色黃赤有刺

其子大如指尖狀如石榴而長其核細碎而有白毛

修治金櫻子劈開去核并毛酒洗淨用

吳茱萸

始生上谷及宛句。今江淮蜀漢最多。木高丈餘。皮青綠色。葉似椿而闊厚紫色。三月開紅紫細花。七月八月結實似辣子。顆粒緊小。嫩時微黃。熟則色青綠。陳藏器曰。茱萸南北總有。入藥以吳地者爲好。所以有吳之名也。

氣味辛溫有小毒

主治溫中下氣止痛除濕血痺逐風邪開腠理欬逆寒熱○利五臟去痰冷逆氣飲食不消心腹諸冷絞痛中惡心腹痛○霍亂轉筋胃冷吐瀉腹痛產後心痛治遍身𤸊痺刺痛腰脚軟弱利大腸壅氣腸風痔疾殺三蟲○殺惡蟲毒牙齒蟲䘌鬼魅疰氣○下產後餘血治腎氣脚氣水腫通關節起陽健脾主痢止瀉厚腸胃肥健人○治痞滿塞胃咽膈不通潤肝燥脾○開鬱化滯治吞酸厥陰痰涎頭痛陰毒腹痛疝氣血痢喉舌口瘡

本經中品



吳茱萸形

陳久者良開口者有毒

如食茱萸而小黑色

修治　吳茱萸須深湯中浸去苦烈汁七次焙用

好古曰辛苦熱氣味俱厚陽中陰也半浮半沉入足太陰經血分少陰厥陰氣分　李時珍曰辛熱走氣動火昏目發瘡

之才曰蓼實爲之使惡丹參消石白堊畏紫石英

陰下濕痒吳茱萸煎湯頻洗取効

卮子

始生南陽川谷。今南方及西蜀州郡皆有之。木高七八尺。葉似李而厚硬。二三月開白花。花皆六出。甚芬香。夏秋結實如訶子狀。生青熟黃。中仁深紅。九月採實暴乾。皮薄而圓小。刻房七稜至九稜者爲佳。卮酒器也。卮子象之。故名。俗作梔子。司馬相如賦云。鮮支黃爍。註云。鮮支即支子也。

氣味苦寒無毒

主治五內邪氣胃中熱氣面赤酒皰皶鼻白癩赤癩瘡瘍○療目赤熱痛胸心大小腸大熱心中煩悶○去熱毒風除時疾熱解五種黃病利五淋通小便解消渴明目主中惡殺䗪蟲毒○解玉支毒○主瘖瘂紫癜風○治心煩懊憹不得眠臍下血滯而小便不利○瀉三焦火清胃脘血治熱厥心痛解熱鬱行結氣○治吐血衄血血痢下血血淋損傷瘀血及傷寒勞復熱厥頭痛疝氣湯火傷

卮子　本經中品



色赤

大梔子　染色用

修治　震亨曰治上焦中焦連殼用下焦去殼炒用血病炒黑用

好古曰去心胸中熱用仁去肌表熱用皮

元素曰氣薄味厚輕清上行氣浮而味降陽中陰也　杲曰沉也陰也入手太陰肺經

黎居士易簡方治鼻衄血山卮子燒灰吹之屢用有效

樟腦

樟樹高丈餘。小葉似楠而尖長。背有黃赤茸毛。四時不凋。夏開細花。結小子。木大者數抱。肌理細而錯縱有文。故謂之樟。豫章縣因木得名。腦係樟樹脂也。狀如龍腦。白色如雪。故謂之腦。又出韶州。故一名韶腦。俗訛爲朝腦。

氣味辛熱無毒

主治通關竅利滯氣治卩惡邪氣霍亂心腹痛寒濕脚氣疥癬風瘙齲齒殺蟲辟蠹着鞵中去脚氣

朝腦朱砂等分擦蟲牙疼効



煎樟腦法用樟木新者切片以井水浸三日三夜入鍋煎之柳木頻攪待汁減半柳上有白霜即濾去滓傾汁瓦盆內經宿自然結成塊也鍊升之法不一升一次者色皂升兩三次者色白人多以此亂片腦不可不辨

騏驎竭

今南番諸國及廣州皆出之。木高數丈。婆娑可愛。葉似櫻桃而有三角。其脂液從木中流出滴下如膠飴狀。久而堅凝乃成竭。赤作血色。故亦謂之血竭。採無時。本草綱目云。騏驎赤馬名也。曰騏驎者。隱之也。

氣味甘鹹平無毒

主治心腹卒痛金瘡血出破積血止痛生肉去五臟邪氣○傷折打損一切疼痛血氣攪刺內傷血聚補虛並宜酒服○補心包絡肝血不足○益陽精消陰滯氣○傳一切惡瘡疥癬久不合性急不可多使却引膿○散滯血諸痛婦人血氣小兒瘛瘲

（南越志云騏驎竭紫鉚樹之脂也欲驗真偽但嚼之不爛如蠟者為上今人試之以透指甲者為真或云燒之赤汁出灰不變色）



騏驎竭

唐本草

修治（雷公云凡使勿用海母血真似騏驎竭只是味鹹并腥氣騏驎竭味微鹹甘似梔子氣也欲使先研作粉篩過入丸散中用若同衆藥擣則化作塵飛也　淂蜜陀僧良）

龍腦香

出婆律國。今惟南海番舶賈客貨之。相傳云。其木高七八尺。大可六七圍。如積年杉木狀。傍生枝。葉正圓而背白。結實

如草豆蔻。皮有甲錯。香即木中脂也。曰龍腦者。因其狀而貴重之稱也。以白瑩如冰及作梅花片者為良。故俗呼片腦。又呼冰片。或云梅花片。

氣味辛苦微寒無毒○主治婦人難產研末少許新汲水服立下○心腹邪氣風濕積聚耳聾明目去目赤膚翳○內外障眼○鎮心秘精治三蟲五痔○散心盛熱○入骨治骨痛○治大腸脫○療喉痺腦痛鼻瘜齒痛傷寒舌出小兒痘陷



龍腦香婆律樹中脂膏也

修治龍腦香合糯米炭相思子貯之則不耗或以燈草杉木炭養之更良（元素曰熱陽中之陽）（大片明亮者良）龍腦香色如氷清香臭之有杉木氣今人多以樟腦升打亂之不可不辨

阿魏

木生波斯國。及伽闍那國。木長八九尺。皮色青黃。三月生葉。似鼠耳。無花實。其枝汁出如飴。久乃堅凝。名阿魏。阿曰呢。魏曰噠。西番語也。一云。阿我也。魏畏也。此物極臭。阿之所畏也。唐本草謂之薰渠。古人謂之哈昔泥。

氣味辛平無毒

主治殺諸小蟲去臭氣破癥積下惡氣除邪鬼蠱毒○治風邪鬼疰心腹中冷○傳尸冷氣辟瘟治瘧主霍亂心腹痛腎氣溫瘴禦一切蕈菜毒○解自死牛羊馬肉諸毒○消肉積

阿魏阿虞樹脂也狀如桃膠其色黃如栗瓣者爲上色黑者不堪用繫羊射脂之說俗亦相傳但無實據諺云黃金無假阿魏無真以其多偽也劉純詩云阿魏無真却有真臭而止臭乃爲珍

炳曰人多言煎蒜白爲假者斅曰驗法有三第一以半銖安熟銅器中一宿至明沾阿魏處白如銀永無赤色第二將一銖置於五斗草自然汁中一夜至明如鮮血色第三將一銖安於柚樹上樹立乾便是真者凡用乳鉢研細熱酒器上裛過入藥

治惡疰腹痛不可忍者阿魏末熱酒服一二錢立止永類鈐方


唐本草

波斯國呼阿虞
天竺國呼形虞

阿魏此木津液
自草部移入此

蘆薈

生波斯國。木之脂淚凝聚而成。狀似黑餳。故醫學入門曰。盧黑色也。會聚也。一名訥會。一名奴會。俗呼爲象膽。蓋以其味苦如膽故也。

氣味苦寒無毒

主治熱風煩悶胸膈間熱氣明目鎮心小兒癲癇驚風療五疳殺三蟲及痔病瘡瘻解巴豆毒主小兒諸疳熱單用殺疳蛀吹鼻殺腦疳除鼻癢研末傅䘌齒甚妙治濕癬出黃汁


宋開寶

盧會係此木脂

修治先搗成粉待衆藥末出然後入藥中

自草部移入此

蕪荑

始生晉山川谷。今近道亦有之。大抵類類而差小。其實亦早成。此榆乃大。氣臭如汛。一名無姑。一名蕨蘠。醫學入門曰。蕪穢也。荑傷也。其氣臭如傷敗之物也。

氣味辛平無毒主治五內邪氣散皮膚骨節中淫淫溫行毒去三蟲化食逐寸白散腸中嗢嗢喘息○主積冷氣心腹癥痛除肌膚節中風淫淫如蟲行長食治五痔殺中惡蠱毒諸病不生○治惡瘡疥癬殺蟲止痛婦人子宮風虛孩子疳瀉冷痢得訶子豆蔻良


蕪荑

本經中品

形類榆莢

氣臭

三月采實
大者爲良

修治蕪荑擣末入藥使

枳實枳殼

枳實生河內川澤。枳殼生商州川谷。今京西江湖州郡皆有之。木如橘而小。高五七尺。葉如橙多刺。春生白花至秋成實。本草綱目云。枳乃木名。從只諧聲也。醫學入門云。七月八月采者爲實。小而色青中實。故名枳實。九月十月采者爲殼。大而色黃紫多穰。入藥去穰用殼。故名枳殼。

枳實氣味苦寒無毒

主治大風在皮膚中如麻豆苦痒除寒熱結止痢長肌肉利五臟益氣輕身○除胸脇痰癖逐停水破結實消脹滿心下急痞痛逆氣脇風痛安胃氣止溏泄明目○解傷寒結胸主上氣喘欬腎內傷冷陰痿而有氣加而用之○消食散敗血破積堅去胃中濕熱

枳實　本經中品



青而小者俗呼鵝眼枳實近道出者小而綠色氣臭俗呼綠衣枳實不堪用

修治枳實用皮厚而小翻肚如盆口狀陳久者爲勝水漬透切片晒乾小麥麩炒至麩焦去麩用　其性酷而速

氣厚味薄浮而升微降陰中陽也

子母秘錄治婦人陰腫堅痛枳實半斤碎炒令熟故帛裹熨冷即易之　枳實臣

枳殼氣味苦酸微寒無毒

主治風痺麻痺通利關節勞氣欬嗽背膊悶倦散留結胸膈痰滯逐水消脹滿大腸風安胃止風痛○遍身風疹肌中如麻豆惡瘡腸風痔疾心腹結氣兩脇脹虛關膈壅塞○健脾開胃調五臟下氣止嘔逆消痰治反胃霍亂瀉痢消食破癥結痃癖五膈氣及肺氣水腫大小腸除風明目炙熟熨痔腫泄肺氣除胸滿○治裏急後重　其性詳而緩

枳殼　宋開寶

氣味沉降與枳實同　果曰沉也陰也

修治水浸去穰切片麩炒



小兒軟癤大枳殼一箇去白磨口平麪糊抹邊合癤上自出膿血盡更無痕也

烏藥始生嶺南邕容州及江南。今台州雷州衡州亦有之。以天台者爲勝。木似茶檟。高五七尺。葉微圓。而尖作三椏。面青背白。五月開細花。黃白色。六月結實。根色黑褐。似山芍藥根。又似烏樟根。八月采根。以作車轂形如連珠狀者佳。烏以色名。其葉狀似鰟魮鯽魚。故俗呼爲鰟魮樹。拾遺作旁其。方音訛也。其氣似樟。故南人呼爲矮樟。

氣味辛溫無毒

主治中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背膂婦人血氣小兒腹中諸蟲○除一切冷霍亂反胃吐食瀉痢癰癤疥癘并解冷熱其功不可悉載猫犬百病並可磨服○理元氣○中氣脚氣疝氣氣厥頭痛腹脹喘急止小便頻數及白濁

烏藥　宋開寶



修治烏藥極硬難切須水漬一二日漉出晾片時切片入劑亦有以童便浸煮者各隨方法

好古曰氣厚於味陽也入足陽明少陰經

濟急方治小兒慢驚昏沉或搐烏藥磨水灌之

厚朴始出交趾冤句。今京西陝西江淮湖南蜀川山谷中往往有之。而以梓州龍州者爲上。木高三四丈。徑一二尺。春生葉如槲葉。四季不凋。紅花而青實。其木質朴而皮厚。故名厚朴。其味辛烈而色紫赤。故日華子名烈朴。別錄名赤朴。

氣味苦溫無毒

主治中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痺死肌去三蟲○溫中益氣消痰下氣療霍亂及腹痛脹滿胃中冷逆胃中嘔不止洩痢淋露除驚去留熱心煩滿厚腸胃○建脾治反胃霍亂轉筋冷熱氣瀉膀胱及五臟一切氣婦人產前產後腹臟不安殺腸中蟲明耳目調關節○治積年冷氣腹內雷鳴虛吼宿食不消去結水破宿血化水穀止吐酸水大溫胃氣治冷痛主病人虛而尿白○主肺氣脹滿膨而喘欬

皮鱗皺而厚紫色油潤者俗呼紫油厚朴入劑最佳薄而白者俗呼山厚朴不堪用三月九月十月采皮

厚朴本經中品



修治刮去粗皮入丸散酥油炙入湯飲薑汁炒○元素曰氣溫味苦辛氣味俱厚體重濁而微降陰中陽也杲曰可升可降之才曰乾薑爲之使惡澤瀉消石寒水石忌豆食之動氣治霍亂厚朴以薑汁火炙令香爲末新汲水調下二錢匕甚妙

茗（即茶）今閩浙蜀荆江湖淮南山中皆有之爾雅所謂檟苦荼郭璞云木小似梔子冬生葉可煮作羹飲今呼早采者爲茶晚採

者爲茗茶經云茶者南方佳木自一尺二尺至數十尺其巴川峽山有兩人合抱者伐而掇之木如瓜蘆葉如梔子花如白薔薇實如栟櫚蒂如丁香根如胡桃其名一曰茶二曰檟三曰蔎四曰茗五曰荈今通謂之茶茶荼聲近故呼之楊慎丹鉛錄云茶即古荼字詩云誰謂荼苦其甘如薺是也

茶氣味苦甘微寒無毒

主治瘻瘡利小便去痰熱止渴令人少睡有力悅志○下氣消食作飲加茱萸葱薑良○破熱氣除瘴氣利大小腸○清頭目治中風昏憒多睡不醒○治傷暑合醋治泄痢甚效○炒煎飲治熱毒赤白痢同芎藭葱白煎飲止頭痛○濃煎吐風熱痰涎

茶清明采者上穀雨采者次之古人謂茶爲雀舌麥顆言其至嫩也又有新芽一發便長寸餘其粗如針最爲上品其根幹水土力皆有餘故也細茶宜人粗茶損人少飲則醒神思多飲則致疾病



茗
唐本草

藏器曰苦寒久服令人瘦去人脂使人不睡飲之宜熱冷則聚痰胡洽曰與榧同食令人身重李廷飛曰大渴及酒後飲茶入腎經令人腰脚膀胱冷痛兼患水腫攣痹諸疾大抵飲茶宜少不飲尤佳空腹最忌之時珍曰服威靈仙土茯苓忌飲茶

毛文錫茶譜云蒙山有五頂上有茶園其中頂曰上清峯昔有僧人病冷且久遇一老父謂曰蒙之中頂茶當以春分之先後多搆人力俟雷發聲併手采摘三日而止若獲一兩以本

處水煎服即能祛宿疾二兩當眼前無疾三兩能固肌骨四兩即爲地仙矣其僧如說獲一兩餘服之未盡而疾瘳其四頂茶園采摘不廢惟中峯草木繁密雲霧蔽虧鷙獸時出故人跡不到矣近歲稍貴此品製作亦精于他處

兒茶出南番係細茶末入竹筒中緊塞兩頭污泥溝中日久取出搗汁熬製而成其塊小而黑潤者爲上塊大焦枯者次之番人呼爲烏爹泥又呼爲烏疊泥俗因搽小兒諸瘡效每呼爲兒茶又呼爲孩兒茶

氣味苦甘微寒無毒主治清上膈熱痰生津塗金瘡一切諸瘡生肌定痛止血排膿除濕降火

按兒茶乃治瘡之聖藥徧查本草並無載之者予補之未知其詳待後之識者再攷之

山茱萸始生漢中山谷及琅琊冤句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡頹子有核亦可

嗽。既乾皮甚薄。九月十月採實陰乾。吳普云。葉如梅。有刺毛。二月花如杏。四月實如酸棗。赤色。故本經名蜀酸棗。醫學入門曰。茱色赤也。萸肥腴也。

氣味酸平無毒

主治心下邪氣寒熱溫中逐寒濕痺去三蟲久服輕身○腸胃風邪寒熱疝瘕頭風風氣去來鼻塞目黃耳聾面皰下氣出汗強陰益精安五臟通九竅止小便利久服明目強力長年○治腦骨痛療耳鳴補腎氣興陽道堅陰莖添精髓止老人尿不節治面上瘡能發汗止月水不定○煖腰膝助水臟除一切風逐一切氣破癥結治酒皶○溫肝



本經中品

鮮者紅潤陳者黑枯

陽中之陰入足厥陰少陰經氣分蓼實爲之使惡桔梗防風防己

修治山茱萸以酒潤去核取皮一斤只取四兩緩火焙乾方用能壯元氣秘精其核能滑精不可服

山茱萸使

紫葳

（陵霄花也）始生西海川谷及山陽。今處處皆有。生山中。人家園圃。亦或種蒔。初作藤蔓生依南木。歲久延引至巔而有花。其花黃赤。夏中乃盛。俗謂赤艷曰紫葳。此花赤艷。故曰紫葳。附木而上高數丈。故曰陵霄花。俗呼爲凌霄花。

氣味酸微寒無毒

主治婦人產乳餘疾崩中癥瘕血閉寒熱羸瘦養胎○主熱風風癇大小便不利腸中結實止產後奔血不定安胎○治身遊風風瘮治瘀血帶下○酒皶熱毒風風刺婦人血膈崩中

紫葳今蔓延而生謂之鳥草又有木身謂之鳥木又須木而上然幹不逐冬斃亦得木之多也故分入木部爲至當唐白樂天詩有木名凌霄擢秀非孤標由是益知非草也　紫葳臣



本經中品

豬苓

始生衡山山谷及濟陰冤句。今蜀州眉州亦有之。生土底。是木之餘氣所結。皮黑作塊似豬屎。故以名之。一名豭豬屎。

氣味甘平無毒

主治痎瘧解毒蠱疰不祥利水道久服輕身耐老○鮮傷寒溫疫大熱發汗主腫脹滿腹急痛○治渴除濕去心中懊憹○瀉膀胱○開腠理治淋腫脚氣白濁帶下妊娠子淋胎腫小便不利

豬苓本經中品

本草綱目曰馬屎曰通豬屎曰零即苓字其塊零落而下故也

屎曰甘平降也陽中陰也

久服損腎氣昏人目宜詳審之

入足太陽足少陰經



豬苓取其行濕生用正宜

五倍子

以蜀中者爲勝。生膚木葉上。七月結實無花。生青熟黃。九月采實暴乾。因商販此得五倍之利。故名五倍子。形似海中文蛤。故一名文蛤。內多小蟲。故一名百蟲倉。會意也。法釀過名百藥煎。隱名也。

氣味酸平無毒

主治齒宣疳䘌肺臟風毒流溢皮膚作風濕癬瘡瘙癢膿水五痔下血不止小兒面鼻疳瘡○腸虛泄痢爲末熟湯服之生津液消酒毒治中蠱毒毒藥○口瘡以末摻之便可飲食○斂肺降火化痰飲止咳嗽消渴盜汗嘔吐失血久痢黃病心腹痛小兒夜啼烏鬚髮治眼赤濕爛消腫毒喉痺飲潰瘡金瘡脫肛子腸墜

五倍子　宋開寶



五棓子今染家多用

修治五倍子搥破去內蟲及污穢或炒或生各隨方法

戲術壁上移字五倍子肉煎水寫字在壁上俟乾却將水澆之其字自見

烏鬚經驗方五倍子炒一錢銅末醋炒三分白礬飛二分食鹽（一分四味爲細末合一處爲一料）烏黑霜（旱蓮草膏二錢沒食子雌雄二箇訶子肉五分白芨五分川芎五分遼細辛五分以上六味各爲細末攪和一處名爲烏黑霜）前五倍子等四味一料入烏黑霜二三分用濃茶調不稀不稠盛磁器中入鍋內水煑鏡面相似爲度每用先以皂角燒水洗鬚淨令乾以搨柄塗藥白鬚上待乾或茶或水洗去則鬚柔潤光黑可耐月餘且無摧折之患矣真佳方也要炒倍子浮法炒五倍子法五倍子搥破去蟲淨肉小指尖大塊一次炒或四兩或八兩文武火炒不住手更易柳條勤攪令白煙出透熟用水濕青布一塊鋪於淨地上將熟倍子傾于布中包佉以腳一踹開之自成一塊隨用上等照前方分兩稱入鬚多勿拘一料

百藥煎氣味酸鹹微甘無毒主治化痰清肺定嗽止熱生津解渴收濕消酒烏鬚髮止下血久痢脫肛牙齒宣䘌面鼻疳蝕口舌糜爛風濕諸瘡

沒藥始出波斯國。今海南諸國及廣州或有之。木之根株皆如橄欖。葉青而密。歲久者則有脂液流滴在地下凝結成塊。或大或小。亦類安息香。采無時。一名末藥。沒末皆梵言。或云沒瀹沒也。木之膏液沒入地中。故名沒藥。

沒藥氣味苦平無毒主治破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏卒下血目中翳暈痛膚赤○破癥瘕宿血損傷瘀血消腫痛○心膽虛肝血不足○墮胎及產後心腹血氣痛並入丸散服○散血消腫定痛生肌製同乳香

戲術酒滿過盞空盞先以沒藥抹其弦斟酒高一二分泛不出



宋開寶

沒藥如琥珀色者佳

海桐皮始出南海已南山谷。今雷州及近海州郡亦有之。葉如手大作三花尖。皮多刺似桐皮黃白色。故名海桐皮。

氣味苦平無毒主治霍亂中惡赤白久痢除疳䘌疥癬牙齒蟲痛並煑服及含之水浸洗目除膚赤○主腰腳不遂血脈頑痺腿膝疼痛霍亂泄瀉○古方多用浸酒治風㿗　入藥用皮



海桐　宋開寶

皮有刺

合歡始生益州山谷。今近京雍洛間皆有之。人家多植於庭除間。木似梧桐。枝甚柔弱。葉似皂角極細而繁密。互相交結。每一風來。輒自相解。了不相牽綴。五月花發紅白色。上有絲茸。至秋

而實作莢子極薄細。崔豹古今注云。欲蠲人之忿。則贈以青裳。青裳合歡也。植之庭除。使人不忿。故嵇康養生論云。合歡蠲忿。萱草忘憂。其葉至暮即合。故唐本草名合昏。日華子名夜合。

木皮氣味甘平無毒

主治安五臟和心志令人歡樂無憂久服輕身明目得所欲○煎膏消癰腫續筋骨殺蟲擣末和鐺下墨生油調塗蜘蛛咬瘡用葉洗衣垢○折傷疼痛研末酒服二錢匕○和血消腫止痛

合歡　本經中品

葉擣絞濃汁浣衣服去黑炲黴



皮　采無時

蜜蒙花始生益州川谷。今蜀中州郡皆有之。木高丈餘。葉似冬青葉而厚。背白色。有細毛。又似橘葉。花微紫色。二月三月采花暴乾。其味甘甜如蜜。花一朵數十房。蒙蒙然細碎也。故名蜜蒙。

氣味甘平微寒無毒

主治青盲膚翳赤澁多眵淚消目中赤脉小兒麩豆及肝氣攻眼羞明怕日入肝經氣分潤肝燥

花小色黃嚼之甚甜

蜜蒙花　宋開寶



製酒洗候乾蜜拌炒

巴豆今嘉州眉州戎州皆有之。木高一二丈。葉如櫻桃而厚大。初生青色。後漸黃赤。至十二月葉漸凋。二月復漸生。四月舊葉落盡。新葉齊生。即花發成穗。微黃色。五六月結實作房。生青。至八月熟而黃。類白豆蔻。漸漸自落乃收之。一房有二瓣。一瓣一子或三子。子仍有殼。用之去殼。戎州出者。殼上有縱文隱起如線一道至兩三道。彼土人呼為金線巴豆。最為上等。此物始出巴蜀。而形如菽豆。故以名之。

氣味辛溫有毒

主治傷寒溫瘧寒熱破癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腹蕩練五臟六腑開通閉塞利水穀道去惡肉除鬼毒蠱疰邪物殺蟲魚○療女子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫殺斑蝥蛇虺毒可練餌之益血脉令人色好變化與鬼神通○治十種水腫痿痺落胎○通宣一切病泄壅除風補勞健脾開胃消痰破血排膿消腫毒殺腹臟蟲治惡瘡息肉及疥癩丁腫○導氣消積去臟腑停寒治生冷硬物所傷○治瀉痢驚癇心腹痛疝氣風喎耳聾喉痺牙痛通關利竅最能瀉人

本經下品



連殼形



子形



殼黃仁白

八月采用之去心皮

修治有用仁者用殼者用油者有生用者有水煮者酒煮者醋煮者有麩炒者燒存性者有研爛以紙包壓去油者謂之巴豆霜

杲曰性熱味辛有大毒浮也陽中陽也時珍曰生猛熟緩能吐能下能止能行是可升可降藥也

芫花爲之使惡蘘草畏大黃黃連藜蘆冷水反牽牛得火良中其毒者冷水黃連汁大豆汁解之

危氏得效方治夏月水瀉不止巴豆一粒針頭穿燈上燒存性化蠟和作一丸倒流水下

巴豆使

連翹始生太山山谷。今處處山谷有之。此物有二種。一種似椿實之未開者。殼小堅而外完無跗蕚。剖之則中解。氣甚芬馥。其實纔乾。振之皆落不著莖也。圖經曰大翹者即此也。一種乃如菡萏。殼柔外有跗蕚抱之。無解脉。亦無香氣。乾之雖久。著莖不脫。圖經曰小翹者即此也。俗多用如椿實者。其實折之其間片片相比如翹應。以此得名爾。又一名異翹。一名連苕。

氣味苦平無毒

主治寒熱鼠瘻瘰癧癰腫惡瘡癭瘤結熱蠱毒去白蟲○主通利五淋小便不通除心家客熱○通小腸排膿治瘡癤止痛通月經○尤宜小兒

連翹本經草部下品今移木部



連翹樹高數尺及丈餘

連翹使

修治連翹去蒂瓤任用鵮口者佳開瓣者不堪用

蜀椒始生武都川谷及巴郡。今歸峽及蜀川陝洛間人家多作園圃種之。高四五尺。似茱萸而小。有針刺。葉堅而滑。可煑飲食。甚辛香。四月結子。如小豆顆而圓。生青熟紫赤色。八月采實陰乾。此椒江淮及北土皆有之。莖實都相似。但不及蜀中者皮肉厚。腹裏白。氣味濃烈耳。故本經惟曰蜀椒。俗呼川椒。其子光黑如人瞳子。謂之椒目。

椒紅氣味辛溫有毒

主治邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚死肌寒熱痺痛下氣久服頭不白輕身增年○除六腑寒冷傷寒溫瘧大風汗不出心腹留飲宿食腸澼下痢洩精女子字乳餘疾散風邪瘕結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒久服開腠理通血脉堅齒髮明目調關節耐寒暑可作膏藥○治頭風下淚腰脚不遂虛損留結破血下諸石水治欬嗽腹內冷痛除齒痛○破癥結開胸治天行時氣產後宿血壯陽療陰汗暖腰膝縮小便止嘔逆○通神去老益血利五臟下乳汁滅瘢生毛髮○散寒除濕解鬱結消宿食通三焦溫脾胃補右腎命門殺蚘蟲止泄瀉

本經下品



他處出者俗呼花椒不及蜀椒功力

修治蜀椒去目及閉口者炒熱隔紙鋪地上以椀覆待冷碾取紅用

別錄曰多食令人乏氣口閉者殺人詵曰五月食椒損氣傷心令人多忘李廷飛曰久食令失明傷血脉

杏仁爲之使畏欵冬防風附子雄黃可收水銀中其毒者涼水麻仁漿解之

蜀椒使

大全良方治寒濕脚氣川椒二三斤踈布囊盛之日以踏脚貴人所用

椒目氣味苦寒無毒主治水腹脹滿利小便治十二種水氣及腎虛耳卒鳴聾膀胱急止氣喘

海上方治痔漏腫痛椒目一撮碾細空心水服三錢如神

使

皂莢始生雍州川谷及魯鄒縣。今所在有之。木極有高大者。葉瘦長而尖。枝間多刺。夏開細黃花。結實有三種。一種小如豬牙。一種長而肥厚。多脂而粘。一種長而瘦薄。枯燥不粘。皂、黑色也。莢、兩相夾合而中藏子也。故名皂莢。俗呼皂角。本經以形如豬

牙者爲良。故俗皆用猪牙皂莢。每呼爲牙皂。

氣味辛鹹温有小毒

主治風痺死肌邪氣風頭淚出利九竅殺精物○療腹脹滿消穀除欬嗽囊結婦人胞不落明目益精可爲沐藥不入湯通關節頭風消痰殺蟲治骨蒸開胃中風口噤○破堅癥腹中痛能墮胎又將浸酒中取盡其精煎成膏塗帛貼一切腫痛○溽暑久雨時合蒼朮燒烟辟瘟疫邪濕氣○燒烟熏久痢脫肛○搜肝風瀉肝氣○通肺及大腸氣治咽喉痺塞痰氣喘欬風癘疥癬

外丹本草謂之懸刀

長皂莢



有不結莢者樹鑿一孔入生鐵三五斤以泥封之自然結莢

皂角樹多刺難上釆時以篾箍其樹一夜其角自落亦一異也

猪牙皂莢
本經下品



修治皂莢以銅刀削去粗皮以酥反復炒透槌去子弦用今用
有蜜炙酥炙絞汁燒灰之異各依方法　皂莢損鐵
好古曰入厥陰經氣分之才曰柏實爲之使惡麥門冬畏空青
人參苦參伏丹砂粉霜硫黃硇砂
千金方治鬼魘不寤皂莢末刀圭吹之能起死人
皂莢使

訶梨勒 始生交愛州。今嶺南皆有而廣州最勝。株似木梡。花白。子似梔子。青黃色。皮肉相着。八月采實。六路者佳。梵言天主持來也。俗呼訶子。

氣味苦温無毒

主治冷氣心腹脹滿下食○破胸膈結氣通利津液上水道黑髭髮○下宿物止腸澼久泄赤白痢○消痰下氣化食開胃除煩治水調中止嘔吐霍亂心腹虛痛奔豚腎氣肺氣喘急五膈氣腸風瀉血崩中帶下懷孕漏胎及胎動欲生脹悶氣喘并患痢人肛門急痛産婦陰痛和蠟燒烟熏之及煎湯熏洗○治痰嗽咽喉不利含三數枚殊勝○實大腸歛肺降火

訶梨勒
唐本草


有白色者
有青黃色者
有蒼黑色者

修治酒浸後蒸一伏時刀削去路取肉剉焙用用核去肉今用
多火炮去核用肉　六路黑色肉厚者良
好古曰苦酸平苦重酸輕味厚陰也降也
千金方治一切氣疾訶子三枚濕紙包煨熟去核細嚼以牛乳
下　訶梨勒使

楝 始生荆山山谷。今處處有之。以蜀川者爲勝。故俗呼川楝子。木高丈餘。葉密如槐而長。三四月開花紅紫色。芬香滿庭。實如彈丸。生青熟黃。十二月采實。根采無時。種有雌雄。雄者根赤無子。有大毒。服之使人吐不能止。雌者根白有子。微毒。入藥當用。圖經謂之苦楝。因味苦也。按羅願爾雅翼云。楝葉可以練物。故謂之楝。其子如小鈴。熟則黃色。故一名金鈴子。象形也。

實氣味苦寒有小毒

主治溫疾傷寒大熱煩狂殺三蟲疥瘍利小便水道○主中大熱狂失心躁悶作湯浴不入湯使○入心及小腸主上下部腹痛○瀉膀胱○治諸疝蟲痔

楝 本經下品

葉 五月五日取佩之辟惡

花 熱痱焙末掺之鋪席下殺蚤虱



根及木皮氣味苦微寒微毒主治蚘蟲利大腸○苦酒和塗疥癬甚良○治遊風熱毒風瘮惡瘡疥癩小兒壯熱煎湯浸洗

修治楝實酒拌令透蒸待皮軟刮去皮取肉去核用凡使肉不使核使核不使肉如使核搥碎用漿水煑一伏時晒乾用

經驗方治臟毒下血以苦楝子炒黃爲末蜜丸梧桐子大米飲空心下十九至二十丸甚妙

集簡方治小兒蚘蟲用楝根皮同雞卵煑熟空心食之次日蟲即下

無食子 出波斯國。呼爲摩澤樹。高六七丈。圍八九尺。葉似桃而長。三月開花。白色心微紅。子圓如彈丸。初青熟乃黃白。蟲蝕成孔者。入藥用。其樹一年生無食子。一年生跋屢子。大如指長三寸。上有殼。中仁如栗黃可啖之。波斯每食以代果。番胡呼爲没食子。今人呼爲墨石。没石。轉傳訛矣。

氣味苦溫無毒主治赤白痢腸滑生肌肉○腸虛冷痢益血生精和氣安神烏髭髮治陰毒痿燒灰用○溫中治陰瘡陰汗小兒疳䘌冷滑不禁○聖濟總錄治牙齒痛無食子末一錢綿裹咬之涎出吐去



無食子唐本草

有黑白二種

凡使勿犯銅鐵并被火驚用顆小無枚米者沙鍋炒細研入藥

益智子 按山海經云。生崑崙國。今嶺南州郡往往有之。葉似蘘荷。長丈餘。其根傍生小枝。高七八寸。無葉。花萼作穗生。其上如棗許大。皮白中仁黑。仁細者佳。含之攝涎唾。采無時。醫學入門曰。服之益人智慧。故名。

仁氣味辛溫無毒

主治遺精虛漏小便餘瀝益氣安神補不足利三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎入鹽同煎服有奇驗○治客寒犯胃和中益氣及人多唾○益脾胃理元氣補腎虛滑瀝○冷氣腹痛及心氣不足夢洩赤濁熱傷心系吐血血崩諸症

益智子

宋開寶



子如筆頭而兩頭尖長七八分修治去殼取仁

蘇方木 樹似菴羅。葉如榆葉而無澀。抽條長丈許。花黃。子生青熟黑。海島有蘇方國。其地產此木。故名蘇方木。今人省呼爲蘇木耳。

蘇方木氣味甘鹹平無毒

主治破血產後血脹悶欲死者水煑五兩取濃汁服婦人血氣心腹痛月候不調及蓐勞排膿止痛消癰腫撲損瘀血女人失音血噤赤白痢并後分急痛○霍亂嘔逆及人常嘔吐水煎服之效○破瘡瘍死血產後敗血



唐本草

俗呼蘇木此人用染色者

謹按徐表南海記生海畔葉似絳木若女楨味平無毒主虛勞血癖氣壅滯産後惡露不安心腹㽲痛及經絡不通男女中風口噤不語並宜細研乳頭香末方寸匕以酒煎蘇方木去滓調服立吐惡物差

木鼈子始出朗州及南中。今湖廣諸州及杭越全岳州亦有之。春生苗作蔓。葉有五花。狀如山芋青色面光。四月生黄花。六月結實。似栝樓而極大。生青熟紅。肉上有刺。每一實其核三四十枚。七月八月采實。其核似鼈。故以爲名。

氣味甘温無毒

主治折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛除粉刺䵟䵳婦人乳癰肛門腫痛○研燒湯熏痔

木鼈子老者殼色蒼黑嫩者殼色黄白仁皮緑肉白者佳多油及瘦薄者不堪用

俗呼土木鼈子亦呼正木鼈子

木鼈子

別録下品


齊者爲雌


尖者爲雄

修治去殼取仁或去油用

百中方治小兒泄瀉白痢用木鼈子一枚去殼細切母丁香一枚共爲一處碾爲末先以米泔洗臍淨拭乾納末于臍中令滿上以小膏藥貼之即止

椿木樗木舊並不載所出州土。今南北皆有之。二木形幹大抵相類。但椿木實而葉香可啖。樗木疎而氣臭膳夫亦能熬去其氣。北人呼樗爲山椿。江東人呼爲虎目。葉脱處有痕。如虎之目。又如樗蒲子。故得此名。

葉氣味苦温有小毒主治煑水洗瘡疥風疽樗木根葉尤良白禿不生髮取椿桃楸葉心擣汁頻塗之○嫩芽消風祛毒

白皮及根皮氣味苦温無毒主治疳䘌樗根尤良○去口鼻疳蟲疥䘌鬼注傳尸蠱毒下血及赤白久痢○得地榆止疳痢○止女子血崩産後血不止赤帶腸風瀉血不住腸瀉縮小便實炙用○利溺澀○治赤白濁赤白帶濕氣下痢精滑夢遺燥下濕去肺胃陳積之痰

椿皮色赤性澁入血分樗皮色白性利入氣分

唐本草


椿樗二樹大同小異

衍義曰洛陽一女子年四十六七耽飲無度多食魚蟹畜毒在臟日夜二三十謂大便與膿血雜下大腸連肛門痛不堪任醫以止血痢藥不效又以腸風藥則益甚蓋腸風則有血而無膿如此半年餘氣血漸弱食減肌瘦服熱藥則腹愈痛血愈下服凉藥即注瀉食愈減服温平藥則病不知如此將朞歲垂命待盡或人教服人參散一服知二服減三服膿血皆定遂常服之而愈其方治大腸風虛飲酒過度挾熱下痢膿血痛甚多日不差樗根白皮一兩人參一兩爲末每服二錢空心温酒調服米飲亦可忌油膩濕麪青菜果子甜物雞猪魚羊蒜薤等

椶櫚始出嶺南及西川。今江南亦有之。木高一二丈。無枝條。葉大而圓。有如車輪。萃於樹杪。其下有皮重疊褁之。每皮一匝爲一節。二旬一采。皮轉復生上。六七月生黄白花。八九月結實作

房如魚子黑色。九月十月采其皮用。山海經云。石翠之山。其木多椶是也。

皮氣味苦濇平無毒主治止鼻衄吐血破癥治腸風赤白痢崩中帶下燒存性用○主金瘡疥癬生肌止血

筍及子花主治澀腸止瀉痢腸風崩中帶下及養血

椶櫚（宋嘉祐）其皮每歲剥取不爾束死或不長也皮作繩入水千年不爛年久敗椶入藥尤妙



苞木部

竹處處有之。其類甚多。入藥者惟三種。人多不能別。謹按竹譜。篁竹堅而節促體圓而質勁。皮白如霜。即水白竹也。淡竹似篁而茂。即甘竹也。苦竹有白有紫。李時珍綱目云。竹字象形。許慎說文云。竹冬生草也。故字從倒草。

篁竹葉味苦平無毒主治欬逆上氣溢筋急惡瘍殺小蟲除煩熱風痓喉痺嘔吐

根作湯益氣止渴補虛下氣消毒汁主風痓



淡竹葉氣味辛平大寒無毒主治胷中痰熱欬逆上氣

治吐血熱毒止消渴壓丹石毒○消痰治熱狂煩悶中風失音不語壯熱頭痛頭風止驚悸溫疫迷悶姙婦頭旋倒地小兒驚癇天弔○喉痺鬼疰惡氣煩熱殺小蟲○凉心經益元氣除熱緩脾

竹茹微寒主嘔啘溫氣寒熱吐血崩中溢筋



竹瀝大寒療暴中風風痺胷中大熱止煩悶

苦竹葉氣味苦冷無毒主治口瘡目痛明目利九竅○治不睡止消渴解酒毒除煩熱發汗療中風瘖瘂○殺蟲治諸瘡疥癬



竹根鞭喜行東南宜死猫畏皂刺油麻

筍主治消渴利水道益氣宜食



草中一種莖如鐵綫而長葉小如竹一種莖青而短葉大如竹俗皆呼淡竹葉利小水治喉痺等證並效

肘后方治時行發黃竹葉五升切小麥七升石膏三兩水一斗半煑取七升細服盡劑而愈

天竹黄志曰生天竺國大明曰此是南海邊竹内塵沙結成者宗奭曰此是竹内所生如黄土著竹成片者故名竹黄按吳僧賛寧云竹黄生南海鏞竹中此竹極大又名天竹其内有黄可以療疾本經作天竺者非矣　竹黄氣味甘寒無毒主治小兒驚風天弔去諸風熱鎮心明目療金瘡滋養五臟治中風痰壅卒失音不語小兒客忤癎疾制藥毒發熱　竹黄形塊大小散碎不同體輕有黑白牙色之異味甘牙色者善白者次黑者下人多燒龍蛟諸骨蛤粉雜之宜辨

雷丸生石城山谷及漢中土中。竹之餘氣所結。故一名竹苓。本草綱目云。雷斧雷楔。皆霹靂擊物精氣所化。此物生土中無苗

蔓而殺蟲逐邪。猶雷之丸也。醫學入門云雷纍也纍纍相連如丸狀也。

氣味苦寒有小毒主治殺三蟲逐毒氣胃中熱利丈夫不利女子○作摩膏除小兒百病逐邪氣惡風汗出除皮中熱結積蠱毒寸白蟲自出不止久服令人陰痿○逐風主癲癎狂走

雷丸本經下品
荔實厚朴芫花
爲之使惡蓄根
葛根赤者殺人



皮黑肉白者良

修治甘草湯浸一夜銅刀刮去黑皮酒拌蒸焙乾用大明曰入藥炮用

按陳正敏遯齋閑覽云楊勔中年得異病每發語腹中有小聲應之久漸聲大有道士見之曰此應聲虫也但讀本草取其不應者治之讀至雷丸不應遂頓服數粒而愈　雷丸君

本草原始卷之四

本草原始

穀部卷之五

胡麻（今脂麻）　麻蕡（今火麻仁）　黑大豆（大豆黄卷淡豆豉赤小豆）

粟（今穀子）　醋　糯米（俗呼江米）　粳米（俗呼大米）　黍

酒　小麥（浮麥麩麪寒食麪麥奴麪筋麥粉）　神麯　大麥（麥芽）

飴餹　薏苡仁　綠豆　白稨豆（今眉豆）

菜部卷之六

冬葵　胡荽（今原荽）　瓜蒂　白芥　蒲公英

萊菔（今蘿蔔）　白花菜　蘹香（今小茴香）　蒔蘿　葱

韭　假蘇（今荊芥）　紫蘇　薄荷　堇堇菜

兔兒酸　生薑（乾薑）　葫（蒜）　茄　翻白草

果部卷之七

橘皮（青橘皮）　藕實（節花葉房蓮石蓮子）　大棗　葡萄

銀杏　栗　雞頭實（即芡實）　梅實（白梅烏梅）　木瓜

柹（俗呼柿）　枇杷　荔枝　龍眼　甘蔗

桃　杏　安石榴　松子　郁李仁

胡桃　檳榔　大腹子（大腹皮）　山樝（今山查）　枸櫞（今佛手柑）

本草原始

本草原始卷之五

雍丘正宇李中立纂輯並書畫

穀部

胡麻 巨勝也。苗名青蘘。處處種之。苗梗如麻而葉圓銳光澤。嫩時可作蔬。按沈存中筆談云。胡麻即今油麻。更無他說。古者中國止有大麻。其實爲蕡。漢使張騫始自胡地大宛得油麻種來。故名胡麻。其莖方。故吳普本草名方莖。其實類狗蝨。故名醫別錄名狗蝨。多脂油。故食療本草名油麻。本草衍義名脂麻。俗作芝麻非也。八穀之中。惟此大勝。故本經名巨勝。

黑胡麻氣味甘平無毒主治傷中虛羸補五內益氣力長肌肉填髓腦久服輕身不老○堅筋骨明耳目耐飢渴延年療金瘡止痛及傷寒溫瘧大吐後虛熱羸困○潤養五藏補肺氣止心驚利大小腸耐寒暑逐風濕氣遊風頭風治勞風產後羸困催生落胞細研塗髮令長白蜜蒸餌治百病○炒食不生風風人久食則步履端正語言不蹇○生嚼塗小兒頭瘡煎湯浴惡瘡婦人陰瘡大效

白胡麻氣味甘大寒無毒主治虛勞滑腸胃行風氣通血脉去頭上浮風潤肌肉食後生噉一合終身勿輟又與乳母食之孩子永不生病客熱可作飲汁服之生嚼傳小兒頭上諸瘡仙方蒸以辟穀

青蘘氣味甘寒無毒主治五藏邪氣風寒濕痺益氣補腦髓堅筋骨久服耳目聰明不飢不老增壽○主傷暑熱作湯沐頭去風潤皮膚益血色治崩中血凝注者生擣一升熱湯絞汁半升服立愈又牛傷熱擣汁灌之立愈

胡麻花主治生禿髮潤大腸人身上生肉丁者擦之即愈

麻稭主燒灰點痣去惡肉方中用

胡麻本經上品



今之脂麻即古之胡麻

修治胡麻取烏色者九蒸九晒熬擣餌之斷穀長生充飢雖易得而人未肯常服況餘藥耶又製方以水淘去浮者晒乾以酒拌蒸熟舂去皮用

胡麻即脂麻也有遲早二種實有黑白赤三色其莖皆方秋開白花亦有帶紫艷者節節結角長者寸許有四稜六稜者房小而子少七稜八稜者房大而子多皆隨土地肥瘠而然蘇恭以四稜爲胡麻八稜爲巨勝正謂其房勝也胡地所出者肥大其紋鵲其色紫黑取油亦多故詩云松下飯胡麻此乃所食之穀無疑與白油麻爲一物如川大黄川當歸上黨人參齊州半夏之類不可與他土出者更爲二物蓋特以其地之所宜立名也

其葉有本圓而末銳者有本圓而末分三丫如鴨掌形者葛洪謂一葉兩尖者指此殊不知烏麻白麻皆有二種葉也其莖高者三四尺有一莖獨上者角纏而子少有開枝四散者角繁而子多皆因苗之稀稠而然也

今市肆間因莖分方圓角稜分多寡遂以茺蔚子僞爲巨勝以黄麻子及大藜子僞爲胡麻誤而又誤矣梁簡文帝勸醫文有云世誤以灰滌菜子爲胡麻則胡麻之訛其來久矣惟孟詵謂四稜八稜爲土地肥瘠寇宗奭據沈存之說斷然以

脂麻爲胡麻足以證諸家之誤矣又賈思勰齊民要術種收胡麻法即今種收脂麻之法其爲一物尤爲可據

列仙傳云魯生女長樂人初餌胡麻漸絕火穀凡十餘年少壯色如桃花一日與知故別入華山後五十年有識者逢生女乘白鹿從王母游焉後還家謝其親里知故而去

續齊諧記漢明帝永平十五年中剡縣有劉晨阮肇二人入天台山採藥迷失道路忽逢一溪過之偶遇二女以劉阮姓名呼之如舊識耳曰即等何来晚耶遂邀之過家設胡麻飯以延之故唐詩云御羹和石髓香飯進胡麻

千金方烏麻九蒸九曬研末棗膏爲丸服之白髮返黑

胡麻油即脂麻油俗呼香油氣味甘微寒無毒主治利大腸產婦胞衣不落生油摩腫生禿髮○去頭面遊風○主天行熱閉腸內結熱服一合取利爲度○主瘖瘂殺五黃下三焦熱毒氣通大小腸治蚘心痛傅一切惡瘡疥癬殺一切蟲取一合和雞子兩顆芒硝一兩攪服少時即瀉下熱毒甚良○陳油煎膏生肌長肉止痛消癰腫補皮裂○治癰疽熱病○治熱毒食毒虫毒殺諸虫螻蟻

麻蕡始生太山川谷。莖如蒿。一枝七葉。或九葉。五六月開細黃花成穗。隨即結實。大如胡荽子。可取油。其皮作布及履用之。其稭有稜。可爲燭心。一名麻勃。麻花上勃勃者。子有雌雄。雄者名枲麻。牡麻雌者名苴麻。爾雅翼名麻蕡爲漢麻。本經名大麻。今人呼爲火麻。

火麻仁氣味甘平無毒主治補中益氣久服肥健不老神仙○治中風汗出逐水氣利小便破積血復血脈乳婦產後餘疾沐髮長潤○下氣去風痺皮頑令人心歡炒香浸小便絞汁服之婦人倒產吞二七枚即止○潤五臟利大腸風熱結燥及熱淋○補虛勞逐一切風氣長肌肉益毛髮通乳汁止消渴催生難產○取汁煮粥去五臟風潤肺治關節不通髮落○利女人經脈○調大腸下痢塗諸瘡癩殺蟲取汁煮粥食止嘔逆○畏牡蠣白微茯苓

麻勃音[illegible]一名麻花（氣味）辛溫無毒（主治）一百二十種惡風黑色遍身苦癢逐諸風惡血治女人經候不通○治健忘及金瘡內漏　畏牡蠣入行血藥以䗪蟲爲之使　生疔腫忌見

油主治熬黑壓油傅頭治髮落不生煎熟時時啜之治硫黃毒發身熱

葉擣汁服五合下蚘蟲搗爛傅蝎毒俱效



本經上品

七月十五斫倒

麻勃即此

麻蕡時珍曰此當是麻子連殼者（氣味）辛平有毒（主治）五勞七傷多服令人見鬼狂走○利五臟下血寒氣破積止痺散膿久服通神明輕身　畏牡蠣白微

弘景曰麻子中仁合丸藥并釀酒大善但性滑利

好古曰麻仁手陽明足太陰藥也陽明病汗多胃熱便難三者皆燥也故用之以通潤也

千金方治赤遊丹毒麻仁擣末水和傅之　麻仁使

大豆原生太山平澤。今處處有之。夏至前下種。苗高三四尺。葉團有尖。秋開小白花成叢。結莢長寸餘。經霜乃枯。有大小兩種。黑白黃褐青斑數色。黑者名烏豆。俗呼黑豆。可入藥用。一名尗。時珍曰。豆尗皆莢穀之總稱也。篆文尗象莢生附莖下垂之形。豆象子在莢中之形。廣雅云。大豆菽也。小豆荅也。弘景曰。黑大

豆爲櫱牙生五寸長便乾之。名大豆黃卷。

黑大豆氣味甘平無毒

主治塗癰腫煑汁飲殺鬼毒止痛○逐水脹除胃中熱痺傷中淋露下瘀血散五藏結積內寒殺烏頭毒久服令人身重炒爲屑味甘主胃中熱去腫除痺消穀止腹脹○煑食治溫毒水腫○調中下氣通關脉制金石藥毒牛馬溫毒○炒黑熱投酒中飲之治風痺癱緩口噤産後頭風食罷生吞半兩去心胸煩熱熱風恍惚明目鎮心溫補久服好顏色變白不老煑食性寒下熱氣腫壓丹石煩熱消腫○主中風脚弱産後諸疾同甘草煑湯飲去一切熱氣治風毒脚氣煑食治心痛筋攣膝痛脹滿同桑柴灰煑食下水鼓月脹和飯擣塗一切毒腫療男女陰腫以綿裹納之○治下痢臍腹痛止消渴治腎病利水下氣制諸風熱活血解諸毒蠱毒百藥毒

大豆黃卷氣味甘平無毒

主治濕痺筋攣膝痛○五藏不足胃氣結積益氣止痛去黑皯

潤肌膚皮毛○破婦人惡血○宜腎○除胃中積熱消水病脹滿

淡豆豉係蒸熟窨曬江右每製賣極多以淡名者爲其無鹽故也豉嗜也五味調和須之而成乃可甘嗜也

淡豆豉氣味苦寒無毒主治傷寒頭痛寒熱瘴氣惡毒煩燥滿悶虛勞喘吸兩脚疼冷殺六畜胎子諸毒治時疾熱病發汗熬水能止盜汗除煩生擣爲丸服治寒熱風胸中生瘡煑服治血痢腹痛研塗陰莖生瘡治瘡疾骨蒸中毒藥蠱氣犬咬下氣調中治傷寒溫毒發斑嘔逆

大豆生平炒食極熱煑食甚寒作豉極冷造醬及生黃卷則平牛食之溫馬食之冷一體之中用之數變惡五參龍膽得前胡烏喙杏仁牡蠣良



黑大豆本經中品



大豆黃卷

陶華以黑豆入鹽煑時常食之云能補腎蓋豆乃腎之穀其形類腎而又黑色通腎引之以鹽所以妙也

詵曰大豆黃屑忌豬肉小兒以炒豆豬肉同食必壅氣致死十有八九十歲已上不畏也

王氏農書云辟穀之方見於石刻水旱蟲荒國家代有甚則懷金立鵠易子炊骸爲民父母者不可不知此法也昔晉惠帝永寧二年黃門侍郎劉景先表奏臣遇太白山隱氏傳濟飢辟穀仙方臣家大小七十餘口更不食別物若不如斯臣一家甘受刑戮其方用大豆五斗淘淨蒸三遍去皮用大麻子三斗水浸一宿蒸三遍令口開取仁各擣爲末和擣作圓如拳大入甑內蒸從戌至子時止寅時出甑午時晒乾爲末乾服之以飽爲度不得食一切物第一頓得七日不飢第二頓得四十九日不飢第三頓三百日不飢第四頓得二千四百日不飢更不必服永不飢也不問老少但依法服食令人強壯容貌紅白永不憔悴口渴即研大麻子湯飲之轉更滋潤臟腑若要另喫物用葵子三合研末煎湯冷服取下藥如金色任喫諸物並無所損前知隨州朱頌教民用之有驗序其首尾勒石於漢陽大別山太平興國寺

赤小豆今江淮間多種之。苗高尺餘。葉名藿。類豇豆葉微圓峭而小。花似豇豆花淡銀褐色。結莢比綠豆莢稍大。入藥以粒緊小而色赤者爲良。蘇恭名赤豆。廣雅名荅。俗呼紅小豆。

赤小豆氣味甘酸平無毒

主治下水腫排癰腫膿血○療寒熱熱中消渴止洩痢利小便下腹脹滿吐逆卒澼○治熱毒散惡血除煩滿通氣健脾胃令人美食擣末同雞子白塗一切熱毒癰腫煑汁洗小兒黃爛瘡不過三度○縮氣行風堅筋骨抽肌肉久食瘦人○散氣去關節煩熱令人心孔開暴痢後氣滿不能食者煑食一頓即愈和鯉魚煑食甚治脚氣○解小麥熱毒煑汁解酒病解衣粘綴

本經中品



赤黯而小者良



一種色紅如珊瑚頂黑

辟厭疾病正月元旦面東以蠡水吞赤小豆三七枚一年無諸疾○又七月立秋日面西以井華水吞赤小豆七枚一秋不犯痢疾

赤小豆使

粟出江東及西間。今處處有之。苗葉似茅。種類有青赤黃白黑諸色。穗有大小。毛光不同。粒比黍而圓小。春秋題辭云。粟乃金所立。米爲陽之精。故西字合米爲粟。許慎云。粟之爲言續也。續於穀也。古者以粟爲黍稷粱秫之總稱。而今之粟在古但呼爲粱。後人乃專以粱之細者名粟。今北人呼爲穀子。熟舂成細粒。謂之小米。

粟米氣味鹹微寒無毒○主治養腎氣去脾胃中熱益氣陳者苦寒治胃熱消渴利小便○止痢壓丹石熱○水煮服治熱腹痛及鼻衄爲粉和水濾汁解諸毒治霍亂及轉筋入腹又治卒得鬼打○解小麥毒發熱○治反胃熱痢煮粥食益丹田補虛損開腸胃

粟米泔汁主治霍亂卒熱心煩渴飲數升立瘥○臭泔止消渴尤良○酸泔及澱洗皮膚瘙疥殺蟲飲之主五痔和臭樗皮煎服治小兒疳痢



粟　別錄中品

古呼粟爲粱粱者良也穀之良者也或云種出自梁州或云粱米性凉故得粱名自漢以後始以大而毛長者爲粱細而毛短者爲粟今則通呼爲粟而粱之名反隱矣

黃粱米氣味甘平無毒主治益氣和中止洩○去客風頑痺○止霍亂下痢利小便除煩熱

白粱米氣味甘微寒無毒主治除熱益氣○除胸膈中客熱移五臟氣緩筋骨凡患胃虛并嘔吐食及水者以米汁二合薑汁一合和服之佳○炊飯食之和中止消渴

青粱米氣味甘微寒無毒主治胃痺熱中消渴止洩痢利小便益氣補中輕身長年煮粥食之○健脾治洩精

赤粱米俗呼紅穀米胎動下血炊飯食之良

陳粟米治痢甚并胃熱消渴

藏器曰胃冷者不宜多食粟浸水至敗者損人瑞曰與杏仁同食令人吐瀉鴈食足重不能飛

普濟方治鼻衄不止粟米粉水煮服之良

醋有數種、有米醋、麥醋、麴醋、糠醋、糟醋、餳醋、桃醋、葡萄、大棗、蘡薁、諸雜果醋、亦極酸烈、惟米醋陳久者入藥良、餘止可啖食、古方多用酢字、俗呼苦酒、以其有苦味也、劉熙釋名云、醋、措也、能措置食毒也、孔子曰、或乞醯焉、即此也、

米醋氣味酸苦溫無毒

主治散癰腫散水氣殺邪毒○理諸藥消毒○治產後血運除癥塊堅積消食殺惡毒破結氣心中酸水痰飲○下氣除煩治婦人心痛血氣并產後及傷損金瘡出血昏運殺一切魚肉菜毒○磨青木香止卒心痛血氣痛浸黃蘗含之治口瘡調大黃末塗腫毒煎生大黃服治痃癖甚良○散瘀血治黃疸黃汗

綱目云酸屬木脾病勿多食酸酸傷脾肉䐢而脣揭

北瑣夢言一婢抱孩子擁爐不覺落火爐上遽以醋泥塗之至曉不痛亦無瘢痕

又一少年晴中常見一小鏡子俾醫工趙卿診之與少年期來日以魚膾奉候少年及期赴之延於內且從容俟客進方接

餓而設臺子施一甌芥醋更無他味卿亦未出迨久候不至少年飢甚且聞醋香不免輕啜之逡巡竭甌啜之覺胸中豁然眼花不見卿出云君良魚鱠太多有魚鱗在胃中所以眼花魚畏芥醋故偹芥醋欲君因飢以啜之果愈此疾烹鮮之會乃權詐也

服茯苓丹參人不可食醋

糯米

本經載名曰稻米一名稌南方水田處多種之按蘇東坡云稻者穬穀通名羅氏亦曰在穀通謂之稻爾雅云稌稻也郭璞云沛國呼稌周頌云豐年多黍多稌禮記云牛宜稌豳風云十月穫稻皆是一物也說文云秔稻屬也沛國謂稻爲糯字林云糯粘稻也秔不粘稻也今人呼糯者如字林所說也本經稱稻者如說文所說也稻從舀象人在臼上治稻之義稌則方言稻音之轉爾其性粘軟故謂之糯頴曰糯米緩筋令人多睡其性懦也宗奭曰今造酒糯稻也北人呼爲江米

糯米氣味苦溫無毒（思邈曰味甘）

主（治作飯溫中令人多熱大便堅○能行榮衛中血積解芫青斑蝥毒○益氣止泄○補中益氣止霍亂後吐逆不止以一合研水服之○以駱駝脂作煎餅食主痔疾○作糜一斗食主消渴○暖脾胃止虛寒泄痢縮小便收自汗發痘瘡）

米（泔氣味甘涼無毒主治益氣止煩渴霍亂解毒食鴨肉不消者頓飲一盞即消）

花（陰乾入揩牙烏鬚方用）

稈（氣味辛甘熱無毒主治黃病如金色煮汁浸之仍以穀芒炒黃爲末酒服○燒灰治墜撲傷損）

糯米
別錄下品
本草專指糯爲稻



（頌曰糯米性寒作酒則熱糟乃溫平時珍曰糯性粘滯難化小兒病人最宜忌之）

（思邈曰稉米味甘脾之穀也脾病宜食之）

（澹寮方治勞心吐血糯米半兩蓮子心七枚爲末酒服）

粳米

一名秔有水旱二種早中晚三收南方地下塗泥多宜水稻北方地平惟澤土宜旱稻西南夷亦有燒山地爲畬田種旱稻者謂之火米古者惟下種成畦故祭祀謂稻爲嘉蔬今人皆拔秧栽插矣其種不同俱隨土地所宜也其穀有光芒長短大小其米有赤白紫青堅鬆其性有溫涼寒熱亦因土產形色而異也入藥以晚粳者爲良故曰粳米粳者硬也北人呼爲大米亦呼稻米孔子曰食夫稻即此也

粳米氣味甘苦平無毒

主（治益氣止煩止渴止洩○溫中和胃氣長肌肉○補中壯筋骨益腸胃○煑汁主心痛止渴斷熱毒下痢○合芡實作粥食益精強志聰耳明目○通血脉和五臟好顏色○常食乾粳飯令人不噎）

淅（二泔主治清熱止煩渴利小便涼血）

粳穀奴主治走馬喉痺燒研酒服方寸匕立效

禾稈主治解砒毒燒灰新汲水淋汁濾清冷服一碗毒當下出



粳米
別錄中品

十月收者
爲晚粳

今人呼粳
通謂之稻

頴曰新米乍食動風氣陳者下氣病人尤宜

詵曰同馬肉食發痼疾和蒼耳食令人卒心痛急燒倉米灰和
（蜜漿服之不爾即死）

簡要濟衆方治鼻衄不止服藥不應獨聖散糯米微炒黃爲末
（每服二錢新汲水調下）

[illegible]出北間。禾屬而黏者也。其苗似粟而低小。有毛。結子成枝而殊散。其粒大於粟而光滑。有數種。赤者曰虋曰穈。白者曰芑。黑者曰秬。一稃二米曰秠。魏子才六書精蘊云。黍下從氺。象細粒散垂之形。氾勝之云。黍者、暑也。待暑而生。暑後乃成也。故謂之黍。孔子曰。禾可爲酒。禾入水也。然則又以禾入水三字合而爲黍。其米北人呼爲黃米。

黍米氣味甘溫無毒

主治益氣補中○燒灰和油塗杖瘡止痛不作瘢○嚼濃汁塗
（小兒鵝口瘡有效）

丹黍米氣味甘微寒無毒

主治欬逆上氣霍亂止洩利除熱止煩渴下氣止欬嗽退熱
（治鷩瘕以新熟者淘泔汁生服一升不過三二度愈）

詵曰醉臥黍穰令人生厲人家取其莖
（穗作提拂掃地印匠作刷印書作湯）
（浴通身水腫煑莖汁飲之解苦瓠毒）
（和小豆煑汁下小便）

黍別錄中品

黍米肺之穀
也肺病宜食
之



黍

黍米久食令人多煩熱發故疾昏五臟緩筋骨絕血脈合葵菜
（食成痼疾合牛肉白酒食生寸白蟲）

傷寒類要治男子陰易用丹黍米三兩煑薄酒和飲令發汗即
愈

酒秫、黍、粳、糯、麥、粟、並可釀造。惟糯米黍米麫麯造者爲良。飲饍標題云。酒之清者曰釀。濁者曰盎。厚曰醇。薄曰醨。重釀曰酎。一宿曰醴。美曰醑。未榨曰醅。紅曰醍。綠曰醽。白曰醝。按許氏說文云。酒、就也。所以就人之善惡也。一說酒字。篆文象酒在卣中之狀。

酒氣味苦甘辛大熱有毒○主治行藥勢殺百邪惡毒氣○通
（血脈厚腸胃潤皮膚散濕氣消憂發怒宣言暢意○養脾氣）
（扶肝除風下氣○解馬肉桐油毒丹石發動諸病熱飲之甚）
（良）

陶弘景曰大寒凝海惟酒不冰明其性熱獨冠群物藥家多用以行其勢人飲多則體弊神昏是其有毒故也

博物志云王肅張衡馬均三人冒霧晨行一人飲酒一人飽食一人空腹空腹者死飽食者病飲酒者健此酒勢辟惡勝於作食之效也

詵曰久飲傷神損壽軟筋骨動氣痢醉臥當風則成癜風醉浴冷水成痛痺服丹砂人飲之頭痛吐熱

藏器曰凡酒忌諸甜物酒漿照人無影不可飲酒合乳飲令人氣結同牛肉食令人生蟲酒後臥黍穰食豬肉患大風中酒毒者枳椇葛花赤豆花綠豆粉解之寒勝熱也

震亨曰本草止言酒熱有毒不言其濕中發熱近於相火醉後振寒戰慄可見矣又性喜升氣必隨之痰鬱于上溺澀于下恣飲寒凉其熱內鬱肺氣太傷其始也病淺或嘔吐或自汗或瘡疥或鼻皶或瀉痢或心脾痛尚可散而去之其久也病深或消渴或內疽或肺痿或鼓脹或失明或哮喘或勞瘵或癲癇或痔漏為難名之病非具眼未易處也可不謹乎

頴曰人知戒早飲而不知夜飲更甚既醉既飽睡而就枕熱壅傷心傷目夜氣收斂酒以發之亂其清明勞其脾胃停濕生痰動火助慾因而致病者多矣朱子云以醉為節可也

時珍曰酒天之美祿也麪麴之酒少飲則和血行氣壯神禦寒消愁遣興痛飲則生痰動火耗血亡精爛胃腐腸蒸筋潰髓邵堯夫詩云美酒飲教微醉後此得飲酒之妙所謂醉中趣壺中天者也若夫沉湎無度醉以為常者輕則致疾甚則喪國亡家而隕軀命其害可勝言哉此大禹所以疏儀狄周公所以著酒誥為世範戒也

宗奭曰戰國策云帝女儀狄造酒進之於禹說文曰少康造酒然本草已著酒名素問亦有酒漿則酒自黃帝始非儀狄矣驚怖辛死溫酒灌之即醒

小麥

一名來。秋種冬長。春秀夏實。具四時中和之氣。故為五穀之貴。許氏說文云。天降瑞麥。一來二麰。象芒刺之形。天所來也。如足行來。故麥字從來從夂。（夂音綏、）足行也。詩云。貽我來牟是矣。又云。來象其實。夂象其根。醫學入門云。小、形小也。麥、脈也。以繼續穀未。續民命脈。爾雅云。麥者、接絕續乏之穀。

小麥氣味甘微寒無毒○主治除客熱止煩渴咽燥利小便養肝氣止漏血唾血令女人易孕○養心氣心病宜食之○煎湯飲治暴淋○熬末服殺腸中蚘蟲○陳者煎湯飲止虛汗燒存性油調塗諸瘡湯火傷灼

浮麥氣味甘鹹寒無毒○主治益氣除熱止自汗盜汗骨蒸虛熱婦人勞熱

麥麩主治時疾熱瘡爛撲損傷折瘀血醋炒署貼之○和麪作餅止洩痢調中去熱健人以醋拌蒸袋盛包熨人馬冷失腰脚傷折處止痛散血○醋蒸熨手足風濕痺痛寒濕脚氣互易至汗出并良末服止虛汗

麥麪氣味甘溫有微毒○主治補虛久食實人膚體厚腸胃強氣力○養氣補不足助五臟○水調服治人中暑馬病肺熱○傅癰腫損傷散血止痛生食利大腸水調服止鼻衄吐血

寒食麪藏瘢痕○蒸餅打糊調上焦藥為丸下咽即化

麥奴治熱煩天行熱毒解丹石毒○苗消酒毒絞汁飲之

小麥
別録中品



麪觔解熱和中益氣勞熱人宜煮食之

麥粉係麩麪洗觔澄出漿粉今人漿衣多用之按萬善堂方云烏龍膏治一切癰腫發背無名腫毒初發焮熱未破者取效如神用隔年麥粉愈久者愈佳以鍋炒之初炒如餳久炒則

乾成黃黑色冷定研末陳米醋調成糊熬如黑漆瓷罐收之用時攤紙上剪孔貼之即如冰冷疼痛即止少頃覺痒乾亦不能動久則腫毒自消藥力亦盡而脫落甚妙此方屢用屢驗藥易而功大濟生者宜收藏之

神麴　按六月六日造者。謂諸神集會此日故也。所用藥料。各肖神名。其方用白麪一百斤。以象白虎。蒼耳草自然汁三升。以象勾陳。野蓼自然汁四升。以象滕蛇。青蒿自然汁三升。以象青龍。杏仁去皮尖四升。以象玄武。赤小豆煑熟去皮三升。以象朱雀。一如造酒麯法式。用麻葉或楮葉包罨。待生黃衣。晒收之。本草綱目曰。麴以米麥包罨而成。故字從麥、從米、從包省文。會意也。劉熙釋名云。麴。朽也。鬱之使生衣敗朽也。

神麴氣味甘辛溫無毒

主治化水穀宿食癥結積滯健脾暖胃○養胃氣治赤白痢○消食下氣除痰逆霍亂泄痢脹滿諸疾其功與麴同閃挫腰痛者煅過淬酒溫服有效婦人產後欲回乳者炒研服二錢日二即止甚驗

元素曰陽中之陽也入足陽明經

修治神麴須火炒黃以助土氣陳久者良

摘玄方治食積心痛陳神麴一塊燒紅淬酒二大椀服之

大麥　一名牟麥。出關中。麥之苗粒皆大於来。故得大名。說文云。牟。大也。通作麰。孟子曰。今夫麰麥。即此也。水浸脹候生芽曝乾。名**麥糵**。俗呼麥芽。

大麥氣味鹹溫微寒無毒

主治消渴除熱益氣和中又云令人多熱爲五穀長○補虛劣壯血脉益顏色實五臟化穀食止洩不動風氣久食令人肥白滑肌膚爲麪勝於小麥無躁熱○麪平胃止渴消食療脹滿○久食頭髮不白和針砂沒石子等染髮黑色○寬胸下氣涼血消積進食

麥芽氣味鹹溫無毒主治消食和中○破冷氣去心腹脹滿○開胃止霍亂除煩悶消痰飲破癥結催生落胎○補脾胃虛寬腸下氣腹鳴者用之○消米麪諸果食積

別錄中品



大麥飼馬良

修治麥芽去鬚取其中米炒研麪用今惟炒用

大麥石蜜爲之使麥芽豆蔻縮砂烏梅木瓜芍藥五味子爲使

孫真人方治麥芒入目大麥煑汁洗之即出

李絳兵部手集方治產後腹脹不通轉氣急坐臥不安以麥糵一合爲末和酒服良久通轉神驗此乃供奉輔太初傳與崔郎中方也

飴餳　北人謂之餳。糯米、粳米、黍米、粟米、蜀秫米、大麻子、枳椇子、黃精、白术。並堪熬造。惟以糯米作者入藥。粟米者次之。餘但可食耳。李時珍曰。飴餳用麥糵或穀芽同諸米熬煎而成。古人寒食多食餳。故醫方亦收用之。按劉熙釋名云。餹之清者曰飴。形怡怡然也。稠者曰餳。強硬如錫也。如餳而濁者曰餔。方言謂之餦

餳。陳嘉謨曰。因色紫類琥珀。方中謂之膠飴。乾枯名餳。

飴餹氣味甘大溫無毒〇主治補虛乏止渴去血〇補虛冷益氣力止腸鳴咽痛治唾血消痰潤肺止嗽〇健脾胃補中治吐血打損瘀血者熬焦酒服能下惡血又傷寒大毒嗽於蔓菁薤汁中煑一沸頓服之良〇脾弱不思食人少用能和胃氣亦用和藥

入太陰經

凡中滿吐逆秘結牙䘌赤目疳病者切宜忌之

集異記云刑曹進河朔健將也爲飛矢所中鏃之不動痛困俟死忽夢胡僧令以米汁注之必愈廣詢于人無悟者一日一僧丐食肖所夢者叩之僧云但以寒食餳點之如法用之清涼頓減酸楚至夜瘡痒用力一鉗而出旬日而瘥

老人煩渴寒食大麥一升水七升煎五升入赤餳二合飲之

薏苡仁始出交趾。今處處人家種之。春生苗。莖高三四尺。葉似蠡實葉而解散。故本經名解蠡。又似芑黍之苗。故別錄名芑實。五六月開花結實。其實青白色。形如珠子而稍長。小兒多以線穿如貫珠爲戲。故人呼爲薏珠子。

薏苡仁氣味甘微寒無毒

主治筋急拘攣不可屈伸久風濕痺下氣久服輕身益氣〇除筋骨中邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食〇炊飯作麪食主不飢溫氣煑飲止消渴殺蚘蟲〇治肺痿肺氣積膿血欬嗽涕唾上氣煎服破毒腫〇去乾濕脚氣大驗〇健脾益胃補脾清熱去風勝濕炊飯食治冷氣煎飲利小便

據千金方自草部移入此



薏苡仁本經上品



色白堪作粥

修治取子於甑中蒸使氣餾曝乾挼之得仁亦可碓取之或杵之取仁色青白者良雷公云每一兩以糯米一兩同炒熟去糯米用亦有更以鹽湯煑過者

張師正倦游錄云辛稼軒忽患疝疾重墜大如盃一道人教以薏珠用東壁黃土炒過水煑爲膏服數服即消

綠豆處處種之。三四月下種。苗高尺許。葉尖而有毛。至秋開小花。莢如赤豆莢。入藥以粒小而色鮮者爲良。綠以色名也。舊本作菉者非矣。

綠豆氣味甘寒無毒主治煑食消腫下氣壓熱解毒生研絞汁服治丹毒煩熱風疹藥石發動熱氣奔豚〇治寒熱熱中止泄痢卒澼利小便脹滿〇厚腸胃作枕明目治頭風頭痛除吐逆〇補益元氣和調五臟〇安精神行十二經脈去浮風潤皮膚宜常食之煑汁止消渴〇解一切藥草牛馬金石諸毒治痘毒利腫脹

綠豆粉氣味甘涼平無毒主治解諸熱益氣解酒食諸毒治發背癰疽瘡腫及湯火傷灼〇痘瘡濕爛不結痂疕者乾撲之良〇新水調服治霍亂轉筋解諸藥毒死心頭尚溫者〇解菰菌砒毒

綠豆宋開寶



綠豆粒粗而色鮮者皮薄而粉多粒小而色深者皮厚而粉少早種者呼爲摘綠可頻摘也遲種呼爲拔綠一拔而已北人用之甚廣可作豆粥豆酒磨麪澄清取粉以水浸濕生白芽又爲菜中佳品牛馬之食亦多賴之真濟世之良穀也

綠豆皮寒肉平宜連皮用

汴州涇口市民陳公誦觀音甚誠慶元初出行顛折一足忍痛叫菩薩越三晝夜夢一僧柱杖持鉢登門問所苦陳曰不幸折一足貧無力訪醫只得告佛僧曰不用憂吾有一方接骨膏正可治汝便買綠豆粉於新鐵銚內炒令真紫色旋汲水調成稀膏厚傳換處須教徧滿以白紙將杉木縛定其效如神不必假他劑也語訖僧忽不見陳亦寤如方修製用

之則愈

稨豆處處有之。人家多種於籬援間。蔓延而上。葉大如盃。團而有尖。一枝三葉。其花狀如小蛾有翅尾形。莢生花下。有長團不同。皆纍纍成枝。白露後實更繁衍。嫩時可充蔬食茶料。老則收子煑食。子有黑白赤斑不同。入藥用白者。稨本作扁。莢形扁也。形象蛾眉。故一名蛾眉豆。俗呼眉豆。

白扁豆氣味甘微溫無毒（主治和中下氣○補五臟主嘔逆久服頭不白○療霍亂吐利不止研末和醋服之○行風氣治女子帶下解酒毒河豚魚毒○解一切草木毒生嚼及煑汁飲取效○止泄痢消暑暖脾胃除濕熱止消渴）

白扁豆別錄中品（患冷人勿食）



八九月采收

修治（連皮炒熟入藥亦有水浸去皮及生用者從本方）

白扁豆入太陰氣分通利三焦能化清降濁故專治中宮之病消暑除濕而解毒也

永類方治女人服毒藥墮胎腹痛者及服藥胎氣已傷未墮或口噤手強自汗頭低似乎中風九死一生醫多不識作風治必死無疑遇此症者生白扁豆去皮爲末米飲服方寸七濃煎汁飲亦可

事林廣記治中六畜肉毒者白扁豆燒存性研末水服之良

本草原始卷之六

雍丘正宇李中立纂輯並書畫

菜部

葵始生少室山。今處處有之。古人種爲常食。今之種者頗鮮。苗高二三尺。莖及花葉似蜀葵而差小。有紫莖白莖二種。以白莖爲勝。實大如指頂。皮薄而扁。內子輕虛如榆莢仁。以秋種覆養。經冬至春作子者。謂之冬葵子。古人多用入藥。王禎農書云。葵陽草也。其菜易生。郊野甚多。不拘肥瘠地皆有之。爲百菜之主。備四時之饌。本豐而耐旱。味甘而無毒。可防荒儉。可以菹腊。其枯枿可以榜簇。根子可以療疾。咸無遺棄。誠蔬茹之要品。民生之資益者也。今人不復食之。亦無種者。按爾雅翼云。葵者。揆也。葵葉傾日。不使照其根。乃智以揆之也。古人采葵必待露解。故一名露葵。其性滑利。今人呼滑菜。

冬葵苗氣味甘寒無毒爲百菜主其心傷人（主治脾之菜也宜脾利胃氣滑大腸○宣導積滯妊婦食之胎滑易生○煑汁服利小腸治時行黄病乾葉爲末及燒灰服治金瘡出血○除客熱治惡瘡散膿血女人帶下小兒熱毒下痢丹毒並宜食之○服丹石人宜食○潤燥利竅功與子同）

根氣味甘寒無毒主治惡瘡療淋利小便解蜀椒毒○小兒吞錢不出煑汁飲之神妙○治疳瘡出黃汁

冬葵子氣味甘寒滑無毒主治五臟六腑寒熱羸瘦五癃利小便久服堅骨長肌肉輕身延年○療婦人乳內閉腫痛○出癰疽頭○下丹石毒○通大便消水氣滑胎治痢

救荒本草名冬葵菜
古呼葵菜本經上品
食須用蒜又伏硫黃



冬葵子臣陰中之陽
黃芩爲之使

誌曰葵菜雖冷若熱食之令人熱悶動風氣四月食之發宿疾天行病後食之令人失明霜葵生食動五種留飲吐水凡服百藥忌食其心心有毒也黃背紫莖者勿食不可合鯉魚黍

米鮓食害人

唐王燾外臺秘要云天行斑瘡須臾遍身皆戴白漿此惡毒氣永徽四年此瘡自西域東流於海內但煑葵菜葉以蒜虀啖之則止

陳自明婦人良方云乳婦氣脉壅塞乳汁不行及經絡凝滯乳房脹痛留蓄作癰毒者用葵菜子炒香縮砂仁等分爲末熱酒服二錢此藥滋氣脉通營衛行津液極驗乃上蔡張不愚方也

胡荽始生胡地今處處有之許氏說文作葰云薑屬可以香口也故本草拾遺名香荽其莖柔葉細而根多鬚綏綏然也張騫使西域始得種歸故名胡荽一名胡菜今俗呼爲蒝荽蒝乃莖葉散布之貌俗作芫花之芫非矣

根葉氣味辛溫微毒主治消穀治五臟補不足利大小腸通小腹氣拔四肢熱止頭痛療沙疹豌豆瘡不出作酒歕之立出通心竅○補筋脉令人能食○治腸風用熱餅裹食甚良○合諸菜食氣香令人口爽辟飛尸鬼疰蠱毒○辟魚肉毒

子氣味酸平無毒主治消食能食○蠱毒五痔及食肉中毒吐下血煑汁冷服又以油煎塗小兒禿瘡


胡荽
宋嘉祐
八月下種
晦日尤良
五月收子

凡服一切補藥及藥中有白术牡丹者不可食此伏石鍾乳

經驗後方治小兒疹痘不快用胡荽二兩切以酒二大盞煎令

沸沃以物合定勿令洩氣候冷去滓微微含噴從項背至足令遍勿噀其面

瓜蔕始生嵩高平澤今處處有之人家園圃種蒔甚多二三月下種延蔓而生葉大數寸五六月開黃花結瓜六七月熟名甜瓜其瓜有長尖團扁大或徑尺小或一捻其稜或有或無其色或青或綠或黃或白其瓤或黃或白或赤未熟謂之苦瓜去瓜用蔕約半寸許曝乾入藥俗呼苦丁香篆文瓜字象實在鬚蔓之間王禎曰大曰瓜小曰瓞其子曰瓣其肉曰瓤其跗曰環瓜之脫華處也其疐謂之蔕蔕瓜之繫蔓處也詩曰綿綿瓜瓞

即此也。

瓜蒂氣味苦寒有毒主治大水身面四肢浮腫下水殺蠱毒欬逆上氣及食諸果病在胸腹中皆吐下之○去鼻中瘜肉療黃疸○治腦塞熱齆眼昏吐痰○吐風熱痰涎治風眩頭痛癲癇喉痺頭目有濕氣○得麝香細辛治鼻不聞香臭

甜

瓜瓤氣味甘寒滑有小毒主治止渴除煩熱利小便通三焦間壅塞氣治口鼻瘡○暑月食之永不中暑多食瓜作脹者食鹽花即化

瓜蒂使
宋嘉祐

苦瓜去瓤醬淹食為菜中佳品甜瓜苦瓜之熟者



凡瓜有兩鼻兩蒂者殺人

瓜子仁治腹內結聚破潰膿血最為腸胃脾內壅要藥○止月經太過研末去油水調服○炒食補中益人

宗奭曰甜瓜雖解暑氣而性冷消損陽氣多食未有不下痢者貧下多食深秋作痢最為難治惟以皮蜜浸收之良皮亦可作羹

熱病發黃瓜蒂末大豆許吹鼻中輕半日重一日流取黃水愈

芥生太原河東葉如芥而白子粗大如白粱。王禎農書云其氣味辛烈菜中之介然者食之有剛介之象故字從介其種來自胡戎而盛於蜀故一名胡芥一名蜀芥。

莖葉氣味辛溫無毒

主治歸鼻除腎經邪氣利九竅明耳目安中久食溫中○止咳嗽上氣除冷氣○主欬逆下氣去頭面風○通肺豁痰利膈開胃○安五臟

子氣味辛溫無毒

主治發汗主胸膈痰冷上氣面目黃赤又醋研傳射工毒○敷惡氣遁尸飛尸及暴風毒腫流四肢疼痛○燒煙及服辟邪魅欬嗽胸脇支滿上氣多唾者每用溫酒吞下七粒○利氣豁痰除寒暖中散腫止痛治喘嗽反胃痺木脚氣筋骨腰節諸痛

本草攤度治小兒乳癖白芥子研末水調攤膏貼之以平為度

性暖熱病及患痔漏者不可食

白芥宋開寶　葉花花黃結角



蒲公英處處有之春初生苗葉如苦苣中心抽莖莖端出花色黃如金錢如單菊而大又似金簪頭故土宿本草名金簪草千金方作鳧公英圖經作僕公罌庚辛玉冊作鵓鴣英本經作蒲公草。俗呼蒲公丁又呼黃花地丁。

苗氣味甘平無毒○

主治婦人乳癰水腫煑汁飲及封之立消○解食毒散滯氣化熱毒消惡腫結核丁腫○擦牙烏鬚髮壯筋骨○白汁塗惡刺狐尿刺瘡即愈

足少陰腎經君藥也

蒲公英　唐本草　北人呼黃花苗斷之有白汁出堪生啖有先葉者亦有花葉者



昔日越王曾遇異人得此方極能固牙齒壯筋骨生腎水凡年未及八十者服之鬚髮返黑齒落更生年少服之至老不衰得遇此方宿有仙緣當珍重之不可輕泄用蒲公英一斤洗淨勿令見天日晾乾入斗子解鹽一兩香附子五錢二味爲細末入蒲公英淹一宿分爲二十團用皮紙三四層裹扎定用六一泥即蚯蚓糞如法固濟入灶內焙乾乃以武火煅通紅爲度冷定取出去泥爲末早晚擦牙漱之吐嚥任便久久自效係積德堂方名還少丹

萊菔生江北秦晉最多。今天下通有之。六月下種。其葉如蕪青。秋采苗。冬掘根。春末抽高薹。開小花紫碧色。夏初結角。其子大如急性子。圓長不等。黃赤色。五月亦可再種。其根有紅白二色。其狀有圓長二類。按爾雅云。葖。蘆葩。孫炎註云。紫花菘也。俗呼

溫菘。一名雹突。一名蘆菔。頌曰。紫花菘溫菘皆南人所呼。吳人呼楚菘。廣南人呼秦菘。按菘乃菜名。因其耐冬如松。故名菘。萊菔乃根名。上古謂之蘆葩。中古轉爲萊菔。後世訛爲蘿蔔。陸佃乃言萊菔能制麪毒。是來麰之所服。以菔因服。蓋亦就文起意耳。（萊菔音來北葩蔔俱音北）

氣味辛甘溫無毒

主治散服及炮煮服食大下氣消穀和中去痰癖肥健人生擣汁服止消渴試大有驗○利關節理顏色練五臟惡氣制麪毒行風氣去邪熱氣○利五臟輕身令人白淨肌細○消痰止欬治肺痿吐血溫中補不足同羊肉銀魚煮食治勞瘦欬嗽○同豬肉食益人生擣服治噤口痢○擣汁服治吐血衄血寬胸膈利大小便生食止渴寬中煮食化痰消導○殺[illegible]鯹氣治豆腐積

子　氣味辛甘平無毒主治研汁服吐風痰同醋研消腫毒下氣定喘治痰消食除脹利大小便止氣痛下痢後重發瘡疹　子入藥微炒

頌曰萊菔功同蕪菁然力猛更出其右斷下方亦用其根燒熟入藥尤能制麪毒昔有婆羅門僧東來見食麥麪者驚云此大熱何以食之又見食中有萊菔乃云賴有此以解其性自此相傳食麪啖萊菔

思邈曰萊菔平不可與地黃同食令髮白爲其澀營衛也時珍曰多食動氣惟生薑能制其毒又伏硇砂



唐本草

根葉可生可熟可醬可醋蔬中之最有利益者

醫說云饒州市民李太常苦鼻衄遂至危困醫授以方取蘿蔔自然汁和無灰酒飲之則止

裕陵傳王荆公偏頭疼方云是禁中秘方用生蘿蔔汁一蜆殼仰臥注鼻中左痛注右右痛注左或兩鼻俱注亦可數十年患皆一注而愈

洞微志云齊州有人病狂云夢中見紅裳女子引入宮殿中小姑令歌每日遂歌云五靈樓閣曉玲瓏天府由來是此中惆悵悶懷言不盡一丸蘿蔔火吾宮有一道士云此犯大麥毒也少女心神小姑脾神醫經言蘿蔔制麪毒故曰火吾宮火者毀也遂以藥并蘿蔔治之果愈

白花菜三月種之。柔莖延蔓。一枝五葉。葉大如拇指。秋開小白花。長蕊。結小角長二三寸。其子黑色而細。狀如初眠蠶沙。不光澤。菜氣羶臭。惟宜鹽菹食之。因花色白故名。

白花菜氣味苦辛微毒

主治下氣○煎水洗痔搗爛敷風濕痺痛擂酒飲止瘧

子今人治瘧疾藥多用

頴曰多食動風氣滯臟腑令人胃中悶滿傷脾

其莢六七月采暑晒以擄椒揉熟少晾安置罐中發過油醋調食香美


白花菜食物本草

氣臭

蘹香今交廣諸番及近郡皆有之。宿根經冬生苗作叢。肥莖絲葉。五六月開花如蛇床花而色黃。結子大如麥粒。輕而有細稜。北人呼爲茴香。聲相近也。弘景曰。煑臭肉下少許。即無臭氣。臭醬入末亦香。故曰茴香。今人謂之小茴香。（唐本草草部移入此）

子氣味辛平無毒

主治諸瘻霍亂及蛇傷○膀胱胃間冷氣及育腸氣調中止痛嘔吐○治乾濕脚氣腎勞癩疝陰疼開胃下氣○補命門不足暖丹田

修治得酒良炒黃用入腎經鹽製

好古曰陽也浮也入手足少陰太陽經

莖葉主治煑食治卒惡心腹中不安○治小腸氣卒腎氣衝脇如刀刺痛喘息不得生擣汁一合投熱酒一合和服○氣味與子同


八九月採實形圓有稜色青黃氣香臭月祛蠅辟臭食料宜之

袖珍方治脇下刺痛小茴香一兩炒枳殼五錢麩炒爲末每服二錢鹽酒調服神

范汪方療惡毒癰腫或陰卵髀間疼痛攣急牽入小腹不可忍一宿即殺人者用茴香葉搗汁一升服之日三四服其滓貼腫上冬月用根此是外國神方永嘉以來用之起死回生神驗

蒔蘿生佛誓國。苗莖花實亦類蛇床而簇生。辛香。六七月採實。開寶本草名慈謀勒。李時珍曰。蒔蘿慈謀勒。皆番語也。

子氣味辛溫無毒主治小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷不下食兩肋痞滿○建脾開胃氣溫腸殺魚肉毒補水臟治腎氣壯筋骨○主膈氣消食滋食味

求類鈐方治閃挫腰痛用蒔蘿碾爲細末無灰酒調服二錢匕

蒔蘿類蛇床子而圓小有稜氣香今人每呼土茴香爲蒔蘿

葱有冬葱漢葱胡葱茖葱。凡四種。冬葱夏衰冬盛。莖葉俱軟美。分莖栽蒔而無子也。漢葱冬枯。其莖實硬而味薄。胡葱莖葉粗短。根若金燈。茖葱生于山谷。入藥冬葱最善。氣味亦佳。醫學入門曰。葱。空也。其葉中空。故名葱。一云葱。青白色也。爾雅翼云。西域有葱嶺。其山高大。上悉生葱。故以名焉。

葱莖白氣味辛平葉溫根鬚平並無毒

主治作湯治傷寒寒熱中風面目浮腫能出汗○傷寒骨肉碎痛喉痺不通安胎歸目益目睛除肝中邪氣安中利五臟殺百藥毒根治傷寒頭痛○主天行時疾頭痛熱狂霍亂轉筋及奔豚氣脚氣心腹痛目眩○止心迷悶○通關節止衄血利大小便○治陽明下痢下血○達表和裏止血○除風濕身

痛麻痺蟲積心痛止大人陽脫陰毒腹痛小兒盤腸內釣婦人妊娠溺血通乳汁散乳癰利耳鳴塗猘犬傷制蚯蚓毒殺一切魚肉毒汁能消玉為水化五石

實 俗呼葱子氣味辛大溫無毒主治明目補中氣不足○溫中益精

葱初生曰葱針葉曰葱青衣曰葱袍莖曰葱白葉中涕曰葱苒根曰葱鬚

葱

別錄中品



元素曰味辛而甘平氣厚味薄升也陽也入手太陰足陽明經

宗奭曰葱主發散多食昏人神　思邈曰正月食生葱令人面上起遊風生葱同蜜食作下利燒葱同蜜食壅氣殺人

崔 氏纂要治卒中惡死或先病或平居寢臥奄忽而死皆是中惡急取葱心黄刺入鼻孔中男左女右入七八寸鼻目血出即甦○又法用葱針入耳中五寸以鼻中血出即活也如無血出即不可治矣此扁鵲秘方也

崔 給事頃在澤潞與李抱真作判官李相方以毬杖按毬子其軍將以杖相格承勢不能止因傷李相拇指並爪甲擘裂遽索金瘡藥裹之強坐頻索酒飲至數杯已過量而面色愈青忍痛不止有軍吏言取葱新折者使入溏灰火煨熟剝皮擘開其間有涕取傅損處仍多煨取續續易熱者凡三易之面色却赤斯須云已不痛凡十數度易用熱葱并涕裹纏遂畢席笑語

蚯蚓化水　葱一枝將蚯蚓去泥以鹽塗之內入中化為水見食物本草

韭

叢生豐本。長葉青翠。可以根分。可以子種。葉高三寸便翦。翦忌日中。一歲三四割之其根不傷。收子者只可一翦。八月開花成叢。九月收子其子黑色而扁。許慎說文曰一種而久者。故謂之韭。象笭云久刈不乏故。以韭名字畫因之。亦合九數綱目云韭之莖名韭白。根名韭黄。花名韭菁。禮記謂韭為豐本言其美在根也。因溫補。故本草拾遺名草鍾乳因益陽。故侯氏藥譜名起陽草。

韭氣味辛微酸溫濇無毒

主治歸心安五臟除胃中熱利病人可久食○葉煑鯽魚鮓食斷卒下痢○根入生髮膏用○根葉煑食溫中下氣補虛益陽調和臟腑令人能食止洩血膿腹中冷痛生擣汁服主胸痹骨痛不可觸者又解藥毒療狂狗咬人數發者亦塗諸蛇虺蠍蠆惡蟲毒○煑食充肺氣除心腹痼冷痃癖擣汁服治肥白人中風失音○煑食歸腎壯陽止洩精暖腰膝○燒熟以鹽醋空心吃十頓治胸膈噎氣擣汁服治胸痺刺痛如錐即吐出胸中惡血甚驗又灌初生小兒吐去惡水惡血永無諸病○主吐血唾血衄血尿血婦人經脈逆行打撲傷損及膈噎病擣汁澄清和童便飲之能消散胃脘瘀血甚效○飲生汁主上氣喘息欲絕解肉脯毒煑汁飲止消渴盜汗熏產婦血運洗腸痔脫肛

韭子氣味辛甘溫無毒主治夢中洩精溺血○暖腰膝治鬼交甚效○補肝及命門治小便頻數遺尿女人白淫白帶



韭

別錄中品

修治韭子揀淨蒸熟暴乾簸去黑皮炒黄用
宗奭曰春食則香夏食則臭多食則能昏神暗目酒後尤忌
熱病後十日食之即發不可與蜜及牛肉同食花食之動風
韭黄未出糞土最不益人食之滯氣蓋含抑鬱未申之氣故也
孔子曰不時不食正謂此輩
金瘡出血韭汁和風化石灰日乾每用為末傅之良

假蘇蘇恭曰即菜中荆芥是也別録名薑芥始生漢中川澤今處處有之葉似落藜而細初生辛香可噉人取作生菜古方稀用近世醫家治頭風虚勞瘡疥婦人血風等為要藥並取花實成穗者暴乾入藥曰蘇曰薑曰芥皆因氣味辛香如蘇如薑如芥也今人惟呼荆芥

莖穗氣味辛温無毒
主治寒熱鼠瘻瘰癧生瘡破結聚氣下瘀血除濕疸○去邪除
勞渴冷風出汗煑汁服之擣爛醋和傅丁腫○單用治惡風
賊風口面喎斜遍身𤸷痺心虛忘事益力添精辟邪毒氣通
利血脉傳送五臟不足氣助脾胃○主血勞風氣壅滿背脊
疼痛虛汗理丈夫脚氣筋骨煩疼及陰陽毒傷寒頭痛旋
眩手足筋急○利五臟消食下氣醒酒作菜生熟皆可食并
煎茶飲之以豉汁煎服治暴傷寒能發汗○治婦人血風及
瘡疥為要藥○產後中風身強直研末酒服○散風熱清頭
目利咽喉消瘡腫治項強目中黑花及生瘡陰㿗吐血衄血
下血血痢崩中痔漏

荆芥
本經中品



詵曰作菜食久動渴疾熏人五臟神○反驢肉無鱗魚及鱉
元素曰辛苦氣味俱薄浮而升陽也好古曰肝經氣分藥也能
搜肝氣
經驗方治産後中風荆芥穗子微炒為末酒服二錢匕效

紫蘇紫蘇也今處處有之二三月下種或宿子在地自生其莖方其葉團而有尖四圍有鉅齒肥地者面背皆紫瘠地者面青背紫嫩時采葉和蔬茹之八月開紫花成穗作房九月半枯時收子子細如芥子而色蒼赤本草綱目曰蘇從穌音酥舒暢也蘇性舒暢行氣和血故謂之蘇紫言其色也肘後方名赤蘇蘇乃荏類而味更辛如桂故爾雅謂之桂荏

莖葉氣味辛温無毒
主治下氣除寒中其子尤良○除寒熱治一切冷氣○補中益
氣治心腹脹滿止霍亂轉筋開胃下食止脚氣通大小腸○
通心經益脾胃煑飲尤勝與橘皮相宜○解肌發表散風寒
行氣寬中消痰利肺和血温中止痛定喘安胎解魚蟹毒治
蛇犬傷○以葉生食作羹殺一切魚肉毒
子氣味辛温無毒主治下氣除寒温中○治上氣欬逆冷氣及
腰脚中濕氣風結氣研汁煑粥長食令人肥白香○調中益
五臟止霍亂嘔吐反胃補虛勞肥健人利大小便破癥結消
五膈消痰止嗽潤心肺○治肺氣喘急○治風順氣利膈寬
腸解魚蟹毒

紫蘇
別録中品



（李廷飛曰不可同鯉魚食生毒瘡 談埜翁試驗方治攧撲傷損用紫蘇擣傅之瘡口自合）

薄荷舊不著所出州土今處處有之莖葉似荏而尖長經冬根不死夏秋採莖葉暴乾古方稀用或與薤作齏食近世治傷風頭腦風通關格及小兒風痰爲要藥故人家多蒔之本草綱目曰薄荷俗稱也陳士良食性本草作菝蔄楊雄甘泉賦作茇葀呂忱字林作茇苦則薄荷之爲訛稱可知矣孫思邈千金方作蕃荷又方音之訛也今人入藥多以蘇州者爲勝故食性本草謂之吳菝蔄本草衍義謂之南薄荷

莖葉氣味辛溫無毒

主治賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂宿食不消下氣煑汁服之發汗大解勞乏亦堪生食○作菜久食却腎氣辟邪毒除勞氣令人口氣香潔煎湯洗漆瘡○通利關節發毒汗去憤氣破血止痢○療陰陽毒傷寒頭痛四季宜食○治中風失音吐痰○杵汁服去心臟風熱○清頭目除風熱○利咽喉口齒諸病治瘰癧瘡疥風瘙癮疹擣汁含嗽去舌胎語澀接葉塞鼻止衄血塗蜂螫蛇傷


薄荷
唐本草
梗方嫩青老紫
葉對生有齒

（元素曰辛凉氣味俱薄浮而升陽也好古曰手足厥陰氣分藥也能搜肝氣）

（陸農師曰薄荷貓之酒也犬虎之酒也桑椹鳩之酒也莽草魚之酒也昝殷食醫心鏡云薄荷煎豉湯煖酒和飲煎茶生食並宜蓋菜之有益者也）

（明目經驗方治眼弦赤爛薄荷以生薑汁浸一宿晒乾爲末每用一錢沸湯泡洗）

（薄荷使）

堇堇菜生田野中苗初搨地嫩葉可作茹至夏葉間攛葶開紫花結三瓣角兒中有子如芥子而小茶褐色其角類箭頭故一名箭頭草

氣味甘平無毒

主治傅諸腫毒止痛散血


堇堇菜
新增
開紫花結三稜蒴兒
蒴乾裂子落

兔兒酸所在田野皆有之苗比水荭矮短莖葉亦類水荭其莖節密其葉亦稠比水荭葉瘦小可作菜食根赤黃色有節今人呼爲穿地鱗

味甘無毒

兔兒酸根今人接骨藥中多用之


新增
兔兒酸形
救飢採苗葉煠熟以新汲水淘淨油鹽調食

生薑乾薑生犍爲山谷及荆州楊州。今處處有之。以漢溫池州者爲良。苗高二三尺。葉似箭竹葉而長。兩兩相對。苗青根黃。無花實。秋採根於長流水洗過。日曬爲乾薑。漢州乾薑法。以水淹三日去皮。又置流水中六日。更刮去皮。然後曝之。令乾。釀於瓮中。三日乃成也。今人呼爲白乾薑。又曰均薑。按許慎說文。薑作蘁。云禦濕之菜也。王安石字說云。薑能疆禦百邪。故謂之薑。初生嫩者其尖微紫。名紫薑。或作子薑。宿根謂之母薑也。

生薑氣味辛微溫無毒

主治久服去臭氣通神明○歸五臟除風邪寒熱傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐去痰下氣○去水氣滿療欬嗽時疾和半夏主心下急痛和杏仁作煎下急痛氣實心胸擁隔冷熱氣神效擣汁和蜜服治中熱嘔逆不能下食○散煩悶開胃氣汁作煎服下一切結實衝胸膈惡氣神驗○破血調中去冷氣汁解藥毒○除壯熱治痰喘脹滿冷痢腹痛轉筋心滿去胸中臭氣狐臭殺腹內長蟲○益脾胃散風寒○解菌蕈諸物毒○生用發散熟用和中解食野禽中毒成喉痺浸汁點赤眼擣汁和黃明膠熬貼風濕痛甚妙○薑屑和酒服治偏風○薑皮主消浮腫腹脹痞滿和脾胃去瞖

乾薑氣味辛溫無毒

主治胸滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風濕痺腸澼下痢生者尤良○寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚間結氣止唾血○治腰腎中疼冷冷氣破血去風通四肢關節開五臟六腑宣諸脈絡去風毒冷痺夜多小便○消痰下氣治轉筋吐瀉腹臟反胃乾嘔瘀血撲損止鼻紅解冷熱毒開胃消宿食○主心下寒痞目睛久赤

生薑　別錄草部中品今移入此



漢州白乾薑白淨結實俗呼爲均薑入藥最良



他處乾薑皮色黑黃肉不結實市賣通是此類



好古曰大熱[illegible][illegible]口久服令人目暗餘同生薑

[illegible]曰生薑溫要熱則去皮要冷則留皮○元素曰辛而其溫氣味俱厚浮而升陽也○修治乾薑火炮用

之才曰秦椒爲之使殺半夏莨菪毒惡黃芩黃連天鼠糞

弘景曰久服少志少智傷心氣今人啖辛辣物惟此最常故論語云不撤薑食言可常食但不可多爾有病者是所宜矣

思邈曰八九月多食薑至春多患眼損壽減筋力孕婦食之令子盈指○晦菴語錄亦有秋薑夭人天年之語

久患咳噫連咳四五十聲者取生薑汁半合蜜一匙煎熟溫服如此三服立效　生薑使

傷寒類要治婦人傷寒雖差未滿百日不可與男交合爲陰陽易之病以手足拘拳欲死丈夫病名爲陰易婦人名爲陽易速當汗之可愈滿四日不可療宜令服此藥乾薑四兩爲末湯調頓服覆衣被出汗得解手足伸遂愈

千金方治中寒水瀉乾薑炮研末粥飲服二錢立效

葫大蒜也。處處有之。每顆六七瓣。初種一瓣。當年便成獨子葫。至明年。則復其本矣。其花中有實。亦作葫瓣狀而極小。亦可種之。張騫使西域得大蒜。則此物漢始有之。以其自胡中來故名葫。

蒜小蒜也。處處有之。根苗皆如葫而細小。許氏說文謂之葷菜。爾雅曰蒚。即此也。中國初惟有此。後因漢得葫于西域。遂呼此爲小蒜。蒜字從祘。音蒜。諧聲也。又象蒜根之形。

葫　氣味辛温有毒久食損人目

主治　歸五臟散癰腫䘌瘡除風邪殺毒氣○下氣消穀化肉○去水惡瘴氣除風濕破冷氣爛痃癖伏邪惡宣通温補療瘡癬殺鬼去痛○健脾胃治腎氣止霍亂轉筋腹痛除邪祟解温疫療勞瘧冷風傳風損冷痛惡瘡蛇蟲蠱毒溪毒沙虱並擣貼之熟醋浸經年者良○温水擣爛服治中暑不醒擣貼足心止鼻衄和豆豉丸服治暴下血通水道

蒜　氣味辛温有小毒

主治　歸脾腎主霍亂腹中不安消穀理胃温中除邪痺毒氣○主溪毒○下氣治蠱毒傳蛇蟲沙虱瘡○塗丁腫甚良



葫　蒜　別録下品

蒜大小二種皆八月下種春食苗夏初食薹五月食根北人食之最多

震亨曰大蒜屬火性熱喜散快膈善化肉暑月人多食之傷氣之禍積久自見養生者忌之化肉之功不足論也

頴曰多食傷肺傷脾傷肝膽生痰助火昏神○台蜜食殺人

葉石林避暑録云一僕暑月馳馬忽仆地欲絶同舍王相教用大蒜及道上熱土各一握研爛以新汲水和之去滓決齒灌之少頃即甦相傳徐州市門忽有版書此方咸以爲神仙救人云

按　李絳兵部手集方云毒瘡腫毒號叫臥眠不得人不能別者取獨頭蒜兩顆擣爛麻油和厚傳瘡上乾即易之屢驗盧垣侍郎有上瘡作連心痛悶用此便差又李僕射患腦癰久不差用此亦差又葛洪肘後方云凡背腫取獨蒜横截一分安腫頭上炷艾如梧子大灸蒜百壯不覺漸消多灸爲善勿令太熱若覺痛即擎起蒜蒜焦更換新者勿損皮肉洪嘗苦小腹下患一大腫灸之亦差又江寧府紫極宮刻石記其事云但是發背癰疽惡瘡腫核初起有異皆可灸之不計壯數惟要痛者灸至不痛不痛者灸至痛極而止疣贅之類灸之亦便成痂自脫其效如神乃知方書無空言者但人不能以意詳審則不得盡應耳

茄　處處有之。二月下種生秧。移栽株高二三尺。葉大如掌。自夏至秋開紫花。五瓣相連。五稜如縷。黄蕊緑蒂。蒂包其茄。茄中有瓤。瓤中有子。子待九月黄熟時收取。按段成式云。茄音加。乃蓮莖之名。今呼茄。其音若伽。未知所自也。陳藏器本草云。茄一名落蘇。按五代貽子録作酪酥。蓋以其味如酪酥也。杜寳拾遺録云。隋煬帝改茄爲崑崙瓜。又王隱君養生主論治瘧方。用乾茄。諱名草鼈甲。蓋以鼈甲能治寒熱。茄亦能治寒熱故爾。

茄子　氣味甘寒無毒

主治　寒熱五臟勞○治温疾傳尸勞氣醋摩傅腫毒○老裂者燒灰治乳裂○散血止痛消腫寬腸

蔕　燒灰米飲服二錢治腸風下血不止及血痔○治口齒䘌瘡生切擦癜風

花　治金瘡牙痛

根　及枯莖葉主治凍瘡皴裂煑湯漬之良

根飯上蒸過治癱瘓



茄　宋開寶

久冷人不可多食損人動氣發瘡及痼疾

李廷飛曰秋後多食損目生生編云茄性寒利多食必腹痛下
利女人能傷子宮也
劉松石保壽堂方治卵癀偏墜用雙蒂茄子懸于房門上出入
用眼視之茄蔫所患亦蔫茄乾亦乾矣又法用雙蒂懸門上
每日抱兒視之二三次釘針于上十餘日消矣
治癜風用茄蒂蘸薑汁調硫黄白附子末擦之取其散血也白
癜用白蒂紫癜用紫蒂亦各從其類耳
海上名方治牙痛秋用茄花乾之旋燒研塗痛處立止
鮑氏方治牙痛取牙方用茄科以馬尿浸三日晒乾炒爲末每
用點牙即落真妙

翻白草救荒本草名雞腿根野菜譜名天藕高七八寸葉硬而厚有鋸齒背白似地榆而細長開黄花根如指大長三寸許皮赤肉白剝去赤皮其內白色如雞肉生食煮熟皆宜本草綱目

曰翻白以葉之形名也雞腿天藕以根之味名也

根氣味甘微苦平無毒
主治吐血下血崩中瘧疾
癰腫瘡疥
瀕湖集簡方治崩中下血
用湖雞腿根一兩擣碎
酒二錢煎一錢服
疔瘡初起不拘已成未
成用翻白草十科酒煎
服出汗即愈
臁瘡潰爛端午日午時
采翻白草每用一握煎
湯盆盛圍住熏洗極效



新增

葉今人作湯洗瘡疥用

葉正面色青翻面色白

楚人謂之湖雞腿淮人謂之天藕

本草原始卷之六

本草原始卷之七

果部

雍丘正宇李中立纂輯並書畫

橘生江南及南山川谷今江浙荊襄湖嶺皆有之木高一二丈葉與枳無辨刺出莖間夏月生白花六月七月而成實至冬黄熟大者如盃包中有瓣瓣中有核也入藥用皮去白者名橘紅久藏者名陳皮本草綱目曰橘從矞音鷸諧聲也又云五色爲慶二色爲矞矞雲外赤內黄非煙非霧郁郁紛紛之象橘實外

赤內黄剖之香霧紛郁有似乎矞雲橘之從矞又取此義也

橘實氣味甘酸溫無毒
主治甘者潤肺酸者聚痰
○止消渴開胃除胸中
膈氣
黄橘皮氣味苦辛溫無毒
主治胸中瘕熱逆氣利水
穀久服去臭下氣通神
○止嘔逆治氣衝胸中
吐逆霍亂療脾不能消
穀止洩除膀胱留熱停
水五淋利小便去寸白
蟲○清痰涎治上氣欬
嗽開胃主氣痢破癥瘕
痃癖○療嘔噦反胃嘈



橘　本經上品

黄橘皮湯液本草名紅皮食療本
草名陳皮

凡果木樹生蟲杉木釘釘孔中絕

雜時吐清水痰痞痎瘧大腸悶塞婦人乳癰

橘藏綠豆中不壞橙柑亦然橘皮入食料解魚腥毒臣

時珍曰橘皮紋細色紅而薄內多筋脉其味苦辛柑皮紋粗色黃而厚內多白膜其味辛甘柚皮最厚而虛紋更粗色黃內多膜無筋則味甘多辛少但以此別之即不差矣橘皮性溫柑柚皮性冷不可不知今天下多以廣中來者爲勝江西者次之然多以柑皮襍之柑皮猶可用柚皮則懸絕矣凡橘皮入藥和中理胃則留白下氣消痰則去白其說出於聖濟經去白者以白湯入鹽洗潤令透刮去筋膜晒乾用

百一選方治男婦霍亂吐瀉但有一點胃氣存者服之回生廣陳皮去白五錢真藿香五錢水二盞煎一盞服之愈

橘核氣味苦平無毒主治腎疰腰痛膀胱氣痛腎冷炒研每溫酒服一錢或酒煎服之〇治酒皶風鼻赤炒研每服一錢胡桃肉一个擂酒服以知爲度〇小腸疝氣及陰核腫痛炒研五錢老酒煎服或酒糊丸服效

時珍曰橘核須以新瓦焙香去殼取仁研碎入藥

[illegible]乃橘之未成熟落之頭破裂狀如蓮瓣其氣芳烈皮薄而光純青色故名青皮本經載名青橘皮

氣味苦辛溫無毒

主治氣滯下食破積結及膈氣〇破堅癖散滯氣去下焦諸濕治左脇肝經積氣〇治胃膈氣逆脇痛小腹疝痛消乳腫疏肝膽瀉肺氣

本經上品



青皮形

青皮頭破裂者俗呼四花青皮凡用以此爲勝今人多以小柑小柚小橙僞爲之不可不辨入藥以湯浸去穰切片醋拌瓦上過用

杲曰黃橘皮氣薄味厚陽中之陰也可升可降爲脾肺二經氣分藥

元素曰青橘皮氣味俱厚沉而降陰也入厥陰少陽經治肝膽之病

[illegible]始生汝南池澤今處處有之生水中其葉名荷爾雅云荷芙蕖其莖茄其葉蕸其本蔤其華菡萏其實蓮其根藕其中菂菂中薏邢昺云芙蕖總名也別名芙蓉桉莖乃負葉者也有負荷之義故謂之荷蔤乃嫩蒻如竹之行鞭者節生二莖一爲葉一爲花盡頭乃生藕爲花葉根實之本顯仁藏用功成不居可謂退藏于密矣故謂之蔤花葉偶生故根謂之藕或云藕善耕泥故字從耦耦者耕也茄音加加于蔤上也蕸音遐遠于蔤也

菡萏函合未發之意芙蓉敷布容艷之意蓮者連也花實相連而出也菂者的也子在房中點點如的也的乃凡物點注之名薏猶意也含苦在內也古詩云食子心無棄苦心生意存是矣

藕實俗呼蓮肉氣味甘平濇無毒

主治補中養神益氣力除百疾久服輕身耐老不飢延年〇主五臟不足傷中益十二經脉血氣〇止渴去熱安心止痢治腰痛及泄精多食令人歡喜〇益心腎厚腸胃固精氣強筋骨補虛損利耳目除寒濕止脾泄久痢赤白濁女人帶下崩中諸血病〇擣碎和米作粥飯食輕身益氣令人強健〇安靖上下君相火邪

藕氣味甘平無毒主治熱渴散留血生肌久服令人心懽〇止怒止洩消食解酒毒及病後乾渴〇擣汁服止悶除煩開胃治霍亂破產後血悶擣膏署金瘡並折傷止暴痛蒸煮食之

大能開胃〇生食治霍亂後虛渴蒸食甚補五臟實下焦同蜜食令人腹臟肥不生諸蟲亦可休糧〇汁解射罔毒蟹毒

擣浸澄粉服食輕身益年

藕蔤　氣味甘平無毒主治生食主霍亂後虛渴煩悶不能食解酒食毒〇解煩毒下瘀血〇功與藕同

藕節　氣味澀平無毒主治擣汁飲主吐血不止及口鼻出血〇能消瘀血解熱毒產後血悶和地黃研汁入熱酒小便飲〇能止欬血唾血血淋溺血下血血痢血崩

蓮薏　即蓮子中青心也一名苦薏氣味苦寒無毒主治血渴產後消生研末米飲服二錢立愈〇止霍亂〇清心去熱

蓮花　氣味苦甘溫無毒主治鎮心益色駐顏輕身

蓮房　氣味苦濇溫無毒主治破血〇治血脹腹痛及產後胎衣不下酒煑服之解野菌毒〇止血崩下血溺血

蓮蕋鬚　氣味甘濇溫無毒主治清心通腎固精氣烏鬚髮悅顏色益血止血崩吐血

荷葉蒂名荷鼻　氣味苦平無毒主治止渴落胞破血治產後口乾心肺躁煩〇治血脹腹痛產後胎衣不下酒煑服之荷鼻安胎去惡血留好血止血痢殺菌蕈毒並煑水服〇生發元氣助脾胃澀精滑散瘀血消水腫癰腫發痘瘡治吐血咯血衄血下血溺血血淋崩中產後惡血損傷敗血


藕實俗呼蓮肉
蓮薏一名苦薏
蓮房俗呼蓮蓬殼
蓮蕋鬚一名佛座鬚
荷葉俗呼蓮葉
八月采實

藕實即蓮子八九月采黑色堅石者剝去黑殼謂之蓮肉以水浸去赤皮青心生食甚佳入藥蒸熟去心或晒或焙乾用

石蓮子　生水中其子中肉黃白色心內空無青芽嚼之味極殼光黑堅硬如石故名石蓮別是一種蓮子也

石蓮肉氣味苦寒無毒主治久痢噤口炒為末陳倉米飲調服二錢便思飲食甚妙加入香連丸尤妙脾瀉腸滑噦逆不止用六枚炒赤黃色研末冷熟水半盞和服便止

石蓮子　新增



入水必沉煎塩鹵能浮之

石蓮不知出何處殼光黑堅石兩頭停有有節者無節者更黑味極苦此物經百年不壞

大棗　乾棗也生河東今近北州郡皆有之木赤心有刺四月生葉尖觥光澤五月開小白花色微青結實生青熟紅八月摘取晒乾入藥須用青州及晉地肥大甘美者為良故曰大棗按陸佃埤雅云大曰棗小曰棘棘酸棗也棗性高故重朿棘性低故並朿朿音刺棗棘皆有刺鍼會意也

大棗此即晒乾大棗也氣味甘平無毒

主治心腹和氣安中養脾氣平胃氣通九竅助十二經補少氣少津液身中不足大驚四肢重和百藥久服輕身延年〇補中益氣堅志强力除煩悶療心下懸腸澼久服不飢神仙〇潤心肺止嗽補五勞治虛損除腸胃癖氣和光粉燒治疳痢〇小兒患秋痢與蛀棗食之良〇殺烏頭附子天雄毒和陰陽調榮衛生津液

生棗氣味甘辛熱無毒多食令人寒熱羸瘦者不可食


生棗　本經上品

葉氣味甘温微毒

主治覆麻黄能令出汗和葛粉揩熱痱瘡良治小兒壯熱煎湯浴之

三歲陳核中仁燔之味苦主腹痛邪氣

氣味俱厚陽也

大明曰有齒病疳病蟲䘌人不宜啖棗小兒尤不宜食又忌與葱同食令人五臟不和與魚同食令人腰腹痛

百一選方治食椒閉氣京棗食之即解

[illegible]始生隴西五原燉煌山谷今河東及近京州郡皆有之苗作藤蔓而極長大盛者一二本綿被山谷間花極細而黄白色其實有紫白二色而形之圓銳亦二種有無核者皆七月八月熟取其汁可以釀酒人酺飲之則醄然而醉故有是名其圓者名草龍珠長者名馬乳葡萄白者名水晶葡萄黑者名紫葡萄漢書作蒲桃

實氣味甘平濇無毒

主治筋骨濕痺益氣倍力強志令人肥健耐飢忍風寒久食輕身不老延年可作酒○逐水利小便○除腸中水調中治淋○○時氣痘瘡不出食之或研酒飲甚效○胎上衝心煎作湯飲之即下


葡萄本經上品

誌曰甘酸温多食令人卒煩悶眼暗

【銀杏】生江南以宣城者爲勝樹高二三丈葉薄縱理儼如鴨掌形有刻缺面綠背淡二月開花成簇青白色二更開花隨即卸落人罕見之一枝結子百十狀如楝子經霜乃熟爛去肉取核爲果其核兩頭尖三稜爲雄二稜爲雌其仁嫩綠色久則黄雌雄同種其樹相望乃結實實一名鴨脚子因葉形似鴨脚也宋初始入貢改呼銀杏因子形似小杏而核色白也今呼白果

核仁氣味甘苦平濇無毒

主治生食引疳解酒熟食益人○熟食温肺益氣定喘嗽縮小便止白濁生食降痰消毒殺虫嚼漿塗鼻面手足去皶皰䵟黷皴皺及疥癬疳䘌陰蝨

銀杏宋初始著名而修本草者不載近時方藥亦時用之其氣薄味厚性濇而收色白屬金故能入肺經益肺氣定喘嗽縮小便生擣能浣油膩則其去穢濁之功可類推矣其花夜開人不得見蓋陰毒之物故又能殺虫消毒然食多則收歛太過令人氣壅臚脹昏憒故物類相感志云銀杏能醉人而三元延壽書言白果食滿千箇者死又云昔有飢者同以白果代飯食飽次日皆死也


白果新增

治小便頻數方白果十四枚七生七煨食之取效則止

[illegible]處處有之而兗州宣州者最勝木高二三丈葉極類櫟花青

黄色實有莍蝟自彙大者如拳中子三四小者若桃李中子一二熟則罅拆子出栗説文作㮚從卤音條象花實下垂之狀也梵書名篤迦

實氣味鹹温無毒主治益氣厚腸胃補腎氣令人耐飢○生食治腰脚不遂○療筋骨斷碎腫痛瘀血生嚼塗之有效

栗楔主治筋骨風痛○治血尤效○每日生食七枚破冷痃癖又生嚼罯惡刺出箭頭傅瘰癧腫毒痛

毛毬主治煑汁洗火丹毒腫

別録上品

栗



栗殼主治反胃消渴瀉血煑汁飲之又治鼻衂不止

宗奭曰栗欲乾收莫如曝之欲生收莫如潤沙藏之至夏初尚如新也小兒不可多食生者難化熟即滯氣隔食生蟲

思邈曰栗腎之果也腎病宜食之弘景曰有人患腰脚弱往栗樹下食數升便能起行此是補腎之義然應生啖若服餌則宜蒸曝之

醫說治馬咬成瘡獨顆栗子燒研傅之

雞頭實始生雷澤池澤今處處有之生水中葉大如荷皺而有刺俗謂之雞頭盤花下結實其形類雞頭故以名之古今注謂之鴈頭韓退之謂之鴻頭本草綱目曰雞頭實可濟儉歉故一名芡實徐青淮泗謂之芡子莊子謂之雞雍管子謂之卯蔆其莖蔌之嫩者名蔿蔌人采以爲菜茹亦名蔿菜○

仁氣味甘平濇無毒主治濕痺腰脊膝痛補中除暴疾益精氣強志令耳目聰明久服輕身不飢耐老神仙○開胃助氣○止渴益腎治小便不禁遺精白濁帶下

蔿菜雞頭莖也氣味鹹甘平無毒主治止消渴除虛熱

修治雞頭實詵曰凡用蒸熟裂日晒裂取仁亦可舂取粉用

時珍曰新者煑食良入澀精藥連殼用

雞頭實　本經上品



外青皮如蝟花苞頂如雞喙

内子如珠殼内有白米赤皮

梅實始生漢中川谷今襄漢川蜀江湖淮嶺皆有之按陸機詩疏云梅杏類也樹葉皆畧似杏葉有長尖先衆木而花隨便結實采青者鹽淹曝乾爲白梅采半黄者以煙熏黑爲烏梅惟白

梅烏梅可入藥李時珍曰梅古文作呆象子在木上之形梅乃杏類故反杏爲呆書家訛爲甘木後作梅從每諧聲也或云梅者媒也媒合衆味故書云若作和羹爾惟鹽梅而梅字亦從某也○

白梅○修治取大青梅以鹽汁漬之日晒夜漬十日成矣久乃生霜一名鹽梅一名霜梅氣味酸鹹平無毒

主治和藥點誌蝕惡肉○刺在肉中者嚼傅之即出○治刀箭傷止血研傅之○乳癰腫毒杵爛貼之佳○除痰

烏梅○修治取青梅籃盛於突上熏黑用去核微炒之氣味酸温平濇無毒

主治下氣除熱煩滿安心止肢体痛偏枯不仁死肌去青黑誌蝕惡肉○去痺利筋脉止下利好唾口乾○水漬汁飲治

傷寒煩熱○止渴調中去痰治瘧瘴止吐逆霍亂除冷熱痢治虛勞骨蒸消酒毒令人得睡和建茶乾薑爲丸服止休息痢大驗○斂肺澀腸止久嗽瀉痢反胃噎膈蚘厥吐利消腫袪痰殺蟲解魚毒馬汗毒硫黃毒

大明曰梅多食則損齒傷筋蝕脾胃令人發膈上痰熱服黃精人忌食之食梅齒齼者嚼胡桃肉以解之○物類相感志云梅子同韶粉食之則不酸亦不軟牙

聖濟總錄治下痢膿血烏梅一兩去核燒過爲末每服二錢米飲下立止



○梅實本經中品

別錄曰五月采實火乾　杲曰寒忌猪肉　弘景曰生梅烏梅白梅功應相似　好古曰烏梅脾肺二經血分藥也

木瓜

山陰蘭亭尤多今處處有之而宣城者尤佳木狀如柰春末開花深紅色其實如瓜而小按爾雅云楙木瓜郭璞註云木實如小瓜酢而可食則木瓜之名取此義也或云木瓜味酸得木之正氣故名楙從林矛諧聲也

實氣味酸溫無毒○主治濕痺脚氣霍亂大吐下利轉筋不止○治脚氣衝心取嫩者一顆去子煎服佳強筋骨下冷氣止嘔逆心膈痰唾消食止水利後渴不止○調榮衛助穀氣○去濕和胃滋脾益肺治腹脹善噫心下煩滿○治水腫冷熱痢心腹痛



木瓜　別錄中品

木瓜如小瓜而有鼻津潤味不木者爲木瓜圓小於木瓜味木而酢濇者爲木桃似木瓜而無鼻大於木桃味濇者爲木李亦曰木梨食之傷氣

修治木瓜勿犯鐵器以銅刀削去硬皮并子切片晒乾用

杲曰木瓜入手足太陰血分氣脫能收氣滯能和

陶隱居曰如轉筋時但呼其名及書上作木瓜字皆愈蓋梅望之而齵渴楙書之而緩筋理有相感不可得而詳也

聖惠方治霍亂腹痛木瓜五錢桑葉三片棗肉一枚水煎服效

柿（音士）

其樹高大葉圓有尖而光澤四月開小花黃白色結實青綠色八九月乃熟紅色本草綱目云柿從朿音滓諧聲也說文曰赤實果也事類合璧云朱果也俗呼爲柿

白柿○柿霜○（白柿即乾柿生霜者其法用大柿去皮捻扁日納瓮中待生白霜乃取出今人謂之柿餅其霜謂之柿霜）

氣味甘平濇無毒○主治補虛勞不足消腹中宿血濇中厚腸建脾胃氣○開胃澀腸消痰止渴治吐血潤心肺療肺痿心熱欬嗽潤聲喉殺虫○溫補多食去面黯○治反胃咯血血淋腸澼痔漏下血○霜清上焦心肺熱生津止渴化痰寧嗽治咽喉口舌瘡痛

柿大者如楪八稜而扁其次如拳小者如鴨子雞子牛心鹿心之狀皆以核少者爲佳

生柿置器中自紅者謂之烘柿日乾者謂之白柿火乾者謂之烏柿水浸藏者謂之醂柿

生柿性冷同蟹食令人腹痛作瀉同酒食令人易醉或心痛欲死



柿　別錄中品

實有大小方圓長扁不同

柿蔕氣味濇平無毒主治欬逆噦氣煑汁服

爾雅翼云俗傳柿有七絕一壽二多陰三無鳥巢四無蟲蠹五霜葉可翫六嘉實七落葉肥滑可以臨書也

王璆百一選方云一人食蟹多食紅柿至夜大吐繼之以血昏不省事一道者曰惟木香可解乃磨汁灌之漸醒而愈

枇杷 今襄漢吳蜀閩嶺皆有之木高丈餘葉如驢耳背有黃毛陰密婆娑可愛四時不凋盛冬開白花至三四月成實作梂生大如彈丸熟時色如黃杏微有毛皮肉甚薄核大如小栗黃褐色四月采葉暴乾用宗奭曰其葉形似琵琶故名

實氣味甘酸平無毒○主治止渴下氣利肺氣止吐逆主上焦熱潤五臟

葉氣味苦平無毒○主治卒啘不正下氣煑汁服○治嘔噦不止婦人產後口乾○煑汁飲主渴疾治肺氣熱嗽及肺風瘡胷面上瘡○和胃降氣清熱解暑毒療脚氣

木白皮主治生嚼咽汁止吐逆不下食煑汁冷服尤佳

別錄中品

使



修治枇杷葉以水潤布拭去毛不爾射人肺令欬不已或以粟稈作刷刷之尤易潔淨治胃病以薑汁塗炙治肺病以蜜水塗炙

實多食發痰熱傷脾同炙肉及熱麪食令人患熱黃疾

龐安常方治溫病發噦因飲水多者用枇杷葉去毛炙香茅根各半斤水四升煎二升徐徐服之

氣薄味厚陽中之陰

荔枝 生嶺南及巴中○今泉福漳嘉蜀渝涪州興化軍及二廣州郡皆有之其品閩中第一蜀川次之嶺南爲下扶南記云此木以荔枝爲名者以其結實時枝弱而蔕牢不可摘取以刀斧劙取其枝故以爲名耳按白居易荔枝圖序云荔枝生巴峽間樹形團團如帷蓋葉如冬青花如橘而春榮實如丹而夏熟朶如蒲桃核如枇杷殼如紅繒膜如紫綃瓤肉潔白如冰霜漿液甘酸如醴酪大畧如彼其實過之若離本枝一日而色變二日而香變三日而味變四五日外色香味盡去矣故李時珍本草綱目名離枝司馬相如上林賦作離支

實氣味甘平無毒○主治止渴益人顏色○食之止渴頭重心燥背膊勞悶○通神益智健氣○治瘰癧瘤贅赤腫疔腫發小兒痘瘡

核氣味甘溫濇無毒○主治心痛小腸氣痛以一枚煨存性研末新酒調服○治癩疝氣痛婦人血氣刺痛

殼主治痘瘡出不快煎湯飲之

治疝氣癩腫荔枝核四十九箇陳皮九錢硫黃四錢為末鹽水打麪糊丸菉豆大痛時空心酒服九丸不過三服甚效



荔枝宋開寶

龍眼今閩廣蜀道出荔枝處皆有之嵇含南方草木狀云木高一二丈似荔枝而枝葉微小凌冬不凋春末夏初開細白花七月實熟殼青黃色文作鱗甲形圓大如彈丸核若木梡子肉薄于荔枝白而有漿其甘如蜜實極繁每枝二三十顆作穗如蒲桃別錄名龍眼吳普名龍目俗呼圓眼象形也荔枝纔過龍眼即熟故南人目為荔枝奴開寶名為亞荔枝

實氣味甘平無毒

主治五臟邪氣安志厭食除蠱毒去三蟲久服聰明輕身不老通神明○開胃益脾補虛長智

核主治胡臭六枚同胡椒二七枚研遇汗出即擦之

時珍曰食品以荔枝為貴而資益則龍眼為良蓋荔枝性熱而龍眼性和平也嚴用和濟生方治思慮勞傷心脾有歸脾湯取其甘味歸脾能益人智之義



龍眼別錄中品

恭曰甘酸温李廷飛曰生者沸湯瀹過食不動脾肉浸白酒飲

甘蔗今川廣湖南北二浙江東西皆有畦種叢生莖似竹而內實大者圍數寸長六七尺根節密以漸而踈抽葉如蘆葉而大長三四尺扶踈四垂八九月收莖可留過春充果食按野史云呂惠卿言凡草皆正生嫡出惟蔗側種根上庶出故字從庶也嵇含作竿蔗謂其莖如竹竿也

蔗氣味甘平濇無毒主治下氣和中助脾氣利大腸○消痰止渴除心胸煩熱解酒毒利大小腸○止嘔噦反胃寬胸膈



別錄中品

詵曰蔗共酒食發痰瑞曰多食發虛熱動衄血相感志云同榧子食則渣軟

紫沙糖係蔗汁過樟木槽取而煎成者俗呼黑沙糖氣味甘寒無毒主治心腹熱脹口乾渴○潤心肺大小腸熱解酒毒臘月瓶封窖糞坑中患天行熱狂者絞汁服甚良○和中助脾緩肝氣

詵曰性温多食令人心痛生長蟲消肌肉損齒發疳䘌與鯽

魚同食生疳蟲與葵同食生流澼與笋同食不消成癥身重不能行

白沙糖乃甘蔗汁煎而曝之凝作餅塊色白者氣味甘寒冷利無毒主治心腹熱脹口乾渴○治目中熱膜明目和棗肉巨勝末為丸噙之潤肺氣助五臟生津○潤心肺燥熱治嗽消痰解酒和中助脾氣緩肝氣

桃生太山今處處有之汁東陝西者尤大而美大抵佳果肥美者皆圃人以他木接成殊失本性入藥當以一生者為佳七月取核破之取仁陰乾醫學入門曰桃逃也能令鬼邪逃遁故謂之桃

實氣辛酸甘熱微毒多食令人有熱主治作脯食益顏色○肺之果肺病宜食之○冬桃食之解勞熱


桃
本經下品

核仁氣味苦甘平無毒

主治瘀血血閉癥瘕邪氣殺小蟲〇止欬逆上氣消心下堅硬除卒暴擊血通月水止心腹痛〇治血結血秘血燥通潤大便破畜血〇殺三蟲又每夜嚼一枚和蜜塗手面良〇主血滯風痺骨蒸温瘧寒熱鬼疰疼痛産後血病

修治時珍曰桃仁行血宜連皮尖生用潤燥活血宜湯浸去皮尖炒黃用或麥麩同炒或燒存性各隨本方雙仁者不可用

香附爲之使

采曰桃仁苦重于甘氣薄味厚沉而降陰中之陽手足厥陰經

血分藥也

桃仁比杏仁大而扁

梅師方治諸蟲入耳取桃葉熟挼塞兩耳出或作枕枕之使

桃梟係桃實着樹經冬不落者正月采之中實者良一名桃奴〇氣味苦微溫有小毒主治殺精魅五毒不祥療中惡腹痛〇治肺氣腰痛破血療心痛酒磨煖服之〇主吐血諸藥不效燒存性研末米湯調服有驗

杏

種出濟南郡之分流山。今處處有之。以東來者爲勝。葉團而有尖。二月開紅花。結實熟最早。甘而有沙者爲沙杏。黃而帶酢者爲梅杏。青而帶黃者爲柰杏。扁而青黃者爲木杏。圓大而深赭色者爲金杏。五月采破核去雙仁者。李時珍曰。杏字篆文象子在木枝之形。


杏
別錄下品

實氣味酸熱有小毒生食多傷筋骨主治曝脯食止渴去冷熱毒心之果心病宜食之

核仁氣味甘苦溫冷利有小毒主治欬逆上氣雷鳴喉痺下氣產乳金瘡寒心賁豚〇驚癇心下煩熱風氣往來時行頭痛解肌消心下急滿痛殺狗毒〇治腹痺不通發汗主溫病脚氣欬嗽上氣喘促入天門冬煎潤心肺和酪作湯潤聲氣〇除肺熱治上焦風燥利胸膈氣逆通便閉

兩仁者殺人可以毒狗

葉主治人卒腫滿身面洪大煑濃汁熱漬亦少少服之

枝主治墮傷取一握水一升煑半升入黃酒三合和勻分服大效

得火良惡黃芩黃耆葛根畏蘘草

修治杏仁以湯浸去皮尖炒黃用或以麪麩炒過用

杏仁比桃仁小而飽滿


杏仁形

桃仁比杏仁大而形扁


桃仁形

市家無杏仁亦有以桃仁充之用者宜辨之

保壽堂方治血崩不止諸藥不效服此立止用甜杏仁上黃皮燒存性爲末每服三錢空心熱酒調服

安石榴

本生西域。今處處有之。木不甚高大。枝柯附幹自地便生。作叢。種極易息。折其條盤土中便生也。五月開花。有紅黃白三色。實有甜苦酸三種。甘者可食。酸者入藥。醫學入門曰。榴留也。其性留滯戀膈生痰。博物志云。漢張騫出使西域。得塗林安石國榴種以歸。故名安石榴。又齊民要術云。凡植榴者。須安僵

石枯骨于根下。即花實繁茂。則安石之名義。或取此也。

甘　石榴氣味甘酸溫濇無毒多食損人肺主治咽喉燥渴○能理乳石毒○制三尸蟲

酸　石榴氣味酸溫濇無毒主治赤白痢腹痛連子擣汁頓服一枚○止瀉痢崩中帶下

酸　石榴皮主治止下痢漏精○治筋骨風腰脚不遂行步攣急疼痛濇腸取汁點目止泪下○煎服下蚘蟲○止瀉痢下血脫肛崩中帶下

酸　石榴東行根主治○蚘蟲寸白青者入染鬚用○治口齒病止濇瀉痢帶下功與皮同



安石榴別録下品

詵曰多食損齒令黑凡服食藥物人忌食之

修治榴皮葉根勿犯鐵並不計乾濕皆以漿水浸一夜取出用其水如墨汁也

附后方治赤白痢疾用酸石榴皮燒存性為末每米飲服方寸匕日三服效乃止

松　出遼東及雲南。其樹與中土松樹同。惟五葉一叢者。毬內結子大如巴豆而有三稜。一頭尖爾。世當果食。咸呼為海松子。又呼為新羅松子。

仁　氣味甘小溫無毒主治骨節風頭眩去死肌變白散水氣潤五臟不飢○逐風痹寒氣虛羸少氣補不足潤皮膚肥五臟○主諸風溫腸胃久服輕身延年不老○潤肺治燥結欬嗽同柏子仁治虛秘

松子　宋開寶



類楓子而小

列仙傳云偓佺采藥父也好食松子體毛數寸能飛行逐走馬以松子遺堯堯不受時受食者皆三百歲

梨　今處處皆有而種類殊別。乳梨出宣城。皮厚而肉實。其味極長。鵝梨出近京州郡及北都。皮薄而漿多。味差短於乳梨。其香過之。醫家相承。二者為勝。其餘消梨、水梨、鹿梨、紫花梨、赤梨、桑梨、青梨、香水梨、棠梨、茅梨、禦兒梨之類。並不入藥。震亨曰。梨者利也。其性下行流利也。

實　氣味甘微酸寒無毒多食令人寒中金瘡乳婦尤不可食主治熱嗽止渴切片貼湯火傷止痛不爛○治客熱中風不語治傷寒熱發解丹石熱氣驚邪利大小便○除賊風止心煩氣喘熱狂作漿吐風痰○卒暗風不語者生擣汁頓服胸中

痞塞熱結者宜多食之○潤肺凉心消痰降火解瘡毒酒毒

葉　主治霍亂吐利不止煑汁服作煎治風○治小兒寒疝○擣汁服解中菌毒

別録云梨甘寒多食成冷痢桑梨生食冷中不益人

物類相感志言梨與蘿蔔相間收藏或削梨蒂種於蘿蔔上藏之皆可經年不爛



梨　別録下品

乳梨鵝梨重六七两者佳皮上有小斑點

按類編云一士人狀若有疾厭〻無聊往謁楊吉老診之楊曰君熱証已極氣血消鑠此去三年當以疽死士人不樂而去聞茅山有道士醫術通神而不欲自鳴乃衣僕衣詣山拜之願執薪水之役道士留置弟子中久之以實白道士道士診之笑曰汝便下山但日日喫好梨一顆如生梨已盡則取乾者泡湯食滓飲汁疾當自平士人如其戒經一歲復見吉老見其顏貌腴澤脉息和平驚曰君必遇異人不然豈有痊理士人備告吉老吉老具衣冠望茅山設拜自咎其學之未至此與瑣言之說彷彿觀夫士人則梨之功豈小補哉然惟乳梨鵞梨消梨可食餘梨亦不能去病也

郁李仁

山谷俱有。子如櫻桃許大。紅黃色。六月採實。碎核取仁。爾雅翼云。李乃木之多子者。故字從木子。竊謂木之多子者多矣。何獨李稱木子耶。按素問言李味酸屬肝。東方之果也。則李於五果屬木。故得專稱爾。郁。盛貌。詩所謂棠棣之華即此也。

仁氣味酸苦平無毒

主治　活血潤燥滑大腸利小便泄五臟膀胱急痛宣腰胯冷膿主大腹水腫面目四肢浮腫消食下氣破癖氣治卒心痛及腸中結氣關格不通

增　眞郁李形



粒小而光皮黃仁白者眞

僞郁李形



顆大皮皺如小杏仁

修治　郁李仁湯泡去皮尖研膏用　降也陰中陽也　臣

郁李處〻有之成株葉尖亦有作鋸齒者結實熟紅味甘堪啖

胡桃

樹高丈許。春初生葉。長四五寸。兩兩相對。三月開花如栗花。穗蒼黃色。結實至秋如青桃。此種原出羌胡。漢時張騫使西域始得種還。植之秦中。漸及東土。故名胡桃。一名羌桃。漚爛青皮肉取核爲果。故俗呼核桃。

核仁氣味甘平溫無毒

主治食之令人肥健潤肌黑鬚髮多食利小便去五痔擣和胡粉拔白鬚髮內孔中則生黑髮燒存性和松脂研傅瘰癧瘡○食之令人能食通潤血脉骨肉細膩○治損傷石淋同破故紙蜜丸服補下焦○補氣養血潤燥化痰益命門利三焦溫肺潤腸治虛寒喘嗽腰腳重痛心腹疝痛血痢腸風散腫毒發痘瘡制銅毒

頌曰性熱多食生痰動腎火

胡桃宋開寶



油胡桃氣味辛熱有毒主治殺虫攻毒治癰腫癘風疥癬楊梅白禿諸瘡潤鬚髮

戲術爵錢如粉預置胡桃肉一塊口內將銅錢嚼之即碎誤吞銅錢多食胡桃自化出也胡桃銅錢共嚼成粉可證矣

檳榔

生南海。今嶺外州郡皆有之。木大如桄榔而高五七丈。正直無枝。皮似青桐。節似桂枝。葉生木顛。大如楯頭。又似芭蕉葉。其實作房。從葉中出。旁有刺若棘針。重疊其下。一房數百實。如雞子狀。皆有皮殼。其實春生。至夏乃熟。肉滿殼中。色正白。蘇恭言其肉易爛。不經數日。今入北貨者。皆先以灰煮熟。焙熏令乾。始可久留也。小而味甘者名山檳榔。大而味澀核亦大者名猪檳榔。最小者名蒳子。雷氏言尖長而有紫文者名檳。圓大而矮

者名榔。榔力大而檳力小。今醫家亦不細分。但以作雞心狀正穩心不虛破之作錦文者爲佳爾。嶺南人噉之以當果食。言南方地濕。不食此無以祛瘴癘也。生食其味苦澀。得扶留藤與瓦屋子灰同咀嚼之。則柔滑甘美也。本草綱目曰。賓與郎皆貴客之稱。稽含草木狀言交廣人。凡貴勝族客。必先呈此果。若邂逅不設用相嫌恨。則檳榔名義蓋取于此。

檳榔子氣味苦辛澀溫無毒

主治消穀逐水除痰澼殺三蟲伏尸寸白○治腹脹生擣末服利水穀道傳瘡生肌肉止痛燒灰傳口吻白瘡○宣利五臟六腑壅滯破胷中氣下水腫治心痛積聚○除一切風下一

氣通關節利九竅補五勞七傷健脾調中除煩破癥結○主賁豚膀胱諸氣五膈氣風冷氣脚氣宿食不消○治衝脉爲病氣逆裏急○治瀉痢後重心腹諸痛大小便氣秘痰氣喘急療諸瘧禦瘴癘

檳榔別録中品

尖小者俗呼公檳榔



圓大者俗呼母檳榔



自木部移入此

修治檳榔揀存坐穩正心堅有錦文者以刀刮去底細切用近時亦有火煨焙用者若用白檳榔必本境初生鮮者販他處必經煮熏安得白者耶

元素曰味厚氣輕沉而降陰中陽也

治口吻生瘡檳榔燒研入輕粉末傳之良

檳榔君

大腹 志曰。生南海諸國。所出與檳榔相似。莖葉根幹小異耳。李時珍曰。出嶺表滇南。即檳榔中一種腹大形扁而味澀者所謂豬檳榔是矣。名曰大腹子。象形也。

大腹子氣味辛澁溫無毒主治與檳榔同功

大腹皮氣味辛微溫無毒主治冷熱氣攻心腹大腸蠱毒痰膈醋心並以薑鹽同煎入疏氣藥用之良○下一切氣止霍亂通大小腸健脾開胃調下○降逆氣消肌膚中水氣浮腫脚氣壅逆瘴瘧痞滿胎氣惡阻脹悶

大腹子宋開寶

大腹子與檳榔相似但形扁大



皮外黑色皮內筋絲如椰子皮



木部移此

修治大腹皮先以酒洗後以大豆汁再洗過晒乾入灰火燒煨切用今惟以酒洗切用

直指方治漏瘡惡穢大腹皮煎湯洗之

樝 出山南申安隨諸州。樹高數尺。葉似香薷。二月開白花。實有赤黃二色。肥者如小林檎。小者如指頂。九月乃熟。味似樝子。故名樝。此物生於山原茅林中。猴鼠喜食之故。一名茅樝。猴樝。鼠樝。俗呼山查。

實氣酸冷無毒

主治煮汁服止水痢沐頭洗身治瘡癢○煮汁洗漆瘡多瘥○治腰痛有効○消食積補脾治小腸疝氣發小兒瘡疹○健胃行結氣治婦人產後兒枕痛惡露不盡煎汁入沙糖服之立效○化飲食消肉積癥瘕痰飲痞滿吞酸滯血痛脹○化血塊氣塊活血

震亨曰山樝大能剋化飲食若胃中無食積脾虛不能運化不思食者多服之則反剋伐脾胃生發之氣也

修治山楂九月霜後取帶熟者去核曝乾或蒸熟去核擣作餅子日乾用

山楂核主治吞之化食磨積治𤸇疝

莖葉煮汁洗漆瘡

根主消積治反胃

山楂（唐本草）



其核狀如牽牛子白色甚堅

危氏得效方治痘疹出不快乾山楂爲末湯點服之立出紅活

枸櫞（矩員）生嶺南柑橘香櫞之屬也。今閩廣江西皆有之。木似朱欒而葉尖長枝間有刺。植之近水乃生。其實狀如人手有指俗呼佛手柑象形也。

枸櫞皮穰氣味辛酸無毒陶弘景曰性温

主治下氣除心頭痰水○煑酒飲治痰氣欬嗽○煎湯治心下氣痛○根葉主治同皮

枸櫞實大如盞生綠熟黃其核細其味不甚佳而清香襲人南人彫鏤花鳥作沙糖煎蜜煎果食置之几案可供玩賞擣蒜罨其蒂上則香更充溢異物志云浸汁浣葛紵勝似酸漿也○枸櫞今人呼爲佛手柑



枸櫞形長如小瓜狀其皮若橙柚而光澤可愛肉甚厚色白而鬆虛雖味短而香芬大勝置衣笥中則數日香不歇寄至北方人甚貴重

本草原始卷之七

本草原始卷之八

石部

丹砂（即朱砂）　水銀（水銀粉）　銀朱（俗亦呼水華朱）　靈砂（即二氣砂）　雲母
玉屑（玉泉）　石鍾乳　礬石　朴消（芒消　馬牙消　風化消　生消　玄明粉）
消石（即焰消）　滑石　石膽（即膽礬）　空青　曾青
禹餘粮　太乙餘粮　石中黄子　白石英（紫石英）　五色石脂
無名異　雄黄（雌黄）　石硫黄　食鹽（青鹽）　鹵鹹
玄精石　石膏（理石）　長石（即硬石膏）　方解石　金屑（金星石）
銀屑（銀星石）　慈石　凝水石　陽起石　密陀僧
鐵　珊瑚　石蟹　馬腦　伏龍肝
石灰　砒石（即信）　硇砂　鉛（胡粉　黄丹）　海石
水精　東壁土　赤銅屑　自然銅　古鏡
古文錢　代赭石　石鷰　礞石　花乳石（即花蕊石）
不灰木　爐甘石　蓬砂（即硼砂）　鵝管石　蛇含石
薑石
雨水（露水　臘雪　夏冰　千里水　東流水　甘爛水　逆流水　井華水　新汲水　地漿　熱湯　漿水　無根水　半天河）
梁上塵　百草霜　墨

本草原始卷之八

本草原始卷之八

雍丘正宇李中立纂輯並書畫

石部

丹砂始生符陵山。今出辰州蠻洞井中。在井圍青石壁內。土人欲覓。多聚乾柴縱火滿井焚之。致壁迸裂。始見有石床潔白如玉。砂塊生于其上。大塊類芙蓉頭。小塊類箭鏃。其甚小者豆砂米砂。作墻壁明澈者爲優。成顆粒鹿簌者次之。米砂爲下。鐵屑最低。火井不如水井者力勝。新井不如舊井者色深。凡治病邪。惟取優等。本草綱目云。丹乃石名。其字從井。中一點象丹在井中之形。義出許慎說文。後人以丹爲朱色之名。故呼朱砂。

丹砂氣味甘微寒無毒

主治身體五臟百病養精神安魂魄益氣明目殺精魅邪惡鬼久服通神明不老能化爲汞○通血脉止煩滿消渴益精神悅澤人面除中惡腹痛毒氣疥瘻諸瘡輕身神仙○鎮心主尸疰抽風○潤心肺治瘡痂息肉并塗之○治驚癇解胎毒痘毒驅邪瘧能發汗

丹砂本經上品○采無時○形如芙蓉破之如雲母可拆者良

箭頭朱砂形



俗呼和尚頭



俗呼石榴子



俗呼馬牙砂



以上等形入藥服食並佳

斅曰砂凡百等不可一一論有妙硫砂如拳許大或重一鎰有十四面面如鏡若遇陰沉天雨即鏡面上有紅漿汁出有梅柏砂如梅子許大夜有光生照見一室有白庭砂如帝珠子許大面上有小星現有神座砂金座砂玉座砂不經丹竈服之自延壽命次有白金砂澄水砂陰成砂辰錦砂芙蓉砂鏡面砂箭鏃砂曹末砂土砂金星砂平面砂神末砂等不可一一細述也

修治取好光澈有神者研末以流水飛三次曬用

丹砂以石膽消石和埋土中可化爲水

之才曰惡慈石畏鹹水忌一切血入火則熱而有毒能殺人

類編云錢丕少卿忽夜多惡憂但就枕便成輒通夕不止後因赴官經漢上與鄧州推官胡用之相遇驛中同宿遂說近日多憂慮非吉兆胡曰其嘗如此驚怕特甚有道士教戴丹砂初任辰州推官求得靈砂雙箭鏃者戴之不涉旬即驗四五年不復有憂至口祕惜因解髻中以一紗袋遺之即夕無憂神魂安靜真誥及他道書多載丹砂辟惡豈不信然

丹砂君

水銀一名汞。生符陵平土。出于丹砂。乃是山中採粗次朱砂。作爐置砂于中。下承以水。上覆以盆。外加火煆養。則煙飛于上。水銀溜于下。其狀似水如銀。故名水銀。

水銀氣味辛寒有毒

主治疹瘻痂瘍白禿殺皮膚中蝨墮胎除熱殺金銀銅錫毒鎔化還復爲丹久服神仙不死○以傅男子陰陰消無氣○利水道去熱毒○主天行熱疾除風安神鎮心治惡瘡瘑疥殺蟲催生下死胎○治小兒驚熱涎潮○鎮墜痰逆嘔吐反胃

之才曰畏慈石砒霜

宗奭曰水銀得鉛則凝得硫則結併棗肉則散別法煆爲膩粉粉霜唾研之死虱銅得之則明灌尸中則後腐以金銀銅鐵置其上則浮得紫河車則伏得川椒則收可以勾金可爲涌

泉匱盖藉死水銀之氣也　盛葫蘆中免其走失

藏器曰水銀入耳能食人腦至盡入肉令百節攣縮倒陰絕陽人患瘡疥多以水銀塗之性滑重直入肉宜謹之頭瘡切不可用恐入經絡必緩筋骨百藥不治也

宗奭曰水銀入藥雖各有法極須審謹有毒故也婦人多服絕娠今有水銀燒成丹砂醫人不曉誤用不可不謹

李樓怪證方云一女年十四腕軟處生物如黃豆大半在肉中紅紫色痛甚諸藥不效一方以水銀四兩白帋二張揉熟蘸水銀擦之三日自落而愈

水銀君

水銀粉 其升鍊法用水銀一兩白礬二兩食塩一兩同研不見星鋪于鐵器內以小烏盆覆之篩竈灰塩水和封固盆口以炭打二炷香取開則粉升於盆上矣其白如雪輕盈可愛一兩水

銀可升粉八錢又法水銀一兩皂礬七錢白塩五錢同研如上升鍊其質輕其狀如粉故本草拾遺名輕粉

水銀粉氣味辛冷無毒

主治通大腸轉小兒疳痺瘰癧殺瘡疥癬蟲及鼻上酒皶風瘡瘙痒○治痰涎積滯水腫鼓脹毒瘡

一真者體輕色白如雪片可愛撮些放銅鐵器內置火上化無痕假者多攙石膏末焚之有滓亦有攙朴消者宜細辨之

大明曰畏慈石石黃忌一切血本出于丹砂故也

時珍曰温燥有毒升也浮也黃連土茯苓陳醬黑鉛鐵漿可制其毒

醫方摘玄治楊梅癬用輕粉二錢杏仁四十二箇去皮洗瘡拭乾搽其末不過三次即愈乾則以鵝膽汁調

銀朱 一名猩紅係硫黃同水銀升鍊而成故俗謂之水華朱昔人謂水銀出于丹砂鎔化還復爲朱者即此也名亦由此

銀朱氣味辛温有毒

主治破積滯刼痰涎散結胸瘡疥癬惡瘡殺蟲及虱

時珍曰銀朱乃硫黃同汞升鍊而成其性燥烈亦能爛齦筋今廚人往往以之染色供饌宜去之更不可作丸藥衣

造朱墨法用好鮮紅銀朱勿雜以黃丹及礬紅者細研水飛過澄清去水用秦皮梔子皂角各一分巴豆一粒去皮廣東黃明牛膠五錢同煎汁和銀朱作墨陰乾任用

靈砂 用水銀一兩硫黃六銖細研炒作青砂頭後入水火既濟爐抽之如束鍼紋者成就也因名二氣砂此以至陽勾至陰脫陰反陽故曰靈砂

靈砂氣味甘温無毒主治五臟百病養神安魂魄益氣明目通

血脉止煩滿益精神殺精魅惡鬼氣久服通神明不老輕身神仙令人心靈○主上盛下虛痰涎壅盛頭旋吐逆霍亂反胃心腹冷痛升降陰陽既濟水火調和五臟輔助元氣研末糯糊爲丸棗湯服最能鎮墜神丹也

修治宜桑灰淋醋煮伏過用乃良　畏鹹水惡慈石

靈砂若飼猿猴鸚鵡輒作人語不差

雲母 生泰山山谷齊盧山及琅琊北定山石間今兖州雲夢山及江州濠州杭越間亦有之生土石間按荆南志云華容方臺山土人候雲所出之處于下掘取無不大獲色有五般入藥用輕薄成層色白通透者爲上但掘時忌作聲也據此則此石乃雲之根故得雲母之名

雲母氣味甘平無毒主治身皮死肌中風寒熱如在車舡上除邪氣安五臟益子精明目久服輕身延年○下氣堅肌續絕補中療五勞七傷虛損少氣止痢久服悅澤不老耐寒暑志高神仙○主下痢腸澼補腎冷

兖州雲母



江州雲母



作片成層

修治雲母須要光瑩如氷色爲上每一斤用小地膽草紫背天葵生甘草地黃汁各一鎰乾者細剉濕者取汁了于甆堝中安置下天池水三鎰着火煑七日夜水火勿令失度雲母自然成碧玉漿在堝底却以天池水猛投其中攪之浮如蝸涎者即去之如此三度淘淨取沉香一兩搗作末以天池水煎沉香湯二升以来分爲三度再淘雲母漿了日晒任用

權曰有小毒惡徐長卿忌羊血

之才曰澤瀉爲之使畏鮀甲及流水制汞伏丹砂

明皇雜錄云開元中有名醫紀朋者觀人顏色談笑知病淺深不待診脉帝聞之召於掖庭中看一宮人每日晨則笑歌啼號若狂疾而足不能履地朋視之曰此必因食飽而大促力頓仆於地而然乃飲以雲母湯令熟寐覺而失所苦問之乃言因太華公主載誕宮中大陳歌吹某乃主謳懼其聲不能清且長喫㹠蹄羹飽而當筵歌大曲曲罷覺胷中甚熱戲於砌臺上高而墜下久而方甦病狂足不能及地

玉屑 生藍田○採無時○顏色有綠黑赤白黃五般○其質溫潤而澤○其聲清越以長○屑如麻豆○服餌用白○按許慎說文云○玉乃石之美者○有五德○潤澤以溫○仁也○鰓理自外可以知中○義也○其聲舒揚遠聞○智也○不撓而折○勇也○銳廉而不技○潔也○其字象三玉連質之形○

玉屑氣味甘平無毒主治除胃中熱喘息煩滿止渴屑如麻豆服之久服輕身長年○潤心肺助聲喉滋毛髮○滋養五臟止煩燥宜共金銀麥門冬等同煎服有益

寶藏論玉玄真首餌之其命無極令人舉身輕飛不但地仙而已然其道遲成服一二百斤乃可知也玉可以爲米酒及地榆酒化之爲水亦可以葱漿水消之爲粘亦可餌以爲丸可燒爲粉服一年已上入水中不濡

天寶遺事楊貴妃含玉嚥津以解肺渴○王莽遺孔休玉曰君面有疵美玉可以滅瘢

異物志云玉出崑崙別寶經云凡石韞玉但夜將石映燈看之內有紅光明如初出日便知有玉楚記卞和三獻玉不鑒所以刖足後有辨者映燈驗之方知玉在石內乃爲玉璽價可重連城也

太平御覽云交州出白玉夫餘出赤玉挹婁出青玉大秦出菜玉西蜀出黑玉藍田出美玉色如藍故曰藍田

惡鹿角養丹砂　火刃不可傷

玉泉 弘景曰○此當是玉之精華者○質色明澈○可消之爲水○故名玉泉○又一名玉漿○一名璚漿○

玉泉氣味甘平無毒○主治五臟百病柔筋強骨安魂魄長肌肉益氣利血脉久服耐寒暑不飢渴不老神仙人臨死服五斤三年色不變○療婦人帶下十二病除氣癃明耳目久服輕身長年○治血塊

修治青霞子曰作玉漿法玉屑一升地榆草一升稻米一升取白露二升銅器中煑米熟絞汁玉屑化爲水名曰玉液以藥納杯中美醴所謂神仙玉漿也

畏欵冬花青竹

石鍾乳 始生少室山谷及太山○今道州江華縣及連英韶階峽

州山中皆有之。生嵓穴陰處。溜山液而成。空中相通。長者六七寸。如鵝翎管狀。碎之如爪甲。中無鴈齒光明者善。色白微紅。採無時。入水不沉。係石之津氣鍾聚成乳滴溜成石。故名石鍾乳。

氣味甘溫無毒○主治欬逆上氣明目益精安五臟通百節利九竅下乳汁○益氣補虛損療脚弱疼冷下焦傷竭強陰久服延年益壽好顏色不老令人有子不鍊服之令人淋○主泄精寒嗽壯元氣益陽事通聲○補五勞七傷○補髓治消渴引飲

石鍾乳本經上品



體輕白佳

服忌參朮犯者多死

修治每乳八两用甘草紫貝天葵各二两以水煑一伏時漉出拭乾緩火焙之擣篩水飛過晒乾入鉢復研萬遍貯磁器中任用

之才曰蛇牀爲之使惡牡丹玄石牡蒙畏紫石英蘘草忌羊血

丹房鏡源乳石可爲水匱

礬石 生河西山谷及隴西武都石門。今白礬則晉州、慈州、無爲軍。綠礬則隰州溫泉縣、池州銅陵縣。並煎礬處出焉。初生皆石也。採之燒碎煎鍊。乃成礬。凡有五種。其色各異。白礬、黃礬、綠礬、黑礬、絳礬也。白礬入藥及染人所用甚多。煆枯者名巴石。俗呼枯礬。綠礬入咽喉口齒藥及染色。黃礬丹竈家所須。時亦入藥。黑礬惟出西戎。亦謂之皂礬。染鬚鬢藥或用之。絳礬燒之赤色。故有絳名。時珍曰。礬者燔也。燔石而成也。

礬石本經上品

甘草爲之使惡牡蠣畏麻黃



今製煆乾汁謂之枯礬不煆者爲生礬

礬石氣味酸寒無毒主治寒熱瀉痢白沃陰蝕惡瘡目痛堅骨齒鍊餌服之輕身不老增年○除固熱在骨髓去鼻中息肉○除風去熱消痰止渴煖水臟治中風失音和桃仁葱湯浴可出汗○生含嚥津治急喉痺療鼻衄齆鼻鼠漏瘰癧疥癬

枯礬貼嵌甲牙縫中血出如衄○吐下痰涎飲澼燥濕解毒追涎止血定痛食惡肉生好肉治癰疽疔腫惡瘡癲癇疸疾通大小便口齒眼目諸病虎犬蛇蝎百蟲傷

波斯白礬氣味酸濇溫無毒主治赤白漏下陰蝕泄痢瘡疥解一切毒蛇蟲等去目赤暴腫齒痛火鍊之良

黃礬氣味酸濇鹹有毒主治療瘡生肉○野雞痔惡瘡疥癬○治陽明風熱牙疼

綠礬釋名皂礬青礬煆赤者爲絳礬氣味酸涼無毒主治疳及諸瘡○喉痺虫牙口瘡惡瘡疥癬釀鯽魚燒灰服療腸風瀉血○消積滯燥脾濕化痰涎除脹滿黃腫瘧利風眼口瘡諸病

戲術綿上噴花用白礬一塊研爲粉用滾湯泡將淨筆醮水隨意畫花在綿上候乾摺在身畔何人前展開用水噴綿其花顯然

千金翼方治脚氣衝心白礬三两以水一斗五升煎三五沸浸洗脚良

千金方治妬精陰瘡黃礬青礬麝香等分爲末傳之不過三度

陸氏積德堂方治重舌水舌綠礬二錢鐵上燒紅研末摻之

礬石使

朴消 生益州山谷。有鹹水之陽。採無時。以水淋取汁。一煎而成。未經再鍊。故曰朴消。一名消石朴者。消、即是本體之名。石者、乃

堅白之號朴者即未化之義也以其芒消英消皆從此出故爲消石朴也其英消即今俗間謂之馬牙消者是也李時珍曰此物見水即消又能消化諸物故謂之消生于鹽鹵之地狀似末鹽故今有鹽消之名凡牛馬諸皮須此治熟故俗有皮消之稱煎鍊入盆凝結在下粗朴者爲朴消在上有鋒芒者爲芒消形大于芒消與馬牙無異者爲馬牙消置之風中吹去水氣則輕白如粉爲風化消用朴消十斤水一桶同入鍋内溶化掠去面上油膩其水將細布或縑子濾去滓用蘿蔔十斤冬瓜五斤豆腐三斤俱切厚片同消水入鍋内煑六七沸撈去蘿蔔等物又掠去油膩再濾過令滓去净放瓦盆内置星月之下自然生出消牙取出放于卓上任其風乾將原水又煎一沸入瓦盆令其再生消牙如此者數次以水中無消牙爲度如前風乾用罐子裝盛按實泥累碎炭周圍不走火氣煎煉一晝夜待冷取出着净地上以新瓦盆覆之以去火毒後研爲末每斤加生熟甘草麵各一兩和勻爲玄明粉

朴消氣味苦寒無毒○主治百病除寒熱邪氣逐六臟積聚結固留癖能化七十二種石鍊餌服之輕身神仙○胃中飲食

熱結破留血閉絕停痰痞滿推陳致新○療熱脹養胃消穀○治腹脹大小便不通女子月候不通○通泄五臟百病及癥結治天行熱疾頭痛消腫毒排膿潤毛髮

芒消氣味辛苦大寒無毒主治五臟積聚久熱胃閉除邪氣破留血腹中痰實結搏通經脉利大小便及月水破五淋推陳致新○下瘰癧黃疸病時疾壅熱能散惡血墮胎傅漆瘡

馬牙消氣味甘大寒無毒主治除五臟積熱伏氣○末篩點眼赤去赤腫障瞖濇淚痛亦入點眼藥中用○功同芒消

風化消主治上焦風熱小兒驚熱膈痰清肺解暑以人乳和塗去眼瞼赤腫及頭面暴熱腫痛煎黃連點赤目

生消朴消而小堅不經煑鍊而成生茂州西山岩石間其形塊大小不定色青白採無時惡麥句薑氣味大寒無毒主治風熱癲癇小兒驚邪瘛瘲風眩頭痛肺壅耳聾口瘡喉痺咽塞牙頷腫痛目赤熱痛多眵淚

玄明粉氣味辛甘冷無毒主治心熱煩燥并五臟宿滯癥結○明目退膈上虛熱消腫毒

朴消君別錄曰苦辛大寒鍊白如銀能寒能熱能滑能濇能辛能鹹能酸入地千年不變權曰有小毒降也陰也之才曰石韋爲之使惡麥句薑畏三稜

風眼赤爛明净朴消一盞水二盞煎化露一夜濾净澄清朝夕洗目三日其紅即消雖半世者亦愈

芒消權曰有小毒元素曰氣薄味厚沉而降陰也一去實熱二滌腸中宿垢三破堅積孕婦惟三四月及七八月不可用餘用無妨

骨蒸熱病芒消末水服方寸七日二神良

馬牙消治食物過飽不消遂成痞膈用一兩碎之吳茱萸陳者半升煎汁投消乘熱服良久未轉更進一服立愈

風化消時珍曰甘緩輕浮故治上焦心肺痰熱而不泄利

玄明粉沉也陰也忌苦參脾胃虛冷及陰虛火動者服之是速其咎矣

傷寒蘊要治傷寒發狂者用玄明粉二錢朱砂二錢為末冷水調服

消石 始生益州山谷及武都隴西西羌採無時今所在山澤有之此即地霜也冬月地上有霜掃取以水淋汁煎鍊而成蓋以能消化諸石故名消石非與朴消芒消同類而有消名也一名芒消者以其煎鍊時有細芒而狀若消故亦有芒消之號與前芒消全別今丹爐家用制五金八石銀匠家用化金銀兵家用作烽燧火藥得火即焰起故土宿本草名焰消俗呼火消

消石氣味苦寒無毒

主治五臟積熱胃脹閉滌去蓄結飲食推陳致新除邪氣鍊之如膏久服輕身〇療五臟十二經脉中百二十疾暴傷寒腹中大熱止煩滿消渴利小便及瘻蝕瘡天地至神之物能化七十二種石〇破積散堅治腹脹破血下瘰癧瀉得根出〇含嚥治喉閉〇治伏暑傷冷霍亂吐利五腫淋疾女勞黑疸心腸疞痛赤眼頭痛牙痛

消石君時珍曰辛苦微鹹有小毒陰中陽也得陳皮性疎爽之才曰火爲之使惡苦參苦菜畏女菀杏仁竹葉

炮炙論治頭痛欲死消石末吹鼻內即愈

時珍曰諸消自晉唐以來諸家皆執名而猜都無定見惟馬志開寶本草以消石爲地霜鍊成而芒消馬牙消是朴消鍊出者此言足以破諸家之說矣諸家因消石一名朴消朴消一名消石朴其名相混遂致費辨不決不知消有水火二種形質雖同性氣迥別也惟神農本草朴消消石二條爲正其別錄芒消嘉祐馬牙消開寶生消俱係多出今並歸併之神農所列朴消即水消也今俗呼皮消有二種煎鍊結出細消有鋒芒者爲芒消結出如馬牙者爲牙消俗呼馬牙消其凝底成塊者通爲朴消其色青其氣味皆鹹而寒置風中則化石爲風化消用蘿蔔等煮製而爲玄明粉〇神農所列消石即火消也亦有二種煎鍊結出細芒者亦名芒消結出馬牙者亦名牙消其凝底成塊者爲消石其色白其氣味皆辛苦[illegible]大溫風不能化亦不能爲玄明粉二消皆有芒消牙消之[illegible]故市家混賣醫家混用今凡用芒消牙消者當用朴消中芒消牙消用消石者用火消爲是以凝水石豬胆煎成者爲消石則誤矣

滑石 生赭陽山谷及太山之陰或掖北白山或卷山采無時今所在皆有嶺南始安出者白如凝脂極軟滑宜入藥時珍曰性滑利竅其質又滑膩故名滑石

滑石氣味甘寒無毒

主治身熱洩澼女子乳難癃閉利小便蕩胃中積聚寒熱益精氣久服輕身耐飢長年〇通九竅六腑津液去留結止渴令人利中〇燥濕分水道實大腸化食毒行積滯逐凝血解燥渴補脾胃降心火偏主石淋爲要藥〇療黃疸水腫脚氣吐血衄血金瘡血出諸瘡腫毒

滑石
本經上品



色白者佳

修治滑石擇色白滑膩以刀刮去黃色用東流水淘過曬乾用

之才曰石韋爲之使惡曾青制雄黃

好古曰入足太陽經

益元散又名天水散太白散六一散解中暑傷寒疫癘飢飽勞損憂愁思慮驚恐悲怒傳染并汗後遺熱勞復諸疾兼兩感傷寒百藥酒食邪熱毒治五勞七傷一切虛損內傷陰痿驚悸健忘癇瘛煩滿短氣痰嗽肌肉疼痛腹脹悶痛淋閟澀痛服石石淋療身熱嘔吐泄瀉腸澼下痢赤白除煩熱胸中積聚寒熱止渴消畜水婦人產後損液血虛陰虛熱甚催生下乳治吹乳乳癰牙瘡齒疳此藥大養脾腎之氣通九竅六腑

去留結益精氣壯筋骨和氣通經脉消水穀保真元明耳目安魂定魄強志輕身駐顏益壽耐勞役飢渴乃神驗之仙藥也白滑石水飛過六兩粉甘草一兩爲末每服三錢蜜少許温水調下實熱用新汲水下解利用葱豉湯下通乳用豬蹄湯下催生用香油漿下凡難産或死胎不下皆由風熱燥澁結滯緊斂不能舒緩故也此藥力至則結滯頓開而瘥矣上係劉河澗傷寒直格

滑石　臣

石膽　生羌道山谷羌里句青山今惟信州鈆山縣有之二月庚子辛丑日採又著其說云石膽最上出蒲州大者如拳小者如桃栗擊之縱橫解皆成疊文色青見風久則緑擊破其中亦青也其次出上饒曲江銅坑間者粒細有廉稜如釵股米粒時珍曰膽以色味命名俗因其似礬呼爲膽礬

石膽氣味酸辛寒有毒

主治明目目痛金瘡諸癇痙女子陰蝕痛石淋寒熱崩中下血諸邪毒氣令人有子鍊餌服之不老久服增壽神仙○散癥積欬逆上氣及鼠瘻惡瘡○治虫牙鼻內息肉○帶下赤白面黄女子臟急○入吐風痰藥最快

石膽　君

本經上品



色青綠狀如琉璃有白文易折

時珍曰氣寒味酸而辛入少陽膽經之才曰水英爲之使畏牡桂菌桂芫花辛夷白微

周密齊東野語云密過南浦有老醫授治喉痺極速垂死方用鴨觜膽礬末醋調灌之大吐膠痰數升即瘥臨汀一老兵妻苦此絕水粒三日矣如法用之即瘥屢用無不立驗神方也

空青　生益州山谷及越巂山有銅處銅精熏則生空青今信州亦時有之狀若楊梅故別名楊梅青其腹中空破之有漿者絕難得亦有大者如雞子小者如豆子三月中旬採亦無時本草綱目云空言其質也青言其色也

空青氣味甘酸寒無毒

主治青盲耳聾明目利九竅通血脉養精神益肝氣久服輕身延年○療目赤痛去膚翳止淚出利水道下乳汁通關節破堅積令人不忘志高神仙○治頭風鎮肝瞳人破者得再見物○鑽孔取漿點多年青盲內障翳膜養精氣其殼摩翳○中風口喎以豆許含嚥甚效

造化指南云銅得紫陽之氣而生綠綠二百年而生石綠銅始生其中焉曾青空青則石綠之得道者均謂之礦又二百年得青陽之氣化爲鍮石觀此則空青有金坑銅二種或大如拳卵小如豆粒或成片塊或若楊梅鮮有精粗之異皆以有漿爲上不空無漿者爲下也方家以藥塗銅物生青刮下僞作空青者終是銅青非石綠之得道者也

本經上品



中空有漿

權曰空青畏兔絲子　諸藥惟此最貴　能化銅鐵鈆錫作金

曾青　生蜀中山谷及越巂採無時形累累如黄連相綴色理相類空青李時珍曰曾音層其青層層而生故名

曾青氣味酸小寒無毒

主治目痛止淚出風痺利關節通九竅破癥堅積聚久服輕身

不老○養肝膽除寒熱殺白蟲療頭風腦中寒止煩渴補不足盛陰氣

曾青本經上品



可合仙藥

修治勿用夾石及銅青每一两要紫背天葵甘草青芝草三件乾濕各一鎰細剉放瓷堝內安曾青于中以東流水二鎰緩緩煑之五晝夜勿令水火失時取出以東流水浴過入乳鉢研如粉用

之才曰畏兎絲子獨孤滔云曾青住火成膏可結汞制丹砂盖含金氣所生也葛洪曰塗鐵色赤如銅

治斑瘡入目曾青一錢丹砂二錢爲末蠐螬五枚搗汁和點

禹餘粮 會稽山中出者甚多。形如鵝鴨卵。外殼重疊包裹。中有細粉如麪。故曰餘粮。一云。昔禹行山乏食。採以充粮而棄其餘。故名禹餘粮。

禹餘粮氣味甘寒無毒主治欬逆寒熱煩滿下赤白血閉癥瘕大熱鍊餌服之不飢輕身延年○療小腹痛結煩疼○主崩中○治邪氣及骨節疼四肢不仁痔瘻等疾久服耐寒暑催生固大腸

修治細研水洮汁澄之勿令有沙土也

之才曰牡丹爲之使伏五金制三黃○入手足陽明血分

衛生易簡方治婦人小腹痛禹餘粮爲末每米飲服二錢日二服極效　禹餘粮君

太一餘粮 生太山。上有甲。甲中有白。白中有黃。如雞子黃色。采無時。吳普藏器曰。太一者。道之宗源。太者大也。一者道也。大道之師。即理化神君。禹之師也。師嘗服之。故有太一之名。

太一餘粮氣味甘平無毒主治欬逆上氣癥瘕血閉漏下除邪氣肢節不利久服耐寒暑不飢輕身飛行千里神仙○治大飽絕力身重○益脾安臟氣○定五腑鎮六臟

之才曰杜仲爲之使畏貝母菖蒲鐵落

修治凡修事四两用黑豆五合黃精五合水二斗煑取五升置瓷鍋中下餘粮煑之旋添汁盡爲度其藥氣自然香如新米擣了又研一萬杵方用

禹餘粮太一餘粮俱本經上品

石中黃子 出餘粮處有之。其石如麪劑紫黑色。石皮內黃色者。謂之中黃。本經云。水已凝者爲餘粮。水未凝者爲石中黃子也。宗奭曰。子當作水。

石中黃子氣味甘平無毒主治久服輕身延年不老

恭曰此禹餘粮殼中未成餘粮黃濁水也○石中黃子唐本草

按別錄言禹餘粮生東海池澤及山島中太一餘粮生太山山谷石中黃出餘粮處有之乃殼中未成餘粮黃濁水也據此則三者一物也生于池澤者爲禹餘粮生于山谷者爲太一餘粮其中水黃濁者爲石中黃水

白石英 生華陰山谷及太山。大如指。長二三寸。六面如削。白澈有光。二月采。亦無時。徐鍇云。英亦作瑛。玉光也。英有白黃赤青黑五種。皆石之似玉而有光璧者。故得英名。

白石英氣味甘微溫無毒主治消渴陰痿不足欬逆胷膈間久寒益氣除風濕痺久服輕身長年○療肺癰吐膿欬逆上氣疸黃○實大腸

五色石英主治心腹邪氣女人心腹痛鎮心胃中冷氣益毛髮悅顏色治驚悸安魂定魄壯陽道下乳隨臟而治青治肝赤治心黃治脾白治肺黑治腎

白石英本經上品



白色若水精

時珍曰白石英手太陰陽明氣分藥也之才曰惡馬目毒公

生太山山谷。采無時。其色紫。其質瑩澈。隨其大小皆五稜兩頭如箭鏃。煑水飲之。暖而無毒。

紫石英氣味甘溫無毒主治心腹欬逆邪氣補不足女子風寒在子宮絕孕十年無子久服溫中輕身延年○療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心氣不足定驚悸安魂魄塡下焦止消渴除胃中久寒散癰腫令人悅澤○養肺氣治驚癇蝕膿

紫石英

本經上品



有淡紫色

有深紫色

修治紫石英火煆醋淬七次研末水飛過晒乾入丸散用

之才曰長石爲之使畏扁青附子惡鮀甲黃連麥句薑得茯苓人參療心中結氣得天雄菖蒲療霍亂

好古曰紫石英入手少陰足厥陰經

日華子本草治癰腫毒氣用紫石英火燒醋淬爲末生薑米醋煎傅之摩亦得

一名五色符。普曰青符生南山或海崖。黃符生嵩山。色如豘腦鴈雛。黑符生洛西山空地。白符生少室天婁山或太山。赤符生少室或太山。色絳滑如脂。時珍曰膏之凝者曰脂。此物性粘。固濟爐鼎甚良。蓋兼體用而名也。

五種石脂並甘平無毒主治黃疸洩痢腸澼膿血陰蝕下血赤白邪氣癰腫疽痔惡瘡頭瘍疥瘙久服補髓益氣肥健不飢輕身延年五石脂各隨五色補五臟治洩痢血崩帶下吐血衄血濇精淋瀝除煩療驚悸壯筋骨補虛損久服悅色治瘡癤痔瘻排膿

青石脂氣味酸平無毒主治養肝膽氣明目療黃疸洩痢腸澼女子帶下百病及疽痔惡瘡久服補髓益氣不飢延年

黃石脂氣味苦平無毒主治養脾氣安五臟調中大人小兒洩痢腸澼下膿血去白蟲除黃疸癰疽蟲久服輕身延年

黑石脂氣味鹹平無毒主治養腎氣強陰主陰蝕瘡止腸澼洩痢療口瘡咽痛久服益氣不飢延年

白石脂氣味甘酸平無毒主治養肺氣厚腸補骨髓療五臟驚悸不足心下煩止腹痛下水小腸澼熱溏便膿血女子崩中漏下赤白沃排癰疽瘡痔久服安心不飢輕身長年○濇大腸○之才曰得厚朴米汁飲止便膿燕屎爲之使惡松脂畏黃芩○頌曰畏黃連甘草飛廉馬目毒公

赤石脂氣味甘酸辛大溫無毒主治養心氣明目益精療腹痛腸澼下痢赤白小便利及癰疽瘡痔女子崩中漏下產難胞衣不出久服補髓好顏色益智不飢輕身延年○補五臟虛乏○補心血生肌肉厚腸胃除水濕收脫肛○之才曰畏芫花惡大黃松脂

斗門方治小兒疳瀉赤石脂爲末米飲調服半錢立瘥加京芎等分更妙

時珍曰五色石脂皆手足陽明藥也其味甘其氣溫其體重其性濇濇而重故能收濕止血而固下甘而溫故能益氣生肌而調中五種主療大抵相同故本經不分條目但云各隨五色補五臟別錄雖分五種而性味主治亦不甚相遠以五味配五色爲異亦只強分爾赤白二種一入血分一入氣分故時用尚之

赤石脂君　俱本經上品

始出大食國。生於石上。今廣州山石中及宜州南八里龍濟山中亦有之。黑褐色。大者如彈丸。小者如黑石子。採無時。

名無名異者言無可名其異也

無名異氣味甘平無毒主治金瘡折傷內損止痛生肌肉○消腫毒癰疽醋摩傅之○收濕氣

無名異宋開寶



似蛇黃而色黑

昔人見山雞被網損其足脫去啣一石摩其損處遂愈乃取其石理傷折大効人因傳之

談埜翁試效方治臨杖無名異末臨時溫服三五錢則杖不甚痛亦不甚傷

簡便方治赤瘤丹毒無名異末葱汁調塗立消

雄黃

重三五兩一塊毄之不聞臭氣赤如雞冠明澈者價類金焉有孕佩之轉女成男仙家入點化黃金用故一名黃金石因

生武都燉煌山陽故名曰雄黃

雄黃氣味苦平寒有毒主治寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死肌殺精物惡鬼邪氣百蟲毒勝五兵鍊食之輕身神仙○療疥蟲䘌瘡目痛鼻中息肉及絕筋破骨百節中大風積聚癖氣中惡腹痛鬼疰殺諸蛇虺毒解藜蘆毒悅澤人面餌服之者皆飛入腦中勝鬼神延年益壽保中不飢得銅可作金○主疥癬風邪癲癇嵐瘴一切蟲獸傷○搜肝氣瀉肝風消涎積○治瘧疾寒熱伏暑泄瀉痢疾酒飲成癖驚癇頭風眩運化腹中瘀血殺勞蟲疳蟲

修治雄黃搗如粉水飛澄去黑者曬乾再研用

頌曰形塊如丹砂明澈不夾石其色如雞冠者真有青黑色而堅者名熏黃有形色似真而氣臭者名臭黃並不入服食只可療瘡疥其臭以醋洗之便去足以亂真尤宜辨

土宿真君曰南星地黃萵苣五加皮紫河車地榆五葉藤黃芩白芷當歸地錦鵞腸草雞腸草苦參鵞不食草圓桑蝟脂皆可制雄黃

甲志觀音治痢昔虞丞相自渠州被召途中冒暑得泄痢連月夢觀音壁間有韻語一絕讀之數遍其詞曰暑毒在脾濕氣連腳不泄則痢不痢則瘧獨煉雄黃蒸餅和藥甘草作湯服之安樂別作治療醫家大錯如方服之遂愈

明皇雜錄有黃門奏使交廣回周顥謂曰此人腹中有蛟龍上驚問黃門曰卿有疾否曰臣馳馬大庾嶺時當大熱困且渴遂飲水覺腹中堅痞如石周遂以消石及雄黃煑服之立吐一物長數寸大如指視之鱗甲具投之水中俄頃長數尺復以苦酒沃之如故以器覆之明日已生一龍矣上甚訝之

唐書甄立言究習方書仕唐爲太常丞有道人心腹滿煩彌二歲立言診曰腹有蠱誤食髮而然令餌雄黃一劑少頃吐一蛇如小指無目燒之有髮氣乃愈

雌黃君　本經中品

雌黃

生武都山谷與雄黃同山其陰山有金金精熏則生雌黃

今出階州以其色如金又似雲母甲錯可析者爲佳其夾石及黑如鐵色者不可用或云一塊重四兩者析之可得千重此尤奇好也採無時李時珍曰生山之陰故曰雌黃土宿本草云陽石氣未足者爲雌已足者爲雄相距五百年而結爲石造化有夫婦之道故曰雌雄

雌黃氣味辛平有毒主治惡瘡頭禿痂疥殺毒蟲蝨身痒邪氣諸毒鍊之久服輕身增年不老○蝕鼻中息肉下部䘌瘡身面白駁散皮膚死肌及恍惚邪氣殺蜂蛇毒久服之腦滿○治冷痰勞嗽血氣蟲積心腹痛癲癇解毒

雌黃本經中品　別錄云大寒不入湯用

治勿令婦人雞犬新犯淫人有患人不男人非形人及曾是

刑獄臭穢之地佗之雌黄黑如鐵色不堪用也反損人壽凡用搗篩以水飛過晒乾研如塵用

土宿真君曰芎藭地黄獨帚益母羊不食草地榆五加皮瓦松冬瓜汁皆可制伏又雌見鉛及胡粉則黑

試法但于甲上磨之土色者好又燒熨斗底以雌畫之如赤黄線一道者好舶上来如噀血者上湘南者次之青色尤佳葉子者爲上造化黄金非此不成亦能柔五金乾汞轉硫黄伏粉霜又云雌黄變鐵雌黄變錫

聖惠方治烏癩蟲瘡雌黄粉醋和雞子黄塗之

雌黄君

石硫黄

生東海牧羊山及太山河西山礬石液也。今惟出南海諸番嶺外州郡或有。而不甚佳。以色如雞子初出殻者爲真。謂之崑崙黄。其赤色者名石亭脂。青色者號冬結石。半白半黑名神驚石。並不堪入藥。李時珍曰。硫黄秉純陽火石之精氣而結成。性質流通。色賦中黄。故名硫黄。含其猛毒爲七十二石之將。故藥品中號爲將軍。外家謂之陽侯。亦曰黄牙。又曰黄硇砂。

石硫黄氣味酸温有毒

主治婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨除頭秃能化金銀銅鐵奇物○療心腹積聚邪氣冷痛在脇欬逆上氣脚冷疼弱無力及鼻衄惡瘡下部䘌瘡止血殺疥蟲○治婦人血結○下氣治腰腎久冷除冷風頑痺寒熱生用治疥癬鍊服主虚損泄精○壯陽道補筋骨勞損風勞氣止嗽殺臟蟲邪魅○長肌膚益氣力老人風秘並宜鍊服○主虚寒久痢滑泄霍亂補命門不足陽氣暴絶陰毒傷寒小兒慢驚

石硫黄本經中品

修治李時珍曰以蘿蔔剜空入硫黄在内合定稻糠火煨熟去其臭氣以紫背浮萍同煑過消其火毒以皂莢湯淘之去其黑漿一法打碎以絹袋盛無灰酒煑三伏時用

權曰硫黄有大毒以黑錫煎湯解之及食冷猪血

葛洪曰四黄惟陽侯爲尊金石煆煉者不可用惟草木制伏者[illegible]入藥用桑灰益母紫荷波稜天鹽桑白皮地骨皮車前馬鞭草黄蘗何首烏石韋蕎麥獨帚地榆蛇床兎絲蓖麻蠶砂[illegible]灰或汁皆可伏之

之才曰曾青爲之使畏細辛飛廉朴消鐵醋

[illegible]補要治欬逆打呃流黄燒烟嗅之立止

石硫黄君

食鹽

有東海鹽。北海鹽。南海鹽。河東鹽池。梁益鹽井。西羌山鹽。胡中樹鹽。色類不同。以河東者爲勝。五味之中。惟此不可闕。乃人所常食者。故别録名食鹽。俗呼大鹽。許慎説文云。鹽鹹也。李時珍曰。鹽字象器中煎鹵之形。

食鹽氣味甘鹹寒無毒主治腸胃結熱喘逆胷中病令人吐○傷寒寒熱吐胷中痰澼止心腹卒痛殺鬼蠱邪疰毒氣下部䘌瘡堅肌骨○除風邪吐下惡物殺蟲去皮膚風毒調和臟腑消宿物令人壯健○助水臟及霍亂心痛金瘡明目止風淚邪氣一切蟲傷瘡腫火灼瘡長肉補皮膚通大小便療疝氣滋五味○空心揩齒吐水洗目夜見小字○解毒凉血潤燥定痛止痒吐一切時氣熱痰飲關格諸病

食鹽　别録中品

修治須以水化澄去脚滓煎鍊白色入藥乃良

保昇曰多食令人失色膚黑損筋力　之才曰漏蘆爲之使

頌曰唐柳柳州纂救三死方云元和十一年十月得霍亂上不可吐下不可利出冷汗三大斗許氣即絶河南房偉傳此方入口即吐絶氣復通一法用鹽一大匙熬令黄童子小便一

（升合和溫服少頃吐下即愈○千金翼治諸瘡癬初生痒痛者嚼鹽頻擦之妙）食鹽

青鹽生胡鹽山及西羌北地酒泉福祿城東南角。北海青。南海赤。十月採。大明曰。西番所食者。故號戎鹽羌鹽。其形作塊方圓大小不常。方稜明瑩青色者最奇。故俗通呼青鹽。

青鹽氣味鹹寒無毒

主（治明目目痛益氣堅肌骨去毒蠱○心腹痛溺血吐血齒舌血出○助水臟益精氣除五臟癥結心腹積聚痛瘡疥癬○解芫青斑蝥毒）

（青鹽本經下品載名戎鹽）（方塊明淨無夾泥土者佳）

獨（孤滔曰戎鹽赤黑二色能累卵乾汞制丹砂）

通（變要法青鹽二兩白鹽四兩用川椒四兩煎汁拌鹽炒乾日用揩牙洗目永無齒疾目疾）

鹵鹹機曰。即鹵水也。鹵水之下。凝結如石者。即鹵鹹也。所謂石鹼是已。時珍曰。鹹音咸。潤下之味。鹼音減。鹽土之名。許慎說文云。鹵。西方鹹地也。故字從西省文。象鹽形。東方謂之斥。西方謂之鹵。河東謂之鹹。傳云。兌為澤。其於地也為剛鹵。亦西方之義。今人不復呼鹵鹹。並呼為鹼。為鹻。

鹼氣味苦寒無毒主（治大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒柔肌膚○去五臟腸胃留熱結氣心下堅食已嘔逆喘滿明目目痛）

（鹵鹹本經下品）

獨（孤滔曰制四黃作銲藥同硇砂罨鐵一時即軟洗衣去垢）

玄精石出解州解池及通泰州積鹽倉中。亦有之。其色青白龜背者佳。採無時。此石乃鹹鹵至陰之精。凝結而成。故名玄精石。又名太乙玄精石。

（玄精石氣味鹹溫無毒主治除風冷邪氣濕痺益精氣婦人痼冷漏下心腹積聚冷氣止頭痛解肌○主陰證傷寒指甲面色青黑心下脹滿結硬煩渴虛汗不止或時狂言四肢逆冷咽喉不利腫痛脈沉細而疾宜佐他藥服之又合大藥塗大風瘡）

獨（孤滔曰玄精石制硫黃丹砂）

石膏生齊山山谷。及齊盧山。魯蒙山。採無時。有紅白二色。紅者不可服。白者潔淨細文。短密如束針。正如凝成く蠟狀。鬆軟易碎。燒之即白爛如粉。俗呼軟石膏。震亨曰。藥之命名。多有意義。或以色。或以形。或以氣。或以質。或以味。或以能。或以地。或以時。石膏火煅細研。醋調封丹竈。其固密甚于脂膏。此蓋兼質與能而得名。正與石脂同意。時珍曰。其性大寒如水。故一名寒水石。

石膏氣味辛微寒無毒（元素曰性寒味辛而淡氣味俱薄體重而沉降也陰也乃陽明經大寒之藥）

主（治中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡○除時氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中結氣解肌發汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘咽熱亦可作浴湯○治傷寒頭痛如裂壯熱皮如火燥和葱煎茶去頭痛○治天行熱狂頭風旋下乳揩齒益齒○除胃熱肺熱散陰邪緩脾益氣○止陽明經頭痛發熱惡寒日晡潮熱大渴引飲中暑潮熱牙痛）

（石膏本經中品）

修治石膏斆曰凡使石臼中擣成粉羅過生甘草水飛過澄晒篩研用時珍曰古法惟打碎如豆大絹包入湯煑之近時因其性寒火煆過研用或糖拌炒過不妨脾胃



石膏一名寒水石凝水石一名寒水石同名異物雞子爲使惡莽草巴豆馬目毒公畏鐵

保壽堂方治胃火牙疼軟石膏一兩火煆淡酒淬過爲末入防風荊芥細辛白芷各五分爲末日用揩牙甚效

和劑局方治瘡口不歛生肌肉止疼痛去惡水用軟石膏火煆二兩黃丹半兩爲末摻之名紅玉散

石膏臣

理石生漢中山谷及盧山。今出寧州。采無時。即石膏之長文細直如絲。而明潔帶微青色者。因形有文理。故名理石。

理石氣味甘寒無毒主治身熱利胃解煩益精明目破積聚去三蟲○除營衞中去來大熱結熱解煩毒止消渴及中風痿痺○漬酒服療癖令人肥悅○滑石爲使惡麻黃

理石本經中品



理石與石膏一類二色可通用

長石生長子山谷。故名長石。大者如升。小者如拳。性堅硬潔白。理粗起。齒稜。擊之則片片橫碎。光瑩如雲母白石英。亦有墻壁。但不似方解石。破之作方塊。爾燒之　散不得如軟石膏成粉。故俗呼硬石膏。

長石氣味辛苦寒無毒主治身熱胃中結氣四肢寒厥利小便通血脉明目去瞖眇下三蟲殺蠱毒久服不飢○止消渴下氣除脇肋肺間邪氣

長石本經中品

一名方石



長石方解乃一類二種氣力功効相同通用無妨

方解石生方山。采無時。此石與長石相似。敲破塊塊方解。故名方解石。

方解石氣味苦辛大寒無毒主治胷中留熱結氣黃疸通血脉去蠱毒沙州大鳥山出者佳

長石方解石唐宋諸方皆以爲石膏今人又以爲寒水石雖俱不是其性寒治熱之功大抵不相遠惟解肌發汗不能如軟石膏耳

別錄下品



敲之段段片碎者爲硬石膏塊塊方稜者爲方解石

金屑始生益州。采無時。有山金沙金二種。其色七青八黃九紫十赤。以赤爲足色。寶貨辨疑云。馬蹄金象馬蹄。難得。橄欖金出荆湖嶺南。胯子金象帶胯。出湖南北。瓜子金大如瓜子。麩金如麩片。出湖南及高麗。沙金細如沙屑。出蜀中。葉子金出雲南。出處不一。采亦多端。按許慎說文曰。五金黃爲之長。久埋不生衣。百鍊不輕。從革不違。生于土。故字左右注。象金在土中之形。爾雅云。黃金謂之璗。美者謂之鏐。餅金謂之鈑。絶澤謂之銑。獨孤滔云。天生牙。謂之黃牙。梵書謂之蘇代羅。弘景云。仙方名金爲

寇宗奭曰。不曰金而更加屑字者。是已經磨屑可用之義。

金屑氣味辛平有毒

主治鎮精神堅骨髓通利五臟邪氣服之神仙○療小兒驚傷五臟風癇失志鎮心安魂魄○癲癇風熱上氣欬嗽傷寒肺損吐血骨蒸勞極作渴並以薄入丸散服○破冷氣除風

金別錄中品　珣曰生者有毒熟者無毒

金漿氣味同金主治長生神仙久服腸中盡爲金色

金必須烹鍊鍛屑爲薄方可入藥生金有毒能殺人（中其毒者）性鸕鵲肉可解之金性惡錫畏水銀得餘甘子則體柔亦相感耳

金星石有金星簇如麩片生并州濠州寒無毒主治脾肺壅毒肺損吐血嗽血下熱涎解衆毒

齊徐王方治水銀入肉令人筋攣惟以金物熨之水銀當出蝕金侯金白色是也頻用取効

銀出永昌○採無時○李時珍曰○閩浙荆湖饒信廣滇貴州交趾諸處山中皆產銀○有鉚中鍊出者○有沙土中鍊出者○其生銀俗呼銀筍○銀牙○亦曰○出山銀○許慎說文曰○鋈白金也○

氣味辛平有毒

主治安五臟定心神止驚悸除邪氣久服輕身長年○定志去驚癇小兒癲疾狂走○破冷除風○銀薄堅骨鎮心明目去風熱癲癇入丸散用

生銀氣味辛寒無毒

主治熱狂驚悸發癇恍惚夜臥不安讝語邪氣鬼祟服之明目鎮心安神定志小兒諸熱丹毒並以水磨服之功勝紫雪○小兒中惡熱毒煩悶水磨服之○煑水入葱白粳米作粥食治胎動不安漏血

銀別錄中品

修治入藥只用銀薄易細

保昇曰畏黃連甘草飛廉石亭脂砒石惡羊血馬目毒公

大明曰冷微毒畏慈石惡錫忌生血時珍曰荷葉蕈火能粉銀羚羊角烏賊魚骨鼠尾龜殼生薑地黃慈石俱能瘦銀羊脂紫蘇子油皆能柔銀

今人用銀器飲食遇毒則變黑中毒死者亦以銀物探試之則銀之無毒可徵矣其入藥亦是平肝鎮怯之義

斆曰凡使金銀銅鐵只可渾安在藥中借氣生藥力而已勿入藥服能消人脂

衍義曰銀屑金條中巳解屑義銀本出於礦須煎鍊而成故名熟銀所以別立生銀條也其用與熟銀大同世有術士能以朱砂而成者有鉛汞而成者有焦銅而成者何復更有造化之氣豈可更入藥既有此類不可不區別其生銀即是不自礦中出而特然自生者又謂之老翁鬚亦取像而言之曰然銀屑經言有毒生銀經言無毒釋者漏畧不言蓋生銀已生發干外無蘊欝之氣故無毒礦銀尚蘊蓄于石中欝結之氣

金末數揚故言有毒　銀屑君

銀星石主療與金星石大體相似

慈石生泰山山谷○及慈山山陰有鐵處則生其陽○今慈州徐州及南海傍山中皆有之○慈州者歲貢最佳○能吸鐵虛連十數針○或一二斤刀器○回轉不落者尤真○採無時○其石中有孔○孔中黃赤色○其上有細毛○性溫○功用更勝○藏器曰○慈石取鐵如慈母之招子○故名○

氣味辛寒無毒

主治周痺風濕肢節中痛不可持物洗洗酸消除大熱煩滿及耳聾○養腎臟強骨氣益精除煩通關節消癰腫鼠瘻頸核喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令人有子○補男子腎虛身[illegible]

腰中不利加而用之○治筋骨羸弱補五勞七傷眼昏除煩躁小兒誤吞鍼鐵等即研細末筋肉莫令断與末同吞下之○明目聰耳止金瘡血

慈石本經中品　俗呼吸鐵石



吸鐵者佳

修治慈石須火燒醋淬碾如塵水飛過用或醋煑三日夜研用

之才曰柴胡爲之使殺鐵毒消金惡牡丹莽草畏黄石脂獨孤滔曰伏丹砂養汞去銅暈

衍義曰慈石其毛輕紫石上頗澁可吸連鐵俗謂之協鐵石其玄石即慈石之黑色者慈磨鐵鋒則能指南然常偏東不全南也其法取新纊中獨縷以半芥子許蠟綴于鐵腰無風處垂之則鍼常指南以鍼横貫燈心浮水上亦指南然常偏丙位盖丙爲大火庚辛受其制物理相感耳

直指方治耳卒聾協鐵石半錢入病耳内鐵砂末入不病耳内自然通透

外臺秘要治丁腫慈石末酢和封之拔根立出　慈石臣

凝水石即寒水石也○生常山山谷又出中水縣及邯鄲今河東汾隰州及德順軍亦有之○三月采○此有兩種有縱理者有横理者○色清明者爲上○投置水中與水同色○其水凝動○故名凝水石

氣味辛寒無毒

主治身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒煩滿水飲之久服不飢○除時氣熱盛五臟伏熱胃中熱止渴水腫小腹痺○壓[illegible]石毒風解傷寒勞復○治小便白内痺凉血降火○止牙[illegible]堅牙明目

凝水石本經中品一名白水石一名凌水石　盬之精[illegible]

凝水石生于鹵地積盬之下精液滲入土中年久至泉結[illegible]

[illegible]大塊有齒稜如馬牙消清瑩如水精亦有帶青黑色[illegible]

至暑月回潤入水浸久亦化

寒水石有二一是軟石膏一是凝水石惟陶弘景所注是凝水之寒水石與本文相合蘇恭蘇頌寇宗奭閻孝忠四家所說皆是軟石膏之寒水石王隱君所說則是方解石諸家不詳本文盬精之說遂以石膏方解石指爲寒水石唐宋以來相承其誤通以二石爲用而盬精之寒水絶不知用此千載之誤也石膏之誤近千載朱震亨氏始明凝水之誤非時珍深察恐終于絶響矣

修治每寒水石十兩用生薑自然汁一溢煑乾研粉用

之才曰解巴豆毒畏地榆　獨孤滔曰制丹砂伏玄精

陽起石生齊山山谷及琅邪或雲山陽起山○今惟出齊州他處不復有○齊州一土山○石出其中○彼人謂之陽石山○其山常有溫暖氣○雖盛冬大雪徧境○獨此山無積白○盖石氣熏蒸使然也○山惟一穴○官中常禁閉○至初冬則州發丁夫遣人監取○歲月積久○其穴益深○鑱鑿他石○得之甚艱○以色白肌理瑩白若狼牙者爲上○時珍曰陽起石以能命名○

氣味鹹微溫無毒

主治崩中漏下破子臟中血癥瘕結氣寒熱腹痛無子陰痿不起補不足○療男子莖頭陰下濕痒去臭汗消水腫久服不飢令人有子○補腎氣精乏腰疼膝冷濕痺子宮久冷冷癥寒瘕止月水不定○治帶下溫疫冷氣補五勞七傷○補命門不足○散諸熱腫

陽起石本經中品

之才曰桑螵蛸爲之使惡澤瀉菌桂雷丸石葵蛇蛻畏菟絲子忌羊血



修治陽起石擇[illegible]凝白雲頭雨脚鷺鷥毛者火煅酒淬七次研細水飛過日乾用

普濟方治陰痿陰汗陽起石火煆爲末每服二錢鹽湯下　臣

密陀僧始出波斯國。今各處銀銅冶中有之。是銀鉛脚。形似黃龍齒。堅重者妙。擊碎有金色者佳。一名沒多僧。密陀沒多並胡語也。

氣味鹹辛平有小毒主治久痢五痔金瘡面上瘢䵟面膏藥用
之○鎮心補五臟治驚癇欬嗽嘔逆吐痰○療反胃消渴瘧
疾下痢止血殺蟲消積治諸瘡消腫毒除胡臭染髭髮
○密陀僧唐本草

修治凡使擣細安瓷鍋中重紙袋盛柳蛀末焙之次下東流水
浸滿火煑一伏時去柳末紙袋取用

聖惠方治鼻皶赤皰密陀僧二兩細研人乳調夜塗旦洗

鐵出牧羊平澤及枋城或析城。采無時。李時珍曰。鐵截也。剛可截物也。於五金屬水。故一名黑金。一名烏金。

鐵氣味辛平有毒主治堅肌耐痛○勞鐵療賊風燒赤投酒中
飲○此熟鐵也

生鐵氣味辛微寒微毒主治下部及脫肛○鎮心安五臟治癇
疾黑鬚髮治癬及惡瘡疥蜘蛛咬蒜磨生油調傅○散瘀血
消丹毒

鋼鐵氣味甘平無毒主治金瘡煩滿熱中胷膈氣塞食不化

鐵華粉取鋼鍛作葉如笏或團平面磨錯令光淨以鹽水灑之
於醋甕中陰處埋之一百日鐵上衣生鐵華成矣刮研成霜
此鐵之精華功用強於鐵粉也氣味鹹平無毒主治安心神
堅骨髓除百病變黑潤肌膚令人不老體健能食久服令人
身重肥黑合和諸藥各有所主○化痰鎮心抑肝邪特異○
止驚悸虛癇鎮五臟去邪氣治健忘冷氣心痛痃癖癥結脫
肛痔瘻宿食等及傳竹木刺入肉

鐵落是煆家燒鐵赤沸砧上鍛之皮甲落者氣味辛平無毒主
治風熱惡瘡瘍疽瘡痂疥氣在皮膚中○除胸膈中熱氣食
不下止煩去黑子可以染皁○治驚邪癲癇小兒客忤消食
及冷氣並煎服之○主鬼打鬼疰邪氣水漬沫出澄清暖飲
一二盃○炒熱投酒中飲療賊風痙又裹以慰腋下療胡臭
有驗○平肝去怯治善怒發狂

鐵鏽此鐵上赤衣也主治惡瘡疥癬和油塗之蜘蛛蟲咬蒜磨
塗之○平肝墜熱消瘡腫口舌瘡醋磨塗蜈蚣咬

鐵秤鎚氣味辛溫無毒主治賊風止產後血瘕腹痛及喉痺熱
塞燒赤淬酒熱飲○治男子疝痛女子心腹妊娠脹滿胎卒
下血

珊瑚生南海。又從波斯國及師子國來。今廣州亦有。云生海底作枝柯狀。明潤如紅玉。中多有孔。亦有無孔者。枝柯多者更難得。采無時。梵書謂之鉢擺娑福羅。

珊瑚氣味甘平無毒
主治去目中翳消宿
血爲末吹鼻止鼻衄
○明目鎮心止驚癇
點眼去飛絲

唐本草



入藥用紅油色者爲良

漢積翠池中有珊瑚高一丈二尺一本三柯上有四百六十三
條云是南越王趙佗所獻夜有光景

晉石崇家有珊瑚高六七尺今並不聞有此高大者

錢相公篋中方治小兒麩翳未堅不可亂藥宜以珊瑚研爲粉
日少少點之三日愈

石蠏生南海。今嶺南近海州郡皆有之。體質石也。而都與蠏相似。或云是海蠏多年水沫相著化而爲石。每遇海潮即飄出。又一般入洞穴年深者亦然。采無時。

石蟹氣味鹹寒無毒

主治青盲目淫膚瞖丁瞖漆瘡○解一切藥毒并蠱毒天行熱疾催生落胎療血運並熱水磨服○醋摩傅癰腫熱水磨服解金石毒

石蟹　宋開寶



按顧玠海槎録云崖州榆林港内半里許土極細膩最寒但蟹入則不能運動片時成石矣人獲之名石蟹置之几案云能明目也

石蟹（入藥細研水飛過用）

馬腦生西南諸國曹昭格古論云多出北地南番西番非石非玉堅而且脆刀刮不動其中有人物鳥獸形者最貴顧薦負暄録云馬腦品類甚多出産有南北大者如斗其質堅硬碾造費工南馬腦産大食等國色正紅無瑕可作杯斝西北者色青黑寧夏瓜沙羗地砂磧中得者尤奇有柏枝馬腦花如柏枝有夾胎馬腦正視瑩白側視則若凝血一物二色也截子馬腦黑白相間合子馬腦漆黑中有一白線間之錦紅馬腦其色如錦纏絲馬腦紅白如絲此皆貴品漿水馬腦有淡水花醬斑馬腦有紫紅花曲蟮馬腦粉紅花皆價低又紫雲馬腦出和州土馬腦出山東沂州亦有紅色雲頭纏絲胡桃花者竹葉馬腦出淮右花如竹葉並可作卓面屏風金陵雨花臺小馬腦止可充玩耳試馬腦法以砑木不熱者爲真按增韻云玉屬也文理交錯有似馬腦故以名之藏器曰赤爛紅色似馬之腦故名亦云馬腦珠俗呼瑪瑙

（氣味辛寒無毒主治辟惡熨目赤爛○主目生障瞖爲末日點之）

伏龍肝弘景曰此竈中對釜月下黄土也以竈有神故號爲伏龍肝并以迂隱其名爾時珍曰按廣濟曆作竈忌日云伏龍在不可移作則伏龍者乃竈神也後漢書言陰子方臘日晨炊而竈神見形註云宜市買猪肝泥竈令婦孝則伏龍之名義又取此也館安陳輿言砌竈時納猪肝一具于土俟其日久與土爲一乃用之始與名符蓋本于此

（伏龍肝氣味辛微温無毒主治婦人崩中吐血止欬逆血醋調塗癰腫毒氣○止鼻洪腸風帶下尿血泄精催生下胞及小兒夜啼○治心疼狂顛風邪蠱毒妊娠護胎小兒臍瘡重舌風噤反胃中惡卒魘諸瘡）

（伏龍肝别録下品）

（聖惠方治小兒臍瘡久不差用伏龍肝末傳之良）

石灰生中山川谷頌曰所在近山處皆有之燒青石爲灰也又

名石鍛。有風化水化二種。風化者。取鍛了石。置風中自解。此為有力。水化者。以水沃之。熱蒸而解。其力差劣。弘景名石堊。本經名堊灰。別錄名希灰。日華子名鍛石。俗呼白虎。又呼礦灰。

氣味辛溫有毒

主治疽瘍疥瘙熱氣惡瘡癩疾死肌墮眉殺痔蟲去黑子息肉○療髓骨疽○治瘑疥蝕惡肉止金瘡血甚良○生肌長肉吐血白癜癧瘍瘢疵痔瘻瘿贅疣子婦人粉刺產後陰不能合解酒酸治酒毒暖水臟治氣○墮胎○散血定痛止水瀉血痢白帶白淫收脫陰挺消積聚結核貼口喎黑鬚髮

石灰本經下品

大明曰苷無毒獨孤滔曰伏雌黃硫黃硇砂去錫暈

古墓中石灰名地龍骨主治頑瘡瘻瘡膿水淋漓斂諸瘡口棺下者尤佳

艌船油石灰名水龍骨主治金瘡跌撲傷損破皮出血及諸瘡瘻止血殺蟲

集玄方去靨子取石灰炭上熬令熱插糯米於灰上候米化以針刺點少許于上二日而愈

砒石今近銅山處亦有之。惟信州者佳。其塊有甚大者。色如鵝子黃。明澈不雜。此生砒者。謂之砒黃。必得此類。乃可入藥。砒性猛如貔。故名砒。出信州。故名信。而又隱信字為人言。生砒置火上。以器覆之。令煙上飛。着器凝結。纍然下垂如乳尖者。名砒霜。

砒黃氣味苦酸暖有毒主治瘧疾腎氣帶之辟蚤虱○冷水磨服解熱毒治痰壅○磨服治癖積氣○除齁喘積痢爛肉蝕瘀腐瘰癧

砒霜療諸瘧風痰在胸膈可作吐藥不可久服傷人○治婦人血氣衝心痛落胎○蝕癰疽敗肉枯痔殺虫殺人及禽獸

砒石宋開寶

砒石紅色者良

砒霜白色者佳

大明曰畏綠豆冷水醋入藥醋煮殺毒用

時珍曰砒乃大熱大毒之藥砒霜之毒亦烈鼠雀食少許即死貓犬食鼠雀亦死人服一錢許亦死雖鉤吻射罔之毒不過如此而宋人著本草不甚言其毒何哉此亦古者礜石之一種也若得酒及燒酒則腐爛腸胃頃刻殺人雖綠豆冷水亦難解矣今之收瓶酒者往往以砒烟熏瓶則酒不壞其亦嗜利不仁者哉飲酒潛受其毒者徒歸咎于酒耳此物不入湯飲惟入丹藥凡痰瘧及齁喘用此真有劫病立地之效但須冷水吞之不可飲食杯勺之物靜臥一日或一夜亦不作吐少物引發即作吐也其燥烈純熱之性與燒酒焰消同氣寒疾濕痰被其劫而怫鬱頓開故也今烟火家用少許則爆声更大急烈之性可知矣用者宜審

[illegible]出西戎。今西涼夏國及河東陝西近邊州郡亦有之。然西戎者顆塊光明。大者有如拳。重三五兩。小者如指面。入藥用狀如消石明淨者良。李時珍曰。硇砂性毒。服之使人硇亂。故曰硇砂。炳曰。出北庭者為上。故四聲本草名北庭砂。土宿本草云。硇性透物。五金藉之以為先鋒。故號為透骨將軍。

氣味鹹苦辛溫有毒

主治積聚破結血止痛下氣療欬嗽宿冷去惡肉生好肌爛胎亦入驢馬藥用○主婦人大夫羸瘦積病血氣不調腸鳴飲食不消腰脚痛冷痃癖痰飲喉中結氣反胃吐水令人能食肥健○除冷病大益陽事○補水臟煖子宮消瘀血宿食不消食肉飽脹多小便大夫腰胯酸重四肢不任婦人血氣疼氣塊痃痒及血崩帶下惡瘡息肉傅金瘡生肉○去目翳弩肉○消肉積○治噎膈癥瘕積痢骨哽除痣黶疣贅

硇砂唐本草　能變鐵又能制銅爲大青大綠
硇砂色白明亮連石者俗呼者硇又呼夾石硇最優又一種白
色或紅色者狀類硼砂塊俗呼氣硇次之又一種色青底黑
形如鹽塊俗呼鹽硇此其下也

修治宗奭曰凡用須水飛過去塵穢入瓷器中重湯煑乾則殺
其毒時珍曰今人多用水飛淨醋煑乾如霜刮下用

權曰酸鹹有大毒能消五金八石腐壞腸胃生食之化人心爲
血中其毒者生綠豆研汁飲一二升解之畏漿水忌羊血

元素曰硇砂破堅癖不可獨用須入群隊藥中用之

普濟方治目生瘀肉弩出杏仁百箇蒸熟去皮尖研濾取淨汁
入硇砂末一錢水煑化日點一二次自落

硇砂使

鈆生蜀郡平澤。今有銀坑處有之。李時珍曰。錫爲白錫。此爲黑錫。許愼說文曰。青金。而神仙家拆其字爲金公。隱其名爲水中

金。鈆易沿流。故謂之鈆。俗名鉛。

氣味甘寒無毒主治鎮心安神治傷寒毒氣反胃嘔噦蛇蜴所
咬炙熨之○瘰癧瘻瘤鬼氣疰忤錯爲末和青木香傅瘡腫惡
毒○消瘰癧癰腫明目固齒烏鬚髮治實女殺蟲墜痰治膈
噎消渴風癇解金石藥毒

鈆性能入肉故女子以鈆珠紝耳即自穿孔○實女無竅者
以鈆作鋌逐日紝之久久自開此皆昔人所未知者也

黑錫灰主治積聚殺蟲同檳榔末等分五更米飲服

粉錫弘景曰。即今化鈆所作胡粉也。釋名曰。胡者餬也。和脂以餬面也。名定粉。瓦粉。言其形。名光粉。水粉。白粉。言其色。俗呼吴越者爲官粉。韶州者爲韶粉。辰州者爲辰粉。桂林者爲桂粉。

氣味辛寒無毒

主治伏尸毒螫殺三蟲○去鼈瘕療惡瘡止小便利墮胎○治
積聚不消炒焦止小兒疳痢○治癰腫瘻爛嘔逆療癥瘕小
兒疳氣○止泄痢久積痢○治食復勞復墜痰消脹治疥癬
狐臭黑鬚髮

粉錫本經下品　今婦女用之塗面通呼官粉

肘後方治篤病新起早勞復食復欲死者水服胡粉少許
又方治卒從高落下瘀血搶心面青短氣欲死方胡粉一錢和
水服之即安

粉錫使

鈆丹生於鈆。出蜀郡平澤。弘景曰。即今熬鈆所作黃丹也。

氣味辛微寒無毒

主治吐逆胃反驚癇癲疾除熱下氣鍊化還成九光久服通神
明○止小便除毒熱臍攣金瘡血溢○驚悸狂走消渴煎膏
止痛生肌○鎮心安神止吐血及嗽傅瘡長肉及湯火瘡染
鬚○治瘧及久積○墜痰殺蟲去怯除忤惡止痢明目

鈆丹本經下品

三因方治妊娠下痢用烏雞蛋一箇開孔去白留黃入鈆丹五
錢攪勻泥裹煨乾研末每服二錢一服愈是男二服愈是女

海石日華子名浮石。乃海間細沙水沫凝聚。日久結成者。狀如石出海中。故名海石。

氣味鹹平無毒主治煑汁飲止渴治淋殺野獸毒○止欬○去
目瞖○清金降火消積塊化老痰○消癭瘤結核疝氣下氣
消瘡腫



體輕色褐而光有孔如蚌窠海人呼爲海檳榔又呼海石



色白玲瓏市者通呼海石

二色海石功用大同小異

震亨曰海石治老痰積塊鹹能軟堅也時珍曰浮石乃水沫結
成色白而體輕其質玲瓏肺之象也氣味鹹寒潤下之用也

故入肺除上焦痰熱止咳嗽而軟堅清其上源故又治諸淋

水精 生倭國。亦石類也。其形瑩澈晶光。如水之精英。故名水精。一名水晶。

氣味寒無毒主治熨目除熱淚亦入點目藥穿串吞咽中排引
諸哽物出

水精色似水明亮

[illegible] 此屋之西壁向東土也。蓋謂西壁東面。得太陽真火烘炙則少陽之氣壯。及午則壯陽之氣衰。故不用南壁而用東壁。

氣味甘溫無毒
主治下部瘡脫肛○止洩痢霍亂煩悶○溫瘧點目去瞖同蜆
殼爲末傳豌豆瘡○療小兒風臍○摩乾濕癬極効
東壁土則録下品　世人泥東字多用東墻土非也

昔一女子忽嗜河中汚泥日食數盌玉田隱者以壁間敗土調
水飲之遂愈

赤銅屑 即打紅銅落下末也。或以紅銅火鍛水淬。亦自落下。以水淘淨。用好酒入沙鍋炒見火星。取研末用。俗呼銅末。時珍曰。銅與金同。故字從金同也。

赤銅屑氣味苦平無毒主治賊風反折熬使極熱投酒中服五
合日三或以五斤燒赤納二斗酒中百遍如上服之又治腋
臭以醋和如麥飯袋盛先刺腋下脉去血封之神効○明目
治風眼接骨銲齒療女人血氣及心痛○同五倍子能染鬚
髮

赤銅屑唐本草

慎微曰朝野僉載云定州崔務墜馬折足醫者取銅末和酒服
之遂差及亡後十年改葬視其脛骨折處猶有銅束之也

自然銅 生邕州山巖中出銅處。今信州火山軍皆有之。於銅坑中及石間採之。方圓不定。其色青黃如銅。不從鑛鍊。故號自然銅。

氣味辛平無毒主治折傷散血止痛破積聚○消瘀血排膿續
筋骨治產後血邪安心止驚悸以酒摩服



自然銅宋開寶　堅明有稜者佳

修治自然銅以火煆醋淬七次研爲細末水飛過用
宗奭曰有人以自然銅飼折翅胡鴈後遂飛去今人打撲損傷
研細水飛過同當歸沒藥各半錢以酒調服之仍以手摩痛
處

古鏡 一名鑑。李時珍曰。鏡者。景也。有光景也。鑑者。監也。監於前也。軒轅內傳言。帝會王母。鑄鏡十二。隨日用之。此鏡之始也。或云。始於堯臣尹壽。

古鏡氣味辛無毒主治驚癇邪氣小兒諸惡煑汁和諸藥煑服
文字彌古者佳○辟一切邪魅女人鬼交飛尸蠱毒催生及
治暴心痛並火燒淬酒服　百蟲入耳鼻中將鏡就敲之即出
○小兒疝氣腫硬煑汁服

漢宣帝有寶鏡如八銖錢能見妖魅帝常佩之

孟昶時張敵得古鏡徑尺餘照寢室如燭舉家無疾號無疾鏡

漢高祖得始皇方鏡廣四尺高五尺表裏有明照之則影倒見
以手捧心可見腸胃五臟人疾病照之則知病之所在女子
有邪心則膽張心動

宋史云泰寧縣耕夫得鏡厚三寸徑尺二照見水底與日爭輝
病熱者照之心骨生寒

錄云　師王氏有鏡六鼻常有雲烟照之則左右前三万

（尹皆見賊巢将至照之兵甲如在目前筆談云吳僧一鏡照之知未来吉凶出處又有火鏡取火水鏡取水皆鏡之異者也）

古文錢

時珍曰但得五百年之外者即可用唐高祖所鑄開元通寶得輕重大小之中尤爲古今所重綦母氏錢神論云黃金爲父白銀爲母鉛爲長男錫爲適婦其性堅剛須水終始體圓應天孔方效地此乃鑄錢之法也管子言禹以歷山之金鑄幣以救人困此錢之始也至周太公立九府泉法泉體圓含方輕重以銖周流四方有泉之象故名曰泉後轉爲錢

氣味辛平有毒

主治瞖障明目療風赤眼鹽鹵浸用婦人生產橫逆心腹痛月膈五淋燒以醋淬用○大青錢煑汁服通五淋磨入目主盲盲障膚赤和薏苡仁根煑服止心腹痛

昔有患赤目腫痛數日不能開者客有教以生薑一塊洗淨去皮以古青錢刮汁點之初甚苦熱淚蔑面然終無損後有患者教之往往疑惑信士點之無不一點即愈但作膚者不可用也

戲術用開元錢一般厚大十箇八箇一面貼成金的一箇二面貼成金的一箇本色的做與人看時將九箇本色的擺開惟壓蓋住二面金錢一箇着都是本色錢釋在手中偷轉下面過喝聲變金錢將金面九箇攄開後一錢復壓蓋住本色錢一箇則惟見金錢名曰大變金錢

代赭石

生齊國山谷今河東京東山中亦有之以赤紅青色如雞冠有澤染爪甲不渝者良別錄曰出代郡者名代赭時珍曰

赭赤色也代即鴈門也今俗呼爲土朱鐵

氣味苦寒無毒

主治鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒邪氣女子赤沃漏下○帶下百病產難胞不出墮胎養血氣除五臟血脉中熱血痺血瘀大人小兒驚氣入腹及陰痿不起○安胎建脾止反胃吐血鼻衄月經不止腸風痔瘻瀉痢脫精遺溺夜多小兒驚癇疳疾金瘡長肉辟鬼魅

代赭石本經下品

時珍曰修治今人惟煅赤以醋淬三次或七次研水飛過用

好古曰代赭入手少陰足厥陰經時珍曰乃肝與包絡二經血分藥也

之才曰畏天雄附子乾薑爲之使

昔有小兒瀉後三日不乳目黃如金氣將絕有名醫曰此慢肝驚風也宜治肝用水飛代赭石末每服半錢冬瓜仁煎湯調下果愈

相感志云代赭以酒醋煑之揷鐵釘于內扇之成汁

石鷰

出零陵郡今永州祈陽縣江傍沙灘上有之狀類鷰而有文乃石類也故名石鷰

氣味甘凉無毒主治淋疾煑汁飲之婦人難產兩手各把一枚立驗○療眼目障瞖諸般淋瀝久患消渴臟腑頻瀉腸風痔瘻年久不瘥面色虛黃飲食無味婦人月水湛濁赤白帶下多年者每日磨汁飲之一枚用三日以此爲準亦可爲末水飛過每日服半錢至一錢米飲服至一月諸疾悉平

石鷰唐本草



徐氏家傳方治婦人赤白帶下多年不止用石燕一枚磨水服

之江効

雨水時珍曰地氣升為雲天氣降為雨

氣味鹹平無毒○立春雨水主治夫婦各飲一盃還房當獲時有子神效

宜煎發散及補中益氣藥

露水時珍曰露者陰氣之液也夜氣着物而潤澤於道傍者也

氣味甘平無毒主治秋露繁時以槃收取煎如飴令人延年不飢

稟陰殺之氣宜煎潤肺殺祟之藥及調疥癬蟲癩諸散

臘雪按劉熙釋名曰雪洗也洗除瘴癘蟲蝗也凡花五出雪花六出陰之成數也冬至後第三戊為臘臘前三雪大宜菜麥又殺蟲蝗臘雪密封陰處數十年亦不壞用水浸五穀種則耐旱不生蟲洒几席間則蠅自去淹藏一切果食不蛀蠹豈非除蟲蝗之驗乎

氣味甘冷無毒主治解一切毒治天行時氣溫疫小兒熱癇狂啼大人丹石發動酒後暴熱黃疸仍小溫服之○洗目退赤○煎茶煮粥解熱止渴○宜煎傷寒火暍之藥抹痱亦良

藏器曰春雪有蟲水亦易敗所以不收

夏冰時珍曰冰者太陰之精水極似土變柔為剛所謂物極反兼化也故字從水從仌

氣味甘冷無毒主治去熱煩熨人乳石發熱腫○解煩渴消暑毒○傷寒陽毒熱盛昏迷者以冰一塊置於膻中良亦解燒酒毒

宋徽宗食冰太過病脾疾國醫不效召楊介診之介用大理中

丸上曰服之髮矣介曰疾因食冰臣因以冰煎此藥是治受病之原也服之果愈

[illegible]東流水甘爛水一名勞水

氣味甘平無毒主治病後虛弱揚之萬過煮藥禁神最驗○主五勞七傷腎虛脾弱陽盛陰虛目不能瞑及霍亂吐利傷寒後欲作奔豚

逆流水主治中風卒厥頭風瘧疾咽喉諸病宣吐痰飲

藏器曰千里水東流水二水皆堪蕩滌邪穢煎煮湯藥禁呪神鬼潢汙行潦尚可薦之王公況其靈長者哉

時珍曰勞水即揚泛水張仲景謂之甘爛水用流水二斗置大盆中以杓高揚之千萬遍有沸珠相逐乃取煎藥蓋水性本鹹而體重勞之則甘而輕取其不助腎氣而益脾胃也

虞摶醫學云甘爛水甘溫而性柔故烹傷寒陰證等藥用之順流水性順而下流故治下焦腰膝之證及通利大小便之藥用之急流水湍上峻急之水其性急速而下達故通二便風痺之藥用之逆流水洄瀾之水其性逆而倒上故發吐痰飲之藥用之也

宗奭曰東流水取其性順疾速通膈下關也倒流水取其回旋流止上而不下也

井華水將旦首汲曰井華

氣味甘平無毒主治酒後熱痢洗目中膚翳治人大驚九竅四肢指岐皆出血以水噀面和朱砂服令人好顏色鎮心安神治口臭堪鍊諸藥石投酒醋令不腐○宜煎補陰之藥○宜煎一切痰火氣血藥

新汲水無時初出曰新汲

主治消渴反胃熱痢熱淋小便赤澁却邪調中下熱氣並宜飲之射癰腫令散洗漆瘡治墜損腸出冷噴其身面則腸自入

也又解閉口椒毒下魚骨哽〇解馬刀毒〇解砒石烏喙燒酒煤炭毒治熱悶昏瞀煩渴

禹錫曰凡飲水療疾皆取新汲清泉不用停汚濁煖非直無效亦且損人

虞摶曰新汲井華水取天一真氣浮於水面用以煎補陰之劑及鍊丹煑茗性味同於雪水也

濟急方治中暍汗毒飲冷水即安

南史云將軍房伯玉服五石散十許劑更患冷疾夏月常復衣徐嗣伯診之曰乃伏熱也須以水發之非冬月不可十一月氷雪大盛時令伯玉解衣坐石上取新汲冷水從頭澆之盡二十斛口噤氣絶家人啼哭請止嗣伯執撾諫者又盡水百斛伯玉始能動背上彭彭有氣俄而起坐云熱不可忍乞冷飲嗣伯以水一升飲之疾遂愈自爾常發熱冬月猶單衫體更肥壯

[illegible]弘景曰此掘黃土地作坎深三尺以新汲水沃入攪濁少

頃取清用之故曰地漿亦曰土漿。

氣味甘寒無毒主治解中毒煩悶〇解一切魚肉果菜藥物諸菌毒療霍亂及中暍卒死者飲一升妙

熱湯乃百沸湯也一名麻沸湯一名太和湯。

氣味甘平無毒主治助陽氣行經絡〇熨霍亂轉筋入腹及客忤死

汪頴云熱湯須百沸者佳若半沸者飲之反傷元氣作脹或云熱湯漱口損齒病目人勿以熱湯洗浴凍僵人勿以熱湯濯之能脫指甲銅瓶煎湯服損人之聲

漿水嘉謨曰漿酢也炊粟米熱投冷水中浸五六日味酢生白花色類漿故名漿水俗呼酸漿。

氣味甘酸微溫無毒主治調中引氣宣和強力通關開胃止渴霍亂洩利消宿食宜作粥薄暮啜之解煩去睡調理腑臟煎令酸止嘔噦白人膚體如繒帛〇利小便〇浸至敗者害人

[illegible]土凹積留不見流動者是也。

甘無毒主治脾胃虛損

[illegible]一名上池水弘景曰此竹籬頭水及空樹穴中水也戰國策云長桑君飲扁鵲以上池之水能洞見臟腑注云上池水半天河也。

氣味甘微寒無毒主治鬼疰狂邪氣惡毒〇洗諸瘡〇主蠱毒殺鬼精恍惚妄語與飲之勿令知之〇槐樹間者主諸風及惡瘡風瘙疥痒

宗奭曰半天河水在上天澤之水也故治心病鬼疰狂邪氣惡毒

[illegible]江北諸山往往有之以盱山出者爲佳有青白二種以青者爲佳堅細而青黑打開中有白星點煆後則星黃如麩金時珍曰其色濛濛然故名俗呼青礞石。

氣味甘鹹平無毒

主治食積不消留滯臟腑宿食癥塊久不瘥小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得巴豆硇砂大黃荊三稜作丸服良〇治積痰驚癇欬嗽喘急

修治礞石用大坩鍋一箇以礞石四兩打碎入消石四兩拌勻炭火十五斤簇定煆至消盡其石色如金爲度取出研末水飛去消毒晒乾用

衍生方治小兒急驚青礞石磨水服

礞石宋嘉祐



梁上塵凡使須去煙火大遠高堂殿上倒掛塵篩取末用之俗呼烏龍尾象形也

氣味辛苦微寒無毒主治腹痛噎膈中惡鼻衄小兒軟瘡○消積食止金瘡出血齒齦出血鼻中息肉吹之

百草霜此乃竈額及煙筒中墨煙也其質輕細故謂之霜

氣味辛溫無毒主治消積滯止上下諸血婦人崩中帶下胎前產後諸病傷寒陽毒發狂黃疸瘧疾噎膈咽喉口舌一切諸瘡

墨古者以黑土爲墨故字從黑土許慎說文曰墨煙煤所成土之類也故从黑土

氣味辛溫無毒主治止血生肌膚合金瘡治產後血運崩中卒下血醋磨服之又止血痢及小兒客忤搗篩溫水服之又眯目物芒入目點摩瞳子上○利小便通月經治癰腫

松煙墨方可入藥

千金方治飛絲入目磨濃墨點之即出

花乳石頌曰出陝州閿鄉縣體至堅重色如硫黃形塊有極大者人用琢器采無時宗奭曰黃石中間有淡白點以此得花之名圖經作花蘂石是取其色黃也

氣味酸濇平無毒

主治金瘡出血刮末傅之即合仍不作膿又療婦人血運惡血治一切失血傷損內漏目中瞖

修治以罐固濟頂火煅過出火毒研細水飛晒乾用



花蘂石宋嘉祐

今市者通是白石黃點

頌曰花蘂石古方未有用者近世以合硫黃同鍛研末傅金瘡其效如神又人倉卒中金刃不及鍛合但刮末傅之亦效

不灰木出上黨今澤潞山中皆有之蓋石類也其色青白如爛木燒之不然以此得名

氣味甘大寒無毒主治熱痱瘡和棗葉石灰爲粉傅之○除煩熱陽厥

爐甘石川蜀湘東最多太原澤州陽城高平靈丘融縣及雲南者爲勝金銀之苗也其塊大小不一狀類滑石鬆如石脂亦粘舌其色微黃者爲上產于銀坑者其色白或帶青或帶綠或粉紅赤銅得之即變爲黃今之黃銅皆此物點化也九天三清俱尊之曰爐先生非小藥也時珍曰爐火所重其味甘故名爐甘石

氣味甘溫無毒主治止血消腫毒生肌明目去瞖退赤收濕除爛同龍腦點治目病

爐甘石新增



俗呼片子爐甘



俗呼羊腦爐甘

修治以炭火煅紅童子小便淬七次水洗淨研粉水飛過晒用凡用以片子者爲勝

時珍曰爐甘石陽明經藥也受金銀之氣故治目病爲要藥

通妙邵真人方治下疳陰瘡用爐甘石火煅醋淬五次一兩孩兒茶三錢爲末脂麻油調傅立愈

集玄方治齒疏陷物爐甘石煅寒水石等分爲末每用少許擦

牙忌用刷牙久久自寄

硼砂生西南畨有黃白二種○西者白如明礬○南者黃如桃膠○或云鍊出盆中結成○謂之盆砂○日華子名蓬砂○又名鵬砂○俗呼硼砂○

氣味苦辛暖無毒主治消痰止嗽破癥結喉痺○上焦痰熱生津液去口氣消障翳除噎膈反胃積塊結瘀肉陰㿗骨哽惡瘡○口齒諸病

獨孤滔曰制汞啞銅結砂子○土宿真君曰知母鵞不食草芸薹紫蘇甑帶何首烏皆能伏蓬砂同砒石煆過有變化

鄱陽汪友良因食辣蹄誤吞一骨如小指大硬于咽喉間隱然見于膚革引手揣摸百計不下累日咳嗽作痛僅能進湯飲家人憂之於昏睡次睹一人著朱衣來告曰汝爲骨所苦吾有一藥唯南硼砂最妙洸惚驚悟謂非夢也殆神明陰授以方欲全其命宗藥筒得砂小塊汲水滌洗取而含化纔食頃形然而失（出壬志）

[illegible]此石色白○形如鵝管○故名○

氣味甘平無毒主治肺寒久嗽痰氣壅膈兼治痔瘡

鵝管石新增



鵝管石狀如鵝管中有空心色純白根上多紋稍上光淨入藥（火煆細研）

[illegible]出嶺南○今越州信州亦有之○本經云○是蛇腹中得之○圖

如錫○黃黑青雜色○注云○多赤色○有吐出者○野人或得之○今醫家用者大如彈九○堅如石○外黃內黑色○二月采○唐本草載名曰蛇黃○

氣味冷無毒主治心痛疰忤石淋小兒驚癇婦人產難以水煮研服汁○鎮心○磨汁塗腫毒

蛇黃唐本草



修治大明曰凡用蛇黃入藥燒赤醋淬三四次研末水飛過用

危氏得效方治暗風癇疾忽然仆地不知人事良久方醒蛇黃火煆醋淬七次爲末每酒調服二錢數服愈年深者亦效

時珍曰蛇黃生蛇腹中正如牛黃之意世人因其難得遂以蛇含石代之

庚辛玉冊云蛇含自是一種石云蛇入蟄時含土一塊起蟄時

化作黃石不稽之言也

[illegible]所在有之○生土石間○狀如薑○有五種○以色白而爛不磣者好○齊州歷城東者良○時珍曰○薑石以形名○

氣味鹹寒無毒

主治熱豌豆瘡丁毒等腫

宗奭曰所在皆有須不見日色旋取微白者佳

修治猛烈火燒醋淬數乾研爲細末用

崔氏方治丁毒腫痛白薑石末和雞子清傅之乾即易丁自出神驗

薑石唐本草



收采不拘時